





INGRASSE
DE
TUMORIBUS


1553








3416
D





42678

IOANNIS PHILIPPI INGRASSIAE

SICVLI RACHALVTENSIS, DE TVMORIBVS PRAETER
NATVRAM TOMVS PRIMVS. IN QVO GENERATIM TVMO-

rum omnium Præternaturalium species: præsertimq; earum nomina & definitio-

nes, atq; etiã causæ, multaq; generalia declarantur. Græciq; & Latini, &

Arabes, quatenus ad hæc ipsa pertinet, enucleantur. Occasione sum-

pta ab Auicennæ uerbis, Arabum Medicorum Principis, Tertia

Fen Quarti Libri, Tractatu Primo. Cuius interim unis

uersum Primum Caput in hoc Tomo elucidatur.

Reliqua in sex alijs Tomis declarabuntur:

quos Elenchus pagina duodeci-
ma demonstrabit.



AVTHORIS INSIGNIA.

NE quiuis alius impunè uel hic, uel usquam locorum hos septem de tumoribus præter naturam
tomos, uel imprimat, uel impressos, uenales afferat: Iulij Tertij Pontificis Maximi, ac Cæsareæ
Maies-tatis Caroli Quinti Priuilegijs cautum est per decénium, ut omnia perdat uolumina, & præ-
terea .300. aureos soluat, pro quolibet uolumine. quorum duæ partes Apostolicæ Cameræ, uel
Regio Fisco, Tertia Authori, Quartaq; accusatori debetur. 1553.

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN

THE PHILIPPI INDIAN



AT THE PHILIPPI INDIAN

NE PHILIPPI INDIAN



Omnia tuta manent: æqua per libro balance: Iustitiam quæris? Me quæras, Desero nunquam.
Distribuo cunctis quæ sibi conueniunt. Deserit hæc non me: semper inesse puta.

ILLVSTRISSIMO EXCELLENTISSIMO'QUE DOMINO

NO. D. PETRO TOLETÒ, MARCHIONI VILLAE FRAN-

cæ, Neapolitaniq; Regni iussissimo, nec non dignissimo Proregi, Atq;

inuietissimo Cæsareæ, & Catholicæ Maiestatis Locumtes-

nenti, Ioannes Philippus Ingrassias, Siculus,

Rachalbutensis Salutem.



QVOT Hominum tyrannica perniciēs, acerbaq; (familiaris tamen ac stipēdio conuocata) lues multis abhinc annis exorta nostram ad ætis tem usq; peruenerit (Excellentissime Principum omnium Coryphæ, ac uerè Monarcha) ob nimiam, quam addicti, inconsultiq; Medici, & præsertim Chirurghi, Barbaris, corruptisq; ac mirum in modum deprauatis caudicibus fidem adhibuerunt: Cum regredi mortuis iustitiam ab Excellentia tua, contra Medicos petitis permissum non sit: Ex ijs tamen, quæ dicenda, hoc in libro proponuntur, promptissime liquebit. In primis enim etiamsi plures hodie priscam, & perpetuò uenerandam Hippocratis, Galeniq; blattis iam, tinceisq; derosam

10 Medicinam suscitantes, atq; è tenebris in lucem reuocantes doctissimi, & utrumq; idioma callentes Medici omnibus neruis propalare conantur: Haudquaquam nihilominus durissima ceruicis, & refractaria Mineruæ homines defunt, Quos non modò Aesculapius, sed ne Musarum quidem pater, unà cum Pegasidibus ab incurabili stultitiæ morbo, calloscq; iam animi scirrbo curare unq; potuerint, Tyrannico tamen aspectu, ac perfricta mediis fidius fronte, usq; adeò non Auicennam modò Barbarorum non iniuria Principem, sed Razem quoq; maximum expertorem ab ipsis nuncupatum, diuinumq; & Euangelistam (prout nonnulli uo-

4
 eant) Mesuem, Quodq; peius est, Dinulum, Gentilem, Forliuensem, Matthæum à Gradi-
 bus, Atq; (ut summam deniq; perstrinxerimus) cunctos Barbarorum, tametsi ineptissi-
 mos interpretes, tanq; orthodoxos, omnisq; uel q; minimi erroris penitus expertes ad usq; sy-
 dera, summis encomijs extollunt: ut repertis iam, uel (rectius dixerim) post tot, tantasq;
 ærummas, inuentis quidem saluberrimis, concoctūq; facillimis frugibus, malint nihilominus
 adhuc in insalubriū, durissimorūq;, & coctioni rebellium gladium usu, porcorum instar, grun-
 niendo consensescere. Aded ut pluribus morbis (quorum non dico substantiam, speciesq;, ac
 symptomata, & sedem affectam, sed in primis nomen ipsum ignorant) aduersissima, &
 prorsus insaluberrima indies, ad lethum usq;, medicamenta tum interiūs, tum exteriūs admo-
 ueant. Publiceq; interim in scholis horum nonnulli discipulos erudientes, uel (si exquisitiūs 10
 loqui tentauerimus) illos, more suo, rudere docentes, mali corui mala quoq; (ut in prouer-
 bio dicitur) oua passim producere enitantur. Garrientes interim, dicentesq; in nullis Auicen-
 nam ab Hippocratis, Galeniq; methodis, simplicibusue, aut compositis medicamentis, quem-
 admodum neq; in Anatomicis administrationibus uarium extitisse. Quauis interea magis
 & à uero, & à Medicinæ fundatoribus uarium ipsimet suis ineptissimis expositionibus, uel
 (ut rectius dixerim) confusionibus reddant. Quod si alicubi diuersum esse sorte quadam
 offenderimus, Non sine ualidissima ratione factum id esse opinantur. Placuit enim Principi,
 & quidem serio contradicere. Absit ergo (aiunt) ab auribus nostris quempiam illi uel
 minimū errorem impingere. Sed quis est (cristam deinde tollentes inquirunt) qui Principis no-
 stri erratum uel per somnium indigitare queat? Multi enim audacter, osceq; loquentes Ara- 20
 bum expertissimam academiam uituperant, ac tanq; innumeris erroribus saburratam abhor-
 rent: Velimus tamen ut unam, uel duas saltem nobis interdum falsitates, in tam ueridico Me-
 dicorum Principe indigarent. Sic enim illis, suoq; Galeno palmam exhiberemus: Omisissq;
 Arabum, et horum intemptum liminibus, Græcorum uestigia sequeremur. Atqui (syn-
 crusio risu adiungunt) id ipsum nobis mirum in modum, oppidoq; displicet: Quoniā hi Prin-
 cipem Medicorum Auicennam, Razem, Serapionem, Mesuem, aliosq; Arabes nauscant:
 Demptis tamen Barbaris, nesciunt suo cum nugiuendo Galeno, siue (ut malunt) Galieno
 simplex clysterium ordinare. Sicq; corridentes, uel potius corrudentes, alto celeusmate sibi
 ipsis inuicem applaudunt, Galenum suis cum affectis quotidie floccipendentes, atq; tetrico
 demum uultu concludunt, Quid nobis cum nugigerulo, fabulatoreq; Galeno? Quod medica- 30
 mentum ægrotis eo docente præcipiemus? Nihil enim præter Mesuæ antidota passim usur-
 pantes Medicos practicos aspeximus. Intantum igitur eius uiri, cæterorumq; Arabum com-
 positiones extollunt: ut si quispiam Galeni, Pauliue, Oribasij, uel Celsi, aut cuiusuis anti-
 quioris tum Græci, tum Latini quapiam uti medicaminis compositione malit, hunc tanq; deli-
 rum, & à recto declinantem uehementer increpent. Etiam si ex illorum fortassis imitatione
 salutem, ex Barbarorum uerò sequela interitum succedere manifestissimè cōspicerēt Quin-
 immò (si exquisitiūs & abiecta larua perlibrarimus) quanq; ab Auicenna uocato, cæterisq;
 antiquioribus Arabibus ipsemet Mesuas, & reliqui omnes Barbarolatini, quos uulgò practi-
 cos uocant, à Galeno Medicorum primo, post Hippocratem, spirarcho, alijsq; Græcis (pluris
 bus interim, quod peius est, interpositis mendis, & periculosis uita humanæ deprauas 40
 tionibus) transcripserunt: Hi tamen Barbaro tanq; (ut aiunt Euangelistæ primam compos-
 nendi

nendi gloriam temerè præbent. Innumeraq; deinceps usq; adeò nefanda connectunt: ut in memoriam ea reuocans, erodi uiscera uel inuitus sentiam. Vtinam uerò & hos, quos infes qui gloriantur, Barbaros intelligerent. In quamplurimis. n. aliud nil, q; Galeni exactissimas leges illi uoluerunt, à quo transcripsisse credebant. Hi tamen interpretis nomine gloriosi uariasq; interim sibi chimæras depingentes, innumera passim nec uera, nec Authoris menti conformia phantasmata, absq; ullo dicendi scopo, ebriorum, & in tenebris palpantium ritu, aceruant. Perindè ut ijs perpensis, quæ declaranda hic sunt, compertissimum fiet; pluresq; Chirurgorum (ut existimant) proton Dinutium, cui tantum temeriter tribuunt, ad lapidem offendere inuenimus. Sic enim diminutiue Dinutium, Dinellum'ue, aut Dinulum nūcupasse nobis placuit: Quoniam iuuenculus adhuc, & qui unico duntaxat anno Medicinæ incubuerat, Neq; dum doctoris insignia meritis, nisi postq; alios deinde quatuor annos studuerit (prout ipsemet^a confessus est) quum totam tertiam (de tumoribus uidelicet) Fen, tra
10 etatum ue, & magnam quoq; quartæ partem exponere conatus est. Ut hinc facile uel cæci
conspiciant morionum Chirurgicorum fatuitates, qui talem uirum, taliaq; scribentem perfricta fronte usq; adeò extollunt, ut Galeni, & Hippocratis quoq; nedum aliorum priscorū authoritati præponant. Ex altero autem latere q; plurimos adeò Galeni, Pauli, ac cæterorum omnium Græcorum, nedum Hippocratis, monumenta extollentes offendimus: ut non minus, q; euangelica dicta ab omnipotentissimo, sapientissimoq; Redemptore nostro, ipsaq; (ut breuiter dixerim) summa ueritate prolata reputent. Quinimmo potius in Euangelicis
20 monumentis, q; in Græcorum, præsertimq; Galeni dogmatibus quidpiam ueritati dissonum reperiri, suis insanis auribus percipere sustulerint. Cum tamen additos esse non semel Galenus^b reprobavit. Ut qui tametsi Hippocrati deditissimus esset, Hippocraticum tamen se dici minime sufferebat. Hominesq; adeò ad hallucinandum promptos, atq; natura pro cliues determinauit.^c Ut qui uis ab errore liber, immunisq; sit: diuinus potius, q; humanus reputandus omnino fuerit. NOS autem qui ad nullius uerba, Galeni quoq; instar (si murem licet elephanto conferre) iurati sumus: & si maxima ex parte Galenum, ipsiusq; interpretatione Hippocratem sectamur. Quippe id ipsum non nisi quia horum dogmata tum rationi conformiora, tum à contradictionibus, calumnijsq; remotiora existunt. Perindè atq; Aristotelis quoq; monumenta cum Alexandro Auerrhoes^d extitisse (abiectis reliquorum omnium
30 decretis) comprobauit. Ex quo non temerè quemadmodum Aristoteles philosophorum, post Platonem, spirarchus: Ita etiam Galenus medicorum non iniuria, post Hippocratem, Coryphæus, nominandi ueniunt. Veritate nihilominus (pro cuius defensione, propria quoq; ipsius met Philosophi^e testimonio, impugnare licet (uel Hippocrati, uel Galeno manifestius refragante, In ijs quidem, quæ per semetipsa intantum liquent, ut ab omnibus etiam Medicinæ candidatis, deducto quouis animo obtenebrante liuore, iudicari facillimè queant: Non Arabes modò, uerum illos quoq; primos Medicinæ parentes tametsi rarissimè cōtinget) reuelata fronte, præsentiq; animo postergabimus. In ijs inq; quæ per semetipsa liquent. In arduis .n. abstrusisq; sententijs, nostræ potius ignorantie, intellectusq; caligini, & imbecillitati attribuemus, q; tantos condemnare uiros, Pandeleti more, audeamus. IMPOSITO igitur nostris
40 humeris, licet indignis, ab Excellentia tua utriusq; medicinæ, hoc in publico Neapolitano Studio, tum Theoricæ, tum Practicæ (ut uocant) partis onere: Hortanteq; deinceps, & ue-

a 4^a. 4^a in fine
ne exponis fuer.

b Vt colligitur in bello de libris proprijs cap. 2. contra Martialis, & uide libello de facultatib; naturalib; substantiæ circa medium. c Ut p^o. lib. 1. de irapologie nostre uersus finem, pluribus authoritatibus ostensum est. d 2. cæli. cō. p^o. et. 12. meta. 18. e p^o. Ethicorum 17^o.

luti calcaribus irritante tuo Medicorum omnium huiusce temporis coryphæo; MARINO SPINELLO, Rarissimo inq; Naturæ miraculo. Cui quidem non temerè Excellentia tua, uniuerſaq; huius Regni nobilitas longè magis, q̃ Aesculapio, innumeris, admirandisq; experimentis commota confidit. Quò ueritas in omnibus ferè, quæcunq; ad Medicum ſpes Etant, pro imbecillimis noſtris uiribus, noſtræq; ſcientiæ meſura, eluceſcat. (Omiffa interim cuiuſlibet uel Græci, uel Latini, aut Barbari affectione, liuoreq;) & ineptiſſimis inde, ignauiffimisq; morionibus reſpondeamus, & innumeras inſimul miſerculis ingenijs errandi occaſiones, & cum quotidiano mortalium periculo præſumptiones deleamus: Auicennæ priùs, quem Barbari ſuum ueluti Principem non temerè uenerantur (Maior enim inter Arabum monumenta in huius operibus doctrina reperitur) caliginem elucidare, Barbaroq; ſub cortice dulciſſimos interdum nucleos emedullare, nec non plurimos errores deſtegere decreuimus, tametſi non ingenijs ſemper, doctrinæ ue deſectū: Sed magna ex parte traducentium è Græco in Arabicum, aut ex Arabico rursus in Latinum fortaiſſis corruptione, ac uitio contingerent. E quibus quidem rudis, indigeſtæq; interpretum molis fatuitates euſtigio perſemetipſas eluceſcent. Atq; in ijs præſertim, quæ Chirurghi multis abhinc annis uelut ſui muneris propria, ob multorum Phyſicorum imperfectionem, rapta poſſeſſione uſurparunt. In ijs inq; præ cæteris inſuſaſſe certum eſt, primitusq; commentaria propalare, tum quia plures longè in ijs, tertia ſcilicet, quarta, & quæ uerè Chirurgorum, ut uidebimus, aliasq; ſ prædiximus, eſt quinta Fen uocata, & errores, & obſcuritates paſſim obſeruantur: tum quia tumorum, uulnerumq; & ulcerum, nec non fracturarum, & luxationum elucidationes Excellentia tuæ perfectum Chirurgum (cui iam dimiſſa penitus horum curatio fuit) exoptanti gratiores fore nobis retulerunt. Vbi quidem perfectiſſimos iam uocatos Phyſicos, DEI Optimi Maximi munere, gratia ue obtinuit. Quaq; ſuis interim laudibus deſraudare Neapolim uiderer, Niſi plures me Hercle tam doctrina, q̃ experientia celeberrimos eam obtinuiſſe conſiterer. Ab horum itaq; commentariorum lucubrationibus exordiendum omnino duximus. A tumoribus præter naturam, præ cæteris aſſumpto initio. Quorum elucidatio maximum (ut ſpero) morborum numerum, cumulum ue tam ſimplicium, q̃ compoſitorum amplectetur. Quoniam ex triplici (ut uidebimus &) morborum genere tumor ipſe præter naturam compoſitus eſt. Eoq; promptius ad huiusmodi tractationem conuertar, quia tertiam hanc quarti libri Fen tractatum ue magnum de præter naturam tumoribus tractantem ſtipendio conducti Chirurghi, Neapolitano in ſtudio, publice quotannis interpretari conſueuerunt. Vt ex noſtris ijs laboribus chirurgicam partem deſcenter, & exquisitè proſiteri cupientibus ueluti Ianua quædam reſeretur. Vnde totius quidè domus illuminatio reſultat. Mox uerò deinde, ſi & Excellentia tuæ priùs, & poſtea legentibus nonnihil gratitudinis præſeſſe cognouerimus, obtenta Summi Redemptoris gratia, reliqua in lucem ædere accingemur. Hippocratem interea, Galenūq; inſimul, nec non Paulum, & Aetium, cæterosq; non Græcos modò, ſed Romanos etiam, quin & Arabes Barbaros ue plurimos, ubi difficultas occurreret, enarrantes: Siq; nonnihil ſuſpectum interciderit, alacri fronte, præſentiq; animo, pro ueritatis amore, pernotantes. Quod ſi malè ad nos horum quiſpiam conuerſus ſit: uel fortè ſibimet ipſi alicubi aduerſus extitiſſe apparuerit, uel alteri fortaiſſis authori, ſiue ſua ſponte, ſiue præter intentionem contradixiſſe inuenietur:

f lib. 2. Iatrapo-
logia. cap. 5.

g. Infra fol. 18.
lin. 8. & 71.
33. 27. 2. 40. 75.
25.

nietur: Traductiones corrigere pro uiribus enitemur, contradictiones uero siquidem sedari poterunt, conciliabimus: sin autem nequeunt, potiore semper, ac rationi conformiore selecta, reliquam condemnabimus. Sed ne præternaturalium quidem tantummodo tumorum cognitio simpliciter disquiretur: At propè omnium morborum, quatenus uidelicet aliquo modo tumoribus adnecti solent. Quibus porro cognitis, ad curationem quoque accingemur. Adeo ut cuncta comprehendens liber hic, TV MORIS quoque naturam præseferat.

VERVM enim uero ni sibi potentissimū defensore, Tutanum ue impetrarit, ab innumeris Philippomastigibus usque adeo non leui quidē rabie mordebitur: ut longè plura stigmata recepturus sit, quàm literulas offeret. Namque si Iatràpologia tribus abhinc annis in lucem æditæ illius

10 strissimum dominum Ioannem à Vigintimilijs Heroem proculdubio non satis à nobis laudatum, ueluti patronū, fautoremque inuocauimus: Vbi aduersum triuiales quosdam chirurgis culos, rudesque duodecim numero mediculos disputabamus: Quid in hac multo maiori prouincia nostris humeris ultra uires imposita quæsimus agendum? Cum & Arabum Principem, & innumeros ferè famosissimos eius interpretes: Quin & Serapionem aliquando, & Razem, Hali Abbatem, Albucasim, Mesuem, ac demum cunctos ex Barbarica secta Medicos, tam priscos, quàm recentiores, in quibus pluribus turpiter defecisse contendamus? Immo & nonnunquam Celsum, ac Plinium maximæ notæ uiros, aliosque interdum uel Latinos, uel etiā Græcos obelisco pernotare certum sit. Adeo ut nec ipsi, quem antea Medicorum, excepto Hippocrate, Coryphæum nominauimus, Galeno parcentes, dicamque uel inuitus neque nostro philosophantium Medicorum protoplasto Hippocrati, ubi fortassis occurret, indulgentes, nedum

20 Paulo, Aetioque, aut Oribasio, uel Philotheo, seu demum cuius eiusdem idiomatis, & sectæ alumno: Veritatem præponere, quibuslibet horum inuitis enitendum perpetuo decretum sit. Id ipsum uero tametsi maximum (ut uidetur) pondus idcirco facillimè, atque alacriter portare, quodque uestigamus assequi speramus, quoniam omni semoto liuore, animique affectu singula disquirimus: nil aliud præter ueritatem exoptantes. Quam ob rem DEI Optimi Maximi, nostrique dulcissimi Redemptoris IESU CHRISTI adiutricem manum firmissimo corde speramus, illiusque gratiæ in omnibus maximè confidimus. At nostrum propositum exequamur. uidelicet ut communem scribentium consuetudinem quolibetissime sectantes, ualentissimi cuiuspiam, inuictissimi que Herois nomen contra susurriones, inuidosque nasutulos, ab operis initio, tanquam perpetuum Tutānum inuocemus. Quò igitur hi famosissimi celeberrimi que doctores, & maximæ olim in toto ferè orbe authoritatis illis rudibus, ignauisque mediculis, aduersum quos Iatràpologia loquebatur, longè præstantiores, & excellentiores sunt: Eò & multo potentiore Monarcha, fautoreque Principe indigemus. Quiquidem ut constantissimus æqui distributor uirtutibus, doctrinæque, & ueritati astipulans, fauensque, & uitæque, & ignorantia, falsitatisque perpetim Herculeis uiribus aduersetur. In hoc autem ipso genere, Te duntaxat unicum uerè Principum exemplar inueniri Phæbo clarius est: Vniuersoque ferè orbi adeo pernotum, ut à me lucidius fieri non queat. Inquit uero Peripateticorum spirarchus: b c. Ethic. 3.º.

30 Excellentiissima uirtutum uidetur esse legitima iustitia, atque (ut Euripides asserit) neque Heesperus, neque Lucifer ita mirabilis. Fit prouerbio dicere consueuimus: Iustitia in sese uirtutes continet omnes: Atque perfectæ maximè uirtus est: quia perfectæ uirtutis est usus. Idque est ex eo, quia non ad se solum (ad quem, prout alias inquit, nec iniustitia esse queat: cum neque i Ibidē cap. 1.º.

mo sibi ipsi nocere uelit) sed ad alium etiam is, qui ipsam quidem habet, uti uirtute potest. Complures enim in proprijs uti possunt: sed in his quæ sunt ad alium, nequeunt. Et propter reâ Biantis Prienæi sententia benè sese habere uidetur & Magistratus uirum ostendit. Ad alium enim est, & in societate iam ipse magistratus consistit. Quæ autem maior (quilibet quæso respondeat) hoc in Regno inuenta est unq; ea, quæ hodie in Rhamnusia TOLETO Iustitia, omnigenaq; uirtus, ac prudentia reperitur? Ut non temerè TOLETVM quasi tollens auferens ue letum, hoc est ipsam mortem, & quicquid letum, hoc est (Prisciano erudiente) deletum iam erat extollens. Cum omnis ferè uirtus, ante tuum aduentum, deleta fuerit: Neapolisq; (ut cuiq; compertum est) non aliud, q; lucus exulibus, ac prædonibus ueluti perniciosus quibusdam feris undiq; refertus fuerit. Quid uerò aliud mortis causa magis est tum animæ, tum corporis, q; Iustitiæ absentia? Contra uerò quid uitæ magis & animæ, & corporis, & cuiusuis reipublicæ præstantior causa est, q; ipsa (cuius pater, & filius es) Iustitia? Cuius quidem ui cunctas, quæ deletæ iam erant, uirtutes in lucem reuocasti. Haud enim Aegyptiorum quidem rex Bocchyrus, uel Manium (ut Poetæ, ob iustitiæ excellentiâ, fingunt) iudices Rhadamanthus, Aeacus ue, aut Cretensis Minos ita ex æquo partiebant, quin interdum aliqua foret strangulatio. Si quidem præteritis temporibus Satyrici carmen uerum esse hoc in Regno, præsertimq; in urbe Neapoli compertum erat & Dat ueniam coruis, uexat censura columbas. Nunc uerò, ubi scilicet regere Biante Prienensi iudicando præstantior excellentia tua incepit, cuiq; quod suum est distribuitur. Ut nullus modò inter sit, qui uel ad te ipsum, quia minùs attentè alicuius causam intellexeris, uel ad alium dignè prouocare queat Macheta. Quemadmodum Philippo Lacedæmoniorum regi Machetæ ius negligentiùs audienti contigit. Ultra quam, perinde ac Numæ Pompilio religione præponeris: Ita & Aristidem incorruptione mirabiliter excellis. Qua de re mirum non est, si DIVVS CAESAROLVS CAESAR Imperatorum coryphæus non minùs tibi, q; sibi metipsi confidat: Amplissimam deniq; potestatem, summa liberalitate præbens: Quam (ut opinor) aliorum nulli unq; præbuerit. At quis esset diuino potius, q; humano spiritu afflatus CAESAR: Qui alium, q; è Regia proculdubio stirpe natum PETRVM TOLETVM eligeret? Petrus enim es super quàm certè petram DEVS Optimus Maximus iustè regendi, gubernandiq; ac ipsius (ut uno uerbo dixerim) sanctissimæ Iustitiæ unicū nostro æuo exēplar ædificare uoluit. Exēplar inq; Etenim postq; tu Prorex, Cæsarisq; locū tenēs annis ab hinc uiginti Neapolim appulisti, In reliquis Maximi Caroli prouincijs, ac Regnis tuâ cæteri Gubernatores Iustitiâ æmulari paulatim exorsi sunt. Missa nihilominus interim facimus in finis ta ferè hoc in Regno, præsertimq; Neapoli, ac per te renouatis iâ Puteolis bona tuo munere confecta. Quot inq; castra, Muros, Aggeres, sacra Tempia & Hospitia, ordine tuo condita: Itemq; Aquæductus, Fontes, plurimaq; ædificia. Ut stratum quoq; nuper utrinq; uarijs ædificijs ornatum, quia primam te præcipiente originem sumpsit, TOLETI nomine TOLETANVM, communissima omnium uoce, uel TOLETVM, nuncupetur. Sed quid de iam extinctis per te pluribus Neapoli assiduam ferè pestem inducentibus paludibus, uiarumq; multarum refectiōe, ac stratorum continuo apparatu dixerim? Cum ne minimam quidem partem in Italia Traianus Imperator (uel Galeno teste) refecerit. Ut qui obscurissimæ speluncæ instar, perforatum à Cocceio (prout nonnulli uolunt) Architecto Pausilypi montem

montem (nonnulli crittam uocant) aliquatenus uel dilatare, uel quopiam spiraculo illumina-
 re non aduertit. Quem tamen ALFONSVS PRIMVS Neapolitanorum Rex quas-
 dantenus ampliare aggressus, dirutis interim angustis tam ingressus, q̄ egressus extremis
 oris, ab obscurissimis tamen liberare tenebris, & hinc & inde pertransseuntium siue homi-
 num, siue equorum, aut curruum confusione haud potuit, Tu uerò demum usq; adeò, non dila-
 tasti modò, sed altè confossum exquisitè collustrasti. Vt absq; luminaribus totum percurrere
 nullibi quidem offensus unusquisq; ualeat. Sed quis est, qui cuncta quidem, quæ per te hoc in
 Regno, nedum alijs in locis, bona humanum genus lucratum sit, non dico in parua Epistola,
 quam nunc intendimus, sed ne in maximo quidem uolumine comprehendere posset? Satiùs er-
 10 go fuerit, industriusq; ab illis abstinere, q̄ ineptissimis nostris definitionibus rem lucidissi-
 mam perturbare. Ad id nihilominus reuertendum omninò duximus, unde sermo progressus
 est. Quoniam scilicet non secus ac perlongam Pausilypi speluncam usq; adeò perlustrasti:
 ut absq; facium, uel cuiusuis luminarium præsidio, tutus quilibet per eam incedere queat: Ita
 Neapolim ueluti quandam antea speluncam, uenenatis quidem pluribus feris completam, inz-
 tantum ad uiuum usq; confodiens, resecasq; expurgasti, tum Iustitia, tum omnigena deinceps
 uirtute, publicisq; studijs, rediuiuis iam opera tua redditis, collustrasti. Vt non interdum modò,
 sed noctu quoq; tutissimi per urbem probi uiri spatientur. Quibus de causis rursùm T O L E
 T V M, hoc est tollens letum, mortem'ue diceris, quia immortalis iam ob admiranda gesta tua
 redditus es. Te igitur D I U I C A E S A R I S Locumtenentem uelut candidissimum prius,
 20 iustitiaq; met ipsa iustiozem: Dein data pro nobis (quemadmodum speramus) sententia, in
 tam ardua quidem, aduersus tot, tantosq; uiros lite, haud leui iurgio. Vt inuidissimum acers-
 rimumq; huiusce (licet tanto Heroe indigni) opusculi Tutânium elegimus. Electoq; ipsum
 inscribimus, & penitus ac toto pectore deuouemus. Tibiq; munusculum id, q̄uis minimum,
 tuo interim nomine fouendum dedicamus: Haud ignari quidem tui duntaxat nominis
 ui roboratum, comburentissimo igni, nedum mordacibus obtrectatorum lin-
 guis obstaturum. Vale igitur & obnoxium, deditissimumq; seruũ
 tuum Philippum, perindè atq; consueuisti, ab inuidis & ini-
 quis aduersantibus, tuo potentissimo, iustissimoq;
 brachio defendas. Iterumq; ac perpetuò Vale.

Datum Neapoli. sexto Idus Aprilis

M. D. LII.



Inuidus, aut stultus, si mastix dicier horres:

Desine, qui nasum Rhinocerotis habes.

Arte homines uiuunt: cuncti ratione ligantur.

Si ars, ratio desunt, Garrule quid loqueris?

Quid prodest naso statim suspendere adunco

Quæ nondum nosti, sed neq; nosse uales?

Ergo adsit ratio, uel quod mordere tyranni

Audes ritu, saltem indigitare uelis.

IOANNES BENEDICTVS CHARERIVS
LOCRENSIS AD LECTOREM
IN TOTVM OPVS QVASI
ARGVMENTVM.

Quicquid docta cohors Argium, Arabūq; caterua,

Et Latij rectè scripsere in Apollinis arte,

Doctorum hic Princeps, Diuinus mente Philippus

Perstringit: Soluit nodos: Velata reuelat:

Illos, dum possunt, concordi fœdere necit:

Cum nequeunt, Veri non ulli parcit amore.

Cumq; tumor libro titulus sit, cuncta uidebis

Morborum signa, & causas, ac nomina, curas,

Anatomen quoq; nec multis, Adeoq; disertè,

Addere ne possis quicquam, seu carpere iussè.

Cedant ergo, Cœus, pariterq; Galenus, & omnes:

Nanq; opus exactè nunc tractans omnia, fulget:

Non igitur nummis parcendum, docta Iuuentus:

Fœnus erit precio: uenales ponite uestes:

Grammaticus, Logicus, Physicus, Diuinus & ipse

Accipiant: nam dic quem non sine fine iuuabit?

Heros quisq; simul, uitam cui cura tuendi:

Dira uenena liber nosse, & curare docebit.

DE TVM. PRAET. NAT. TOMI SEPTEM. QVORVM

P R I M V S est, in quo declaratur primum caput tertiæ Fen quarti Auicennæ. Id quod idcirco fecimus, ut non Græcos modo, sed Arabes etiam, pro uario studentium appetitu, enarremus. Etenim quandoq; stultus olitor uel ualde opportuna locutus est. Itemq; ut nulli nos addictos esse propaleamus. Haud. n. Auicennæ literam, Trivialium interpretum ritu exponere tentabimus. Distinguetur autem id primum caput in quatuordecim textus, siue dixisse mauis, sectiones: Ita & illis respondentia commenta. In quorum primo generatim repetitis ijs, quæ in primo libro Princeps de apostematibus, tumoribus uel præter naturam prædixerat: Quæstionem de causa continere adiunximus. ut eam inuenire in singulis tumoribus queamus. In secundo uberrimè in memoriam rursus reuocatis, et quæ specialius his, quæ in primo libro dicta ià à Principe fuerant: tumores omnes percurramus, singulorum materias disgregantes, atq; unà Galeni libellum cui titulus inest, de tumoribus præter naturam, exponentes: ad calidum uel non calidum singulos reduximus. In tertio commento humores omnes, tam naturales, quàm non naturales, eorumq; generationes ostendemus. In ultimo autem, quod numero quartusdecimus est, doloris causas (præter contextus interpretationem) iuxta Galeni sententiã uel ligabimus, atq; unà plures dubitationes ad dolorem pertinentes enodabimus. In reliquis uero hunc præcedentibus commentis, plurima et quæ opportuna, quæ ad textus declarationem pertinent, elucidabimus. Atq; hæc in primo Tomo.

S E C U N D V S Tomus erit, in quo secundum Auicennæ caput, ad calcem usq; primi Tractatus enucleabimus. Vbi de tumoribus præter naturam apostematibus uel calidis unà cum Principe pertractatur.

T E R T I V S Tomus erit, in quo totum secundum Auicennæ tractatum, de tumoribus. scilicet apostematibus uel frigidis, & tertium quoq; de lepra, quæ à Græcis elephantiasis dicitur, loquentem exponemus: Morem interea nostrum in hoc, & alijs obseruantes. Ut uidelicet non Auicennam (quemadmodum nonnulli rudes opinantur) interpretari puerulis intendamus: sed omnes insimul, quos uidisse licuit, Græcos, Latinosq; et Arabes in examen reduxerimus. Veritatem perpetuò ueluti primum scopum intendentes.

Q U A R T V S Tomus erit, in quo reliquos omnes tumores tam extrinsecos uel à Principe, atq; ipso etiã Galeno omisso, quàm intrinsecos, suis cum notis, atq; etiã curatione percurramus. Febris interea plurimosq; alios morbos, quod tumoribus adiungi consueuerunt, non definientes modo, sed exquisitè suis cum symptomatibus curantes. Quo itidem in loco de uenenis etiã, uenenatorumq; animalium demorsu pertractabimus. quatenus uidelicet tumorum quoq; causæ fieri solent.

Q U I N T V S Tomus erit, in quo de uulneribus, ulceribusq; loquentes, ut quæ maxima ex parte à tumoribus minimè absoluitur, quartam interea libri etiã quarti Fen elucidabimus.

S E X T V S Tomus erit, in quo luxationes, & fracturas, earumq; curationes (ut in quibus tumores fiunt) ostendemus. Interim quintam Fen quarti libri exponentes. Vbi & fascias quoq; ligaturasq; & instrumenta declarabimus.

S E P T I M V S Demum Tomus erit, in quo tam pro tumorum, quàm pro uulnerum, & ulcerum curatione, uerã chirurgiam docebimus: Anatomicas interim necessarias administrationes et usus non exteriorum tantummodo, sed interiorum quoq; omnium breui compendio declarantes.

Q U I B V S Tandem expeditis, ad Artis Medicæ, nec non Aphorismorum tandiũ tritas, ultraq; nonnum annum pressas lucubrationes, ut in lucem edantur, accingemur. Si tamen Deo Optimo Maximo placuerit.



IOANNES BENEDICTVS CHARE
rius Locrensis inter Authoris discipulos minimus
ad Lectorem, de Catalogo superius
in ultimis uerbis promisso.

Catalogum quæris? Non est: Clamore Studentum
Dimidio sectus traditur iste Liber:
Aedat nanq; Tomi partem, quâcunq; uolumen
Pertingat metam, nocte, dieq; rogant:
Fronte tamen partis (Domino aspirante) sequentis
Certè aderit præsto, quodq; uidere cupis.





IOANNES BAPTISTA

LOMBARDVS SICVLVS AR-

TIVM, ET MEDICINAE

Doct̃or ad Lectorem.

Hippocrates Magnus sciuit quodcunq; Galenus
 Centaurus Chiron, Græcia tota simul:
 Nec non & Latij quicquid potuere disertè,
 Hic breuib; pro re, continet iste liber
 Quicquid item Princeps Arabum, Græx Barbara tandem
 Conscripsit, paucis hic quoq; Lector habes.
 Inuentum medicina meum est, tuus inquit Apollo,
 Hic tamen expleuit nobilis artis opus.
 Ergo lege, & Siculo, quas debes, redde Philippo
 Grates, nam meruit, nocte, dieq; simul.



PHILIPPVS INGRASSIAS SVIS DISCIPVLIS

SALVTEM SEMPITERNAM.



FFLAGITASTIS Filij charissimi, quotidianis ferè conui-
cijs, ut Primum Tomum nostrarum lucubrationum, de Tumoribus
præter naturam (quem non ob aliud, nisi ob uestram omnium utilita-
tate imprimendum curauimus) ad umbilicum reduxerimus. Cum
tertium iam annum aggrediamur, à die, quo typographis, ut in lue-
cem ædatur, præbuius. Verum haud nostra tantummodo culpa res

intantum delata est, sed Impressorum quoq;. Primo enim calcographo uerba nobis, pro ima-
primendis chartis, indies reddente, ac semper tanq; exquisitissimo decoctore nobis procrastina-
nante, maxima cum difficultate ad trigesimum secundum, supra centesimum folium perue-
nimus. Adèd ut imprimendi typi ferè consumpti fuerint. Id quod ex sequentibus, scilicet cen-
tesimi trigesimitertij, characteribus facillimè iudicari potest. Illo enim officinæ impressoria
domino ad decoctionis extremum reducto (cuius nomen, honestatis causa, omittimus) ad aliū
oportuit cōfugere, ac novos deinde typos effingere. Qua de re longum tempus intercessit.
Fuit autem hic (ut scitis) Matthæus Cancer: uir certè, ob raram uirtutem, omni laude, ac
honore dignus: pariterq; eius officinæ gubernator Thomas Riccionus, solertissimus quidem
typographus, ac uir me hercle usq; adèd industrius, ingenioq; pollens, ut non typos ordina-
re modò, sed quodcunq; uoluerit opus manibus perficere aptissimus sit. Nihilominus tamen
multis deinde causis impediti nos, tam scilicet publicis lectionibus, q; ægrotantium uagitis
bus, anatomicisq; suo tempore administrationibus: aliàs autem æstiuo calore, atq; nonnullis
interdum familiaribus negotijs occupati, uix folium singulo mense imprimendum corrigere
potuimus (Hanc enim ob causam Neapoli potius, q; alibi ædendum curauimus) Quoniam
uerò ab expletis ordinarijs lectionibus (quibus impræsentiarum, pro aphorismorum inter-
pretatione, occupamur) mense, ut speramus, Iunij in Patriam nauigare certum est: Ne ue-
stra expectatio tandiū, ad odiosam usq; famè differatur: Accipite interim **PRIMITOMI**
saltè dimidiū, adèd quidè, ob prædictas causas, intermissionibus impressum, correctumq;, ac res-
uifum, ut à uarijs appareat typographis, quinimò et à uarijs authoribus, cum diuerso quoq;
dicendi stylo compositus. Quò possitis inter hæc plurima, quæ à me publicè legente audiues-
ritis, exquisitiū, atq; adamussim contemplari, Pariterq; iudicare, an huius primi residuum,
cæteri q; sex Tomi publicandi ueniant. Quauis enim Ego in Cathedra residens, uiuāq; uo-
ce uos docens, sæpenuerò uestrum plurimos, præsertim ingeniosiores, & doctrina pros-
uectiores iuuenes, alacri uultu admirari, & (uelut ab ore meo pendentes) magnoperè huius-
cemodi lucubrationes commendare aduerterim: Noscens tamen multum intexesse, scripta in
recessu, per longū otium perlibrare, ac omni semoto Præceptoris amore, uel quouis alio affe-
ctu, peregrina mēte, ac proprijs ex locis singula perpēdere: q; sic uelut pertransennā quē uis
Doctore alto throno residente opera sua confidētibus iā discipulis, acutiori ex industria, rhe-
torū instar, tetrico etiā uultu persuadere. Plurima. n. sunt q; prima statim frōte perpulchra,
et exactissima uidetur: Quæ nihilominus deinde scripta, præcipueq; impressa nullius esse mo-

menti inueniuntur. Quam ob rem nunc ex scriptis, nec amplius ex uiua mea uoce desumpti, ac per multum otium, peregrina mente, atq; demorsis unguibus extusum uestrum expecto iudicium. Quò cætera quidem (si ut spero successerit) alacrius in lucem ædere accingar. Verum id uos admonere interea minime grauabor. Quoniam & si de aliquo tumore loquentes plurima in nostris publicis lectionibus aliquando dixerimus, quum scilicet de tumoribus præter naturam extraordinariè tractaremus, quæ in præsentì uolumine desiderabitis: In sequentibus tamē, locis uidelicet proprijs, inuenietis. Vbi enim opportuniùs enucleanda fore uisum est: eousq; reseruauimus. Quæ tamen à nostro è Sicilia reditu, ut sedulo uobis morem geram, absq; (si DEO Optimo Maximo placuerit) interruptione in lucem ædenda fore, uestre utilitatis, non gloriæ causa curabimus. Paucula interim scholia, & indicem solertiſsi mi, nō minùs q̃ ingeniosissimi nostri discipuli, Ioannis Benedicti Charerij Locresis industria collectum superadiunxisse libitum est, quo promptius cuncta præter laborem inuenire queatis. Valete igitur, & Philippum interea loci uestrum ab inuidis susurronibus, delirisq; & ineptissimis Sycophantis, uel Grammaticen desiderantibus, omni semoto liuore, uel affectu, ueritatem duntaxat præferentes, Non armis quidem, uel contumelijs, at ipsa doctrina, uiuisq; rationibus defendere enitami. Datum Neapoli Quinto Idus Martij. 1552.

SCHOLIUM PRIMVM.



a In prin. mar
ginis. littera A.

Ol. 13. lin. 14. ubi res non postulat (ut Galeni uerbis utar) commo-
rantes. Verba Galeni contra ineptos interpretes, hæc sunt: ἔστι δὲ ἡ ἀναγκαῖος ἡ ἀπορία, quod est: comorantur autem præter ne-
cessitatem; uel ut in prima æditione Crusenius uerterat: ubi res non
postulat: tunc enim rectius interpretatus est Galeni uerba Crusenius,
q̃ in secunda æditione: ubi ad semet Galenum potius, q̃ ad interpre-
tes referre uerba hæc intelligit, dicēdo. Morari uero in ijs non est necesse, de quibus semel
hic statui dicere. etc. In eodem folio. Cum ponantur loca multa, Interpretis munus ostens-
dentia, cum illis considera etiam, quia idem innuisse apparet Galenus. 2. prognost. com. 30. in
fine.

b cap. 2.

Fol. 19. & sequentibus, Græcorum ἀπορία, & ἀπορία declaratur. Pro quibus nos
minibus notandum est, quoniam eiusdem originis nomina sunt, separationem. s. quandam, &
diuisionem. unius ab altero præferentia, παρὰ τὸ ἀφίσταται, quod est, abscedere, segrega-
riq; Vnde & eadē ratione, apud Latinos, Abscessus dicitur à uerbo abscedo: Sic ea Græca
nomina à uerbo ἀφίσταται deriuantur: quod uerbum illis idē, quod nobis abscedo: siue segre-
gor: præfert. Quam ob rem in idem uenit, si apud Græcos interdum legitur ἀφίσταται
vos. q. d. abscedens: quemadmodum Sorani uerba legimus à Galeno relata. 6. de cōp. med.
secundum loca. ἔτι ἀφίσταται ἡ γλῶσσα hoc est abscedentes gingiuas: Cornarius au-
tem Latinè traduxit: ad desperatas per abscessum gingiuas: quò rem clariùs ostende-
ret. Idem quoq; significabit ἀφίσταται ab eodem pariter uerbo ueniens. perindē ac
ibidem, post pauca Galenus ipse ait. ἔτι ἀφίσταται: que uerba idem Cornarius uertit
gingiuarum abscessus: Arabes idipsum dubellet: nomine demonstrant.

Fol. 23. lin. 5. Quum Galeni uerba de iniqua intemperie referuntur. Sic habetur. { Qui uerò
 „ circa costas abscessus colliguntur. etc. } Græcè autē { αἱ δὲ καὶ τὰς πλευρὰς ἀποσώσας }
 quoniam igitur { πλευρὰ } non costam modò, sed latus etiam significare potest: propterea
 non necessariò costarum, ac per hoc ossium abscessus, eo ex loco nos colligere possumus. Ver-
 rum quia numero plurali, statimq; de thorace meminit, cum lateris significatum generalissi-
 mum sit, aptius uidetur speciatim de costis intelligendum. Quod uerò ibidem post pauca sub-
 ditur, de ossium phlegmone, pernotandum: Quum { aliquid simile inflammationi } interpre-
 tes traducunt: Græcè in sexto methodi^c legitur { ἀνέλογον πφλεγμονῆ } hoc est { pro c cap. 5.
 portionale aliquid inflammationi } Quinto autem de composit. med. secundum loca^d dicitur d cap. 4.
 10 τῇ φλεγμονῇ παραπλίσιον } quod est { inflammationi proximum, seu uicinum } Haud
 uerò ineptè conuerterunt { simile } cum & idem significare nomina hæc possint, Græci ni-
 bilominus sermonis uim adnotasse libuit.

4^m.

Fol. 29. in principio. Aristotelis uerba, iuxta Theodori Gazæ traductionem retulimus, mi-
 nimè interim illius defectus curantes. Cum tunc temporis extra propositum fuerint. Ne autē Cōtra Gazæ
 aliquis, ob Gazæ traductionem, Græcè. s. Aristotelem uidens, ambigat: Aduertendum nunc traductionem.
 est, Græcè apud Aristotelem haberi { φυμῶν τῶν καὶ δοθιένων } Theodorus autem inter-
 pretatus est { panis, & papulis } { φυμῶν } ergo { panos } { δοθιένων } uerò Latine { pas-
 pulas } conuertit. Nos autem & Hippocratis, & Galeni, atq; etiam Celsi phymata longo
 20 sermone declarauimus, dum sextum & trigesimum tumorem elucidaremus, quod nonnul-
 li uel ex Celso Latine tuberculum nominare consueuerunt. Differre autem à phymate pas-
 num, penès Celsum (qui φυγέθλον à phymate diuersum panum appellat) atq; ipsum quoq;
 Plinium, sub pani uoce tam Celsi phymata, q. phygethlon comprehendentem enucleauimus.
 Quam ob rem neq; Celsi, neq; Plinij consuetudinē seruans Theodorus, sed ne alterius quis-
 dem ullius Romani authoris, defecisse hoc in loco apparet. Græcorum autem φυγέθλον, &
 Latinorum panos, in declaratione tumoris trigesimi octauū uberrimè declarauimus. f Tur- f folio. 223. in sic
 pius uerò longè aberrat: cum dothienè Latine papulas interpretatus est. Plura. n. de dothie ne, usq; ad foliū.
 nibus, Latine quidē furūculis uerè nominandis, in declaratione tumoris trigesimi quinti præ- 228.
 diximus. & Vbi Marcellum quoq; Virgilium increpuimus, strumas interdum non modò ex g A fol. 209. in
 fine ad foliū usq;
 30 Plinio, sed ex sua nonnunq; sententia, pro dothienibus exponentem: Simulq; à Barbaris { de- 217.
 menul } à quibusdam uerò carbunculum nominari ostendimus. Ex quo & carbunculi nomi-
 nis æquiocationem enodare necessum fuit. Papulas autem in declaratione tumoris uigesimi
 quinti, apud Celsum, eiusq; sectatores, Græcorum Lichenas: b apud Plinium uerò, Græcor- b fo 137.
 rum exanthemata calida significare demonstrauimus. His ergo exquisitè perpensis, quæ præ i fol. 138. et. 139
 notatis in locis uberrimè à nobis præscripta sunt, quàm aberraret hoc in loco Theodorus, uel
 idiotis compertum esse potest. Nos autem (ut diximus) rem obiter pertransientes, hæc ibi k
 uestigare non curauimus. 5^m. k fol. 29. i prin^o.

Fol. 30 4^a. { Nisi herpetem, atq; anthracem intellexisse contenderis. } Alio quopiam tumor-
 re, præter phlegmonem, & erysipelas, posse cor affici Galenus dicens, frigidos uidetur insi-
 40 nuasse. Dictum uerò est ibi nisi contenderis Galenum, per alium à phlegmone, & erysipela-
 te tumorem, intellexisse, uel herpetem, uel anthracem, præsertim quia Græcè habetur { τὸ

ut uertendum potius sit aut alio quopiam huiusmodi, seu tali tumore quam ob rem uideatur calidum, inflammatumque tumorem intellexisse. Restat ergo uel herpetem, uel anthracem audire. Verum quia herpes ex bili quidem tenuissima fieri solet, sanguineque penitus destituta: In corde autem continuo sanguis feruet, remotissimum uidetur ibi herpetem gigni posse, Multoque minus anthracem, cum pustulas huiusmodi tumor uel ab initio statim apportet. quas in corde fieri adeo rarissimum uidetur, ut impossibile potius reputandum sit: etiam si tumoris utriusque principium intellexerimus. Quod autem facilius, ac frequentius, uulnerato scilicet corde, contingere solet, uel phlegmone est simpliciter, uel erysipelacea, uel (et hoc rarius) erysipelas inflammatum: Rarissime autem erysipelas simpliciter dictum. Quicumque uero ex his tumor audiatur, Incipiens statim animal perneccabit: neque ad apostema abscessumue deuenire potest.

Ibidem. 13. Razis locus corrigitur, tribusque rationibus ea correctio probatur. Quibus addere potes quartam. quoniam. scilicet ab initio statim exorsus est et Aegritudines cordis, quas curari possibile est. etc. Deinceps uero in oppositum subdit et Apostema uero, disruptio, aut corruptio complexionis confirmata non sunt possibiles: possibili enim opponitur impossibile, siue non possibile: Haud uero et non facile. Comprobaturque id ipsum denique ab Arabum Principe, dicente confirmatam caliditatem non recipere curam, non confirmatam uero difficilem esse ad curationem. Auerrhoes autem et si prima fronte uidetur penitus negare, subdens tamen et excepto quod non sit cum apostemate, aut non ultimetur et in Galeni opinionem uenit: Quod. scilicet uel non adueniat apostema (large Arabum more capiamus) aut si quandoque aduenit, non ultimatur. Prius enim interficiet.

Fol. 42. 25. Sed haec minus mala est: quae angustia sic uerba Galeni tunc retulimus, prout, in Linacri translatione legimus. Vtpote quam interpretationem non praecedentibus modo, sed ipsis quoque, ac magis, consequentibus congruentiorem iudicauimus. Quoniam uero Fuchsius aliter eum passum interpretatus est: Ut scilicet oppositum, potius ex Galeno collegerit: dicens et Minus uero hac ipsa (scilicet amplitudine) mala est angustia. Ex quo non peiorem esse angustiam, sed minus mala habetur. Hac ob causam hoc in scholio rem exquisitiuam contemplantur. Etenim alteri, quam nos insecuti sumus, translationi, Copi quoque interpretatio respondet: ubi sic apud eum legitur et Sed in hoc ab angustia uincitur et in hoc. scilicet uitio, quod iam iam nominauerat, uincitur amplitudo praeternaturalis ab angustia etiam praeternaturali. Ex quo angustiam uitiosiore esse amplitudine patet. Cui quidem sententiae adhuc Arabum Princeps assilipulatur: quum de pupillae constrictione loquens, sic ait. et Si est naturalis, est laudabilis, et si est accidentalis, est deterior, quae dilatatio. et Id ipsum uero quod dicitur sic intellectum uidetur alia ex parte Galeni met sententiae in praecedentibus aduersari. Cum omnem amplitudinem, suamet ratione, quatenus uidelicet amplitudo est, uitiosam esse dixerit (ob spirituum. scilicet diffusionem) angustiam uero, si natua sit, laudabilem, uisuique potius commodam: Sin autem praeternaturam aduenerit: sui quidem ratione adhuc uitiosam non esse uoluerit. nisi affectuum, quos insequitur, causa. Praeterea statim subdit amplitudinis causam esse tensionem: angustiae uero laxationem. tensionis autem causa siccitas est: quemadmodum laxitatis humiditas. Quod igitur humiditas facilius, quam siccitas curatur, prout ibidem Galenus insinuauerat, Eo minus uitiosa dici debet angustia ex Rhagoidis humiditate proueniens, quam ex siccitate genita

l 3^a. fen. 3ⁱ. tr.

4^o. c. 15. i. prin^o.

genita dilatatio. Atq; hæc ipsa fortassis duntaxat considerauit Fuchsius. Minime interim ad- *Cōtra Fuch-*
 uertens ex siccitate etiam aduenire posse angustiam: perinde ac rursus ex humiditate (uel *sicm.*
 Galeno ibidem erudiente) amplitudinem, tuncq; longè uitiosiore, difficiliorisq; curationis
 esse angustia amplitudine. Quā ob rem neutra potest sententia simpliciter proferri. Nisi cō-
 parationis canonē à Galeno ^m præpositum obseruamus. Vt. si in cæteris paritas cōseruetur. *m 20. de tēpera*
 præsertimq; i effectiuis causis, quod magis ad propositū pertinet. Duplex. n. alterutrius affe- *mētis cap. 2 &*
 ctus causa esse potest. hoc est siccitas, et humiditas, q̄q; diuersis quidē modis. Est. n. humiditas, *2. Apher. com.*
 ut similis partis, id est ipsius substantiæ rhagoidis, causa (ob laxitatem) constrictionis, an- *18. et. 20. et. sē-*
 gustiæ uel pupillæ. Eadem uerò humiditas, ut instrumentalis (siue ab humoribus ascendens
 10 tibus, descendibus uel, & aquosæ humiditati admixtis, indeq; rhagoidē utris instar inflati ex-
 tendentibus, siue ab aliquo præter naturam tumore calido, aut frigido aduenerit) amplitu-
 dinis causa erit. Pariterq; siccitas, ut similis quidem, ut pote eiusdem uicæ tunicæ morbus,
 dilatationem, ut autem instrumentalis, quoniam scilicet aquei uocati humoris defectus sit, an-
 gustiam potius gignet. Quoties igitur uel angustiam amplitudine, uel hanc illa peiorem, aut
 minus malam esse proferre uolumus: tunc eiusdē causæ respectu idipsum decernendum est:
 sicq; semper deteriore esse angustiam inueniemus. Etenim si amplitudinem ex humiditate
 genitam consideremus, siue humores intus cum aqueo inclusi fuerint, siue tumorem præter
 naturam producentes, eorum dissolutionem difficilem non esse Galenus ibidē adiūxit. Quæ
 tamen humiditas in uicæ substantia inspersa, usq; adē ut eam relaxans pupillam angustam
 20 reddat, nō sic facile discuti poterit. Exemplum ex cuiusuis partis alterius paralyti, resolutio-
 ne uel desumi potest. Quam ob rem eiusdē causæ respectu, angustia peior est, q̄ latitudo. Sin
 uerò amplitudinem ex rhagoidem extendente siccitate obortam perlibramus: tametsi hæc
 difficulter humectari potest: longè tamen difficilioris curationis erit angustia, quæ ob siccita-
 tatem, hoc est, aquei humoris diminutionem, defectum uel genita sit (prout ibidem ex Gales-
 no etiam didicimus) q̄q; aliquando curatam in puerulo uidit Galenus, incredibile tamen, &
 uulgò fieri non solitum. Seruata igitur causarum paritate, semper deteriore esse angustia
 (si modò præter naturam aduenerit) q̄ amplitudinem proferemus. Fuchsius uerò tametsi
 rationem assignet, quomodo angustia minus mala est, Eam ex humiditate ortam ad latitudi-
 nem ex siccitate factam comparando: In alijs tamen postea defecit. Græcus uerò contextus
 30 ambiguus adē est, ut hanc interpretibus æquiocationem induxerit. Sic enim habet & *Mis*
 ἡρότερον δὲ ἐστὶ τὸ στενότερον ἢ τὸ πλαγιότερον. Quæ uerba dupliciter quidem exponi possunt: Pri-
 mō quidem: ut Genitiuus {στενότερον} à comparatiuo {πλαγιότερον} regatur, sic uidelicet
 interpretando & Minus uerò malum est id, scilicet amplitudo, q̄ angustia; sicq; nos cum Li-
 nacro, & Copo intelleximus. Aliter autem exponere pro Fuchsiō possumus, ut. s. genitiuus
 {στενότερον} possessiue potius capiatur, Neutrum uerò {πλαγιότερον} substantiue sumatur. ut idē
 significet, quod {κακία} id est malitia. Vt sic uidelicet interpretetur & Minor autem est an-
 gustiæ malitia & q̄. s. amplitudinis malitia sit. Atq; in hanc sententiam Fuchsi traductio uen-
 nit. Cum sic legit & Minus uerò hac ipsa mala est angustia; facitq; pro eo: Quoniam angus-
 tia secundum se spiritus uniens dispergente illos amplitudine melior est. Nobis autem, ob
 40 prædictas rationes, alteram potius insequi sententiam uisum est. Quæ de re sic legimus & Sed
 hæc (scilicet amplitudo) minus mala est, q̄ angustia.

Ibidem lin. 40^a. cum. 41^a } seu frige factionem in neruis. etc. } continentem stuporis causam posuit Galenus eam, quæ facultatis transitum impedit: ueluti constrictio est, siue compressio, uel obstructio, aut demum ipsa frige factio, pro qua tamen frige factione aduertendum, quod exquisitè perpendentes frige factionem, media, quam effecit, densatione, impediti transitus causa hæc est. Quam ob rem frige factio continens, coniuncta uel stuporis causa non est, sed quæ absq; medio lædit, ipsa uidelicet densitas, quemadmodum & obstructio, frigiditas autem, non secus ac obstruens humor, symptoma continentis causæ, morbi uel alia causa est. Cuius morbi ratione, continens dici aliàs potest.

9^m.

Fol. 43. 21. Quandoq; duas, quandoq; tres posuit Galenus sputi facili, aut difficilis causas. 10
differentes tamen, prout in locis ibi notatis apparet. Quibus addere potes alium locum, scilicet libro de const. art. med. cap. 15: uersus finem. Vbi duas etiam posuit, aliter tamen: materiæ, scilicet crassitatem, tenuitatem uel, & membranæ densitatem, aut raritatem. Dolorem interea, uirtutisq; robur omittens. Sic enim Galeni morem sæpè fuisse obseruauimus, ut quæ sibi promptius occurrerēt, protulerit. Tu uerò interim cuncta eius loca perpendas, & ex uno alteri suppleas.

10^m.

u cap. 30.

Fol. 45. 27. Causa conseruans ponitur semper nouam regenerans alterationem, tametsi conseruatiua dicitur. Idcirco & libro de salubri, an ad Gymnasticā pertineat, conseruatiua medicina pars inter correctiuas ponitur, & si pauillum, & occultum est, quod corrigit. Idemq; rursus ibidem repetitur, ° atq; alibi non semel.

20

o cap. 40.

p ut 3^a art. med.
3^o. et i^o prin^o. pri
mi de tunc ual
let. & sæpè.
q cap. 2 propè
medium.

Fol. 48. 4. ponitur ibi, & in præcedentibus, & sequentibus fiens quidam morbus: cuius nulla pars facta, designari potest, qui proprie pathos, non morbus dicendus est, & potius fiens morbus, q; morbus fiens. Eundem eligere potes ex p^o. de locis affectis. Quam ait & quippe nonnunq; à causa quapiam oritur pathos (licet interpretes uertat affectus) Sed ita oritur, ut separata causa, haudquaquæ permanentem habeat dispositionem. etc. }

11^m.

Ibidem lin. 23. } Nisi malis. etc. } Placuit. n. mihi nonnunq; huiusmodi consideratio: prius q; plura Galeni loca perlibrarim. ut. scilicet. } ἐν τῷ νόσῳ } quasi dicat. } adhuc fiens. } præposita dictione } ἐν } Latine } adhuc } illud significet, quod aliquid factum ostendere queat, saltem medicè: quod. scilicet. actiones lædere ualeat: præter id, quod in generatione adhuc est. Quasi factum esse intellexerimus, adhuc autem fientē deinceps. Vt putrida febris quælibet est. Postposita uerò dictione } ἐν } sic dicendo } ἐν τῷ νόσῳ } hoc est } fiens adhuc } non factum aliquid, sed statim fientem præseferat qui talis adhuc est (scilicet in generatione adhuc) nil factum ostendere ualēs. Videbaturq; huiusmodi speculationi tribus ex locis ibi notatis roborari. Veruntamen, à Galeno differentiam hanc minimè obseruari, uel in eodem (ut ibi notauimus) Aphorismo cognouimus. aliumq; locum addamus, hoc est. 13. methodi. Vbi de phlegmone loquens fiente, quæ. scilicet. partem habet factam, partem uerò futuram, postposita dictione } ἐν } sic ait } ἐν τῷ νόσῳ } δ' ἐν τῷ φλεγματῶν } quod Linacer interpretatus est } phlegmones uerò, quæ in generatione adhuc est. } dein uerò eam duntaxat partem intellexisse uolens Galenus, quæ futura est, non facta, præposita eadem dictione ait } τὸ δ' ἐν τῷ νόσῳ } quod Linacer

nacer

* cap. 2.

40

nacer nulla etiam in Latinis dictionibus obseruata proprietate, ait. Quod in generatione adhuc est? Distinctionis tamen gratia nos uti possemus. Quemadmodum infra^s fientem morbum (qui scilicet nunc primum generatur) à morbo fiente (qui uidelicet factus iam est morbus, ueruntamen adhuc increfcit, ac pro aliqua parte fit) clarioris doctrinae gratia, distinximus. Quo etiam pacto fientem hominem (prius q̄ oriatur) ab homine fiente (ut qui natus est iam, ad annum tamē usq; uigefimum quintum augetur) secernere possumus. Hic n. homo iam est: adhuc nihilominus fit, perficiturq; dū incrementum suscipit. Veruntamen antea^t ex industria utrunq; fientem hominem appellauimus, ut confundi posse nomina significaremus.

13^m.

- 10 Fol. 51. 27. & excepto numero. etc. & Dubitare quispiam posset de morbo in numero. Videtur enim q̄ sextus digitus causa sit morbi in numero, & quidem continens. Posito enim, & ablato sexto digito: ponitur, & aufertur morbus in numero. Quo etiam modo uidetur de lapide in uesicae concauo retento: quoniā scilicet posito, uel ablato lapide, ponitur iam, aufertur uel morbus. Verū sic non est. Etenim sextus digitus, ipseq; lapis, uel pterygion, aut quouis morbus in numero positus à Galeno est, nō per aliud medium functiones impediunt. Sextus ergo digitus est, qui functiones impedit, numerusq; similiter diminutus absq; medio laedit. Sic lapis in uesicae cavitare. Qui autem obstructione media laedit, non morbus in numero, nec eius causa, sed morbi in uia, meatu uel causa dicitur. Quod si remoto, aut posito sexto digito, ponitur morbus. Id ipsum non secus est, ac si diceremus, posita febre, ponitur morbus in intemperie calida. Remota febre, remouetur morbus. etc.

14^m.

- Ibidem 39. Magnitudinis causa humoris copia esse potest. quae quidem, si praeternaturalem quempiam tumorem inducat, ut puta phlegmonem, scirrhum, erysipelas, aut aliquem huiusmodi tumorem. Continentis causae nomen merebitur. Sin uero humores illi non amplius humoris, aut diuisae à membro substantiae formam repraesentent, sed in membri substantiam penitus, nutritionis uel permutati fuerint. Contingens causa dici non poterunt. quemadmodum neq; hi, ex quibus factus est sextus digitus. Ni antecedentes fuisse dixeris, tam magnitudinis, q̄ sexti digiti, ut uiscidi humores lapidis, qui in renibus, aut uesicae genitus est. Sic de superexcrecente in ulceribus carne, ex sanguine ad ulcus profluente dicendum est, encanthideq; & eo, qui totus maxime increuit. quemadmodum fuisse Nichomachum Galenus^u refert. Priapismi autem causa continens, flatuosus inq; spiritus est.

u lib de morb. differētijs c. 9.

15^m.

- Fol. 52. 18. Figura per se operationes laedere potest. Ideoq; morbus erit. Exemplū huius est, si uerbi gratia cuiuspiam usq; adeo crura obliqua, & recurua, ac per hoc malè figurata sint: ut genua sibi inuicem occurrentia, ad cursum, uel locumq; motum se se impediant. Huiusce autem curuitatis causa esse potest, interdum siccitas, & quidem coniuncta, ut quum contractionis nerui causa est. qua posita, aucta, diminuta, & ablata: idem secundum proportionem in contractione contingit. Humiditas uero interdum & curua reddit crura, seu blesos, aut uaros pueros. qua paulatim assiccata, in rectitudinem quoq; peruenire crura incrementibus pueris saepissime uidimus. Haudquaquam uero semper haec coniunctae rationem obtinet. Cum aliquos uiderimus, quibus exiccata crura iam sint, in rectum nihilominus uergere nequiuērunt. Ita

et

Et asperitatis causa non semper coniuncta est. Quauis. n. sic dici mereatur siccitas, lingua asperitatem febrientibus tantam inducens, ut locutionem offendat. Nihilominus tamen quæ ab erodentibus sua acrimonia humoribus aduenit asperitas ut continentes causas huiusmodi humores non habet. Vt pote quibus remotis, erosarum partium asperitas, inæqualitasq; remanserit.

16^m.

Fol. 53. 20. Plenitudo, multitudo ue, Græcè πλὴθος, causa continens nonnunq; est. Verum sub silentio prætereundum non est, plenitudinem aliquam ut morbum, aliquam uero ut morbi causam continentis definitione lucrari. Vt. n. obstructionis, uel nimie dilatationis alicuius uasis causa est, non morbus, at morbi causa, et quidē continens dicenda uenit. Vt autē uires aggrauans, cum non intemperiei, neq; solutionis, neq; alicuius ex instrumentalibus naturis ratione id agat: 10
Nisi ut multitudo est: hac ratione morbi naturam participabit, tuncq; ad morborum genus, quod in numero fit, reduendus uidetur.

17^m. Nota id contra Brasauolum, et Fuchsum.

2 cap. 2.

2 cap. 2.

2 cap. 12. post.
principium.

Ibidem circa finem: et consequenter in folio. 54. declaratur distinctio Galeni, libro positam de morborum differentiis. 2 Vbi non subdiuisionem posuit, at aliam nouam et generaliore distinctionem, qua possimus intelligere quot modis aliqua superabundent: Aut. n. ex toto genere præter naturam sunt, aut non. Quorum tamen aliqua sunt morbi, aliqua uero causæ. Eundem distinguendi modum ex alijs Galeni met locis declarare in studijs publicè consueuimus: Sic. n. et secundo de febrium differentiis intelligendum fore, cuius promptissimum est. Cum de biliosis febribus, et quidem continuis loquens: ut exquisitiùs eam cognouerimus, quæ in 20 medio primi, et tertij diei, quandam aliam accessionem facit: hoc est, in secundo die, quam uulgo duplicem nos tertianam appellamus: generalem quandam distinctionem adiunxit: quæ omnes febres quotidie inuadentes, uel (ut eius sermone utar) in die intermedia facientes accessionem, comprehenderet. Idq; non ob aliud, nisi quod possimus biliosam exactius cognoscere. haud quia pituitosas febres, quotidie quidem conformiter affligentes, ad biliosas reducere uoluerit. Id enim falsissimum est. Quam ob rem sic ait: Earum quæ in die intermedia faciunt, accessionem continuæ, nonnullæ quidem in quoddianarum figura progrediuntur. etc. 3 Atq; idipsum alacriter Galenus egit, quod cunctas febrium species recenseat. quemadmodum paulo priùs insinuauerat. Eodem rursus distinctionis modo usum esse Galenum patet. 2º de diebus decretorijs. 2 Vbi morborum acutorum diuisiones multas declarans, eos tandem ostendit, 30 qui ad quadragesimum usq; protenduntur. Vt autem et horum acutorum natura exquisitiùs pateat (cum non omnes, qui ad quadragesimum extenduntur, morbi acuti sint) generalem distinctionem eorum, qui ad quadragesimum peruenire solent, adiunxit, quod uidelicet distinguere nouerimus, qui nam ex ijs acuti sint, qui uero diuturni. Quam ob rem subdit: Duplex autem horum quoq; natura est: intellige horum. scilicet morborum, qui ad quadragesimum diem protendi consueuerunt, non horum scilicet acutorum: Tunc enim ueritati, et sibi metipsi repugnaret, acutos etiam intelligens, qui ad quadragesimum, et cum febre quidem intermittente protelantur. Cum, (si febre habent acuti) hanc necessariò continuam fore alias, tum Hippocratis, tum Galeni quoq; sententia, demonstrarimus. Eorum igitur, qui ad quadragesimum usq; diem producuntur, duplex natura est: et uel enim accessionum remissiones in exa- 40
dam integritatem finiunt, uel continua febris semper perdurat. Atq; hos (scilicet quorum febris
bris

bris continua est) de acutorum natura esse apparet: alij uerò (qui scilicet in exactam integritatem desinunt) manifestè diuturni sunt: sic enim uertenda Galeni uerba sunt: & non quemadmodum Andernacus: Atque huiusmodi de acutorum natura intelligenda sunt. Etes Cōtra Andernim in neutro genere participium & intelligenda: interpretatus, quibusdam errandi ansam naciū. præbuit. Ut utrūque diuisionis membrum ad acutorum naturam reducerent, tam scilicet morbos quorum febris continua est, quā eos, qui ad integram quietem finientes, ad quadragesimum protenduntur. Quauis enim Græcè in neutro genere dictio: τὸ τοιαῦτα id est, hæc ipsa: ponatur: quam uertit Interpres huiusmodi. Id ipsum tamen aduenit, quoniam apud eos morbi in neutro genere proferuntur: τὰ νοσήματα: secus uerò Latinis exponendū uenit. At hæc obiter. Ad propositum ergo reuertamur: & Galeni quoque morem alibi seruatiū ostendamus. Nam tertio artis medicæ Galenus de morbose intemperie locuturus, uniuersalem distinctionem præposuit, quæ futurā intemperiem includeret: sub qua sanum actū corpus, medicinæque salubrem partem rursus assumeret. Exemplum uerò huius rei tale nos declarare consueuimus. Verbi gratia quispiam medicus ægrotanti dicat: piscibus uestendi ueniam præbeo. dein uerò statim subdat. sunt autem pisces quidam saxatiles, quidam autem in alto pelago degentes. Ego uerò saxatiles tibi pisces permitto. Piscium distinctionem præpositam hoc loco agnoscimus, non quidem ut eorum, quibus uesti ægrotans queat, subdivisio sit, uerum tamen generalis quædam diuisio præposita est, quod eam eligamus speciem, quam ægrotanti concessuri sumus. At quispiam dicere posset: Si lapis in uestica morbus, & causa esse potest, diuersis quidem rationibus. ut à nobis declaratum est. in cōcauo enim morbus in numero: in meatu autē urinario, causa morbi in uia: Quod si perforatus sit, causa & morbus, diuersis tamen respectibus, dicitur. Si inque et morbus, & causa esse potest, dicā libro de morborum differentiis lapidem in uestica non ut causam, sed ut morbum capi, pro Fuchsio, ac Brasauolo. Respondendum uerò est, quod si ut morbum capimus, causa caret continente. Verum quando nos causam obstructionis, morbiue in meatu lapidem ponimus: non in concasuo, sed in uia retentum lapidem consideramus. Id quod satis superque pro nobis est. Galenus uerò magis ut obstructionis causam, quā ut morbum in numero, in eo loco accepisse uidetur. Vbi germen in naribus obortū obstructionis causam protulit. In primis enim (ut ait) obstructio morbus est. quoniā et ipsa primò functiones lædit. Sic & antea quoque uberiùs, ac rursus de morborū causis loquēs, obstructionē ipsam, ueluti et cōstipationem in cavitatē, aut meatu morbum, crassos uerò uiscidosque humores non morbum, sed morbi causam esse ait. QVAM OBREM uehementer non admirari nequeo ridiculam senioris iam facti Fuchsii sententiam. ut qui tam acriter, & conuicijs scatens, quibuslibet continētē morbi causam ponentibus refragatur: ut demū obstructione sibi præposita, ne terga uertere, aut herbā dare cogeretur: humores meatui impactos morbum esse, quæ dicitur obstructio, non huius causam ait, in nuper editis cōmentarijs super libris de morbis, & symptomatis, eorumque causis, pluribus quidē in locis impactos humores, siue multos, siue crassos, aut glutinosos, morbum esse, non causam determinauit. Causam uerò esse eosdem, sed antecedentem: prius scilicet quā impacti sint, hoc est, dum fluunt. Quare de re uitiosum quoque succum membranæ costas succingenti adhærentem, non causam phlegmones: seu pleuritidis, at ipsam pleuritim, siue ipsum morbum esse uoluit. & morbum quidē esse nemo (ut subdit) nisi insanus negauerit. quod nimirū illi morbi definitio optimè quadret. etc.

Ex

z tex. 33. cum. 34.

Optimū exemplum.

Obiectio. fol. 54.

b cap. 8.

Responsio.

c cap. 5. 7.

d etiā cap. 7.

Cōtra Fuchsium de causa continētē

e Vide p. de diff. mor. super c. 7. uersus finē & iterū de morborū causis cap. 2. uersus finē. et primo de sympt. causis ca. 2. post medium.

e cap. 10.

f. com. 22.

Ex eo autē in hac uerē demētīā uenit, quonīā Galenus Methodi undecimo^o obstructionis (in-
 qt) ipsius quod iā occupauit, curādū: quod uerō futurū est, propulsandū. Quomā igitur Gale-
 nus obstructionē factā curandā esse ait: Curatio autem ipsi morbo competit, nō causā: cui po-
 tius præsēratio necessaria est. Eāq; rursus factā obstructionis curatio aliter non fit, q̄ corū,
 siue crassorum, siue multorum, aut lentorum quoq; humorum ablatione. Idcirco non causā hu-
 mores illi erūt, uerū ipsamet (ut impacti sunt) obstructio. Multaq; Fuchsius ad huiusmodi
 apertissimam insaniam comprobendam aggregat. Quæ quidem referre, aut impugnare ad
 nauſeam usq; stomachor: A medicorum nanq; catalogo reijciendos eos fore duco: qui quidem
 primo statim obtutu nouas huiusmodi falsitates non conspexerint. Verū enim uerō quoniam
 non desunt duræ ceruicis, crassiorisq; mineruæ sycophantæ: qui sola Fuchsii autoritate moti
 Præsertim quia multa hic bonus uir ex aliorum furis uolumina quotannis in lucē ædens: uir
 multarū se esse lectionū cādidatis præſert. Hāc ob causam pauciſſimis, quoad fieri possibile
 fuerit, rē hāc perstringemus. Omittētes interim quæ Galenus. 2^o. aphorismorū. s. propter des-
 liros addidit, num curatio, an præsēratio dicenda sit, quæ causas auferat. Etenim q̄ depēdens
 causa suum esse, & ueluti adhuc in generatione tam obstructo, q̄ huiusmodi multa obtinues-
 runt: Idcirco ad causæ ablationem, eueſtigio morbum auferri necessum est. Id quod abole-
 tis, qui iam nunc defluunt, obstructionem facturis humoribus, minimē contingit: sed à futuro
 duntaxat præsēratio. Itaq; nō temerē huius præcautio: facti autem uera curatio dici potest.
 q̄q; aliquid ibi etiam præsērationis includitur. At ipsum noui phantasmatis authorem suis
 met ex uerbis (à Galeno licet exscriptis) exquisitē perpensis conuincamus. Dum ait { si so- 20^o
 la citra aliū morbum in ijs (scilicet iecoris cauo, atq; intestinis) fuerit obstructio: Vnicus etiā
 erit morbus. } s. iste pedem hic, & unā cū Fuchſio non huiusmodi meatuū cavitatum ue par-
 uitatem, aut ablationem esse morbum dicās, neq; humores, aut fæces, uel quoduis aliud im-
 pactum, esse causas, at humores ipsos impactos, lapidem ue, aut quodcūq; illud fuerit, ipsam ef-
 se obstructionem, morbumq; determines. Mox uerō deinde sequere. { At si phlegmone quoq;
 intestinum infestetur, atq; ob id internum ipsius occludatur spatium, excrementorūq; descen-
 sus prohibeatur: duo utiq; morbi erunt: nempe phlegmone, et obstructio. Sæpē enim ex mor-
 bo morbus nascitur: ut ex calculo uesicæ, qui per se morbus in numero existit, alius nascitur
 morbus, nempe obstructio. } Perpende igitur quæso phlegmonem, siue quemcūq; alium tu-
 morem, quomodo ipsum obstructio sequitur, nisi huius causa tumor sit? Vbi enim morbus 30^o
 morbum sequitur, proculdubio qui sequitur, symptomatis: quem uerō hic sequitur, causæ ra-
 tionē ille habet. Cui tamē (ut patet) continentis definitio congruit. Nec fluens phlegmone est.
 Sed non secūs obstructionem, meatuū ue paruitatem, aut omnimodam angustationem facit, q̄
 lentus ipse, crassus ue, aut multus humor. Cur ergo impactus humor ipsa met obstructio, mor-
 busq; est: Phlegmone autem internum spatium occludens, siue germen, aut quicūq; alius tu-
 mor sit, causa obstructionis, non ipsamet obstructio dicitur? Quod si pariter & hunc tumore
 ipsa met obstructionē esse posueris: tunc duo morbi non erunt, nec morbus morbi ut sympto-
 ma, aliq; ratione morbus suam causam sequitur. Sed unus idemq; morbus esset. Nisi duos
 hoc pacto morbos contempleris, ipsam uidelicet obstructionem, quæ aliud non est, q̄ tumor ille
 (ut sic dixerim) meatui impactus. quam obstructionem, quem ue morbum intemperies conse- 40^o
 quatur. Sicq; obstructio non sequens, at præcedens morbus esset. Sin uerō tumoris intemper-

riem

riem contempleris: hæc obstructionis causa non est. quemadmodum neque eiusdem tumoris solutio. Non alium ergo morbum obstructio sequitur, nisi tumorem, ratione qua tumor est. Igitur tumor causa obstructionis est. Sed enim uero quod risu magis dignum est, sedulo contemplandum uenit: Etenim ex Fuchsi opinione obstructionem aliud non esse, quam tumorem meatui interpositum, sequitur. Tumor uero hic, siue phlegmone sit, siue quouis alius, non nisi humor ille impactus est (ut de pleuritide ait) Ergo non aliud ibi morbum considerabimus, quam humorem illum impactum. Noua hercle morborum speculatio aureis characteribus, et in durissimo quidem matre, aut (rectius dixerim) perfectissimo quouis metallo, nedum intellectu insculpenda est. Apertius autem id eius exemplo patet, quum de lapide in uesica loquitur, dicens per se morbum esse
 10 in numero, alium tamen ex eo morbum nasci, nempe obstructionem. Quomodo enim ex lapide obstructio nascitur, nisi ut ex causa? Sic enim morbus morbi causa est. Igitur si causa est, & ei continentis definitio congruit, cui dubium, qui mente sanus sit, lapidem in collo uesicæ, aut principio meatus positum, obstructionis continentem causam esse? At rem exquisitius perlibra. Quomodo ex lapide ut morbo in numero potest obstructio fieri, nisi ut continente causa? Etenim si lapidem in uesicæ concavo consideres, tunc in numero morbus est, obstructionis uero antecedens causa, quia nondum obstruit. Si autem hoc modo lapidem intelligis, ut postea morbus in meatu fiat: quum scilicet inde ad meatum peruenerit. Duo me hercle morbi insimul non erunt, quorum alter alterum sequatur, uel ille huius causa sit. quod quidem Galenus intendit. Quando enim in numero est, obstructio non est: cumque obstructio fit, in numero non amplius est. Quod si eundem in ceruice uesicæ positum, & præcipue (ut nos in quaestione diximus &) perforatum supposuerimus: tametsi diuersis quidem rationibus, idem in
 20 numero morbus sit, circularis musculi contractionem impediens, aliaque ratione obstructionis causa, ac magis si perforatus non sit, Idem tamen lapis duplex insimul morbus non est, sed morbus, & causa, Morbus quidem in numero: causa uero, obstructionis respectu. Sicque uerus Galeni sermo erit, ex morbo morbum oriri, ut primus uidelicet morbus secundi causa sit. Quemadmodum febris calidos præter naturam tumores insequens, alter morbus est: qui nihilominus respectu eius, quem sequitur tumoris, symptomatis rationem habet, ille autem, quem febris ipsa sequitur, causæ. Præsertim quoniam læsarum à febre functionum tumor ille proxima, et absque medio coniuncta causa non est. Quicquid autem alterius medijs ratione offendit, non morbi, sed causæ rationem obtinere compertissimum est. Cum ille morbus uerè sit, qui absque ullo medio functionibus officit. At cur in adeo manifesta insania immoramur? Ad alia ergo prope remus. Etenim interea quorundam sententiam negligimus, omnis morbi causam continentem admittentium. Quoniam scilicet non intemperiem, malam uel compositionem, aut continui solutionem morbos, at morborum causas ponunt. Etenim licet exquisitissime, ac Philosophorum more loquendo, sanitas, non caliditas, aut figura. uel situs, uel numerus, magnitudo uel, at in his quædam proportio, Aegritudo autem disproportion sit: quemadmodum uberrimè alias ex Auerrhoe, b atque ipso etiam Turisano i demonstraui. Galeni tamen, cæterorumque medicorum (ut medici sunt) more loquentibus, febris essentiã in genere caloris præter naturam esse
 30 occurret: Itaque in alijs proferendum decernimus.

b 2. de aña com.
 143. et. 7. phy
 sicorū. 17.
 i 2. artis med.
 com. 4. p. 15.
 3. p. 24.

18^m.

Fol. 69. lin. 17. Residuum febris (oblata scilicet putredine) Symptoma non esse determinatur.

natur. Aut ergo remanens intemperies tanta est adhuc, ut lædere queat: Tuncq; febris eadem est putredinalis, quatenus scilicet à putredine generatione suscepit. Aut minor est, q; ut manifeste (morborum instar) offendat: Tunc neutralitas dici poterit. Aut penitus nullam læsionem, uel deniq; occultam inducit, etiam si aliquatenus sentiat. tuncq; sub sanitatis latitudine comprehendetur.

Ibidem lin. 25. Eorum sententia reprobatur, qui ablatis putridis humoribus, remanentem febrē diariam esse uolunt. Sequeretur enim cuiuslibet febris putridæ finem in diariam permutari. Quod autem non à putridis uaporibus, uerum ab acris, uitiosisq; sine putredine tamē exhalationibus, uaporibusq; in constrictionibus ephemeram fieri Galenus dixerit. Cuius Galeni uerba primo de differentiis febrium^k perpendenti liquere potest. Etenim si uapores filigines^{ue} putres essent, febris proculdubio putrida gigneretur. Illi enim non nisi à putridis humoribus eleuarentur. Haudquaq; uerò interim ualet: quoniam ibi Galenus de putrescentibus cibis meminerit: unde uitiosorum succorum generatio resultat. Putridi enim cibi tametsi uitiosos maxima ex parte succos generant, non tamen interea putridos. Quoniam in omnibus qui huiusmodi cibis utuntur, necessario febris, distributo cibo, superueniret. Immo si ualidissimus cuiuspiam uentriculus fuerit, optimumq; iecur, etiam si putridus cibus sit, usq; adeo coctione, ac uitiosarum, & putridarum partium segregatione corrigi potest, ut bonos inde succipiat humores: tantum abest ut necessario putridos aceruet. Exemplum ex canibus non fœtidis modo, putresq; nostras fœces: at carnes quoq; uermibus interdum scatentes, ad satietatem usq; comedentibus defumi potest: Multisq; pariter auibus, in quibus tamen nullam inde conspicimus læsionem contigisse. At hæc obiter, & ueluti per transfennam pro his, quæ in primo commento dicta sunt, satis superq; sint. Ad secundum pertranseamus.



Ol. 72. 35. Notandum ibi est, cum dicitur intemperiem consequi tumorem in apostemate: ipsum uerò tumorem, magnitudinemq; primitus apostemati congruere. Haud enim ex hoc intelligas uelim, q; primò fiat tumor, deinde intemperies, sed q; tumoris, apostematis^{ue} triplici ex morborum genere compositi ratio primitus in magnitudinis tumore consistit. Sæpenuerò, prior intemperies autē præsertim calida succos attrahens, tumoris causa est: nonnunq; uerò continui solutio reliquis antecellit.

l Aphor. 58.
in fine cōmēti.

Fol. 7529. Duæ assignantur ad Auicennæ obiectionem responsiones. Prima est. Simul stare dicens, semper in apostemate figuram, ac magnitudinē uitari. ueluti Princeps ait: et nonnunq; non usq; adeo uitari, ut sensu dignosci queat, Secunda responsio est quoniam. s. Auicennæ dictum magna ex parte (aliorum medicinalium theorematum more) uerum esse affirmabimus. Exquisitiū autem considerantes nunc, utranq; responsionem suspectā habemus. Primam quidem, quia iuxta Principis (quem saluare uolumus) mentem esse non potest. ut qui non ex symptomatibus, at ex morbis, ac per hoc manifestis, & functioni lædentibus compositionem declarare intendebat. Figura autem, dimensioq; sensum effugiens morbus nō est. Secundam quoq; suspectam quadantenus habemus: quoniam Auicennæ sermo uniuersalis est. Quamq; defendi potest ex eo quod à Galeno^l didicimus, maxima. s. ex parte, intelligendum: & si

Et si perpetuū quodam ex figura dictionis ostendatur. Ne ergo ad quartam responsionem peruenire cogamur. Errasse. Principem, de figura inq; uniuersaliter determinantem. Quod magis pium est eligemus: Tercio scilicet dicentes, figurā nomine formationem intelligendam hoc loco esse. sub qua superficies aspera, & lenis, uia, meatus ue, & receptaculum, propriaq; figura comprehenditur. Ex his enim, quæ prædicta iam à nobis sunt, ^m aliquā ^m supra fol. 18. formationis specie necessariò in apostematibus deprauari iam liquet. Nec uioleta huiusmodi interpretatio est. Cū sæpè nostro etiam æuo Interpretes pro formatione figuram, & pro figura formam traducant. Tu uerò eam, tibi ex huiusmodi responsionibus eligito, quæ tuis auribus magis arridet. ^{22^m}

- 10 Fol. 85. 34. § Intelligo autem hic. etc. § Aduerte quoniam Galenus de tumoribus præter naturam loquens, ⁿ ait. Idem in anthracis generatione aduenire, siue ab initio atrabilarius fuerit sanguis, siue ob affationem postea genitus. Est autem qui anthracem gignit succus in eum permigrans, q̄ proculdubio uerè, ac propriè atra bilis (quæ s. præternaturalis est) dicitur. Vel ergo ab initio, ante. s. hunc feruorē, exquisitè atra bilis non erat: Verum crassior tantum sanguis, melancholicus ue fuerat, qui tamen postea superaffatus in atram exquisitè bilim conuertitur. Vel si melancholicus crassiorq; antea non fuerit, usq; adeò tamen adustus est, ut in eandem atram bilim uergat. dum uerò in hoc feruore iam est, & exactè adhuc in atram bilim conuersus non fuerit, sed in eius confinio sit: anthracis causa Galeno docente^o fiet. Ete- ^o 2. de differen- nim postq; exquisita, perfectaq; iam atra bilis est: cinis remanet omni feruore (q̄q; non omni- ^{is} feb. cap. 9. penitus calore) destitutus. Quamobrem canceri potius causa fuerit. Quod si alias huiusmodi atra bilis genita iā sit, tamen si per se ad talē feruorē reuerti nequeat. Sanguini tamē, biliq; admista rursus feruere, anthracisq; causa fieri poterit. Quod aut nonnihil quoq; amaræ bilis in hoc tumore admisceri solitū sit. Cuius ratione feruor exarcebatur, Ex Paulo etiam elici potest, qui erysipelaceas inflammationes nonnunq; excitari protulit. Quoniam uerò densior substantia est, q̄ bilis pura, & exquisita, uel sanguini etiam admista. Idcirco uehementiores, q̄ ab erysipelaceis inflammationibus fiant, febres excitari Galenus^l edocuit. Verum enimuero in eiusdem Galeni monumentis repugnantia quædam inuenitur. Etenim exquisitè completam esse atrā bilim, quæ anthracis causa est, libro de febrium differētis secundo, inficias iuit. Verum potius in confinio. etc. Oppositum uerò, Primo eiusdem prædixisse apparet. Vbi, iu- ^r cap. 9. ^s cap. 3. in fine. sta Leonicensi traductionem, de carbunculis, anthracibus ue loquens, ait § fiunt autem ex sanguine quidem satis calido, & ad atræ bilis naturam, propter adustionem, conuerso. § Si ergo conuersus est ad atræ bilis naturam: quomodo conuersum non esse in libro secundo protulit? Quamq; promptissima responsio est: sic dicēdo. Conuersum esse ad atræ bilis naturā: quia iā ^{Rñsio p^a.} atra bilis naturam participat. Cum quo interim stat exquisitè, atq; adamussim conuersum nō esse. Notandus tamen Græcus contextus est. Nam dicit libro primo^l § μελαγχολικόν ^{2^a} ubi Leonicensius uertit § atræ bilis naturam; quæ quidem Græca dictio melancholicum mater- ^t cap. 3. gis redditum esse sanguinem significat, non atram euasisse bilim. Quemadmodum & in secundo libro: ubi Græcè dicitur § μελαγχολικὸς χυμὸς. § id est § melancholicus humor; idem ^u cap. 9: interpretes § atræ bilis humorem; interpretatur. Quæ quidem uerba pernotasse, futile non erit.
- 40 Cū plures inde obiectiones insurgere queant, de quibus tamen alibi fusiùs decernendum reseruauimus. ^{23^m}

x 2^o. de poten-
tibus naturalibus.
cap. 9. post mes-
dium.

Fol. 91. 26. { Diminutum quoque calorem dixisse, absurdum non est; Aduerte quod à Galenoid
insinuatum alibi legimus. Cum ait. { In sanguine generando quicquid abunde crassum, at ter-
reum ex ciborum natura, in nutrimento fertur, neque commodè à naturali calore alteratur, id
Lien ad se trahit. etc. }

24^m.

v 6. simplicium.
141.

Fol. 94. 28. Erysipelas, Tumor quidem ordine propositus quartusdecimus ad examen succe-
dit. Quoniam uerò nonnulli nominis etymologiam disquirunt: Hanc ob rem quod in studiis
publicè dicere consueuimus, obiter hic annotemus. Aliquando enim ἐρυσιπῆλας, diximus,
quasi ἐρύσιμω πῆλας, per syncopen: ablata syllaba {μω} fit {ἐρυσιπῆλας} hoc est, ery-
simo uicinum, quasi dicat simile {πῆλας} enim significat idem, quod {propè} Adeo ut tur-
morem præseferat, qui quidem instar erysime cutim comburat, & quandam illi mordicationē
inducat. Erysime enim semen (Galenus² ait) sicut gustu nasturtio apparet simile: ita fas-
cultate igneum est, ex calfactorium. etc. Irionem Latini appellant. Sic ergo me declarantem
non semel audiui stis. Quemadmodum & secundo nonnunquam dicere consueuimus {ἐρυσιπῆ-
λας} quasi dicat {ἐρυσιβηπῆλας} per syncopen quoque. Est autem {ἐρυσιβη} idem, quod
Latine ærugo, seu rubigo. Ut affectū æruginis instar erodentem, præsertim quoties exul-
ceratum est, præseferat. Atque iterum tertio diximus {ἐρυθροπῆλας} sic enim à quibusdam
aliquando scriptum Græcè legimus. quoniam scilicet propè ad rubrum accedit. Plauus enim
color exquirit ruber non est, sed illi proximus. Demum ex Etymologico magno {ἐρυσιπῆλας}
quoniam ad uicina trahitur, dictum esse propalauimus. à uerbo {ἐρύω} quod significat {traho} 20
& {πῆλας} quod (uti prædiximus) significat {propè} παρὰ τὸ ἐρυεσθαι ἐπὶ τὸ πῆ-
λας. ὅ ἐστιν ἐλαττωθαι. καὶ ἐπὶ τῷ τῷ πῆλας ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ πῆλας. quod est, Latine {Dici}

z Lib. 3. de his
quæ in medica-
trina fiunt. com.
31. ante mediū.

tur erysipelas (Felicianus Latine uicinitrahā nominauit, Nos autē passiuè potius, ex Ety-
mologico diceremus, uicinitrahentem. s. nuncupantes) ab eo quod est, trahi ad uicinum, proximi-
um ue: quod ē, ulcerari, trahiq; ac defluere: uicinas partes depascēs. { Trahitur. n. ad uicina,
cum extenditur, ac proximis partibus distribuitur, cuiusmodi naturæ esse hunc affectū, cuius
comperitum esse autumo. Tuum uerò fuerit, quamlibet harum nominis originem eligere. Mo-
do id ipsum prænotaueris. Quoniam scilicet omnes quatuor à futuro uerbi {ἐρύω} uidelicet
{ἐρύω} primam originem sumpserunt. Vnde & erysime, erysibe, id est ærugo, &
erythron, hoc est, rubrum quoque; orta nomina sunt. Verum hæc ad Grammaticos, quæ nisi à
quibusdam impulsus, ac magnoperè astrictus fuerim: sub silentio præterissem. Aliud nibi-
lominus interim non oblitus, quod maioris momenti est. Quoniam Galenus libro cui titulus
κατ' ἰντρῶν^a incensum esse, atque inflammatum semper erysipelas ait: cū tumore autē nō sem-
per. Id quod eiusmet dogmati apertissimè refragatur, in tumorum catalogo semper huiusmo-
di affectum connumerantis. Nisi aliquando manifestum non esse tumorem intellexerimus. ut
quum ex tenuiori, ac puri bili genitus, exquisitissimus affectus est. Quamquā semper aliquem
inesse tumorem determinatum à nobis est. Quum nullum esse apostema, tumorem ue ostendi-
mus, quin proueniat læsio in dimensione. hoc est, in ipsa corporis mole, ac (ut dicere con-
sueuerunt) corporeitate, interioriq; magnitudine. Satisque fore dictum est, quod in penitioribus
partibus tumor, moles ue præternaturam existat.

25^m.

Fol. 103. Tres herpetis species, iuxta Galeni mētē, supposuimus: quas infra^d ex ipsiusmet uer^d cōm. 8. bis uberrimē ostēdemus. Quoniā uerō sic DEO Opt. Max. placuit: Vt huius primū Tomi di- midii dūtātaxat publicaremus: Et cōmētū illud à pluribus ex nostris auditoribus desideratū: q. s. uiua uoce à nobis intellexerūt: Idcirco eorū, quæ de huiusmodi speciebus dicēda ibi sunt, sūmā hic obiter tetigisse uisum est. In primis ergo notā herpetē hūc à Scribonio Largo^e La- tinē zonā appellari. Sic. n. expresse ait: Ad Zonā, quā Græci ἐξ ἡντα dicunt. etc. idēq; Mar- cellus innuit. f. ac Plinio ascriptus liber & qui nō modō zonā, sed circinū quoq; nūcupat. Qui- nihilominus seorsum ab igne sacro de circino, zonā ue determinauit: quē sacrum ignē ad Græco- rū herpetē potius, q. ad erysipelas reducēdū fore, uberrimē quoq; infra demonstrabimus. Cu- ius ignis sacri speciem quādā cōsiderabimus: nō ab hoc tantū authore scriptā, Sed in ipso etiā le- gitimo, ac germano Plinij libro inuētā, h. quæ hominē mediū ambiēs, cingensq; ipsum enecare b lib. 26. c. 11. cōsueuit: Zosterq; nominatur. Eandē uerō spēm, et Zonā, et circinū esse opinamur: Et ob id circa finem. quā mediū cingere hominē soleat, et zonā, et circinū appellari. De quo tñ alibi fusius. Quod uerō Manardus prius, ac deinde Tagaultius, atq; alij Manardum amulati dixerunt, apud Hippocratē. s. herpetis nomine interdum intelligendos esse morbillos, reprobatur iam à nobis est. Tres uerō herpetis esse species, adeo me herclē apertē à Galeno prædictū, libro ad Glau- conem secundo^k est, ut cæcis, ac morionibus liquere debeat. Modō Galeni contextum ex i fol. 195. k cap. p.º. Græco emendatū legerint. Etenim Leonicieni traductio erroris, confusionisq; ansam pluribus hucusq; dedit. Vt duas esse herpetis species crediderint. Satius, autem fuerit Galeni uer- ba prius, ut ab ipso scripta sunt, contemplari. Sic. n. ait: ἡ μὲν δ' ἀποκριθεὶς, καὶ κατὰ τὴν μῆριν ἰσαμένως, ἔρως ὀνομαζέται. ἡ μὲν δὲ παχὺὰ τὴν σύσσειν εἶναι, πᾶν ἔλκει μέν, καὶ τῆς ὑποειμένης σαρκὸς τὸ δέρμα, καὶ καλὰ τὰς ἐπιπορφύρας ἔρπης ἐσθίον μέν, ἡ δὲ λεπτοτέρα εἶναι τὸ ἐπιπορφύρας μόνον ὥσπερ ἐπικαίει, καὶ τὸ τὸ εἶδος ἀπνέει, καὶ τὴν τὸ γένος προσκροῖαν ἀπὸ ὧσπερ καὶ χόρῳ προσθίει ἔρπης ὀνομασθέν. τῶν γὰρ ἁμῶν δυὼν εἰδῶν, τὸ μὲν ἢ δὴ προειρημένον, ἐσθίονος ἔρπης ὀνομαζέται: θά- ρον δὲ τὸ λοιπὸν, κακρίας, ὅτι καὶ τὰ βυμβέβηκε φλυκταίνας μικρὰς καὶ πολλὰς, ἐπιπορφύρας τὸ δέρματος ἐπιγέρει κακχοῖς ἐοικύας, γίνεται δ' ὁ ποῖος ἔρπης ὑπὸ χό- λης μὲν καὶ αὐτὸς ἁμῶν ττον σφικμάς καὶ θερμῆς, ἢ οἱ πρόσθεν: quod ē Latine ad uer- bū interpretantibus: sola uerō excreta, et in aliquo membro firmata (s. bili) herpes nominat- tur. Siquidē crassa secūdū substantiā sit, totā exulcerat cutē usq; ad subiectā carnem. Vocatq; hos Hippocrates herpetes exedētes. Si uerō tenuior fuerit, quod in superficie dūtātaxat ē, quasi deurit. Hæc q; species generis nomenclaturā sortita est. Cum simpliciter, et sine additione, her- pes nominetur. Nā ex duabus alijs speciebus, quæ quidē prædicta iā est, herpes est hiomenos, exedens ue nominatur: Altera uerō, quæ reliqua est, miliaris. Quoniā huic bullæ parua, ac multa per superficialē cutem milijs similes excitantur. Fit autem huiusmodi herpes ex bile qdē et ipse, at minū acri, et calida, q. priores. Hæc Galenus ait. Vbi cū scripsit: Sola. etc. cōmuniter loquebatur. Dein uerō species adiunxit: dicēs: Siquidem crassa. etc. Quorum pri- ma spēs est, quā Hippoc. exedētē uocat. 2.º. uerō noīe gñis nūcupari ait. Duas ergo spēs huc usq; Gal. apertissimē retulerat. Quas considerans Leonicienus, ita Græcum textum peruer- tens, subdit: Nam ex duabus speciebus, quæ quidem nuper dictæ sunt: altera herpes ex- dens nominatur: altera uerō miliaris. Quoniam in hoc affectu pustulæ parua, ac multa per summam cutem similes milijs excitantur. In qua Leonicieni uersione, duas esse her- petis

petis species patet. Quarum prima est thionenos herpes, altera uero & nomine generis, & alias speciali nomine, miliaris nuncupetur. Sic enim intellexisse Leoniceum teneo, saltem eo tempore quo librum Galeni ad Glauconem traduxit: De qua herpetis specie secunda statim Galenus addit: Fit autem herpes huiusmodi ex bile quidem & ipse, sed minus calida & acri, quae sit prior. Verum enim uero quantum à uero aberret, Galeni met ipsius Graeca uerba praeserunt, quae sic fidelius, atque ad uerbum translata resonant: Nam ex alijs duabus speciebus intellige alijs ab ea, quae nomine generis herpes simpliciter nuncupabatur. quod si duae praeter illam aliae sunt: cui dubium fuerit tres esse? At Galeni uerba prosequamur: quae quidem nuper dicta est, herpes exedens, siue corrodens, siue esthionenos uocatur: Aduertas quae quoniam ex duabus alijs, ab ea scilicet quae generis nomine dicta est, unius tantum antea meminerat, scilicet exedentis. Ideoque ait: quae nuper dicta est, etc. De altera autem specie (ex duabus, praeter eam quae nomine generis dicitur) nil adhuc dixerat. Quam ob rem euestigio subiunxit: Altera uero quae reliqua est, Miliaris dicitur. Quoniam, etc. Considera igitur uerbum illud à Leoniceo dimissum: quae reliqua est: sicut antea dimiserat alijs: & quod singulari numero legendum fuerat: quae nuper dicta est: ipse numero legit plurali: quae nuper dictae sunt: contra uero infra ubi legendum numero plurali fuerat: Ipse singulariter intellexit dicens: quae sit prior: Tu autem sic legas: Fit autem herpes huiusmodi (scilicet miliaris) ex bile quidem & ipse, sed minus calida, & acri, quae sint priores: ob pituitae scilicet admissionem. Necessarium uero fuit haec uerba subiunxisse, quod scire queamus, an ex bile miliaris etiam fiat. quoniam de hac antea non meminerat, sed de alijs duabus, speciebus. Hanc autem speciem denuo subiunxit: rationem assignare uolens, cur praedictarum altera generis nomen retinuerit. subdit enim: Quasi dicere uolens: Cum tres species sint, duae uero nomen obtinuerunt, ut altera ab Hippocrate exedens diceretur, altera uero ab alijs medicis post Hippocratis aetatem, miliaris nominata sit. Remansit absque nomine tertia. Qua de re simpliciter generis nomine, dicta herpes est. Verum de his loco proprio Deinceps uberius loquemur. Vbi tres etiam ex libro de tumoribus praeter naturam eligemus. Etenim primo dicens: cum biliosus fluor decubuerit, qui exactus quidem est, cutem ulcerat, etc. de quo postea subdit, herpetem hunc esse affirmans. De eo quidem, qui generis nomine simpliciter sic nominatur, intellexisse nec dedecet, neque à Galeni sententia digreditur. Quam obrem quum postea dicit: Cum autem rursus acer ipse alter quidem minus talis, etc. reliquas duas species describere, exedentem uidelicet, atque miliarem, determinari potest. Nec praecedentis, ut generis, diuisionem esse dicendum. Ni tunc temporis incognitam Galeno speciem, quae innominata est, Idcirco & omissam pronuntiasse (quod magis impium est) malueris. Sic & Paulum glossare possumus. Aetius uero iuxta Montani translationem duas potius uidetur intellexisse. Secundum uero Cornarii uersionem tres apertissime declarantur. Nobis autem (ut alias diximus) datum hucusque non est, nisi octo primos Aetii Graeci libros, proprio Idiomate legisse. Princeps Arabum non tres modo species distincte ostendit: sed duplicem exedentem sub formicae corrosivae nomine declarat, formicam interim ambulatiuam solam eam nuncupans, quae nomine generis herpes simpliciter ad Glauconem secundo dicitur. Quamquam turpissimo deinceps errore huiusmodi formicas, herpetes uel cum formicis, acrochordonisque Graecorum confundat. Razes etiam Galeni

k com. 8.
l cap. 10.

m lib. 4. c. 20.
in principio.

n lib. 14. c. 61.
o cap. 60.

p infra tit. 8.

q cap. 6. et. 7.

* Galeni uerba ad Glauconem referens, eo modo legit, quo nos ex Græco emendauimus, r 13. Cōt. cap. tres interim species uel ex Galeni sententia ponens. Pariterq; Haliabbas. Adeo ut miran- 10. tribus in locis dum proculdubio satis, plusq; satis sit de Tagaultio, Fuchioq; & Acalia duas duntaxat s. 8. Theoricæ species noscentibus. At ne in methodo quidem medendi tres quoq; species esse, adamussim sin cap. 10. gula perpendentem latebit. Etenim herpetem Romanæ mulieris describens, & qui duntaxat 14. Methodi cap. 17. xat cuticulā erodat, ulceretq;: Generis nomine uocatum herpetem intellexisse præsefert, qui cuticulam tantū ueluti deurit, etc. Altera enim species, quæ. s. exedens nuncupatur, totam cus- tim ad subiectam usq; carnem (exclusiue tamen ut dicitur) exedere, secundo ad Glauconem posita est. Quocirca quæ libro methodi quartodecimo^{26m} scribuntur, de simpliciter dicto herpete

10 intelligenda ueniunt. Meminit autem postea de miliari. Nulli uero dubium est exedentem quoq; speciem inueniri. Tres ergo necessario species inde colligemus. At de his obiter inton- tum hoc in scholio dictum iam sit. 26^m.

Fol. 114. s. Actium Galeni sententiā exscripsisse diximus: quatenus uidelicet duplex œdematis modus est, secundusq; dicendus potius symptoma est. Quauis Actius primum, quem sciz- licet morbum posuimus, flatuosum continere spiritum, & uelut à uaporofo humore prognat- tum posuerit. Cuius porro sententiam ueram esse ostendemus, cum defluentem prius pituitā, in uapores deinde conuersam, per ipsius carnis, atq; cutis etiam poros dispersam, imaginati fuerimus. Non secus, ac de sanguine in phlegmone generatione Galenus^{27m} dicebat. quoniam x 14. Methodi ca. 2^o. uersus me- diam.

20

27^m.

Fol. 115. lin. 11. { Tuū uero est, etc. } Quoniā ex multis propositis à Galeno tumoribus^{28m} ut œde- y lib. de tumori mate, cæcro, anthrace, carbunculo^{29m} ue, gangræna, atq; alijs sequentibus, sigillatim cæteros des- bus præter natu ram. cap. 6. post finit, eorūq; materiā, causam^{30m} ue expressit: Inflationē uero, Græcè dictā ἐμφύσημα, Latinisq; mediū et cap. 7. characteribus emphysema, non amplius nominauit, neq; (sicut in alijs fecit) definiuit: Hanc ob causam tunc nobis omisisse in catalogo eorū tumorum, qui à Galeno definiti sunt, placuit. Reducendum tamen aliquo modo ad quēpiā ex frigidis tumoribus à Galeno definitis: Quo- niam uero exquisitiū postea singula perpendentes, eum in sequentibus multorum aliorum tu- morum meminisse inuenimus, soloq; tumoris nomine contentum absq; ulla definitione, atq; ulla causæ mentione, pertransiisse, quemadmodum formicarū, acrochordonum, psyracū et 30 epinyctidū, quos tumores non secus, ac emphysema, tanq; oībus notos relinquēs, definire nō cu- rauit. Idcirco in melius nostram sententiā permutantes, huius declarationē neutiquam hoc lo- co postergandam fore, decreuimus: Quam ob rem duos, & sexaginta numero tumores pro- ferre in catalogo possumus, eorū scilicet qui à Galeno in libro de tumoribus præter naturam aliquo modo tacti sunt: Verū hæc q̄minimi momenti sunt: Quod autem necessarium om- ninō est, perpetim considerandum occurrit. uidelicet Tumoris nomen, definitio, causæq; & 40 temperamentum, quæ præ cæteris hoc in loco uestiganda, proposuimus.

28^m.

Fol. 116. lin. 36. { sicq; in foueam excuari nequit } Dictum ibi à nobis est ex uaporibus per poros dispersis alteram œdematis speciem constitui: E quibus deinde adauctis, partemq; 40 lacerantibus, altera quoq; emphysematis species fiat. Hinc est, quod ex œdemate nonnunq; emphysema fieri, contingit. Vt uidemus in cadaueribus, in quibus prius sit œdema (ut se-

y cap. 3.

cundi ad Glauconem.)^y Deinde auditis spirituosus uaporibus, adeo intumescit corpus, ut totum instar tympani resonet, & non amplius foueam, præmentibus digitis efficiat. Sic ergo differunt aliquando hi tumores secundum magis, & minus.

29^m.

Fol. 121. 19. Centaurea semetipsum curasse Chironē. etc. Inde fortassis hercle nomen impositum est, ut centaurea, & centaurium diceretur: quia Chironem Centaurum curauerit. Quæadmodum & chironion eandem nonnulli hærbam, ob curatum Chironem appellarunt.

30^m.

z lib. de medica
mentis. c. 6. post
medium.

a 6. de Hist.
aialiu. c. 22. in fi
ne.

b 30. Georgicoz
rñ uersu. 280.

e 6. de Hist.
aialiu. c. 18. post
principia.

d lib. 3^o. c. 17.
e p^a. 3^o. tr. 4. c.
22. & 23.
f 6. de loc. aff.
cap. 6. pⁱ. de Hi-
storia aialiu. 13.
& 2^o. p^o uersus
finem.

Fol. 130. 25. Lichen equorum declaratur: in eorū. s. genibus, ac super ungulas. Marcellus au-
tem Romanus medicus, Lichenem quoq; Asini ad medicinæ usum capit. dicens {capilli, & 10
barbæ nascentur etiam glabro, si lichenē Asini, id est collectionem duram, quæ est circa cruz
ra eius comburas, & teras, & puluerem illum ex oleo uetere imponas. Hoc ita ualidum est,
ut si mulieri inde maxillam unxeris, barbas ei nasci, scias. Hippomanes uerò, quod à Plinio
describi posuimus, ab Aristotele prius dictum legimus. Sic scribente { Cum equa peperit,
statim secundas deuorat, atq; etiam quod pulli nascētis fronti adhæret, Hippomanes dictum,
magnitudine minùs carica parua, specie latiusculum, orbiculatum, nigrum, hoc si quis prærus
pto odorē moueat, equa excitatur, furitq; agnito eo odore. Quapropter id à ueneficis petitur,
& percipitur mulierculis. Virgilium autem idem inuuisse diximus. cū ait. { Queritur &
nascētis equi. etc. } At hoc nomine expresso, aliud Virgilius intellexit. Cum aliàs inquit. 6
{ Hinc demum (Hippomanes uero quod nomine dicunt Pastores.) Lentum desillat ab inz 20
guine uirus. } Quo etiam ad ueneficia mulieres uti subdit { Hippomanes, quod sæpè malæ
legere noueræ: Miscueruntq; herbas, & non innoxia uerba. } Nec minùs autem ab Aris-
totele id præscriptum legimus. Cum de equarū libidine, ac furore loquens, ait. { Tūm ali-
quid emittunt, quod Hippomanes appellatur, eodem, quo illud, quod nascitur (scilicet in fron-
te pulli) nomine. Sed hoc præcipuè ad amoris ueneficia petitur. } Duplex ergo Hippomanes
Aristoteles docuit. Rursusq; statim subdit { Equæ tempore coitus humorem emittunt suis ge-
nitalibus, similem genituræ, sed multò tenuiorem, q; mares: quem Hippomanes nonnulli ap-
pellant, non quod pullis nascentibus (scilicet in eorum fronte) adhæret. } Quamq; non des-
sunt, qui herbam, Aliq; fruticem huius nominis esse autument. quoniam equis degustata fu-
rorem inducit. Dicitur enim ab { ἵππος } Græcè quod est { equus } & { μανία } quæ 30
furibundam insaniam significat. Quæ quidem ratione tam Hippomanes pulli nascentis fron-
ti adhærēs, q; alterū genituræ simile, à genitalibus libidinosæ, furentisq; Equæ refudans cois-
tus tempore, atq; emanans, nominatum utrunq; à uetustissimis Græcis est. Quoniam scilicet
maniam, furibundam ue, ac temerariam, uel amoris sæpenumerò insaniam, epotum inducit.
Quod si uel herba, uel frutex, uel quodcūq; aliud ab equis exesum, epotum ue illos in insaniam
perducat, Hippomanes quoq; dici potest, q̄tum ad nominis uim pertinet. Quamq; uetustissimi
non id intendunt, sed quod ab equis originem habens, edentes, bibentes ue maniacos, insanosq;
reddat, non uera tantum dementia, q̄tum ex amore. quos ita ob amorem insanientes Paulus,
Græcè appellat { ἐρωτίας }. Auic. uerò Arabicè { Iliſci, seu Alhasach. }

31^m.

Fol. 159. 7. { uel inuito Galeno } Galenus enim glandem non tumesceri ait. f Contra quæ plu-

ra

ra ibi diximus. Quæ non solum ipsi aduersantur Galeno: sed Aristoteli. à quo hæc sententiâ transcripsisse Galenum opinor. Quamq; & aliter quoq; deficit Aristoteles, ut qui cartilaginem esse penis substantiam in homine credidit. ^{32^m}

Fol. 170. 36. Plurima ex Dioscoride Plinium exscripsisse diximus. Plinio Dioscoridem uetustiore esse supponentes, cum Chronicarum Authore. qui Dioscoridem sub Vespasiano Flavio, decimo Romanorum Imperatore, ac Titi patre florente: Plinium uerò sub Traiano quatuordecimo Romanorum Imperare scripsit. Verum si benè consideramus. Plinius quoq; sub Vespasiano floruit: Cui libros naturalis Historiæ dedicauit. quemadmodum in eiusdem Epistola ad Vespasianum nuncupatoria liquet. Quam ob rem contemporaneos fuisse apparet. Id

- 10 quod Hermolaus^e etiam comprobat: præsertim quia tam Plinius, f. q. Dioscorides, & Licanium Bassum cognouerit, & quidem ambo prouecti, & iam commentantes. Quinimò Hermolaus aliquando posteriorem, licet non multò, Dioscoridem suspicatur. Nos autem & si contemporaneos fuisse compertum habemus, prius tamen Dioscoridem sua commentaria in lucem ædidisse reputamus. Vt qui Licanium Bassum cognouerit, eius tamen ut uiuentis mentionem fecit. Plinius uerò se naturalis Historiæ libros condente, mortuum esse Licanium carbunculo testatus est. Impossibile igitur non est à Dioscoride Plinium aliqua transcripsisse: Quem nihilominus nominasse dedignatus fuerit. Quod si nec Dioscoridem Plinius: neq; hunc ille nouerit: Ab eodem tamen ambobus priore aliquo Græcorum scriptorum, utrunq; plurima sumpsisse uerosimile est. Qua de causa in plurimis conueniant. Atq; id ipsum pro eo, quod im-
- 20 præsentiarum intendimus, satis, superq; nobis est. ^{33^m}

Fol. 172. 10. & 11. & ascf. & asaf. significant desudationem unde dicitur asaphati siue saphati ex Rasis locis comprobatum est, ac deinde Serapionis, dicentis & deriuatur hoc nomen proprium saphati ex accidente proprietatis sequentis eam, quod est, quia accidit cum ea quædã foramina parua tenuia ualde. Ex quibus foraminibus resudat aqua. etc. Vbi uerbum & resudat considera. Vnde nominis ratio capitur. Cum, ut diximus & asaphati siue saphati ab ascf. siue asaf. sudorem significantibus deducta nomina sint. Quam ob rem & idem quoq; Razes alibi de hoc eodem affectu loquens, quem Græci ὑπόαξ id est, sudamina uocant, ait Ideo Græci appellant asaf. cum nomine deriuato à sudore. etc. ^{34^m}

^e In Glossematibus in Plinium super libro. 26. cap. p^o.
^f lib. 26. c. p^o.
^g lib. p^o. in præfatione.
^h Vt lib. 29. in fine in glossematibus Plinij.

25. Cont. ca.
23. circa prin^a.

- 30 Fol. 183. 7. & ut formica, & clau. etc. & Auicennæ locus correctus quoq; supra fol. 32. ubi lin. 27. 30. 32. formicas, pro Arabum consuetudine, diximus, quas Græci herpetas uocant. Hic uerò formicam, non Arabum, sed Græcorum intelligimus. μυρμηκῶν illi nuncupant. Sic enim & ipse met. Princeps non semel Græcorum more tam hoc nomen, q. alia usurpat. Quamq; aliàs Arabes insequens, Lectoribus non paruam errandi ansam præbuerit. ^{35^m}

- Fol. 193. 18. & Hippocrates eethymata nuncupasse uisus est & dico uisus est quia nō patet hoc expresse nec à Galeno declaratum alicubi offendimus. Sed ita Manardus, eiusq; deinceps exscriptores Tagaultius, & Fuchsius, acceperunt. Sed enim uerò inde colligi potest: quoniam à crassioribus fieri humoribus eethymata Galenus ait: Cuiusmodi exanthemata Paulus describit. Tenuiores enim uel per halitum discuterentur, uel in amplum latum ue, herpetis, erysipelatis ue instar, extenderentur. ^{36^m}

Fol. 194. prima & eius methodum minimè postergassent } . s. Hippocrates , Galenus , cæte-
riq; Græci, & Latini Authores ueteres . Quòd si fortasse Hippocrates , & Galenus uel
omiserint, uel (si dixisse mauis) scripserint, sed tamen hodie uolumina, in quibus scripta hæc
sint, minimè reperiantur : Oribasius tamen, Paulusq; , & Aetius nequaquã præterijssent . At
hi exanthematum curationem scribentes, longè diuersum ab ijs, quos nunc uesligamus, affe-
ctum intellexerunt. Vt tum ex affectus descriptione, tum ex remediorum natura patere cuius-
uis potest. 37^m.

i 3^l. Apher. 20.
k cap. p^o. post
principia.

l^o ca. 28. sec. 14

Celsi locus.

Ibidem. 5. & uti Celsus Latine conuertit, pustulæ, ulcerosæ ab Hippocrate. etc. } Aduerte qd
nō dicimus nos Celsum uertere { pustulæ ulcerosæ } Sed ad Celsi uersionem refertur dun-
taxat dictio { pustulæ } quæ dictio, sicut & { efflorescentiæ } refertur ad Græcum nomen 10
{ ἐξανθήσεις } & quoniā dicitur ab Hippocrate in aphorismo { ἐλκώδες } Ideo statim sub-
dimus { ulcerosæ } Celsus uerò Hippocratisⁱ aphorismum (ut sui moris est) referens libro
secundo, k { pustulæ } tantum, absq; hac dictione { ulcerosæ } ait: sic dicens { Vere tamen ma-
ximè quæcunq; humoris motu nouantur, in metu esse consueuerunt. Ergo tum lippitudinis, pu-
stulæ, profusio sanguinis, abscessus corporis. etc. } Volumine autem quinto, l^o ubi pustulas, 20
quæ maximè uernis temporibus oriuntur, declarat: exanthemata ostendit, proprijsq; inditijs
describit, subdens & ubi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet: ἐλκώδες Græ-
cè nominatur. etc. } Adeò ut ad Hippocratis aphorismum accedere uideatur, pustulas ulcero-
sas definiens. Quamq; in quibusdam nuper impressis Celsi codicibus, loco dictionis { ἐλκώ-
δες } legatur { φλυκταιναι } sed non ita nostris, & Hippocratis auribus huiuscemodi con- 20
textus: ueluti alter arridet. Inficias tamen minimè imus, & hoc etiam secundo modo legi pos-
se, ac ueritatem in Celsi dictio inueniri. 38^m.

Ibidem. 23. & Multæ coniecturæ persuadent. } Quarum prima est: Quoniam ferè omnes hu-
iuscemodi exanthematibus usq; adeò affliguntur: ut nullus quidem, nisi acerba morte cor-
reptus sit, intactus euaserit. Secunda est quoniam infantibus præcipuè, tenerisq; puerulis ad-
ueniunt. Tertia quoniam si deest in tenera ætate, in sequentibus tamen, uel in ipsa demum de-
crepitate, aduenire consuevit: quasi necessariū quoddam sit humanæ uitæ accidens. q; q; ali-
quo modo ad primam hæc reduci queat. Quarta coniectura est: quoniam cuicunq; semel con-
tigerit, rarissimè secundo, aut tertio reuertitur. Quinta est, quia si una quidem uice uariolas
passus homo fuerit: alia rursus morbillis, maxima ex parte, uexabitur, & contrà. Demumq; 30
rossalia tentabitur. Sexta est, quoniam uariolis prius, dein morbillis, ac tertio demū rossalia, ut
plurimum affligi consueuerimus. Vt minor in secundo, minimaq; in tertio affectu malignitas
remanferit. Septima tandem fuerit, quoniam post uariolas, morbillosq; , & rossaliam, salus
brior homo uiuit: eoq; magis, quò perfectius horum occasione perpurgatus fuerit. Plura tas-
men loco deinceps proprio demonstrabimus. 39^m.

Fol. 197. 7. & Exceptis Adamo, et Eua protoplastis. etc. } Inuidi qdam susurr ones mihi le-
genti occurrerunt, CHRISTVM Gloriosissimum nostrum Redemptorem obijcientes.
quoniam homo fuit, ueruntamen uirili ex semine conceptus non est, nullamq; materni sangui-
nis infectionem recepit. Qui tamen responsione penitus indigni sunt. Cum de hominibus lo-
quamur, & peccato, & cuius morbo subiectis, secus uerò est de CHRISTO uerissimo 40
DEO, et Homine: Vt qui non ex uirili semine, sed Spiritu Sancto cōceptus est. Purissimòq;
&

& immaculatissimo sanguine genitus. Quinimò & Beatissima eius mater, ac sanctissimi
 Apostoli, & reliqui omnes à DEO Optimo Maximo electi extra nostri libri, tumorisq;
 omnis considerationem existunt. Quemadmodum & alij quoq; repellendi, qui à mundi prima
 origine menstrualementem infectionem extitisse, nobis aliquando admittentibus^m obijciunt ante
 primorum Parentum, Adæ. s. atq; Eux originale peccatum, non fuisse in medium adducentes.
 Ut quod nos largè ac Medicorum more, & secundum quendam loquendi modum pronun-
 tiare solemus, ad sophisticas reducere quæstiones enitatur. Satis enim, superq; nobis est, ante
 Aesculapium hanc infectionem extitisse. Quam ob rem ab Hippocrate, cæterisq; uetustio-
 ribus medicis, q̄tum ad hoc attinet, cognoscendum fuerat. Sed omisiss blaterantibus sycophantis,
 10 alia perpendamus. 40^m.

Fol. 200. 202. 203. tangitur, pro responsione ad secundum argumentum Fernely q̄ ex mens-
 struo quidem sanguine embrionis generatio fit. Pro quo notandum est: eos, qui oppositum sen-
 tiunt, inde fortassis persuaderi: quoniam satis absurdum sibi uidebatur naturā, pro embrio-
 nis generatione, peiorem sanguinem transmittere. uidetur ergo ad uterū, pro huiusmodi ope-
 re complendo, perfectiorem descendere. At minimè interim aduertunt quodlibet membrum
 sibi prius, q̄ alijs intendere: quemadmodum ex Galenoⁿ aliàs ostendimus. Cum uerò insitas à
 natura facultates habeat, quibus se ipsum regat, attractiua utitur semper, quod perfectius,
 dulciusq; est attrahendo: Expultrice autem quod molestius, grauiusq; fuerit, à se reijciendo.
 Hepar ergo, & cætera mulieris membra omnia cum perfectiorem, et magis elaboratum san-
 20 guinem, pro sui nutritione, attraxerint: quod crudius, minusq; purū est ad uterū singulo men-
 se deijciunt. Vnde forās expurgari queat. Quod si semen ibi, formatrice sua, generatriceq;
 uirtute operās hic inuenerit, ab eodē retinetur, coquiturq; & exquisitissimè elaboratur: præ-
 sertim quod ex hoc minùs impurum est. Rursusq; ex eo, quod concoctum est, perfectiusq; ac
 magis depuratum attrahens: deterius ad circūstātes uenas, ueluti ad promptuarium quoddam
 (uti Galenus^o ait) transmittit. Vnde nō ad mammas modo regurgitat, eas tume faciēs, in colo-
 strum aliqua ex parte mutatum: sed ad pedes quoq; descendit. qua de causa tume fieri, œde-
 matofo quidem tumore, grauidarū crura consueuerunt. Quauis ergo embrio, & ab initio
 sperma ipsum in utero conceptum, quod exquisitius, perfectiusq; est, ad se trahat. Non potest
 tamen à remotis, & à toto matris corpore attrahere: nisi quod propinquū est, & illuc ab uniz-
 30 uerso corpore, tanq; superfluum, & aliorum membrorum nutritioni ineptum, depulsum fue-
 rit. Aliter. n. concipiens utero mulier crassissimo, imperfectissimoq; & uitioso sanguine uix
 nutrita (cum perfectior ad embrionem traheretur) ad nonum mensem usq; uiua perdurare
 non posset. Etenim sic ualida membrorum natura non est: ut eum sanguinem, spermatis in-
 star, elaborare queat. In quo uis tanta est, ut non coquere modo, aut nutrire, sed generare etiā
 ualeat. Verū plura de his aliàs, & quidem uberrimè locuti sumus.

41^m.

Fol. 202. 28: { Hereditarios podagricos uidemus. etc. } Immo accidit aliquando patrē in sene-
 ctute aliquem pati morbum, quem postea filius, ad eandem perueniens ætatem, patiatur. Cum
 tamen (quod mirabile dictu est) genitus hic filius sit à patre, prius q̄ talem morbum passus ip-
 40 semet pater fuerit, ut potè adhuc iuvene, ac robustissimo existente, ut ex hoc quidem osten-
 datur, non in ipso tantum filio reseruatam diutius, abditamq; huiusmodi uitiosam qualitatem
 extitisse,

m VI fol. 204.

35. de u. ob. 9. q. 9.

ni. 81. q. 2. m. 1.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

q. 2. 2. 2. 2. 2.

existisse, uerum etiam in patre. Quicquid in tempore, quo iam hunc filium generauit, huiusmodi abditam qualitatem reſeruabat. Quam deinde ad ſenectutem perueniens publicauit. Ita quoque in filio obſeruatum eſſe diximus. Sic etiam de caluitiei, & barbæ, multorumque aliorum ſymptomatum ſimilitudine indies conſpeximus, qua filij ad patrem reſeruntur: Ariſtotelesque

p^o de geneſi iam aliquando p^o idipſum tetigit.

42^m.

ratione animarum
lium cap. 18. in
principio.

q^o libro 5. cap.
28. ſec. 14.

r^o Ibidem cap. 28.
in principio.

Fol. 213. lin. 12. & 13. & 16. & 28. Puſtulæ nomine cū interprete Linacro ſæpè uſi ſumus, ubi Græcè habetur {φλυκτελ'ια} atque ita prius, in declaratione tumoris decimi, admiſimus.

quand; puſtulæ nomen genericum apud Celſum⁹ eſt, multas ſub ſe ſpecies includens. Etenim quia Celſus quoque met de carbunculo ſpeciatiſſimè aliquando loquens, puſtulæ nomen ſpeciatiſſimè uſurpauit. Ita & nos ipſum æmulati, bullæ, ampullæ uel loco, puſtulas (ubi præſertim non ex propoſito loquimur) admiſimus.

43^m.

Obiectio.

Ibidem ponuntur reſponſiones ad primum, & ſecundum argumenta facta contra Celſum. In quibus tamen reſponſionibus ambigere quiſpiam poſſet: quoniam uidentur ſibi inuicè reſpugnare. Etenim ſi de ſæuiori, malignaque, ac adeo uenenosa, ut partem affectam ſenſus expertem, gangrænæ inſtar, nedum indoloriam reddat, anthracis ſpecie locutum eſſe Celſum exiſtimarimus: ut primi reſponſio inſinuat: Quomodo ſine febre eſſe poteſt? Quod ſi à febre immunis eſt: quia ſ. in principio adhuc tumor ſit: Quomodo igitur doloris, quin ſenſus quoque interdum expertem particulam reddidiſſe ualuit? Ni ad ſui extremum, ſummumque perueniſſe tumorem intellexerimus? Abſurdum uero nimis apparet horum ſignorum alterum in fine, alterum uero in principio capi. Cum ſimul ambo, ad eiſdem affectus ſignificatione,

Rñſio.

relata ab ipſo Celſo ſint. Cui quidem obiectiōi reſpondendum eſt, ſic proculdubio eſſe. uis delictet primum ſymptoma ipſius morbi potiùs finem inſequi, quo tempore carbunculi effigie exquisitiùs repræſentat. Prius enim quàm in nigredinē peruenierit, aduſtumque, & cruſtoſum ulcus effectum ſit, carbonem præſeferens, Phlegmone potiùs, quàm carbo nuncupandus huiusmodi tumor uenit. At quod nam abſurdum eſt ei, qui cuncta ſigillatim inditia, ſymptomataque narrare intendit, ſi quæ in principio adueniunt, ijs, quæ in medio, aut fine morbi contingere conſueuerint, connumeret? Id quod apud Galenum quoque, Paulum, Auicennam, cæterosque tam Græcos, quàm Arabes, atque ipſos etiam Latinos obſeruari ſæpiſſimè poteſt. Ultra quod ne penitus quidem impoſſibile, aut indecens eſſe arbitramur, anthracem, uel completum, ultimoque combuſtum, in aliqua extremarum partium à corde remotiſſimarum obortum, abſque febre nihilominus ab initio ad finem uſque perſeuerantē aliquā inueniri poſſe. Præſertimque in ſicciffimo, puriſſimoque, & ad putridam febrem ineptiſſimo corpore, & in hyeme, atque aere ſicciffimo, uel tēperato, aut à uentis, & præcipuè Aquilonijs expurgato. Quemadmodum ſæpè phlegmonas uſque adeo uehemētes uidimus: ut ad Gangrænā perduxerint. abſque febre nihilominus perduraſſe. Sic & heryſipelata, & herpes. Quinimmo (quod dictu mirabilius eſt) & leues, paucasque interim numero uariolas eodem modo, præter, ullam febrem, factas aliquādo uidimus. Cui & ratio quadantenus aſtipulatur. Cum totus ille, non multus interim, uenenofus, malignusque, & atrabilarius humor ad extremum, uilemque locum, et à uiſceribus, præſertimque à corde remotiſſimum expellatur. Cuius occaſione ſi febris affuerit, uel comminueretur: uel prorsus ceſſaret. Quoniam ergo Medicorum Theoremata magna ex parte perpetim intelligenda fore Galenus etiam ipſe confeſſus eſt: etiam ſi ex figura dictionis perpetuum quid

s 6^o. Aph. com.

s 8.

oſtendatur.

ostendatur. Idcirco (ni uelis impiè Celsum, atq; Plinium condemnare) Hos authores sibi inuicè congruentes reddere possumus. Quam ob rē neq; Celsus sine febre huiusmodi affectum gigni simpliciter protulit: ut qui rarissimum, & pauco etiam tempore perdurans acceperit: Verum disiunctiue loquens, ait { nonnunq; horror, aut febris oritur, aut utrunq; etc. } Sed uberius loco deinceps proprio, tam hæc, q; reliqua multa contemplabimur.

44^m.

Fol. 220. Tuberculum dupliciter capi, apud ipsum quoq; Celsum dicitur. nec (ut aliqui uolunt) speciatim, pro speciali Græcorum phymate. Quod si apud eundē quoq; Celsum adeò speciale nomen id { tuberculum } caperetur, ut idem penitus suo cum phymate esset: Haud tamen propterea cum Hippocratis, uel Galeni phymate confundi posset. ut cum illis dicamus, Hippocratis, Galeniq; phyma, Celsi tuberculū esse. Quoniā (prout ibi fusiùs ostendimus) idem non est Celsi phyma cū Hippocratis, aut Galeni phymate. Tu igitur perpēde. Sed ne obstat quidem, quia secundo libro, "Hippocratis aphorismum" Latine referens, ait { et plura alia tubercula } ubi quidem Hippocrates Græcè scripserat { καὶ τὰ ἄλλα φύματα } ut hinc Latine tuberculum, propriè dictū phyma præferat. Etenim cōmuniter, generatimq; sumptū esse tuberculi nomen, ueluti & apud Hippocratem, phyma, ex ijs, quæ uberrimè à nobis declarata iam sunt, liquet. quo nomine strumas etiam, acrochordonas, glandulasq; dignatus ipse Celsus sit. Hermanus autē Crusenius primo de morbis uulgaribus: Vbi Græcè Hippocrates habet { ἐπεύματα } Latine dicere possumus eleuationes, ipse uertit { tubercula } tuberculi nomen (ut patet) generatim usurpans.

45^m.

Fol. 222. De Bubone sermo fit: multa; de hoc nomine dicta sunt. Breuiter tamē impræsentiarum annotemus, quoniam si nomen id { βύβων } prius de inguine, sede scilicet, dein uerò de omni phlegmone in glandulis quibuscunq; captum sit: Quemadmodum nonnulli dupliciter tantū bubonem capientes, declarant. Verisimillimū est prius etiam de inguinum inflammatione dici, q; de aliarum partium adenosarum affectu. Qua de re tripliciter capi bubonis nomen supposuimus. Primò pro inguine. s. particula: Secundò pro eiusdem affectu. Teriò pro reliquarum glandosarum partium inflammatione.

46^m.

30 Fol. 224. in principio Galeni φύγελλον definitur. quod quidem caliditate simul, ac generationis celeritate ab alijs phymatibus, tuberculis'ue, in ipso etiam adenosarum partium loco genitis differt. Quam ob rem deductum esse nomen dicere possumus fortasse, παρὰ τὸ φύγιν, καὶ ἐθέλειν: quasi dicat: ab eo quod est, fugam, exiliumq; uelle, arripereq;. Vt dicamus, φύγελλον, id est, φύγιν ἐθέλων hoc est, fugam, exilium'ue cupiēs. quasi humor ille non uti à natura tantū pulsus, eiectusq; in adenas percurrat, uerum sua sponte q; libentissimè accelerans, tanq; ad sibi paratū locum defluat, usq; adeò. s. celerrimè concurrens, ut ocyssimè tumor generetur. Quauis & hoc ipso celerius ad suppurationem perueniat propriè dictum Galeni phyma. ut quod ex sanguine syncero fiat: quemadmodum phygethlo bilis admiscetur, eius suppurationem retardans.

47^m.

40 Fol. 239. 37. { nonnulli uolunt } Hermolaus Barbarus' ita declarat. Quo etiam modo Calpinus. Qui licet de ramice loquētes Celsum minimè nomen: Quoniam tamē antea de her-

y In glossæ
tibus i Pliniū di
Etione { Enteros
cela } litera. E.

nie

e lib. 7.º c. 18. *nia* fermocinati, eam ex Celso⁷ in tres species distinxerant. Idcirco de ramice deinceps ad-
 iungentes, pro Celsi consuetudine, supposuisse uidentur. Cum hæc neq; apud Plinium, neq;
 alium ex ueteribus Romanis, quos uidisse permissum est, colligere potuerint. Motos autē ad
 huiusmodi opinionem hos, & alios idem pronuntiantes, suspicor: quoniam uidentes ipsi Cels-
 a *ibidē* cap. 22. sum, ramicis nomenclatura, circocelam comprehendisse: ^a ac postmodum capite sequenti ^b de
 b *cap. 23.* sarcocela determinasse (quanq; ramicis nomine hanc minimē significauit) demumq; de bu-
 bonocela statim scripsisse: ^c quam & ipse ramicis speciem supposuit, inguinis ramicem nun-
 c *cap. 24.* cupans: sarcocelam sub ramicis etiam nomine comprehendi posse, iudicarunt. Quoniam uerò
 d *lib. 6. c. 63.* sarcocela cum porocela plurimum conuenire, uidetur: adeò ut Paulus^d de utroq; affectu,
 in eodem capite determinarit, distinctionis interim inditia subiungens: hanc fortassis ob cau- 10
 sam, & porocelam ad ramicem reduxerunt. Nos autem (ut ibi quoq; notauimus) solam ex
 Celso circocelam, ac suo modo definitam bubonocelam (quæ uaricis etiam species est) com-
 prehensam esse ramicis uoce, obseruauimus. Sed hæc Grammaticis omittantur.

¶ Hæc sunt, Scholares, ac tanq; filij dilectissimi, paucula quædam scholia, uobis (ut spero)
 non inutilia. Quæ quidem non tanq; publicanda scholia scripta prius fuerant, sed obiter, ac ut
 contingebat, in mei libri margine inter imprimendum annotata. Cuncta à quibusdam
 ex nostris familiaribus discipulis uiderentur, instanter etiam petita fuerunt.

Quamobrem currenti ferè calamo transcripsimus, ac Typographo
 pro uestro rursus commodo præbuimus. Valete igitur,

et me, uti soletis, peramate. Ac necessarium Indiz-

cem ab his accipite: Vnde quæ in libro

scripta sunt, promptissimè in-

uenire uobis integrum

fore, comper-

tum est.

AD LECTOREM

Prius q̄ ad libri examen perveneris, corrige mendas Typographorum incuria contingentes, utpote quæ inter legendum sæpè rei sententiam perturbare possent. Quamobrem ex industria statim ab initio pernotasse decrevimus. Vbi primus numerus foliorum: secundus uerò lineam ostendit. Vbi uerò unus tantum numerus positus est, prænotati folij lineam indigitalat.

Hæc ergo sunt.

Folio. 25. linea. 30. deest dictio {nonnunq̄} legendū ergo est {ab Hippocrate nūnq̄ designatæ} Et 39. {ad sciens} i. adiungens. 27. 18. {audiuimus, comprobatur.} deest ergo {comprobatur} 30. 16. {non confirmata} ibidē in margine litera, e, 123. ante & post {litera, k,} {dictorum} 57. 7. {differentijs} lege {causis} 62. circa medium marginis {Ad p^m. 2^m. & 4^m.} Pauloq; post {Ad. 3^m. & 5^m.} 64. post mediū marg. {Ad p^m. 2^m. & 4^m.} 65. 26. {promiserūt ut ita} 68. post principia marg. {Exemplum} 3^m. {dein} 2^m. {deinde} p^m. {sic. n. ab Auic. disponūt.} 68. in Marg. h. male habetur. {fo. 47. lin. 3.} lege ergo {fo. 35. litera. n.} 74. 27. post uerbū {comprehendit} integrā lineā typographus omisit. sic. n. subdere opz {Haud. n. compositus dici pōt, quia cum intemperie humor existit. Cum nō morbus at causa humor hic sit} Adeo ut etc. 74. 40. {uideatur} 85. 10. {minulentum quidē ulcus intellexerit.} 31. {feruenti} 86. i. {confirmatur} 89. 33. {fermentationemq;} 92. in marg. post principium {tres responsiones} 93. 33. {Χωρις τῶ Ζειν} 103. 27. {quod apostema} absq; accentu. 109. f. {q̄nto de cōpo.} 37. {ad αχχὺ μωσιν} ergo per .x. 112. 16. {expositione, significans} 113. 29. {utro gerentibus} 115. 14. {nonnunq̄} 117. 39. {Quain re} 121. 31. {tam Celsus} 124. 19. {affectus} 21. {colligationeue corporis} 31. {consueuerint} 38. {adhuc} 130. 31. {præceptus} 132. 29. & 30. {Polybi} 148. 4. {elephanticum} 28. {comparare} 173. 12. {ulcuscula} 41. {alband} bis absq; aspiratione legendum. 175. lit. x. {in declaratione} 178. 6. & 11. {ecce smata} 179. 21. {dici possit} ubi legitur {dicere possemus} 21. deest dictio {sedēq;} legendum ergo {symptomate sedēq; nomen} 180. 14. {plures} 182. 4. {nesciens} 186. 24. {uehementiores} 190. 25. {exanthemata} 26. {Galenus} 191. 35. {mordensq;} ubi legitur {moderansq;} 194. 16. dea est {affectum} lege ergo {congenitum affectum, quem} 30. {diuersos quoq;} 195. 37. {sepiissime} 197. 38. superfluit {quia} lege igitur {Enimvero non penitus} 199. 18. {in oppositum} 202. 9. {ad cauum} 203. 18. {generatione} 212. 37. {ut rectius dixerimus} 213. 13. {serusta} 217. in principio {cuius quidem} deest ergo dictio {cuius} 219. 9. {duritie} 236. 39. {occurrens demonstratur} 238. 39. {ἐγὺθροειδὲς} 239. 3. {ἰλυτροειδὲς} 8. {ἰδλος} 11. {ἐγὺθροειδὲς} 241. 28. {cir soclam} lege {hydroclam} 245. 29. {quouis modo} absq; accentu. 246. infine marginis. litera {i} ponitur cū loco Razis. quæ tamen poni debet {fo. 247. 3. ubi est, i, super dictione {lepra.} 258. 29. {uaca} lege {uocatam} 264. 30. {ineptissimisq;} 267. 38. {appareat} 370. 34. {Arabibus} 274. 9. {μεταξὺ} 276. 1. {interpretatus est} 9. {phlegmonenue} 277. 34. {antiadas} 284. 16. {uarijs} 296. 7. {Quarum} 300. 18. {tamen.}

In Scholijs fol. 10. li. 11. {aliorum} 12. 26. {apostemati} 28. {in magnitudinis} 29. superflua est dictio {autem} legendum nāq; {intemperies. præsertim etc.} 14. 2. {ac terream} 25. {ad uicina.} Plura præter hæc errata sunt, præsertimq; in orthographia quæ tamen omisisse uolumus cū unusquisq; facillime aduertat. & interlegendum corrigere possit.



IANCOLA ZIZVS POLISTENENSIS OB:
noxius Discipulus Excell. Philippi Ingrassia huius ætatis Medico-
rū Principis. ad eiusdem Opus Hymnum.

Icarus (fama est) cupiens uolatu
Tangeret stellas , rapidiq; solis
Regna, cum cæcæ caluere, in undas
Corruit audax.

Corruit Phaeton, populante flamma
Corpus , aurati malè qui petitos
Rexerat currus genitoris, atq;
Excidit ausis.

Parua uerò horrens pelagi pericla
Cymba, adit ripas, minus apta uento:
Nanq; si uelis penetraret altum,
Mersa periret.

Hæc timens, laudes caueo referre
Hoc libri uersu modico , uel ore :

Exigunt magna moduletur alter
Flaccus auena.

Nam docens quicquid Medici Latini
Arte dixerunt , Arabesq; , Græci,
Lucidis , paucis tenet iste uerbis
Dogmata cuncta.

Tu senex ergo, Iuuenisq; libro
Et stude , & grates meritæ habendo
Semper (ut debes) sapiente summo
Disce Philippo.

Nestoris uiuat Pylî (Deusq;
Faxit) hic annos, meliora condat
Posteris : fama celebrisq; , toto
Fulgeat orbe.



INDEX OMNIUM

QUAE IN HAC LIBRI PARTE
continentur: In quo primus
numerus folium, secundus li-
neam denotat.



Abse .295.21.
Abdominbernia.
252.9.
Abdominora-
mex.251.40.
Abenxoari os na-
tum in dorso.
25.4.

Abenxoaris opinio de menstruo sangui-
ne pro embrionis generatione.202.5.
Abenxoaris error.202.5.
Abscessus.30.40.
Abscessus unde dicitur. scholio.2.2.33.
Abscessus quid. 19.17.
Abscessus definitio.20.1.
Abscessus quae intus contineat.20.3.
Abscessus secundum aliquos.20.27.
Abscessus quid apud Paulum.21.4.
Abscessus proprie secundum Paulum quod.
20.23.
Abscessus proprie dictus secundum alios
quos.83.26.
Abscessus materia quae.81.2.
Abscessuum genus duplex.20.26.
Abscessuum materiae diuersae.20.21.
Abscessuum uentriculi optima ruptio.23.1.
Abscessuum cerebri quae optima ruptio.
23.3.
Abscessuum costarum, siue laterum quae
optima ruptio.23.5.
Abscessio.81.17.
Abulis pro epulis.262.9.et.21.
Acakiae error.95.14.
Achilles a Chirone eruditus.121.33.
Achilles a Chirone educatus.122.40.
Achilleum herba.123.1.
Achimon.295.2.
Achlys.296.39.295.33.
αχλὺς.295.30.
Achor.85.3=125.3=175.24=172.37=171.7.
Achor quid, et unde dicitur.266.28.
Achor ab ichore mutata, i, in, a.166.38.
Achor cutis capitis ulcus.166.18.
Achor muscarum deus.170.27.
Achora apud Priscianum quid.171.14.
Achoris materia.166.30.
Achoris, et faui materia quae.167.20.
et.21.

Achoris, et faui materia secundum Ale-
xandrum triplex, et signa.163.33.
Achoris, et Cery materia principalis.
169.10.
Achoris, et Cery materia secundum Ga-
lenum.177.2.
Achoris, et Cery materia diuersi modi
dicendi.176.19.
αχὼρ ὠν appellatio unde.167.4.
Acinofornis tunica unde sic dicta.292.
ακινὸς etas uigeris.208.41. (34.
ακνᾶ.208.40.
ακνῆ.208.39.
ακρᾶ.179.20.
Acraia.161.18.
Acrochordon.165.16=177.33.
Acrochordon quid.178.30.
Acrochordon apud Arabes apostema.
19.23.
Acrochordon unde dicitur, secundum Ga-
lenum.179.15.
Acrochordon unde dicitur secundum Paulum.
178.34.
Acrochordon Pauli indolorius tumor.
179.28.
Acrochordon Celsi.180.7.
Acrochordon Celsi dolet.179.28.
Acrochordon Celsi ab acrochordone Pa-
uli differt.179.31.
Acrochordon Celsi diuersus tumor ab eo,
quem Paulus de finit.180.4.
ακροχορδῶν unde componitur.179.11.
ακροχορδῶν nomen a similitudine
sumptum.179.13.
Acrochordon incisa multam sanguinis
quantitatem fundit.178.25.
Acrochordon an singulatum fiat, an plures
in simul.180.12=165.15.
Acrochordon, et myrmecia quo differunt.
177.37.
Acrochordon contagiosus morbus.180.15.
Acrochordon noua affectio.210.1.
Acrochordon uerruca species.181.18.
Acrochordon tumor frigidus.282.24.
183.20.
Acrochordones.33.5=54.27=162.37=183.13=218.18.et.27.
Acrochordones phymatis largè sumpti
species.217.21.
Acrochordoni paratior locus.178.29.
Acrochordoni ad chordae extremum simi-
litudinis, ratio triplex.178.36.
Acrochordoni magnitudo.180.17.
Acrochordoni materia.182.33=183.19.

Acrochordoni causa efficiens, et materia-
lis.182.35.
ακροχ.179.10.
Acrochordon.182.7.
Actio, et passio eadem quae.46.17.
Actiones in apostemate laesae.73.1.
Actionum laesio prima quod a medico con-
sideratur.60.13.
Actraetris facultatis praecipuum munus.
Acumen oculi.298.9. (201.5.
Acumen corneae.298.9.
Acuti morbi necessitas si febrem habent,
illam habent continuam schol.17.8.38.
Addictos esse, Galenus reprobauit.5.20.
Ademenul.216.24.
Adeps.84.36.
Adeps humidissima.79.15.
Adhasue.295.40.
αδῆσιν.288.18.
Adipis generatio qualis, et ex qua mate-
ria.79.25.
Adnata.293.3.
Adus.295.33.
Adustitio in oculo.295.12.
Adustitium ulcus in oculo.295.14.
Aegritudo spinæ.289.9.
Aegylops quid.283.36.
Aematocela materia quae, et tempera-
mentum.254.34.
Aematomphalon.251.1.
Aematomphali materia quae, et tempera-
mentum.254.34.
AEMONPHALON.251.1.
Aesculapius a Chirone nutritus.121.32=123.4.
Aetas uarijs tuberculis obnoxia.163.20.
Aetas concussionis.163.23.
Aetas concussiva.164.10.
Aetas semicana, et cruda senectus, et eius
terminus.207.5.
Aetas constituta quae, et eius terminus.
207.5.
Aetatis certo annorum numero determi-
nari nequeunt.206.24.
Aetates certo annorum numero determi-
nandae non sunt.206.38.
Aetii diminutio.248.38.
Aetii error.99.26=151.1=154.14=165.23=166.2=177.38=186.34=199.33.
Aetii locus.279.6.
Affectus communiter pro omnibus rebus
praeter naturam.35.6.
Affectus lassitudinaceus Graece ακαδῆσις
.37.8.

INDEX

Aficume. 295.13.
 Afocam. 18.2.27. 26.18.3.
 Afrochon. 182.3.
 Afrochoon. 182.28.
 α γ ρ α .i. captura. 134.17.
 α γ ρ ε υ ε ν .134.17.
 Agricola error. 119.18.
 α ι λ ω ι .185.29.
 α ι μ α τ ο μ φ α λ ο ν .251.1.
 α ι μ α τ ο κ ι λ η .241.31.
 α ι μ ο κ η λ η .241.31.
 α ι μ ο μ φ α λ ο ν .251.1.
 α ι π ι α .35.30.
 Aficume. 295.14.27.23.
 Alamica. 195.15.
 Alarbian quid. 280.40.
 Alarbian, & hæmorrhoids nasi quomodo differunt. 281.2.
 Alarbian ad Pauli sarcoma reducitur. 281.11.
 Alarnabet. 280.40.
 Alasaph. 192.13.
 Alasaf. 192.18.
 Alalebiati quid. 173.24.
 Albanus Torinus Rasis interpres. 14.38.
 Albani, & aliorum multorum interpretum error. 236.23.
 Albani Torini error. 237.14.297.35. 278.5.
 Albani Torini error, & nugæ. 278.21.
 Albani, & Andernaci error. 297.29.
 Albaras alba. 128.33.139.27. 140.5. 246.40.
 Albaras alba pilos reddit albos. 142.23.
 Albaras nigra. 120.31.126.35.135.32. 139.27.
 Albaras nigra an sit psora. 127.13. & 34.
 Albaras nigra. 127.2.
 Albaras nigra quid. 127.23.
 Albaras nigra quid, apud Auic. 128.3.
 Albaras nigra squamas habet. 141.35.
 Albaras a morphea quo differat. 142.19.
 Albaras diuisio, ut uocis in significata. 139.29.
 Alband. 173.24.27.33.
 Alband quid. 173.41.174.1.
 Albabud quid. 173.34.
 Albaurachi. 87.32.
 Albothin quid. 134.15.27.25.
 Albucais error. 297.29.
 Alcarnabet. 280.40.
 Alchalam. 181.31.
 Alchafim. 181.31.
 Alchafi. 295.35.

Al'comnati. 285.26.
 Aldebabi. 298.11.
 Aldebani. 298.11.
 Aldemenul. 211.34.216.24.
 Aldememil. 211.37.212.22.
 Aldidar. 173.35.
 Aldubellati. 19.35.
 Aldubellet. 19.34.81.1.
 Aldubellet Arabum, idem quod Græcorum apostema. 21.9.
 Alexandri à Galeno, & Paulo diuersitas circa Cerij, & achoris materiam. 168.37.
 Alexandri, & Galeni cum Paulo conciliū. 169.8.
 Alfase. 111.29.
 Alfaseb. 111.29.
 Alfiringi. 173.9.27.20.
 Al'galsamac. 279.29.
 Al'galsamac quid. 279.26.
 Algeromati. 122.23.
 Algrada. 142.6.
 Alguada. 142.6.
 Alguardenici. 184.10.
 Alguardenigi. 184.20.
 Alguardenisi. 184.24.
 Alhamica. 195.14.
 Albasaf. 192.18.
 Albasce. 164.29.
 Albasef. 192.18.
 Alhumera. 195.15.
 Alieronati. 122.24.
 Alimentum triplex quomodo. 67.16.
 Alkalam. 181.31.
 Alkalim. 181.31.
 Alkiconie. 123.22.
 Alkirunie. 122.23.
 Alhiorum odor quomodo in uasis remanet. 201.13.
 Almekani. 283.9.
 Almessire. 94.35.
 Almufaragi. 298.11.
 Alopecia. 149.17.
 α λ ω π ε κ ι α .142.3.
 α λ φ α ι ν ε ν .141.32.
 Alphi. 142.4.
 Alphi an squamas habeant. 141.30.
 Alphi à leucis quo differant. 142.18.
 Alphos. 140.34.142.13.180.26.
 α λ φ ο ς .140.29.27.39.
 Aphos ex pituita. 132.34.
 Aphos albus. 140.19.26.
 Alphos niger. 140.19.
 Alahos Græcorum est morphea Arabum. 141.39.
 Alphorum generatio. 141.25.

Alphorum materia. 143.16.
 Al'sabafati. 125.2.
 Al'sabafati causæ. 125.26.
 Al'selba. 85.14.
 Altarfati. 112.3.
 Alteratio omnis in fieri essentiam habet. 46.30.
 Althaun. 212.19.228.5.
 Althebegi. 115.2.117.8.
 Altheben. 290.40.
 Althoim. 228.5.
 Althein. 31.37.
 Altoin. 212.19.
 Aluardengi. 284.24.
 Aluardinegi. 284.24.
 Aluathin. 174.15.
 Alui fluxiones quandoq; apostases dicuntur. 19.29.
 Ameda. 175.24.
 Amigdalæ colli quæ. 279.36.
 Amigdalæ quæ glandule sunt. 277.15.
 Amnion membrana. 140.17.
 α μ φ ι β λ η σ σ ο ε ι δ η ς tunica. 293.1.
 α ν α β ι θ ρ ω σ κ ο ν .117.38.
 Anacram. 94.11.
 αν α Græca dictio, per. 260.30.
 Analalium. 294.23.
 Analum. 294.23.
 αν α σ α ρ κ α .114.9.258.32.
 αν α σ α ρ κ α qd, et unde dicitur. 260.27.
 Anasarca quid, et unde dicitur. 260.27.
 Anasarca apud Hippocratem non inuenitur. 260.34.
 Anasarca in declinabile nomen est. 260.28.
 Anasarca quid significat. 260.31.
 Anasarca pituitosus tumor. 261.40.
 Anchylops quid. 283.36.
 Andernaci error. 178.12.231.23.236. 16.237.14.272.6.277.30. 294.35.
 Andernaci, & Vassei error. 238.25.
 Andernaci, & Albani error. 297.29.
 αν ε υ ρ υ σ μ α .110.30.112.36.
 Aneurysma. 112.36.
 Aneurysma quid. 110.30.
 Aneurysma cum œdemate in quibus conuenit, et differt. 113.8.
 Aneurysmatis materia. 112.39.
 Anguli oculorum. 283.9.
 Animalcula in lapostematibus contenta. 76.38.
 Animalia bruta menstruum sanguinem in pilos, et pennas, et cornua, et ungulas uertunt. 208.5.
 A'alia quedā

Animalia quedam, ut canes, et aues foetidas carnes, et uermibus plenas, ita et feces comedunt, et tamen bonos generant humores. scholio. 19. 12. 18.

Animalium hyeme latentium obesitas. 79. 25.

ἀνθρώπων. 208. 31.

ἀνθρώπων. 193. 21.

ἀνθρώπων. 193. 19.

ἀνθρώπων. 193. 20.

ἀνθρώπων latine flos. 208. 29.

ἀνθρώπων. 212. 5. 216. 19.

Anthrax. 85. 28.

ἀνθρώπων ab antro exponere delirium est. 212. 28.

Anthrax ab antro apud Chirurgorum gregem. 211. 14.

Anthrax secundum Razem. 228. 18.

Anthrax secundum Razem quid. 212. 17.

Anthrax dolorificus apud Galenum. 212. 37.

Anthrax necessario cum febre secundum Galenum. 212. 40.

Anthrax an in corde. scholio. 5. 3. 41.

Anthrax ab initio statim pustulas apponit. scholio. 5. 4. 5.

Anthrax inflammatio. 213. 14.

Anthrax crustosum ulcus. 213. 14.

Anthrax tumor praeter naturam. 213. 18.

Anthrax quomodo interdum insensibilis euadit. 213. 25.

Anthrax temporis progressu necessario. febrem sibi associat. 213. 34.

Anthrax cum pruritu, et dolore. 213. 11.

Anthrax interdum sine pustulis. 213. 16.

Anthrax quomodo sibi rigores, aut horrores associat. 213. 39.

Anthrax in uisceribus oriri potest. 214. 2.

Anthrax in musculis, subcutaneisque partibus. 214. 3.

Anthrax uehementiores febres erysipelaceis inflammationibus generare solet. scholio. 22. 13. 25.

Anthracis humor quis. scholio. 22. 13. 12.

Anthracis materia. 85. 32. 36. 40.

Anthracis materia an atra bilis, uel melancholicus humor cum sanguine. 86. 8.

Anthracis materia sanguis praecipue existit. 86. 1.

Anthracis principium ab inflammatione, et pruritu. 213. 27.

Anthracis principium sine febre interdum esse potest. 213. 32.

Anthracis radix. 216. 31.

Antropos. 220. 15.

ἀνθρώπων. 140. 31. 220. 13.

Antiaes. 273. 27.

Antiaes apud Galenum quae. 273. 22. 278. 26.

Antiaes secundum Hippocratem quid significat. 276. 10.

ἀντιαιδέος uario modo captae apud Aethores. 273. 28.

Antiaes quae, et unde dicuntur. 274. 34. 276. 35.

Antiaes secundum Celsum quid. 276. 22.

Antiaes apud Paulum quid. 276. 28.

Antiaes Pauli, Celsi, et Hippocratis quomodo a Galeni paristhmijs differant. 278. 33.

Antiaes Aetij, et Galeni quomodo uel differunt, uel conueniunt. 278. 40.

Antiaes Galeni tumores calidi. 279. 21.

Antiaes Aetij. 279. 21.

Antiaes Pauli, et Aetij quandoque tumores frigidi euadunt. 280. 4.

Antiaes interdum pro particulis, sicut aliquando etiam paristhmijs apud Hippocratem. 275. 14.

Antiaes, et paristhmijs apud Hippocratem pro eodem. 275. 35.

Antiaes in quo gladularum genere sunt. 277. 28.

Antiadum materia. 280. 2.

Antiquorum placita quomodo ad enarrationem suscipienda. 13. 33.

Anulun. 294. 22.

Aphorismi. 22. libri secundi expositio. 47. 3.

ἀντιέμεν. 248. 14.

Apoplexiae generatio insensibilis. 35. 6.

ἀποπληξια. 178. 7.

ἀποπληξια. 178. 7.

Aporisma. 112. 34.

ἀποσπασμα. 20. 16.

ἀποσπασμα. 80. 41.

ἀποσπασμα unde dicitur. scholio. 22. 30.

ἀποσπασμα proprie quid. 19. 31.

ἀποσπασμα quid significat. 19. 28.

Apostema sub quo morborum genere computandum. 18. 3.

Apostema morbus compositus ex tribus morborum generibus. 18. 8. 71. 33. 72. 40. 75. 15.

Apostema simplex morbus non est. 18. 40.

Apostema Graecorum latine abscessus. 18. 32.

Apostema secundum Graecos quid, et apud Arabes. 19. 20.

Apostema omne cum laesione dimensionis, et molis. scolio. 24. 14. 38.

Apostema quae intus contineat. 20. 3.

Apostema ex humorum superabundantia. 20. 13.

Apostema ex uaporosis spiritibus. 20. 14.

Apostema quid, secundum Authorem libri Definitionum medicarum. 20. 28.

Apostema apud Plinium quid. 20. 30.

Apostema an omne sit suppuratio. 20. 38.

Apostema secundum aliquos. 20. 36.

Apostema proprie secundum Paulum quod. 20. 23.

Apostema est bothor magnum. 22. 12.

Apostema in parte molli, uel dura, uel media. 22. 18.

Apostema in membro tantum in quo fieri tensio potest. 23. 34.

Apostema in quibus membris fieri potest. Apostema tumor magnus. 71. 26. (23. 39)

Apostema non semper isdem actionibus ratione triplicis morbi nocet. 73. 1.

Apostema utrum semper ex tribus morbi generibus compositum. 18. 30. 73. 8.

Apostema omne tribus morbis necessario componitur. 74. 34.

Apostema in interioribus partibus. 75. 35.

Apostema omne cum laesione corporeitatis, trinaeque dimensionis. 76. 5.

Apostema ex bili rarissimum. 81. 5.

Apostema proprie dictum quod, secundum aliquos. 83. 26.

Apostema uentosum. 115. 4. 117. 3.

Apostema pestilentielle. 112. 18.

Apostemata quaedam ex inflammationibus, quaedam ex erysipelaceis phlegmonosisque affectibus. 20. 4.

Apostemata frigida quaecumque substantia continent, eandem formam extrinsecus representant. 82. 18.

Apostemata, de quibus locutus est Princeps in distinctionibus suis, et in hoc libro 25. 3. 10.

Apostematis definitio. 20. 1.

Apostematis nomen in textu primo, alijsque Barbarorum scriptis quomodo. 21. 39.

Apostematis diuisio penes sedem affectus, apud Auic. 22. 18.

Apostematis essentia quae. 28. 1.

Apostematis tumor uel euidens, uel occultus. 28. 4.

Apostematis diuisio apud Auic. penes eas usus. 30. 37.

Apostematis diuisio secundum varias dispositiones apud Auic. 31. 4.

Apostematis magni, et parui diuisio. 71. 27.

**Apoſtematis nomen cur Arabes largè ſum-
pſerunt.** 72.8.
**Apoſtematis eſſentia primum in tumore
conſiſtit.** 20. in intemperie, 30. in ſolu-
tione continui. 72.27.
Apoſtematis materia quæ. 81.2.
**Apoſtematibus omnibus ſolutio continui
ineſt.** 32.3.
**Apoſtematum ſermo uniuerſalis in pri-
mo libro.** 17.24.
Apoſtematum materiæ diuerſæ. 20.20.
Apoſtematum genus triplex. 20.26.
**Apoſtematum diuerſæ ſubſtantiæ contenz
te.** 31.27.
Apoſtematum tempora quatuor. 31.38.
**Apoſtematum frigidorum tempora cur nò
deſiniuerit Galenus, & Auic.** 32.4.
Apoſtematum frigidorum ſubdiuiſio.
32.10.
**Apoſtematum diuiſio ſecundum uarios
humores.** 31.22.
Apoſtematum diuiſio prima. 71.24.
diuiſio. 2^a. 75.15.
diuiſio. 3^a. 76.7.
diuiſio. 4^a. 76.12.
diuiſio. 5^a. 76.17.
diuiſio. 6^a. 76.22.
diuiſio. 7^a. 76.25.
Apoſtematum frigidorum genus duplex:
Alterum continens liquidam ſubſtan-
tiam: Alterum uerò ſolidam. 82.7.
**Apoſtematum ex ſolidis, liquidisue ſub-
ſtantijs frigidis compoſitorum cauſæ
quæ.** 82.25.
α τὸς ἰσχυροῦ. 80.40=223.41.
α τὸς ἰσχυροῦ unde dicitur ſcholio. 2.2.30.
α τὸς ἰσχυροῦ quid ſecundū Græcos. 19.31
α τὸς ἰσχυροῦ Græcorum, latinè abſceſſus
.19.36. (20.23.
α τὸς ἰσχυροῦ quid apud Paulum. 21.4.
**Apponenſis ſuperflue diſtinctiones de a-
poſtemate.** 30.22.
α τὸς ἰσχυροῦ 184.41
Apyroſi. 216.12.
Aqua in oculo. 40.33.
Aqua in oculo morbus in numero. 62.27.
Aqua intercus. 255.2.
Aqua intercutem. 255.2.
Aqua intercus propriè apud Celſum.
257.22.
Aqua ad nutritionem inepta. 260.22.
Aquicarnbernia. 241.41.
Aquinteſtibernia. 242.1. & 22.
Aquiramex. 240.20=241.39.

Aquitania regio metagra uexata. 134.39.
Aquuaricoramex. 241.40.
Aquofus ramex. 240.19.
Aquumbilicatio. 250.31.
**Arabum, Barbarorumue interpertum nos
minibus quàm parum fidendum ſit.**
247.2.
Arabum confuſio in formicæ nomine.
Arabū deſenſio 183.9=199.10. (182.23
Arabum dogmata an exponenda. 14.34.
α γ α γ υ ο ε ι δ δ ε tunica. 292.37.
Argemon. 134.26.
α γ γ ε μ ο ν. 194.29.
α γ γ ε μ ο ν, albū Latinis præſeſert. 295.
α γ γ ο ν υ γ γ ο ν. 240.31. (1
α γ ης, pro α γ ης. A Eolice, ac Doricè.
84.23. & 24.
Ariſtæ. 83.41.
**Ariſt. philoſophorum poſt Platonē ſpirar
cus.** 5.30.
Armilla fuſi caput. 298.25.
Arſacum. 161.16.
Arteriſæ uenæ apud Paulum. 237.28.
Artetica. 188.35. (27.32.
Aſaf. 172.10=192.23.
Aſaſa. 192.19.
Aſaſati. 172.13.
Aſaphati. 172.13.
Aſcachillos. 94.16.
Aſcarides. 54.26=55.18=162.37.
Aſcites. 76.37=114.7.
Aſcites hydropiſeos ſpecies. 254.40.
**Aſcites, et tympanites propriè parecchy-
ſes.** 255.15.
**Aſcites apud Hippocratem nomine gene-
ris dicitur hydrops.** 258.28.
Aſcites tumor aquoſus. 259.35.
Aſcites ad œdema nò reducitur. 259.36.
**Aſcites quomodo ad flegmaticos tumores
reduci poteſt.** 259.39.
**Aſcites à maiori frigidityte, q̃ tympani-
tes.** 260.11.
**Aſcites omnium hydropiſ ſpecierum pe-
riculoſiſſima eſt.** 260.13.
**Aſcites reliquis duabus hydropiſ ſpecies
bus peior.** 260.9.
Aſcites aquoſus tumor. 261.40.
α ν ι τ ης unde dicitur. 259.28.
Aſcitis materia aqua cum uento. 257.3.
Aſcitis, & tympaniſ generatio qualis.
260.25.
Aſclites. 258.23.
α σ κ ος uer. 259.27.
Aſef. 172.10=191.23=192.17.

Aſeſa. 192.19.
Aſkakillos. 94.17.
Aſperantur. 132.12.
Aſperitas. 194.8.
Aſperitatis cauſa continens. ſchol. 15.8.1.
Aſpredo corporis totius. 193.3.
Aſſa. 188.15.
Aſa ſæctida. 188.13.
Aſſiſtentes. 236.18.
Aſſiſtentes qui. 236.26.
Aſſites. 236.36.
α θ α γ α. 84.13.
α θ α γ η. 84.13.
**Atheneus præcedentes cauſas nominauit,
contra Leoniceum.** 38.23.
α θ ε ρ ω μ α. 84.28.
α θ ε ρ α an pultem ſignificet. 84.22.
α θ ε ρ ας. 83.41.
α θ ε ρ ι ζ α ν. 84.1.
Atheroma. 138.27.
Atheromata. 54.27=184.26=186.32.
Atheromata membranula continentur.
221.15.
Atheromatiſ figura, & modus. 82.40.
Atheromatiſ materia quæ. 84.30.
Atheromatum tunicula. 241.20.
α θ η ρ ας. 83.34=84.2. & 17. & 20. et
.28. & 31.
α θ η ρ ω μ α. 83.31=84.16. & 18.
Athomi. 295.33.
Atrabilis. 85.36.
Atrabilis pro humore melancholico. 88.36.
Atrabilis an calida, uel ſicca. queſtio.
88.36.
**Atrabilis ſecundum Galenum frigida, et
ſicca. quemadmodum, & humor mel-
lancholicus.** 89.5.
**Atrabilis calida uidetur ſecundum Pau-
lum.** 89.15.
**Atrabilis q̃ ſu calida. ex Galeni fundæ
mentis.** 89.17.
Atrabilis propriè. 89.30=105.12.
**Atrabilis à calore comburente, & putres-
cinali.** 91.30.
**Atrabilis in corpore nò naturaliter diſpo-
ſito generatur.** 81.37.
**Atrabilis ab humore melancholico ſpe-
cie differt.** 92.32=93.2.
**Atrabilis ex congelatione generari ne-
quit.** 93.18.
Atrabilis calida. 93.6.
**Atrabilis, & humor melancholicus ſæpe
confunduntur pro eodem.** 108.13.
Atrabilis ex

Atra bilis ex pituita non datur contra Auicennae. 150. 38.
 Atra bilis ex affatione chili. 151. 8.
 Atra bilis præter naturalis. in simul cum alijs generari humoribus potest. 151. 20.
 Atrae bilis color bitumini similis. 86. 18.
 Atrae bilis natura. 89. 25.
 Atrae bilis notæ. 90. 1.
 Atrae bilis morbi. 93. 9.
 Atrae bilis materia, & origo quincuplex apud Auic. 150. 19.
 Atrae bilis generatio duplex. 150. 1.
 Atrae bili aliquantulum caloris inest secundum Galenum, sed tamen in domino frigida. 89. 13. (4.
 Atram bilem cur fugiunt animalia. 90. 27. 35.
 Auer. philosophorum Arabum princeps. 39. 40.
 Aufume. 295. 14.
 Augmentum fieri etiam in decrepitate quo modo contingit. 26. 4.
 Augmentum cur post. 25^m. uel 30^m. annu cessat. 26. 6.
 Augmentum uerum quid. 26. 21.
 Augmentum in tumoribus uerum non est. 26. 24.
 Auicenna Barbarorum non temere princeps. 6. 10. 13. 29.
 Auic. idem cum Galeno sentit de medicinae definitione, & diuisione. Sed hoc contra Manardum. 15. 41.
 Auic. Medicorum Arabum princeps. 39. 34.
 Auic. philosophus magis, q̃ medicus. 39. 38.
 Auic. nullius interpres esse uoluit. 66. 33.
 Auic. melius, q̃ Paulus, & Aetius erysipelas cognouit. 99. 16.
 Auic. diuersi generis morbos miscere cōfueuit. 209. 10.
 Auicennae caligo. 13. 29.
 Auicennae intentio, & ordo in hoc libro. 17. 24.
 Auicennae laus. 39. 36. 125. 20.
 Auicennae error, q̃ atra bilis ex cōgelatione. 93. 18.
 Auicennae error. 60. 10. 117. 7. 150. 38. 152. 29. 190. 9. & 29.
 Auicennae error, q̃ atra bilis ex pituitæ adustione. 93. 26.
 Auicennae locus. 32. 24. 91. 39. 144. 40. 182. 37. 183. 1. et. 5. 191. 23. 195. 26.

Auicennae locus expositus. 127. 20.
 Auicennae loca. 32. 29.
 Auicennae turpissimus error circa formicas. 182. 4.
 Auicennae error in formicæ sermone unde natus. 182. 9.
 Auicennae error, & confusio. 188. 24. 209. 8.
 Auicennae cōtradictio, et solutio Leonicensi. 127. 26.
 Auicennae contradictionis solutio. 128. 22. 182. 37.
 Auicennae duplex differentia à Galeno, et Paulo de priapismi nomine. 161. 20.
 Auicennae sententia de uariolis melior. 199. 4.
 Auicennae, et aliorum Arabum defensio. 296. 11.
 Aulunum. 294. 22.
 Aurulis, pro, parulis. 262. 20.
 Azaraij locus. 206. 22.
 Azaraij sententia de leproforum generatione ex menstruo perpenditur. 206. 11.
 Azaraij sententia de leprosis per accidens uerificatur. 207. 15.



Alchiati qd. 173. 24.
 Balchie. 173. 22.
 Balkiati. 172. 37. 173. 22. et. 28.
 Balkie. 172. 37.
 Baras pro scabie apud Razem. 127. 39.
 Baras duplex. 128. 1.
 Baras alba. 139. 27.
 Baras alba pilos albos facit. 142. 23.
 Baras nigra. 139. 27.
 Barbarorum scripta interpretanda. 14. 34.
 Barbarorum dictionibus omnimoda series adaptari nequit. 128. 27.
 Barbarorum confusio. 162. 19.
 Baro summardini ter Panormi prefectus. 229. 7.
 Bartholomaei Syluanij error. 179. 39.
 Benat, seu Benath noctis. 33. 8. 190. 30. 209. 22.
 Benat noctis causæ. 191. 6.
 Benat minoris acrimoniae, q̃ sudamina. 191. 36.
 Berules pro parulis. 263. 27.
 Bilis flaua. 89. 20.
 Bilis flaua latitudinem habet in substantia. 101. 1.
 Bilis naturalis, et non naturalis. 96. 6.
 Bilis naturalis quæ. 96. 7.

Bilis pallida minus acris, q̃ flaua naturæ. 101. 24.
 Bilis sero admixta tenuior fit. 101. 19.
 Bilis uitellina. 89. 21.
 Bitum. 294. 22.
 Bituminis Iudaici splendor. 86. 22. 93. 23.
 Blaccie. 194. 31. 195. 23.
 Βλασηματα. 286. 29.
 Boa quid, et unde dicitur. 138. 31.
 Boa serpens. 138. 34.
 Boæ rubentes papule. 207. 40. 208. 1.
 Bognone. 223. 31.
 Bonæ Neapoli quid significant, et unde dicuntur. 208. 1.
 Boonæ. 208. 1.
 Bothor species. 32. 20.
 Bothor quid. 22. 11. 32. 39. 71. 26.
 Bothor ex tribus morbis. 75. 16.
 Bothor lactei. 33. 7. 209. 7.
 Bothor magnum est simpliciter apostema. 71. 30.
 Bothor latine pustula, seu eminētia apud Auic. 71. 31.
 Bothor leues. 173. 2.
 Bothor spinosi. 192. 30.
 Bothor leues. 209. 7.
 Βόθρον. 294. 21.
 Βόθρος. 294. 20.
 Bothryon. 134. 26.
 Βυβών quid. 222. 21.
 Βυβών herba. 223. 6.
 Βυβών pro affectu, non pro parte intere dum. 222. 40.
 Βυβωνοκλή. 233. 14. & 36.
 Βυβωνοκλή Galeni, & sequacium. 248. 9.
 Βυβωνοκλή secundum Paulū. 248. 23.
 Βυβωνοκλή Celsi. 248. 1.
 Βυβωνοκλήκων νόσσημα. 248. 25.
 Βραδέος. 83. 12.
 Βραγχοκλή. 233. 15. & 24.
 Βραγχος fues quomodo interficit. 232. 29.
 Βραγχος suum apud Aristotelem. 232. 15.
 Βραγχος in porcis quare sic dicitur. 232. 25.
 Brasauoli error. 36. 3. 153. 25. 54. 33. 55. 26.

55.26.184.4. et.24.223.19. et.25.
225.14.258.37.274.29.275.24.
2178.19.163.26. et.37.274.29.
scolio.17.8.14.
Brafuoli errata quatuor in simul.227.
24.
Brechmalis.219.6.
Breuis doctrinae usus.14.21.
Breuitas obscuritatis causa.14.16.
Brunfelsii error.244.32.
Brusoli.292.25.
Bruxoli.292.25.
Bua puerorum unde.107.41.
Bubo, seu bubon quid.218.25.222.21.
Bubon.218.7.222.20.
Bubon tripliciter.222.21.223.12.
Bubon inguinis nomen.222.30.
Bubonis nomen quid significet.222.22.
Bubonis nominis primum, ac precipuum
significatum quod.223.22.
Bubonocela ramici species.239.37.
Bubonocela Celsi quomodo a bubonocela
Galenii differt.247.39.
Bubonocela secundum Galenum, et sequa
ces.248.8.
Bubonocela mulierum, et eius signa.249.
12.
Bubonocela materia, et temperamentum
quale.254.22.
Bubua puerorum unde.207.41.
Bucion.294.22.
Bulbus oculi unde dicitur.287.10.
Bulbus oculi quid.287.7.
Buyerinus Auerrois interpres.15.1.

Cachexia.158.
29.261.39.
Cachexia.113.
29.
Cachexia quid.
117.10.
Cachexia.263.37.
Cachexia.117.10.
Cachexia.113.13.120.23.
Cai Marij Constantia in uaricum dissecti
one.244.34.
Calculi.162.37.
Calculi uesicae.40.33.
Caligo in oculo.295.30.
Calli.5.4.28.
Callosa caro in elephantiasi.146.16.
Calor idem numero naturalis, et febris
lis omnis generis.64.34.
Calor an causa febris coniuncta.70.15.
Calor in generandis humoribus qualis.

90.8.
Calor humores generans an idem.90.13.
Calor quo modo unus, et plures in humo
rum generatione.90.21.
Calor excedens dupliciter intelligi potest.
90.34.
Calor comburens.90.36.
Calor resoluens.90.35.
Calor idem naturalis quomodo diminutus,
temperatus, et superfluous respectu di
uersorum.91.11.
Calor idem naturalis quomodo symmetrus,
et excedens respectu et eiusdem.91.19.
Calor putredinalis, assansque atrae bilis ge
nerationi per se inest.92.28.
Calor exurens humida denigrat, sicciora
uero dealbat.131.19.
Caloris duplicis exemplum.90.37.
Caluis non fiunt uarices magnae.250.35.
Cancelli.281.36.
Cancer.87.3.214.31.
Cancer compositus morbus est.74.20.
Cancer an calidus, uel frigidus tumor quae
stio.87.39.
Cancer quo modo ex humore melancholico
naturali.88.23.
Cancer Celsi.87.4.
Cancer Celsi a carcinomate differt.87.3.
Cancer ex quo humore.86.41.
Cancer ab atra bili.93.10.
Cancer affectus qualis.93.10.
Cancer frigidus.32.13.
Cancer melancholicus.32.16.
Cancer inter calidos tumores computatus
93.17.
Cancer an cum feruore generetur.93.29.
Cancer ex atra bili non naturali.105.23.
Cancer in extremitatibus.102.9.
Cancer in oculo.134.26.
Cancer ulceratus.163.39.
Cancer non ulceratus.263.38.
Cancerosa omnia ex atra bili, et emol
lientibus exacerbantur.107.22.
Cancrens.94.11.
Cancris materia.87.12.
Cancris materia atra bilis exacte.86.28.
Cancris principium.263.37.
Cancris materia quae apud Galenum, an. f.
atra bilis, uel humor melancholicus.88.7.
Cancris parum calidi, attamen calidi sunt
87.16.
Cancrorum curatio cum refrigerantibus.
Cancrorum color.87.15. (87.21.
Caninus appetitus.118.19.
Cantbi oculorum duo utriusque palpebrae co
munes.283.13.
Cantbi domestici.283.31.

Uxvdoi oculorum anguli.283.3.
Canibus duplex maior, et minor.283.12.
Canum penis.159.20.
Capitis aegritudo apud mulierculas quid.
Capitis ulcera.171.7. (171.39.
Caput formicae.296.8.
Carbo.85.29.212.4.
Carbo, et eius natura.213.39.
Carbo species phlegmones.73.21.
Carbo compositus morbus est.74.20.
Carbonisus.162.16.
Carbuncho nomen uulgatum.211.40.
Carbunculus.85.29.214.31. scolio.4.
3.31.
Carbunculus Rasis.211.39.212.20.
Carbunculus Romanorum.212.34.
Carbunculus Celsi, an a Graecorum an
thrace differat.212.36.
Carbunculus interdum absque febre secun
dum Celsum.212.38.
Carbunculus quando primum in Italiam
uenit.213.1.
Carbunculus absque pruritu, et dolore.
213.10.
Carbunculus prouintiae Narbonensis pecu
liare malum.213.3.
Carbunculus Plinij sine tumore.213.17.
Carbunculus interdum sine pustulis.213.
16.
Carbunculus inflammatio inferiori carni
affixa est.214.16.
Carbunculus etiam in uisceribus oriri pos
test.214.2.
Carbunculus sine euidenti tumore exteriori.
214.13.
Carbunculus nomen aequiuocum.215.28.
Carbunculus Arabum.215.34.
Carbunculus genus terrae nigrum.216.12.
Carbunculus pro gemma pretiosissima.
216.9.
Carbunculus pro dothiene Graecorum, La
tine autem furunculo.216.23.
Carbunculus ligni succensi, aut extincti
frustum.216.16.
Carbunculi locus.213.8.214.4.
Carbunculi locus an intus in uisceribus.
214.26.
Carbunculi citra pustulas.213.15.
Carbunculi crusta, color, et pruritus.214.
Carbunculi remedia multa.215.8. (20.
Carbunculi significata plura.215.31.
Carbunculi significata sex.216.15.
Carbunculi pretiosi lapides non sentiunt
ignem.216.11.
Carbunculare.215.35.
Carbunculari.215.35.

INDEX

- Carbunculatio.* 215. 35=216. 2.
καρκινώδης. 281. 36.
καρκινώδης. 87. 2.
καρκινώδης. 87. 2=263. 38.
Carcinoma Celsi a cancro differt. 87. 3.
Carcinoma Celsi, Latiorum, Aliorumq;
cancer. 87. 7.
Cardani error. 68. 18=69. 5. & 17.
Carmakile. 228. 7. & 13.
Carmata. 228. 7. & 13.
Carnbernia. 233. 13=239. 23.
Carnbernia quid. 234. 7.
Carnberniosus affectus. 234. 39.
Carniformes partes ex sanguine generan-
tur. 200. 6.
Carniramex. 233. 13=239. 23.
Carniramex quid. 234. 7.
Carniramicosus affectus. 234. 39.
Carnis germen morbi causa. 54. 6.
Carnis lachrymalis additio. 284. 17.
Carnium crassities. 78. 4.
Carnium multitudo. 87. 3.
Carnomentbernia. 239. 29.
Carnosi qui. 79. 31.
Carnostitas. 282. 24.
Carnosum genus humidum. 79. 16.
Carnumbilicatio. 250. 35.
Caro in naso superflua quid. 280. 37.
Caroli Stephani error. 293. 5.
Caruncula lachrymalis, & eius usus. 283.
14. et eius tumor. 283. 5.
Cassor à Portu Baron. Summatini ter
Panormi præfectus. 229. 7.
Catamis. 270. 22.
Catarrhi qui secundum Auic. 20. 16.
Catarrhus secundum Auicennam aliquan-
do Galeni p̄ v̄ 30. 38.
Catafarca. 256. 36.
κατὰ σφύρα. 258. 32.
κατὰ σφύρα. quid significet. & unde.
de. 260. 33.
Catafarca apud Hippocratem non inuenitur
Cataurus. 270. 30. (260. 35.
κατὰ μολύ. 270. 22.
Cauerna. 81. 17. (35.
Cauitates ratione cōtemplabiles quæ. 115.
Cauitatum causæ coniunctæ. 52. 37.
Causa abscissa, ad morbum deuenire opus
est. 47. 12.
Causa adhærens secundum Galenū. 43. II.
Causa antecedens duplex mediata, & im-
mediata. 66. 14.
Causa coniuncta an detur. 33. 19.
Causa coniuncta actionis læsæ morbus ipsæ
semel est. 35. 35.
Causa coniuncta quæ secundum Auicennam.
nam. 39. 28.
Causa coniuncta, siue adhærens actionis
secundum Galenum. 43. 32.
Causa coniuncta secundum Galenum. 43.
*41=44. 12.
Causa coniuncta figuræ.* 52. 17.
Causa coniuncta febris uerè non datur.
sed largè. 68. 18=69. 5. & 17.
Causa coniuncta superficiiei. 52. 27.
Causa continens apud Galenum. 41. 27.
& 37=42. 21. & 32=43. I. & 41
Causa cōtinens secundum Authorem In-
troductorij. 41. 2.
Causa continens pulsus. 41. 28.
Causa continens spumæ. 41. 32.
Causa continens in quibus inuenitur, uni-
uersalis determinatio. 42. 9.
Causa continens febris, & phlegmones a-
pud Galenum. 44. 14. (42. 10.
Causa continens febris non est putredo.
Causa continens magnitudinis, & paruita-
tis pustulæ. 42. 28.
Causa continens stuporis. 42. 30.
Causa continens horroris. 43. 2.
Causa continens doloris duplex. 44. 30.
Causa cōtinens ustulationis est ignis. 44. 1.
Causa continens alterationis, & motus, nō
morbi. 63. 10.
Causa cōtinens sectionis est gladius. 44. 1.
Causa continens motus pulsus, & omnis
alterius motus, non morbi. 63. 11.
Causa continens spumæ, non morbi. 63. 13.
Causa continens spumæ etiam factæ, sicut
obstructionis. 63. 19.
Causa cōtinens symptomatum semper ip-
sæ morbus est. 63. 30.
Causa continens cuius scientis morbi. 49. 7.
Causa continens instantis passionis est
humor in parte contentus. 44. 3.
Causa continens dicitur, & adhærens, et
continua. 42. 35.
Causa continens apud Hippocratem reple-
tio. 42. 17.
Causa continens apud Aristotelem. 44. 19.
Causa continens in apostematibus quomo-
do. 58. 1.
Causa continens in quibus; iuxta uniuersa-
lem Galeni determinationem. 58. 24.
Causa continens in quibus datur, et in qui-
bus non. 62. 5.
Causa continens in ijs quæ habent esse de-
pendens, non absolutum. 63. 23.
Causa continens in primo, et tercio morbi
genere non datur. 45. 19.
Causa continens in omnibus secundum quos-
dā recentiores. scilicet. 17. 11. 32. (26.
Causa conseruans quomodo efficiat. 45.
Causa cōseruans semper aliquid regene-
rans, et efficiens. scilicet. 10. 6. 17.
Causa conseruans non est continens. 45.
*26. (12.
Causa duplex, remota, & propinqua.* 66
Causa eadem continens, & præcedens,
respectu diuersorum. 58. 21.
Causa efficiens, prægenita, præcedensq;
secundum Aristotelem. 39. 6.
Causa efficiens actu, & particularia si-
mul sunt, & non sunt. 44. 21.
Causa efficiens potentia non simul est cū
singularibus, apud Aristotelem. 44. 23.
Causa efficiens quomodo effectui præpo-
nitur. 62. 3.
Causa externa quæ. 217. 23.
Causa & causatum correlatiua. 44. 26
Causa facti non datur. 39. 10.
Causa futuri præcedens. 39. II.
Causa idem et morbus respectu diuersas-
rum actionum. 53. 13.
Causa interdum neglecta morbo intendē-
dum. 69. 12.
Causa multorum affectuum coniuncta ple-
nitudo est. 52. 5.
Causa prius abscondenda, deinde morbi
residuum. 69. 10.
Causa propriè quæ. 61. 14.
Causa propriè cum agit, largè tamen ē
si non agit. 66. 23.
Causa procatarectica. 212. 30.
Causa quid secundum Dioscoridē. 41. II
Causa remota præcedens, propinqua uerò
coniuncta rectius dicitur. 66. 32.
Causæ. 34. 3.
Causæ quæ. 18. 27.
Causæ abditæ quæ. 36. 18.
Causæ abolitio præseruatio futuri morbi
est. 47. 37.
Causæ antecedentis exempla secundum
Auicennam. 39. 31.
Causæ coniunctæ siue continentis de fis-
nitio. 35. 13=38. 35=40. 41.
Causæ coniunctæ exempla secundum A-
uicennam. 39. 29.
Causæ coniunctæ magnitudinis. 51. 30.
Causæ coniunctæ situs. 52. 10.
Causæ coniunctæ definitionem cur Aui-
cenna aliter dederit, q̄ Galenus. 66. 3
Causæ continentis siue coniunctæ definitio.
*35. 13=38. 35=40. 31.
Causæ continentis definitio secundum A-*
uicennam. 65. 4.
Causæ continentis in secundo genere mor-
borum: 51. 27.

Causæ

INDEX

- Causæ continentis Stoicorū opinio. 60.1.
Causæ continentis nomen cur Galenus ab-
horruit Ratio prima. 60.1.
Ratio secunda. 60.11.
Ratio tertia. 60.30.
Ratio quarta. 60.38.
Ratio quinta. 61.11.
Causæ evidentes quæ 36.17.
Causæ internæ duplices. 34.13.
Causæ præcedentes. 34.9.
Causæ præcedentes aliquæ, quæ petiās di-
cendæ coniunctæ. 36.32.
Causæ præincipientes. 34.10.
Causæ salubres duplices. 47.27. (23.
Causæ spontum prohibentes quatuor. 43.
Causam coniunctam ponere, clariorē doc-
trinam, et medico utiliore reddit.
66.41.
Causam continentem Galenus nominans,
cur addit (ut quispiam dixerit) ratio
triplex. 61.20.
Causam prius abscindere oportet, deinde
uenire ad morbum. 35.15 = 49.17.
Causarum diuisio secundum Authorem
Introductorij. 40.41.
Causarum diuisio secundum Ioannitium.
40.13.
Causarum diuisio secundum Philotheū.
40.19.
Causarum diuisio secundum Authorem
libri definitionum. 40.26.
Causarum diuisio, et definitiones secun-
dum Dioscoridem. 41.13.
Causarum genus triplex apud Galenum.
41.26.
Causarum salubrium intentio triplex, cur
tamen aliquando duplex. 67.6.
Cela. 233.17.
Cele. 233.17.
Celij rhodigeni error. 232.12 = 223.16 =
130.37.
Celsi consuetudo in recitandis Hippocra-
tis aphorismis. 163.3.
Celsi defensio. 170.21.
Celsi error secundum primam solutionē
= 179.39.
Celsi error secundum secundam solutio-
nem. 179.31.
Celsi error. 192.9 = 235.24. et. 38 = 238.
25 = 293.26. et. 28.
Celsi, et Galeni concilium. 170.23.
Celsi, et Pauli contradictio. 179.28.
Celsi, et Hippocratis contradictionis solu-
tio. 282.4.
Celsi locus. 40.31 = 169.27 = 184.18 =
220.37.
Celsi locus de strumarum pure, et febre.
228.33.
Celsus à Galeno differens. 170.19.
Celsus Galeno uetustior. 276.33.
κεν χερσας. 103.11.
Centaurea curatus chiron. 121.19.
κερας. 291.40.
κερα τοι δας. 291.41.
κερωσις. 273.12.
Cerebri abscessuum quæ optima ruptio.
23.1.
Cerebri apostemata aquosa. 26.38.
Cerebri calidum apostema suppurans im-
possibile non est circa principia. 26.
40.
Cerebri inflammatio phrenitis, uel phre-
nitidis causa. 22.31.
Cerebri phlegmone a phrenitide distin-
cta. 22.38.
Cerebri portione deperdita, homines uis-
xisse uisi sunt. 27.11.
Cerebri substantia abscessa, puris instar
effluere uisa est. 27.5.
Cerebri substantiam apostemari posse,
præsertimq; frigido apostemate ex ali-
is animalibus experimento confirma-
tur. 27.17.
Cerebrū apostemate etiam bilioso uexari
potest. 28.13.
Cerebrum erysipelate uexari potest. 26.
29.
Cerebrum ex omnibus humoribus aposte-
mate affici potest, licet magis ex pitui-
toso, et aquoso. 28.25.
Cerebrum gargarismam pati potest. 22.28.
Cerebrum non potest apostemari secun-
dum Serapionem. 23.28.
Cerebrum phlegmone uexari absurdum
non est. 26.29.
Cerebrum quomodo sphacelari potest. 22.
29.
Cerebrum uero apostemate uexari potest.
26.31.
κερας. 166.23.
Ceria. 166.23.
Ceri, et achoris materia quæ. 167.21.
Ceri, et achoris materia secundum Ale-
xandrum triplex. 168.31.
Ceri, et achoris materia principalis.
169.9.
Ceri, et achoris materia diuersi modi dis-
cendi. 176.19.
Ceri, et achoris materia secundum Gale-
num. 177.2.
Ceri, et achoris tumores calidi. 177.7.
Ceri locus frequentior. 170.1.
Ceri materia mellis coloris similis. 168.
21.
Ceri materia quomodo melli optimo simi-
lis. 168.6.
Cerion. 125.3 = 166.22 = 167.19.
Cerion apud Plinium. 170.29.
Ceriones. 171.13.
χαλαζιον. 54.26.
χαλαζιον toto genere præternaturam
est. 286.33.
Chateman. 296.5.
Chatemen. 296.6.
χεραρα. 134.19.
χερωσιον ελκεος. 121.10. et. 18.
Chelidones. 130.17.
Chemosis. 284.21.
Cherades, uide chærades.
χηρωσις. 284.21.
Chiphronian. 94.12.
Chiro an ab Hercule uulneratus. 121.13.
Chiro an ex uulnere mortuus, an curatus
fuerit. 121.14.
Chiro Aesculapij, et Achillis præceptor.
121.33 = 122.40 = 123.4.
Chiro cur equi, et hominis filius pingitur
121.34.
Chiron et hominum, et iumentorum medi-
cinæ inuentor. 121.33.
Chiron inter astra locatus à Poetis. 121.
22.
Chiron primus herbarum, et medicamen-
torum uires inuenit. 121.31.
Chiron primus chirurgus. 121.30.
Chiron unde dictus. 121.32.
Chironia ulcera quæ. 123.24.
Chironia ulcera secundum Aesclepiadem,
et Galenum 123.16.
Chironij ulceris materia. 123.31.
Chironij, Telephijne ulceris exemplum.
123.24.
Chironij ulceris ratio non in erosione, sed
in malignitate, et rebellionē ad cus-
tam. 123.19.
Chironion herba. 121.22.
Chironis Centauri uulnus in pede. 121.9.
Chironium unde dicitur. 121.7.
Chironium ulcus unde dicitur uerius. 121.
29.
Chironium ulcus an species phagædenæ.
120.1.
Chironium ulcus secundum Celsum non
serpit. 120.13.
Chironiū ulcus generatim quod dici pot.
121.36. (120.1.
Chironium ulcus quod secundū Celsum.
Chironium

Chironiū ulcus quod proprie apud Vete-
res. 121. 41.
Chironiū ulcus, & Telephium idē sunt,
licet Galenus distinguat. 121. 2.
Chirurgia quid. 14. 6.
Chirurgia pro habitu, & opere, tertia or-
dine est. 15. 23.
Chirurgiæ libri qui uerè sunt. 16. 2.
Chirurgiæ proprium munus quod. 16. 8.
Chirurgus qualis esse debeat. 16. 23.
Chirurgus ab eo nomē suscipit, à quo
plurimum præstat. 16. 15.
Chirurgorum facultates Dinum ad eò ex
tollentium. 5. 14.
Chirurgorum mos in exponendo. 13. 13.
Chirurgorum triuialium errata. 212. 24.
Chirurgorum usurpata possessio. 16. 17.
Chirurgorum communis ignorantia.
16. 29. (21.
Chirurgo ad perfectionem necessaria. 16.
Chcerades. 210. 12.
Chcerades latine strumæ. 210. 40.
Chcerades quid. 276. 33.
Chcerades in quo glandularum genere fi-
unt. 277. 27.
Chcerades petreæ. 231. 27.
Χοιρᾶς. 223. 35. 228. 22.
Χοιρᾶς quid. 231. 28.
Χοιρᾶς unde dicitur, rōnes sex. 230. 28.
Χοιρᾶς quid. 230. 39.
Χολᾶς. 170. 9.
Cholago. 170. 9.
Χορδῆνω. 179. 20.
Χορδῆν. 179. 10.
Χορδῆν. 167. 6.
Choriformis tunica quæ. 23. 31. (26.
Choriformis tunica quare sic dicta. 292.
Χωρίων. 292. 28.
Χοροειδῆς quæ. 23. 31.
Χοροειδῆς tunica cur sic dicta. 292. 26
Chumata. 228. 7. & 13.
Χυμῶσις. 284. 21.
Cibi putridi non necessariò putridos gene-
rant humores, licet sæpè uisofos, &
quandoque bonos scholio. 19. 12. 13.
Cicatrices nigre. 24. 5. 32.
Cicionis. 270. 17.
κῆλη. 234. 6. 243. 16.
κῆλη communiter. 251. 35.
κῆλη communiter quid. 251. 11.

κῆλη genericum nomen. 233. 19.
κῆλη proprie quid. 251. 16.
κῆλη quando simpliciter profertur quid
significat. 233. 27.
κῆλη specialiter quid significat. 233. 26.
κῆλη specialissimè quid significat. 233.
Cilla. 171. 41. (.28.
Cinta. 166. 25.
κίων. 267. 19. 270. 15.
κίων quid. 272. 11.
κίων quid significet. 267. 1.
κίων partis nomen secundum Galenum.
267. 3.
κίων æquiuocum nomen quot significet
273. 3.
κίων, & κιοῖς apud Paulum disse-
runt. 271. 31.
κίων in feminatū pudendis apud Hip-
pocratem. 267. 2.
κίων pro muliebri pudendi affectu æ-
pud Hippocratem quid. 273. 6.
κίων pro morbo apud Paulum. 272. 3.
κίων quomodo crassa, & quomodo tenuis
is columna dicitur. 272. 23.
(271. 31.
κίων apud Paulum etiam morbi nomen.
κίων quid apud Paulum. 271. 34.
κιοῖς. 267. 10. 270. 14.
κιοῖς apud Paulū pro parte. 271. 40.
κιοῖς partis nomen. secundum Galenū.
267. 33.
κηρίον. 171. 41.
κηρίον. 166. 21. 168. 13. 170. 33. 173. 19
κηρίον quid. 85. 1.
κηρίον herba nomen à uaricibus, quas
curat, & non è contra. 244. 31.
Circocela ramicis species. 239. 36.
Circocela, et eius loca quatuor, apud Cel-
sum. 242. 24.
Circocela apud Paulum. 242. 30.
Circocela secundum Authorem Introdu-
ctorij. 242. 34.
Circocela feminarum. 244. 2.
Circocela. 242. 30.
κίρσοκῆλη. 242. 24. 248. 4.
κίρσοκῆλη quid. 243. 37.

κίρσοι δ' εἰς παρὰ σῶτα. 236. 25.
κίρσοι. 242. 31. 243. 4. 244. 35.
248. 3.
κίρσοι δ' ἡ. 234. 3.
κίρσος. 244. 17.
Cirsos. 244. 22.
κίρσος quid significet. 243. 28.
κίρσος & ἰξία quomodo differunt.
Clangere. 232. 23. & 29. (244. 21.
Clangor. 232. 30.
Clangor suum. 232. 22.
Clauialis uicæ procidentia. 296. 23.
Clauelli. 181. 13.
Clauī. 32. 28. 33. 8. 181. 13. 183. 3. & 13
Clauus. 211. 23. 296. 22.
Clauus in oculo quid secundum Paulum,
& Actium. 299. 39.
Clauus in oculo secundum Introductorij
Authorem quid. 300. 3.
Clauus apud Celsum quid. 300. 7.
κνισμός. 125. 38.
Coalitio. 52. 38.
Cocceias Architectus primus Pausilypī
montem perforauit. 8. 41.
Coffuræ. 192. 26.
Cœlij rhodigeni error. 130. 37. 223. 16.
Cœloma. 134. 26. 294. 28. (232. 12.
κίλωμα. 294. 25.
καιοῖς τερῶν. 99. 22.
Colis acutissimi sensus. 157. 40.
Colis an ob spiritum in neruo ortum, uel
per arterias ingressum, an ab utroq;
tumesat. 156. 11.
Colis cauernosus neruus. 155. 2.
Colis corpus duplex. 157. 1.
Colis erectio naturalis. 155. 30.
Colis erectio ad neruum potius, q̃ ad arte-
rias referenda. 155. 37. (156. 4.
Colis erectio cur lumbis calefactis fit.
Colis essentia nullius alterius partis sub-
stantialis similis. 155. 18.
Colis extensio propter libidinem. 155. 23.
Colis extensio ob lumbos calefactos. 155.
23.
Colis non ligamentum sed ligamentaceus
neruus. 157. 40.
Colis origo. 156. 4.
Colis palpitatio. 156. 20.
Colis substantia secundū Galenū 156. 30.
Colis substantia secundum Vesaliū.
156. 31.
Colis substantia, & figura. 157. 12.
Colis

Colis substantia neruus fistulosus. 156.29
 Colis substantia cur duplex. 157.34.
 Colis hominis substantia secundum Phil-
 lippum. 158.6.
 Colis Tauri, & Arietis substantia se-
 cundum Philippum. 158.6.
 Colis uenae, & arteriae. 157.19.
 Colis ulcera siccissimis medicamentis indi-
 gent. 157.41.
 Color flauus non est exquisitus ruber, sed
 illi permixtus. scholio. 24.14.19.
 Colostrum. 202.12.
 κόλινος. 81.16.
 Columna apud Paulum morbi quoque no-
 men. 271.30.
 Columna, & Columella apud Paulum
 differunt. 272.7.
 Columna muris caendam representat.
 272.31.
 Combustio in oculo. 295.12.
 Compressio. 53.4.
 Conceptionis tempus opportunius. 197.19.
 Concipiendi tempus quod est. 200.11.
 Conciliatoris error. 69.23.
 Coniuncta causa secundum Auer. 40.1.
 Coniunctae causae nomen Galenus abhor-
 ruit. 38.38.
 Conopium morsus. 171.31.
 Censeruas causa quomodo agat. 45.26.
 Constantini lepra Graecorum elephantia-
 sis. 148.21.
 Constantinus an uere lepra, elephantiasue
 laborarit. 149.7.
 Constipatio. 52.40.
 Constrictio. 53.5.
 Continens quid, & unde. 61.2.
 Continens causa in quibus inuenitur, uni-
 uersalis determinatio. 42.9.
 Continentes causas primi Stoici nomina-
 runt, quorum primus fuit Athenaeus
 Attaleus. 35.20.
 Continentem morbi causam esse repletio-
 nem, falsum est, licet ex repletionem
 morbum fieri, uerum sit. 38.7.49.5.
 Continentem causam Celsus posuit. 40.5.
 Continentis causae nomen cur Galenus ab-
 horruit, rationes quinque. 59.40.
 Continui solutio in apostemate semper
 morbus. 74.36.
 Conuulsionis causa continens. 42.2.
 Copi error. 146.9.
 Copi traductio notatur. 29.36.
 Cor an apostemari possit. 28.31.
 Cor apostema pati, impossibile est. 28.37.
 Cor apostema proprie dictum pati impos-
 sibile. 29.37.

Cor apostemari potest secundum Barbarorum
 nomen. 29.9.
 Cor apostemari non potest secundum Grae-
 corum nomen. 29.12.
 Cor apostemari non posse, quomodo intelli-
 gendum. 29.14.
 Cor apostemia large sumptum pati potest.
 29.40.
 Cor oedemate, aut scirrbo affici potest. 30.6.
 Cor phlegmone, & erysipelate teneri pos-
 test. 29.6.
 Cor scirrbo uel oedemate tentari, difficilli-
 mum, & rarissimum. 29.21.
 Cor solum nullum patitur uitium graue.
 28.38.
 Cor suppurari penitus impossibile. 29.25.
 Corde uulnerato qui tumores frequentius
 contingere solent. scholio. 5.4.8.
 Cordis apostemata, etiam large dicta im-
 possibilis curationis. 30.12.
 Cordis tumor aliquando frigidus. scholio.
 5.4.39.
 Cornarij error. 28.40.13. 29.139.13.
 = 168.4. = 170.33. = 184.4. & .20. =
 275.22.
 Cornarij, & mulierum aliorum interpre-
 tum error. 271.30.
 Cornarij inconstancia, & inconsulta tra-
 ductio. 276.3.
 Cornea tunica. 291.41.
 Cornea tunica in quatuor laminas desqua-
 mari potest. 292.18.
 Cornea tunica quomodo in laminas diui-
 ditur. 292.3.
 Cornea tunica in anteriori tantum parte
 cornu similis est. 292.6.
 Cornea tunica a quo originem sumit.
 292.23.
 Cornea a quo iridis circulo originem su-
 mit. 293.22.
 Corneae acumen. 296.9.
 Corneae ruptura. 296.10.
 Cornua. 33.8.
 Corona. 286.28. 292.8.
 Coronae oculi circuli septem. 293.7.
 Coronalis. 295.3.
 Corpora salubria simpliciter semper, quo-
 uis uitio libera. 203.17.
 Corpora secundum dispositionem, quam ha-
 bent patiuntur uarijs temporibus. 204.25.
 Corpus salubre simpliciter semper, a ge-
 nerationis initio expurgatum. 199.24.
 Corpus insaluberrimum simpliciter sem-
 per, quale. 203.22.
 Corpus saluberrimum simpliciter rarissi-
 mum. 206.4.
 Corpus salubre simpliciter multum qua-

doque refertur. 206.6.
 Corpus insalubre simpliciter frequentissi-
 me reperitur. 206.9.
 Corpus neurum simpliciter frequentius
 quam salebria. 206.8.
 Corpus semper egrotans. 203.25.
 Corpulentia. 78.3.
 Corpulenti qui. 79.31.
 Correlatiua simul natura. 44.26.
 Correlatiua posita, se ponunt, et per se pta,
 se perimunt. 64.5.
 Corrodens. 117.37.
 Corrosio a putredine differt. 119.23.
 Costarum abscessuum quae melior ruptio.
 23.5.
 Crambe repetita. 14.6. 31.41.
 Crassities pro genere ad crassum, & tes-
 nuc. 272.39.
 κραύχων. 232.11.
 Credendum cuique in arte propria. 22.5.
 κραύχων. 235.21.
 Cremasteres qui, & quomodo a parastis
 differunt. 237.3.
 Cremasteres mulierum. 236.7.
 Cremasteres unde originem habent. 237.6.
 Cremasteres non eandem testium partem
 cum uenis, & arterijs contingunt. 237.31.
 Cremasteris dignotio secundum Paulum.
 238.3.
 κραύχων. 234.21. 235.28.
 κραύχων unde dicantur. 235.40.
 κραύχων. 235.41.
 Crepatura. 240.15.
 Crisis annorum quae. 206.14. & .16.
 Crystalli. 294.34.
 Crystalli quid sunt. 194.40.
 Crystallinus humor. 293.26.
 Cucume. 294.26.
 Cuniculus, & cuniculum quid. 81.23.
 Cuniculosum quid. 81.22.
 Curandi prima intentio a morbo. 48.5.
 Cynocephali efferacis naturae. 152.35.
 Cyrades deprauate scriptum. 232.40.
 Cyrades deprauatum nomen. 232.40.

 Abasa. 288.40.
 = 289.4.
 δαγτός. 238.23.
 δαγτός ualens
 tior membra-
 nae. 238.36.
 δαγτός unde di-
 citur. 238.37.
 Dartos media tunica. 241.4.
 Decubitus quid. 20.16.

Dedocendi tempus prius, & grauius,
quam docendi. 14.27.
Definitio notitiæ omnis origo. 15.18.
Definitio Authoris defectus. 298.28.
Definitio medicarum liber uel non
Galenii, uel non totus eius legitimus.
40.24.
Definitio libri locus. 40.35=160.13
& 36.
Definitio libri error. 297.3.
Definitio libri defectus. 294.11=299.10.
Demenul. 211.35=216.24.
De nominibus nil eruditum dici pot. 22.7.
Dentes phlegmone, uel tumore phlegmonæ simile uexari queunt. 23.7.
Dentes apostemantur. 24.17.
Dentes augentur semper. 24.21, & 29.
Dentes quid inflammationi simile patiuntur. 24.27.
Dentes duabus contrarijs affectionibus obnoxij. 24.32.
Dentes à principio usq; ad finem crescunt. 25.9.
Dentes trina dimensione augentur. 26.11.
Dentibus percussis remedium. 130.23.
Dentium phlegmone quibus à carnis phlegmone differt. 25.27.
Dentium incipienti tumori repellentibus occurrendum. 25.40.
Dentium incremento quæ sit naturæ intentio prima. 26.12.
δ'ε'ρ'μ'α. 179.18.
Desudatio. 172.11=191.30.
Desudationes. 72.24=33.7=183.1, & 3.209.24.
Deus summa ueritas. 14.31.
Diabetes. 257.23.
διαβήτης. 257.23.
Diafilon. 299.3.
διαπύκνωσις. 109.11.
διαπύκνωσις. 81.7.
Diaria affectio. 187.35.
Diaria ex bubone. 66.33.
Diaria quomodo interdum fit. 69.25.
δι'ὅτι τὸν. 288.17.
διαβήτης latine affectus, seu dispositio. 34.36.
διαβήτης communiter pro omnibus rebus præter naturam, proprie pro morbo. 35.6.
Differentiæ substantiales præ cæteris considerandæ. 71.34.
Digitus sextus quomodo morbus in numero. scholio. 13.7.10.

ro. scholio. 13.7.10.
Digitorum pterygion quid. 288.1.
Dilatatio. 112.37.
Dinellus. 5.9.
Dini excusatio. 15.38.
Dinus cur apud chirurgos multum reputatus. 13.24.
Dinuli mos in exponendo. 13.13.
Dinulus uno anno medicinæ incubuerat, quum Auicenna de apostematibus exposuit. 5.10.
Dinulus nugax. 13.12.
Dinutius. 5.9.
Disenteria quandoq; apostasis dicitur. 19.29.
Dispositio pro omnibus rebus præter naturam communiter, proprie pro morbo. 35.6.
Diuisio apostematum prima. 71.24.
diuisio secunda. 75.15.
diuisio tertia. 76.7.
diuisio quarta. 76.12.
diuisio quinta. 76.17.
diuisio sexta. 76.22.
diuisio septima. 76.25.
Diuisio prima cur ex magnitudine. 72.
Diurna affectio. 187.34. (24.
Diuus Siluester Imperatorem à lepra liberauit. 149.8.
Diuus Antonius Satyrum aliquando uidit. 152.36.
Doggam. 289.8.
Dolor actio læsa. 74.11.
Dolor ad se curandi intentionem aliquando trahit. 64.19.
Dolor morbi rationem aliquando subit. 44.32.
Dolor quomodo interdum morbi rationem subit. 64.8.
Dolor quomodo actiones offendit. 64.16.
Dolor non morbus, sed morbi rationem aliquando subit. 64.21.
Dolor in principio priapismi non est necessarius. 165.37.
Doloris causa continens duplex. 44.30.
Doloris causæ duæ medicè loquendo. 19.4.
Doloris causa quomodo una, & quomodo duplex. 67.32.
Dothien. 209.40=210.3.
Dothien morbus notissimus, nomen uero ignotum. 210.7.
Dothien latine apud Celsum, & Plinium furunculus. 210.39.
Dothien quomodo phymati similis, ab eoq; differt. 219.8.
Dothien quomodo phyma est. 219.10.
Dothien ex crassis humoribus gignitur.

219.16.
Dothienes inflamabundi affectus. 211.32.
Dothienes inflammati. 211.20.
Dothienes duplices. seu uarij, & inflammati. 211.20.
Dothienum materia. 211.26.
δοθίων. 210.11=212.21.
δοθίων nomē quod neq; sedem affectus neq; causam obstitit. 211.4.
δοθίωνες τ' ενις, q; Theodorus male papulas uertit. 29.1. pro quo uide in scholio. 4.
δοθίωνες scholio. 4.3.18.
Dracunculus secundum Arabes apostema. 19.26.
Draguncello. 223.31.
Dubellati. 19.35.
Dubellati idem, quod Græcorum apostema. 21.6.
Dubellet. 19.34=80.41.
Dubellet Arabum idem, quod Græcorum apostema. 21.6.
Dubellet quid Arabibus significet. scholio. 3.2.41.
Dura mater cerebri crassior membrana. 292.24.
Durandi causæ plures, ita & curationes. 107.41.
Duritia, uel durities Græcorum scirrhus. 103.29.
Durities frigida. 32.12.
Durities proprie dicta ex congelatione fit. 108.5.
Durities proprie dicta molliētibus proprijs indiget. 108.7.



Bullitio corrupta quæ. 204.8.
Ebullitio perfecta quæ. 204.1.
Ecchymoma. 108.29.
Ecchymomata scirrhus propinqua. 110.10.
ἐκχύμωμα. 108.29.
ἐκχύμωμα aliud, q; ἐγκύμωμα. 109.12.
Ecchymosis. 108.29.
ἐκχύμωσις. 108.29.
Ecchymosis, & ecchymoma quid significet. 108.36.
Ecchymosis quid. 108.39=109.6.
Ecchymosis quomodo scirrhus propinqua, tactui tamen cedens. 110.38. (27.
Ecchymosis tactui cedēs secundū Paul. 110.
Ecchymosis in omnibus corporis partibus aduenire

aduenire potest. 112. 21.
 ἐκχύμωσις aliud, q̄ ὀγχύμωσις.
 109. 12.
 ἐκχύμωσις quid, ita, et ἐκχύμωμα.
 109. 16.
 ἐκχύμωσις quid, & eius generatio.
 109. 37.
 Ecchymoseos causæ efficientes. 108. 27.
 Ecchymoseos causa materialis. 112. 28.
 Ecchymoseos colores. 110. 1.
 Ecchymoseos generatio. 109. 4.
 Ecchymoseos species tres apud Paulum.
 111. 8.
 ἐκχύμωσθαι quid apud Hippocratem.
 109. 3.
 Ecclesia multa bona præcipit, quæ à Chri-
 sto expressè ordinata nō sunt. 65. 34.
 ἐκφυμένους. 217. 6.
 Ecchymata 193. 13 = 194. 8.
 ἐκθύματα unde dicuntur. 193. 34.
 ἐκπυσμός. 297. 24.
 ἐκπύματα. 173. 26.
 Eczemata. 176. 6. & 11.
 Efflorescentes. 193. 20.
 Efflorescentia. 193. 19.
 Efflorescentia. 193. 19 = 194. 7.
 Effusio. 108. 30.
 ὀγχύμωσις quid, ita et ὀγχύμωμα
 109. 16.
 ἔκκον .i. cædens. 110. 32.
 ἔκλειον. 252. 15.
 ἔκλειος. 252. 16.
 ἔκλειος. 87. 25.
 ἔκλειος. 173. 12.
 ἔκλειος. 193. 7.
 Elephantia. 149. 29. & 39.
 ἔλεφαντία. 145. 30.
 Elephantia Arabum. 246. 31.
 Elephantia Arabum diuersus affectus ab
 elephantiasi Græcorum, & Romanor-
 um. 145. 35.
 Elephantia, uel Elephātiāsis Arabū quo-
 modo ab elephantiasi Græcorum, &
 Romanorum differt. 147. 20.
 Elephantia quid secundū Haliabbatem.
 146. 35.
 Elephantia Arabum an calidus, an frigis-
 dus tumor sit. 247. 31.
 Elephantia quid secundū Auic. 247. 11.
 Elephantia pauperculis lucri cā. 247. 13.

Elephantia causa materialis, & coniun-
 ta. 247. 20.
 Elephantia causæ antecedentes, & primi-
 tiuæ. 247. 27.
 ἔλεφαντίασις. 145. 30.
 Elephantiasis. 131. 3 = 149. 24 = 152. 3.
 Elephantiasis ob alimentū uitium. 141. 8.
 Elephantiasis nomen à similitudine sum-
 ptum. 141. 23.
 Elephantiasis nomen duplici similitudinis
 ratione. 145. 39.
 Elephantiasis turpissimus, seuissimusq;
 affectus. 143. 9.
 Elephantiasis morbus magnus, & fortis,
 ut Elephas. 147. 1.
 Elephātiāsis morbus diuturnus, ut elephā-
 tum uita longissima. 147. 10.
 Elephātiāsis Celsi tempore in Italia igno-
 tus morbus, & ante Magni Pompei
 ætatem. 148. 6.
 Elephantiasis alba. 150. 5.
 Elephantiasis cui ætati familiarior. 163.
 29 = 207. 35.
 Elephantiasis Græcorum. 207. 9.
 Elephantiasis Græcorum morbus est raz-
 rissimus. 207. 12.
 Elephantiasis, lepræ Arabum febre in
 sua generatione non indiget. 208. 17.
 Elephantiasis Diabolicum remedium.
 148. 26.
 Elephantiasis materia. 149. 36.
 Elephantiasis species duæ apud Paulum.
 149. 41.
 Elephantiasis species mitior. 150. 2.
 Elephantiasis species malignior. 150. 4.
 Elephantiasis materia est arabilis, quo-
 uis modo genita sit. 151. 25.
 Elephantiasis origo ex menstruo sangui-
 ne quomodo apud Azaraiū. 206. 17.
 Elephantiasim lepræ speciem posuit Ma-
 cer. 147. 5.
 ἔλεφας. 145. 29.
 Elephas. 149. 24 = 180. 26.
 Elephas Græcorum. 139. 35. f
 Elephas inchoans. 144. 30.
 Elephas ubi frequentior, & ubi rarior.
 148. 9.
 Elephas AEgypto frequentior, præsertim
 q; Alexandria. 148. 11.
 Elephas populis funebre malum. 148. 19.
 Elephas ex salsa pituita. 151. 28.
 Elephas tumor calidus, licet aliquo modo
 frigidus. 151. 31.
 Elephantis materia. 144. 3 = 146. 3 =
 Elephantis initium. 144. 30. (148. 15.
 Elephantis morbi ad Animal similitudo.

secundū 46. 4.
 Elephantis initium. 247. 7.
 Elephāticus homo ex mensuri sanguinis
 uitio quo tempore euadit. 197. 13.
 Elephāticus puer triennis. 207. 26.
 Elephāticus morbus apud Haliabbatem.
 246. 33.
 Elephāticus morbus apud Haliabbatem
 quid. 246. 36.
 Elephāti ad LaZarū similitudo. 148. 2.
 Elephāti graues, & uix flexibiles, ut
 Elephantes Animalia. 147. 14.
 Elephāti à generatione. 199. 23.
 Elephāticorum caro, & cutis nigra, mas-
 culosa, asperaq; et dura, et grossa, in-
 star carnis, et cutis Elephantis Anis-
 malis. 146. 1.
 Elephāticorum cutis, et caro qualis red-
 ditur. 146. 20.
 Elephāticorum tumores diuersi. 151. 39.
 Elephantum Græcorum, & Latinorum
 ab elephantiasi Arabum multi distin-
 guere nesciunt. 142. 8.
 Elephantum uita. 247. 11.
 Elephantum etas florens. 147. 12.
 Elmynthes. 180. 26.
 ἔλυτροεις. 239. 3.
 Emborisma. 112. 37.
 Emborismum. 112. 37.
 Eminentia. 71. 31.
 Eminentia idem, quod bobor. 22. 15.
 Eminentia umbilici. 249. 36.
 Emollientia medicamenta scirrhis cōgrua,
 canceris aduersa sunt. 107. 36.
 ἐμπύημα. 115. 14. & 30.
 Emphysema duplex. 116. 9.
 Emphysemata quo differunt ab œdemate.
 Emphysematis materia. 117. 16. (116. 8.
 ἐμπύημα latine inflatio proprie.
 116. 3.
 ἐμπύημα. 117. 1.
 ἐμπύημα. 81. 7 = 218. 30.
 Encanthis. 40. 33 = 62. 34 = 282. 41.
 Encanthis apud Galenum quid. 283. 1.
 Encanthis duplex mitis, et malignus.
 284. 12.
 Encanthis morbus in numoro. 62. 31.
 Encanthis non ex toto genere præter nas-
 turam. 284. 3.
 Encanthis plura significat. 283. 29.
 Encanthis tumor sanguineus, calidusq; et
 humidus. 284. 29.
 Encāthidis generatio prima unde. 284. 6.
 Encāthida qui magis pati solent. 284. 9.
 Encanuma

INDEX

- Encauma Aetij. 295. 15.
 Endemius morbus. 205. 28.
 Endemius uulnorum morbus. 27. 18.
 Enterocela apud Plinium. 240. 2.
 Enterocela berniae propriè dictæ species. 239. 31.
 Enterocelæ materia, & temperamentum. 254. 8.
 ἔντεροκλήη. 241. 25. 248. 24. 242. 13. 233. 41.
 Enterociplocelæ materia, et temperamētum. 254. 8.
 ἔντεροπιπλοκλήη. 242. 20. 233. 41.
 Enterociploomphalon. 250. 40.
 ἔντεροπιπλοομφαλον. 250. 40.
 Entromphalon. 250. 37.
 ἔντερομφαλον. 250. 37.
 ἐπιμφοπερίζεν. 287. 23.
 ἐπανάστασις. 139. 11. 180. 19.
 Ephelidum curatio. 209. 9.
 Ephemera febris ex acribus, uitiisq; ua-
 poribus, nō putridis fieri solet. scholio.
 19. 12. 9.
 Ephemeris. 187. 34.
 Ephemerides. 185. 27.
 Ephemeridos materia. 186. 35.
 ἐπι. 262. 30.
 Epicanibides. 283. 30.
 Epicauma. 134. 16.
 ἐπιάνευμα Pauli. 295. 11.
 ἐπιάνευμα Aetij. 295. 19.
 Epidemia. 212. 19.
 Epidemia apud Rāzem. 228. 19.
 Epidermis. 100. 10.
 ἐπιχρυσόκλήη. 251. 40.
 ἐπιγύντων quid. 241. 14. & 23.
 Epilepsia in principio insensibilis. 75. 6.
 Epilepsiae remedium. 124. 23.
 Epileptici semen aliquādo eyciūt. 160. 34.
 Epinyctides. 180. 21. 187. 41.
 Epinyctides notissimæ Galeni tempore
 affectiones. 183. 24.
 Epinyctides Pauli, & Aetij sunt. benat
 noctis Auicennæ. 190. 28.
 Epinyctidis materia. 186. 22.
 Epinyctidis ueræ materia. 186. 28.
 Epinyctidis locus secundū Celsum. 187. 6.
 Epinyctidis locus uniuersalis secundū
 Paulum, & Aetium. 187. 33.
 ἐπιπυκτις. 185. 33.
 Epinyctis. 185. 21. 209. 27.
 Epinyctis calidas tumor. 187. 16.
 Epinyctis in tibijs, & pedibus secundū
 Pollucem. 187. 4.
 Epinyctis nomen est æquiuocum. 185. 25.
 Epinyctis nota affectio. 110. 1.
 Epinyctis pustula. 184. 34.
 Epinyctis pro nocturnis comentarijs.
 185. 25.
 Epinyctis pro Arabū efferis. 187. 34.
 Epinyctis Pollucis, Celsi, et Plinij ab epi-
 nyctide Pauli, et Aetij tripliciter differt.
 186. 13. et. 20.
 Epinyctis Pauli, & Aetij potius est ephē-
 meris dicenda. 186. 34.
 Epinyctis quid secundū Paulum, et A-
 etium. 186. 1.
 Epinyctis quid secundū Pollucem, Plī-
 nium, & Celsum. 186. 4.
 Epinyctis quia noctū oritur. 185. 32.
 Epinyctis quia per noctem affligit. ibidē.
 Epinyctis somniorum liber. 185. 27.
 Epinyctis ulcus in oculi angulo. 185. 28.
 ἐπιπυκτις. 293. 2.
 ἐπιπλεβος. 266. 40.
 Epiplocela berniae propriè dictæ species.
 239. 33.
 Epiplocela. 234. 14.
 Epiplocelæ materia, & temperamentum.
 254. 8.
 ἐπιπλοκλήη. 233. 4. 241. 2. 242. 6. & 13.
 ἐπιπλοκομίσαι. 242. 17.
 ἐπιπλοενπεροκλήη. 233. 41.
 ἐπιπλοομφαλον. 250. 29.
 Epiloomphalon. ibidem.
 ἐπισαρκίδιος. 258. 32.
 ἐπιδίς. 262. 1.
 Epulides, & parulides tumores calidi
 sunt, & sanguinei. 262. 36.
 Epulis. 262. 1.
 Epulis quid. 262. 5.
 Epulis generatio ex parulide. 262. 17.
 Epulis à parulide bifariam differt.
 262. 24.
 Epulis quo in loco propriè fieri consuevit.
 262. 18.
 Epulis an iuxta infimum duntaxat mor-
 larem fiat. 263. 11.
 Epulis dupliciter sumitur propriè, et cō-
 munit. 263. 11.
 Equorum lichenes. 130. 18.
 Erectio assidua. 162. 8.
 ἐρπης. 103. 6.
 Error in principio paruus in fine maxi-
 mus. 19. 15.
 Eruptiones. 139. 5.
 Eruptiones ficosæ. 139. 14.
 Eruptiones papularum. 139. 8.
 Eruptiones pituitæ. 139. 2.
 Eruptiones pustularum. 139. 8.
 Eruptiones tuberculorum. 139. 14.
 ἐρύω. sch. 24. 14. 20.
 Erysi unde dicitur. sch. 24. 14. 29.
 ἐρύσιβη. sch. 24. 14. 15.
 Erysimi seminis facultas. sch. 24. 14. 12.
 Erysimum unde dicitur. sch. 24. 14. 29.
 Erysipelas. 94. 29.
 ἐρύσιπelas. 94. 28. sch. 24. 14. 17.
 Erysipelas unde dicitur quadruplex eibi-
 mologia. sch. 24. 14. 8.
 Erysipelas secundū Arabes apostema.
 19. 24.
 Erysipelas nō ē apostema propriè. 21. 15.
 Erysipelas species phlegmones. 73. 20.
 Erysipelas compositus morbose est. 74. 20.
 Erysipelas inflammatum. 77. 3. 94. 41.
 phlegmonosum. 77. 4.
 scirrhusum. 77. 4. 95. 1.
 oedematofum. 77. 4. 94. 41.
 Erysipelas exquisitum ex bili etiam san-
 guini feroue admista, quomodo intellia-
 gendum. 102. 17.
 Erysipelas exquisitum duplex. 96. 4.
 Erysipelas quomodo ad uicina trahit. sch.
 24. 14. 25.
 Erysipelas non semper cum tumore, licet
 semper sit inflāmatū. sch. 24. 14. 35.
 Erysipelas nō semper cum manifesto tu-
 more, licet semper cum tumore, saltem
 occulto, & uix apparente. scholio.
 24. 14. 35.
 Erysipelas exquisitum quod est. 94. 38.
 non exquisitum. 94. 41.
 Erysipelas duplex ulceratum, et non ul-
 ceratum. 98. 26.
 Erysipelas ulceratum ex quibus. 95. 3.
 & non ulceratum ex quibus. 95. 8.
 Erysipelas exulceratum magis ex natu-
 rali bili fieri solet. 96. 13.
 Erysipelas exquisitum ex non naturali bi-
 li tripliciter. 96. 21.
 Erysipelas ulceratum eiusdem generis cū
 herpete. 98. 27.
 Erysipelas ulceratum ex crassiore bile, q̄
 herpes. 101. 18.
 Erysipelas an ex sanguine tenui, an ex
 bile, an ex ijs misto fiat. 95. 23.
 Erysipelas non ex sanguine simpliciter
 sed ex tenuissimo, & feruente. 96. 38.
 b Erysi

INDEX

Erysipelas enim erodit, nonnihil etiam subiectæ carnis attingit. 100.37.
Erysipelas in uisceribus. 102.6.
Erysipelas in cute. 214.14.
Erysipelata. 124.31.
Erysipelatis causa continens. 42.2=103.3.
Erysipelatis curatio sine sanguinis missione. 96.1.
Erysipelatis exquisiti causa semper bilis est. 97.20.
Erysipelatis exquisiti causa. 99.35.
Erysipelatis generatio, & causa, & loci. 21.27.
Erysipelatis curatio quæ libro ad Glauconem secundo. 95.28.
Erysipelatis materia, quæ libro de tumoribus. 95.31.
Erysipelatis materia, quæ in alijs locis. 95.39.
Erysipelatis materia an tenuior, quæ herpetis. 100.5.
Erysipelatis suppuratio mala. 224.41.
Erysipelato dispositiones quæ. 20.5.
ἐρυσιπελατώδης dispositio. 20.6.
Erysipilla. 94.34.
Erysipilla, et ignis persicus. 212.8.
Erysipilla procedens. 212.16.
ἐρυσιπέτα. 184.25.
ἐρυθρον. 97.30.
ἐρυθρός. 238.39.
ἐρυθροειδής tunica. 238.31.
ἐρυθροειδής unde dicitur, et quare rubra. 238.39.
Erythroides tunica tenuior est, quæ dactylos. 238.36.
Erythroides infima tunica secundum Celsum. 241.5.
Erythroidis tunicæ forma, nexus, & origo. 239.11.
Essentia rei prius consideranda tam in diuisione, quæ in definitione. 71.6.
Esseræ. 33.6=186.26=187.39=188.16=209.18.
Esseræ cholericæ. 32.24.
Esseræ Arabum. 187.26.
Essere naporosus tumor. 189.32.
Esseræ pituitosæ rarissimæ. 189.7.
Esseræ Serapionis à Pauli, et Aetij epyne fide diuersus affectus. 189.40.
Essere an sit nouus morbus. 190.22.
Esserarum species duplex. 187.27.
Esserarum quatuor interdum modi, pro quatuor humorum diuersitatibus. 189.11.

Esserarum materia potius napor, quæ humor. 189.31.
Esseras tertiana febris insequi solet. 189.14.
ἐσθιόμενον ἔλκος. 117.38.
ἐσθιόμενος. 103.7.
Estbiomenos Auicennæ. 94.22.
Estbiomenos Hippocratis totam erodit cutem. 100.38.
Estbiomenos Celsi. 120.8.
Estbiomeni causa continens. 103.9.
ἐπι προpositum, et postpositum an differant. 48.23.
ἐπι γινόμενον. 4.7.22=48.19.
ἐξακοντισμός. 160.37.
ἐξαρέτω. 218.39.
Exanthema pustula. 184.34.
Exanthemata. 124.32=139.15=171.8=187.39=293.18=209.27.
Exanthemata sublimia. 138.22.
Exanthemata lata. 138.24.
Exanthemata lata non admodum pruriunt. 188.7.
Exanthemata pituitosa dicenda sunt pituitosæ eruptiones. 139.17.
Exanthemata capitis. 176.5=172.36. & 41=176.11.
Exanthemata Celsi plura, ut nomen commune est. 193.9.
Exanthemata sudorum. 192.14.
Exanthemata rubra, rotunda, parua, ut uariæ. 164.12.
Exanthemata pustulæ sunt. 293.38.
Exanthematum genus duplex. 138.21.
ἐξανθημα. 193.21.
ἐξανθήματα. 139.18=193.4. & 19.
ἐξανθήσεις. 193.19.
ἐξανθήσεις. 193.21.
ἐξανθήσεις ἑλκώδεις. 194.4.
Excedens. 117.38.
Excedens quomodo capi largè potest. 122.26.
Exitura. 81.8.
Exitura quid. 21.10.
Exituræ quæ. 31.35.
Exomphali specierum materia, et temperamentum quod. 254.22.
ἐξομφαλον in neutro genere. 149.34.
ἐξομφαλος homo quæ dicitur. 248.12.
ἐξομφαλος nomen adiectiuum. 249.20.
ἐξομφαλοι homines qui. 249.15.

Exostosis. 152.10.
Exostosis. 152.9.
ἐξόστως. 152.9.
Exostoseos causa materialis. 152.12.
Expositoris munus. 13.1=14.10.
Expositorum abusus. 13.4.
Expositorum consuetudo. 14.11.
Expultricis facultatis munus. 201.6.
Extremicordium. 179.9.
Exuatio. 108.31.
Exumbilicæ homines. 249.36.
Exumbilicæ affectus. 249.20.
Exumbilicati homines. 249.36.
Exumbilicati qui. 248.12=249.15.
Exumbilicatio. 249.35.
Exumbilicatorum affectus in quo loco sit. 248.16.



Abescere. 188.37.
Fabius Verruca. 181.11.
Facile est inuenire addere. 33.36=35.41.
Facili causa non

datur. 39.10.
Fauosa tinea. 175.13.
Fauositas. 172.3.
Fauositas species sabasati. 172.25.
Fauis. 167.10=171.8.
Fauis materia quæ. 167.27.
Fauis materia quomodo sit hymeclio mellis similis. 168.7.
Fauis materia mellis colori similis. 168.21.
Fauis materia pessimi mellis colori similis. 168.27.
Fauis, & achoris materia secundum Alexandrum triplex, & signa. 168.33.
Fauis humor quomodo sit hymeclio mellis similis. 167.38.
Fauis locus frequentior. 170.1.
Fauis tuberculorum species. 220.6.
Fauus. 166.20.
Fauus apud Plinium. 170.30.
Fauus quid, & eius materia. 85.2.
Fauus secundum Celsum quid. 169.35.
Febris acutorum morborum necessario continua est. scholio. 17.8.38.
Febris an putrida adhuc dicenda remota putredine. 63.23.
Febris causa continens putredo non est. 42.10.
Febris dicitur in partibus animatis. 70.20.

Febris das

INDEX

Febris duplex morbus. f. & symptoma.
67.13.
Febris causa coniuncta uerè nondatur,
sed largè. 67.40.
Febris ephemera ex uitiosis uaporibus.
scholio. 19.12.9.
Febris in uariolarum, et morbillorum exis-
tu cur necessaria. 208.15.
Febris hectica quomodo ab alijs differat.
49.37.
Febris post ablatam causam cuius generis.
scholio. 18.12.1.
Febris ablatis humoribus an diaria. schol.
19.12.6.
Febris nulla causa continens. 64.29.
Febris omnis per se morbus est. 67.13.
Febris remanens post remotam putredinē
non est symptoma. 69.17.
Ferè i. max^a. ex parte. 187.10.
Fermētū uirtus quomodo in uase remaneat.
201.241.
Fermis. 270.14.
Fernelij error. 193.35=197.37=201.2.
Fernelij sentētia q̄ uariolæ, et morbilli ex
menstruo sanguine originem non ha-
bent. 196.29.
Feruor corruptius quis. 204.3.
Feruor perfectius quis. 204.1.
Ficosa tinea. 175.15.
Ficosæ eruptiones. 139.13=171.3.
Ficosi tumores qui, & quomodo à ionibis
differunt. 208.35.
Ficosi tumores species duplex, altera ca-
pillorum, altera barbæ. 171.21.
Ficosus tumor cui parti proprius morbus,
an communis. 175.15.
Ficus in pedis talo historia. 264.34.
Fiens duplex. 47.5.
Fiens morbus. 51.18.
Fiens morbus, qui propriè patris dicitur.
scholio. 11.6.22.
Fiens morbus, & morbus fiens quomodo
differunt. scholio. 12.6.29.
Fiens homo. 49.29=51.17.
Fiens homo, & homo fiens quo differunt
propriè. scholio. 12.7.5.
Fiens quomodo de facili intelligatur.
47.35.
Fiens, ut fiens passio est. 61.14.
Fiens, ut fiens patris est non morbus.
39.16.
Fientis pars duplex. 39.13.
Fientis non omnis partes due. 46.15.
Fientis duplicis exemplum. 49.28.
Figura pro formatione. scholio. 21.13.3.
Figura quomodo morbus. schol. 15.7.33.
Figura an semper uitetur in apostemate.

75.30. scholio. 21.12.33.
Figura causa continens, uel antecedens.
scholio. 15.7.37.
Filia noctis. 187.40.
Filtrax. 223.18.
Fistula uitulorum morbus quid. 27.21.
Fistula. 81.27.
Fistula apostema, et ulcus. 81.36.
Fistula tumor atrabilarius. 82.2.
Fistula causa. 81.40.
Flatuosus spiritus quis. 117.20.
Flatuosi spiritus generatio, & causæ.
117.22.
Flatus quis. 117.20.
Flaua bilis. 85.20.
Flaua quæ ex sanguinis missione obscu-
rior est, q̄ quæ naturalis. 97.4.
Fluxio manifesta phlegmones causa.
30.41.
Fluxiones alui quandoq; apostases dicun-
tur. 19.29.
Fœcherna. 141.32.
Fœcumbilicatio. 254.37.
Fœmina cur masculo pinguior. 79.26.
Fœminæ mensibus carentes steriles sunt.
200.16.
Fœtus puriorem sanguinis menstrui pars
tem trahit. 201.4.
Fœtus fortis uestitur toto sanguine, qui ad
uterum fluere solet. 200.33.
Fœtus imbecillis, aut non sanus quomodo
cognoscitur. 200.32.
Fœx sanguinis duplex. 104.41.
Fœx uisā à non uisā quomodo differt.
85.35.
Formalis ratio coniunctæ causæ nomē ha-
bere potest secundum Aristot. 39.5.
Formationis aliquæ species necessario in
apostematibus deprauantur. scholio.
21.13.5.
Formatrix faculas, generatrixq; , et nu-
trix eadem. 202.17.
Formica. 177.30.
Formica Arabum. 181.34. scholio. 34.
19.32.
Formica Arabum non apostema propriè.
21.16.
Formica Arabum unde. 182.15.
Formica, et acrochordon in quo differat.
177.36.
Formica Græcorum. i. 183.8=183.13.
Formica Græcorū uerrucæ spēs. 182.21.
Formica miliaris. 32.25. et 27=181.36=
183.2.
Formica siue myrmecia Græcorum unde.
182.20.
Formica unde dicitur. 177.38.

Formicæ. 32.30=35.5.
Formicæ apud Arabes apostema. 19.23.
Formicæ caput. 298.8.
Formicæ morborum nomen æquiuocum.
182.22.
Formicæ paratus locus. 178.27.
Formicæ quando morsus sensus inest.
178.1.
Formicæ spēs apud Arabes tres. 181.36.
Formicalis cornæ ruptura. 298.11.
Formicans uerruca. 181.28.
Formicula. 170.11.
Formiculares. 181.15.
Fossula. 294.21.
Fouea. 294.21.
Foueola. 294.21.
Frigiditas quomodo stuporis causa sit.
scholio. 8.6.3.
Fructuum generatio quomodo sit. 200.21.
Fuchsy error. 45.40=52.25=54.33=55.
26=56.39=69.25=85.15=135.19=
156.26= scholio. 8.5.1= schol. 17.8.14.
Fuchsy error maximus, et ridiculus de cā
continente. scholio. 17.9.31.
Fuchsius Manardi, et Leonici transcrip-
tor. 147.37.
Fuchsius ex aliorum furtis multa uolumi-
na quotannis publicat. schol. 17.10.11.
Fundibulum. 266.41.
Furios. 228.8. et. 13.
Furunculus. 110.3=112.22= schol. 4.3.28.
Furunculus affectus inflamābūdus. 217.3.
Furunculus ex crassis humoribus gigni-
tur. 219.13.
Furunculus duplex mitis, et malignus.
211.8.
Furunculus quando mitis, et quando malis-
gnus. 216.40.
Furunculus mortiferum aliquando malum.
211.3.
Furunculus phymati quomodo similis, uel
ab eo differens. 216.40=219.8.
Furunculus quid secundū Celsū. 216.26.
Furunculus tumor calidus. 211.27.
Furunculi malignitas interdum aduenis-
ens. 216.35.
Furunculi phymatum species. 217.21.
Furunculi radix. 216.31=221.4.
Furunculi uentriculus an sit. 220.29.
Furunculi uentriculus quid. 221.2.
Furunculi uentriculus quare sic dicitur.
216.28.
Furunculi uentriculus apud quosdam.
220.41.
Furunculorum loca. 211.1.
Furunculorum materia. 211.24.
Futuri causa præcedens. 99.11.



Ada 284.17.
Galenus medicorū post Hippocrate coryphæus. 5.31.
Galenus medicorū Phœbus. 41.21.
Galenus medicinæ Hippocratis lumen. 157.28.
Galenum reuereri debemus, quoad possumus. 98.12.
Galenus medicus magis, quā philosophus. 39.38.
Galenus primus tertio generi morborum nomen dedit. 45.18.
Galenus continet causæ nomen abhorruit. 38.38.
Galenus in Aëolica, & Dorica lingua plura ignorauit, q̄ sciuit. 84.24.
Galenus Chironi, Telephūq; ulceris definitionem ignorasse uidetur. 123.14.
Galenus, & Hippocratis dogmata rationi conformiora, & a contradictionibus remotiora existūt, q̄ aliorū medicorū.
Galenus in exponendo mos. 13.7. (5.27.
Galenus locus correctus. 50.36.
Galenus locus elucidatur. scholio. 8.5.30.
& scholio. 17.8.14.
Galenus locus expositus. 53.40=124.2.
Galenus locus obscurus enodatur. 242.37.
Galenus locus. 29.34=37.27=38.27=48.39=86.52=97.2=104.34=109.15=109.35=114.15=135.21=153.26=267.40=224.13=268.23=284.4=283.28. scholio. 1.2.21.
Galenus loca multa. 84.15.
Galenus loca exposita. 50.28.
Galenus loca exposita de scirrbi materia. 50.28. (105.34.
Galenus loca quatuor. 110.17.
Galenus contradictio. 73.22=120.1=268.36.
Galenus contradictio, et solutio duplex. scholio. 22.13.27.
Galenus contradictio sedatur. 103.40=106.38=268.40.
Galenus contradictionis solutio. schol. 24.14.32.
Galenus contradictiones, et diuersitates in laudē potius uertuntur 98.18.
Galenus, et Pauli contradictio. 110.25.
Galenus excusatio cōmunis, et laus. 98.16.
Galenus defensio. 122.27.
Galenus defensio contra Vesaliū. 157.30. 159.23.

Galenus mos. scholio. 9.6.14.
Galenus sermo de erysipelate uariis, et inconstans. 95.22.
Galenus liber ad Glauconem prius scriptus, q̄ methodus. 106.5.
Galenus obscuritas, et diminutio in penis descriptione. 159.11.
Galenus error. 121.4=122.19=159.6=235.33=252.22=276.4.
Galenus error de atræ bilis temperamento. 92.6.
Galenus excusatio triplex de atræ bilis temperamento. 92.8.
Galenus additū esse non debemus. 65.31.
Gallica lues celerius, q̄ elephantiasis incit, et mouetur. 205.32.
Gallica lues in nouis insulis ut endemius morbus, et familiaris. 205.28.
Gallici lues, et eius reseruatā infectio. 202.
Gallici morbi abscessus. 75.35. (34.
Gallici morbi origo prima. 135.15=205.17.
Gallici morbi alia origo secundū aliquos. 205.27.
Gallicus morbus nouus, et qualis naturæ. 135.10.
Gallicus morbus filius spurius elephantias. Galanac. 279.29. (afis. 205.23.
Galsamati. 279.29.
Ganglion. 138.27.
Gangræna. 94.11.
γανγκραινα. 94.10.
Gangræna quid, & causæ. 21.33.
Gangræna species nomen. 119.21.
Gangræna ex carbūculo. 216.36. (24.
Gangræna secundū Arabes apostema. 19.
Gangræna nō semper apostema est, neq; Gangræne origo. 113.4. (ulcus. 21.29.
γανγκραινα quid. 266.18.
γανγκραινα partis nomen. 267.32.
γανγκραινα partis nomē propriū apud Græcos. 267.6.
Gargareon præcipua hoīs pars. 266.19.
Gargareon quibusdā etiam aubus inuenitur. 266.20.
Gargareon particula uenosa. 266.40.
Gargareo apud Aristotelē pro larynge. 267.13.
Gargareo quando uua patitur incidi pot. 268.17.
Gargareon quando manibus tangendus nō est. 268.11.
Gargareon pro uua secundum quosdam suffucatione. 269.22.
Gargareois substantia, et figura. 266.30.

Gargareonis figura naturalis. 272.28.
Gargareonis usus triplex. 266.22.
Gargareonis inflammati color. 273.22.
Gargareonis tumor tripliciter fieri potest. 272.19.
Gargareonis defectu quomodo aliqui mortui sunt. 266.30.
Gargare error. 232.11. scholio. 4.3.15.
Gemma plantarum ad florem uergentes quomodo tument. 193.23.
Generatio ex menstruo sanguine secundū Aristot. 200.20.
Generationis nostræ principia duo: sanguis, & semen. 200.38.
Generatrix facultas eadem, et formatrix. 202.17.
Gentilis Speculator cognominatus. 13.12.
Gentilis mos in exponendo. 13.13.
Gentilis error. 69.5. & 232.19.36.
Geromati. 122.13.
γερματιον εστι. 48.21.
Glacialis oculi humor. 293.26.
Glandis substantia rara. 159.8.
Glandis substantia linguæ carni similis. 159.6.
Glandis substantia a colis substantia distans. 266.3. (uersa. 155.19.
Glandula in oculi angulo. 284.19.
Glandulae in sue, in homine tonsillæ eadē dicuntur. 278.18.
Glandularum genus. 32.13.
Glandularum genera duo. 235.26.
Glandularum genus in collo duplex, eadē rumq; descriptio, & usus. 277.1.
Glandularū species melancholica. 32.15.
Glandulosa corpora quomodo a glandulis differunt. 235.30.
Glans semper æqualem habet magnitudinem secundum Galenum. 155.21.
Glans in erectione augetur, ac tumescit contra Galenum. 159.6.
Glans in oculi angulo. 284.19.
Gonorrhea. 160.34.
Gracilhermia. 252.19.
Gracilumbilicatio. 252.35.
Græci omnis artis principium, et perfectionem inuenerunt. 205.4.
Græcia temperata. 204.39.
Græcis an folis adhibenda fides. 14.34.
Granalis. 298.12.
Grando. 216.1.
Grando in oculo. 54.26.
Grumi. 113.22.
Grunnire. 232.29.
Grunnitus. 232.30.
Guardenici. 284.20.
Guardenigi.

Guardenigi. 284. 20.

Gutturis tumor. 233. 15.

Gurgulio quid. 266. 19.

Gurgulio præcipua hominis pars, licet quibusdam Aibus insit. 266. 20.

Gurgulio pro gutture. 267. 11.

Gurgulio quid Latinis ostendat. 267. 6.

Gurgulio apud Haliabbatem quid significet. 270. 4.

Gurgulion apud Haliabbatem quid. 279. 38.



Alabami. 258.

22.

Haliabbatis loc. 265. 5 = 280.

30 = 270. 4 =

295. 27.

Haliabbatis er-

ror. 188. 20.

Hæreditarij podagrici. 199. 28.

Hæreditarij morbi. 199. 28.

Hæscæ. 264. 39.

Hæscæ. 191. 32. & 34 = 192. 18.

Hæscæ. 33. 7.

Hæscæ. 160. 1.

Hercules an Chironem uulnerauerit.

121. 13.

Hermolai error. 184. 35 = 232. 12.

Hermolai, & plurium aliorum error.

181. 22.

Hermolai comprobatio. 225. 21.

Hernia. 241. 2.

Hernia unde dicitur. 240. 6.

Hernia nomen indecorum, sed commune

latinis. 239. 34.

Hernia, & ramex an differant. 239. 31.

Hernia inguinalia. 248. 40.

Hernia carnosæ. 233. 13.

Herniæ species tres proprie dictæ.

239. 33.

Herniæ species an calidi, uel frigidi tumores sint. 253. 2.

Herniæ species omnes, largè opostemata dici queunt. 253. 7.

Herniarum species an ad sex causarum genera reducibiles. 77. 8.

Herniarum generatio prima ex aliqua sex substantiarum immediate, uel mediate. 253. 27.

Hernium quid. 240. 7.

Herpes. 213. 15.

Herpes quid. 295. 14.

Herpes apud Hippocratem an morbillos significet. 195. 1.

Herpes compositus morbus est. 74. 20.

Herpes cum alijs tumoribus componi nõ solet. 99. 5.

Herpes cutim tantum erodit. 100. 37.

Herpes eiusdem generis cum erysipelate ulcerato. 98. 27.

Herpes ex palida bili, tenuiori tamen, q̃ erysipelas. 101. 38.

Herpes est biomenos. 195. 4.

Herpes est biomenos Celsi. 120. 8.

Herpes est biomenos ex bili minus tenui, q̃ alij duo herpes fit. 101. 13.

Herpes Græcorum. 181. 35.

Herpes an in corde. scholio. 5. 3. 41.

Herpes in cute. 214. 15.

Herpes quæ in cute tantum. 120. 24.

Herpes in uisceribus. 102. 6.

Herpes secundum Arabes apostema.

19. 24.

Herpes non est apostema proprie. 21. 16.

Herpes simpliciter ex tenuissima bili. 10. 8.

Herpes miliaris. 103. 11 = 181. 35.

Herpes miliaris ex bili pituitæ admixta, et si non extreme tenuissima sit. 101. 11.

Herpes miliaris non statim ulcus est.

101. 36.

Herpes miliaris ex bili minus calida, & acri, q̃ alij. 103. 13.

Herpetes magni qui. 195. 4.

Herpetis miliaris continens causa bilis pituitæ admixta. 103. 13.

Herpetis est biomeni causa continens.

103. 9.

Herpetis simpliciter causa continens. 103. 4.

Herpetis generatio, causa, et locus. 21. 28.

Herpetis materia an tenuior, q̃ erysipelas. 100. 5.

Herpetem in corde gigni remotissimum uidetur. scholio. 5. 4. 4.

Herpigo. 134. 14.

Hila. 252. 12.

Hilla. 252. 12.

Hilbernia. 252. 13.

Hilbernia. 252. 13.

Hilumbilicatio. 252. 33.

Hippocratis, et Galeni dogmata rationi cõformiora, et a contradictionibus remotiora existunt, q̃ aliorum medicorum.

5. 27.

Hippocratis laus à Galeno data. 271. 13.

Hippocratis locus. 162. 40 = 268. 23.

Hippocratis regio temperatissima. 204. 40.

Hippocratis sententia declaratur. 47. 4.

Hippomanes. 130. 27.

Hippomanes quid, et eius uirtus. 130. 27.

Hira. 252. 13.

Hircus quid. 283. 9.

Hirbernia. 252. 13.

Hirumbilicatio. 252. 33.

Hirundines. 130. 18.

Hæmorrhoides insaniam solvunt. 245. 22.

Hæmorrhoides morales. 264. 26.

Hæmorrhoides nasi secundum aliquos Arabes quid. 268. 38.

Hæmorrhoides nigrae. 245. 32.

Hæmorrhoidibus curatis, insaniam peruenisse uisum est. 245. 19.

Hæmorrhoids uera. 264. 26.

Hæmorrhoids uerrucalis. 264. 27.

Homines ad errandum prompti, et natura preclues. 523.

Homo siens. 49. 29 = 51. 17.

Homo siens, et siens homo quo differunt proprie scholio. 12. 7. 5.

Horatii limani error. 83. 38 = 87. 23 =

153. 31.

Horroris materia. 126. 13.

Humidum radicale à principio ad finem usq; idem numero. 202. 24.

Humor melancholicus ex calore diminuto. scholio. 23. 14. 1.

Humor melancholicus, et atra bilis specie differunt. 93. 2.

Humor purus physice, aut medicæ.

102. 39.

Humor tenuis non semper, sed cæteris paribus ad exteriora penetrat. 102. 3.

Humores naturales à non naturalibus specie differunt. 89. 19 = 92. 35.

Humores dupliciter commisceri queunt.

102. 23.

Humores corporis latitudinem amplam retinent. 101. 2.

Humorum generationi præsidens, an idem numero calor. 90. 13.

Humorū generatio maxima ex parte simul fit. 90. 18.

Hydros. 255. 5.

Hydros ex renibus. 255. 16.

Hydrentocela. 240. 34.

Hydrentocele. 242. 21.

Hydrenteroepilocela. 240. 35.

Hydrocele. 234. 14.

Hydrocela quid. 240. 22.

Hydrocela herniæ proprie dictæ species.

239. 33.

Hydrocela in mulierum pudendis. 241. 28.

Hydrocelæ species duæ. 240. 35.

Hydrocelæ primæ speciei signa. 241. 3.

Hydrocelæ materiæ. 241. 28.

Hydrocelæ materia qui tumor frigidus est.

254. 7.

Hidromphalon. 250. 31.

Hidrops. 255. 5.

Hydros unde dicitur. 255. 1.

Hydros tumor frigidus, et humidus, et longus morbus. 259. 3.

b iij Hidrops

Hydrops ex hepatis duritie. 255.16.
 Hydrops omnis in medio iccore necessariò le-
 dit. 256.21.
 Hydrops sicca. 255.27=260.17.
 Hydrops quomodo sicca, si est morbus hu-
 midus. 259.14.
 Hydrops sicca est tympanites. 258.34.
 Hydrops leucoplegmaticus quomodo sit.
 261.17.
 Hydrops ex furore. 256.22.
 Hydrops ad matellam. 257.25.
 Hydropsis carnositas. 258.22.
 Hydropsis species tres secundum Galenum,
 & omnes sequaces. 218.16.
 Hydropsis tempora quatuor. 257.13.
 Hydropsis affectus partes quæ. 253.21.
 Hydropsis tussis superueniens. 259.7.
 Hydropsis species omnes frigidi tumores
 sunt. 261.38.
 Hydropsicos species duæ apud Hippo-
 cratem. 255.25.
 Hydropum differentie. 255.29.
 Hydropum differentie diuersæ secundum
 diuersos Auctores. 257.4.
 Hydropicorum substantia, et humidum radi-
 cale siccatur, & tabescit. 259.20.
 Hydropicorum ulcera difficillime sanan-
 tur. 259.5.
 Hydropicorum sitis unde aduenit. 259.9.
 Hydropsismus. 260.1.
 Hymetus mons. 167.38.
 Hymetum mel. 167.38 & 20.
 Hypopyi, & unguis differentia an sit
 apud Paulum, sicut est apud Aetium.
 Hyporisma. 112.37. (285.12.
 Hypofarca proprie syderos. 255.14.
 Hypofarca ad edema reducitur. 259.39
 Hypofarca an reliquis hydropis species
 bus periculiosior. 260.13.
 Hypofarcidiosis. 256.32.
 Hypophagma. 111.35. quid. 111.39.
 Hypophagma Hippocratis quid. 112.14.
 hor. 166.37.
 ἡ χῶρ. 81.30=



175.28.
 ἡ χῶρ quid.
 166.39.
 ἡ χῶρ quid si-
 gnificet secundum Galenum. 87.24.
 ἡ δὲ περὶ. 99.20.
 Iecur, & lien ad scirrhum opportunissi-
 ma. 104.8.
 Iecur quare ad scirrhum promptum. 104.11.
 Ieunbernia. 252.12.
 Ieunamblicatio. 252.32.

ἡ νῆα. 208.30.
 Ieronati. 112.24.
 Ignis dupliciter excedens. 90.40.
 Ignis persicus. 85.31=212.6. & 10.
 Ignis persus. 212.12.
 Ignis sacer. 94.28=212.12=214.31.
 Ignis sacri generatio. 21.27.
 Ignis ustulationis causa continens. 44.1.
 ἡ λῆον. 252.16.
 ἡ λῆον. 252.3.
 ἡ λῆον. 252.35.
 Ilebernia. 252.19.
 Ilibernia. 252.10.
 Ilioramex. 252.2.
 ἡ λος. 298.22.
 ἡ μῆς. 272.16. quid. 270.7.
 ἡ μαντίον. 270.8. 272.16.
 Impetigo. 33.7. unde dicitur. 134.13.
 Impetigo excoriatiua. 139.24=135.33.
 Impetigo excorticatiua. 124.28=128.31.
 Impetigo excorticatiua Græcorum lepra
 est. 125.1.
 Impetigo excoriabilis. 126.35.
 Impetigo excorticatiua an eadem, cum al-
 bara nigra apud Auic. 127.14.
 Impetigo Celsi. 128.35=139.23.
 Impetigo Celsi est Hippocratis lepra, oc-
 toq; indicys ostenditur. 129.1.
 Impetigo Celsi est Hippocratis, Græco-
 rumq; lepra. 130.40.
 Impetiginis Celsi, hoc est, lepræ Græco-
 rum gradus quatuor, etiam ex Celsi
 uerbis. 131.10. & 26.
 Impetigini Celsi squamæ insunt. 138.6.
 Impetigo Plinij. 192.36.
 Impetigo Plinij, Græcorum λῆχ'ν.
 129.28.
 Impetigo Romanorum. 136.3.
 Impetigo nomen æquiuocum. 133.28.
 Impetigo Equorum. 130.22.
 Impetiga maligna. 172.37=174.28.
 Impetigo, & sabafati quomodo differunt.
 174.3.
 Impetigo pro sabafati. 172.32.
 Impetigines. 130.18.
 Impetigines ex pituita. 132.34.
 Impetiginis causæ. 125.26.
 Impetiginis materia. 139.35.
 Impetiginis genera quatuor, apud Cel-
 sum. 129.11.
 Impetiginis nomen antiquum. 135.25.
 Impetix, & unde dicitur. 114.13.
 Incubi. 153.2.
 Infantium uirgæ erectio. 162.40.

Inflammatiō præsertim carni affectio est.
 23.14.
 Inflammatae parti nil secundum naturā.
 23.22.
 Inflatio. 115.26.
 Inflatio apud Auic. 117.15.
 Inflationes. 117.1.
 Inflaturæ. 32.35=183.17.
 Inguen idē, quod Græcè βῆλον. 222.35
 Inguen trifariam capi potest. 223.12.
 Inguina pro bubonibus, apud Plinium.
 223.4.
 Inguinaria herba. 223.7.
 Inguinbernia. 248.7.
 Inguinbernicofus morbus. 248.26.
 Inguiniramex. 248.6.
 Inguiniramicofus morbus. 248.25.
 Inguinis ramex. 247.39.
 Inguinis tumor. 233.15=223.5.
 Inguinum tumor non solum ex intestinis
 sed alijs multis substantijs descendens
 tibus, fieri potest. 248.31.
 Inmemis. 270.7.
 Insaluberrimum simpliciter semper cor-
 pus quale. 203.21.
 Insalubria simpliciter corpora frequentis-
 ora. 206.10.
 Intemperies in apostemate. 72.34.
 Intercus. 255.2.
 Intercus ad matellam. 257.25.
 Intercus proprie dicta quæ. 257.38=

Introduitorij diminutio. 298. 37.
 ἰόνθος Latine uari. 208. 27.
 Iontbus quid. 208. 34.
 Iontbus nomen quod neq; sedē, neq; cau-
 sam indicat. 208. 34.
 Iontbus subindicare potest sedem affectū.
 ibidem.
 Iontbi ἰόνθου .i. mendaces. 209. 5.
 Iontbi mendaces. 185. 12.
 Iontbi pro pilis primū nascētibz. 208. 30.
 Iontbi quomodo à ficosis tumoribus disse-
 runt. 203. 35.
 Iontbi unde dicuntur. 208. 27.
 Iontbi tumores frigidi. 209. 14.
 Iontbi curatio quæ. 209. 9.
 Iontbi secundum Marcellum Virgilium
 Iontbi callosi. 209. 15. (qui. 209. 12.)
 Iontbi inflammati. 209. 15.
 ἰονθώδεις dotbienes. 211. 21.
 Irion. scholio. 24. 14. 13.
 Iris. 286. 24.
 ἰρις coronam oculi refert. 294. 35.
 Iridis circuli septem. 293. 7.
 ἰσπαχὺς. 272. 39.
 ἰσθμός quid. 274. 6.
 Isthmus in homine quid. 274. 8. & 15.
 Isthmus proprie quid. 274. 11.
 ἰστροκλήν. 252. 3.
 Iulius Ruffus Medicorum inscitia carbū-
 culo mortuus. 214. 36.
 Iulius Tertius optimus Pontifex. 194. 4.
 Iustitia uirtutum excellentissima. 7. 38.
 Iustitia maxime perfecta uirtus, & quæ
 re. 7. 40.
 Iustitia in se uirtutes oēs continet. 7. 39.
 Iustitia uitæ causa, eius uero absentia
 mortis. 8. 11.
 Iuuentutis ætas quinta terminatur septi-
 mana. 206. 36.
 Iuxtanginium. 262. 30.
 Ixia. 244. 23.
 ἰξία. 244. 18.
 ἰξία, & κρός quomodo differunt.
 (244. 21.)
 Kiruniæ. 124. 23.



Ac menstru-
 germanum.
 200. 28.
 Lac quando
 menstruū
 significat de
 fectū. 200. 31.

Lac quando factum significat imbecilem.
 200. 31.
 Lac ex uini odore coagulatur. 200. 22.
 Lactis generatio ex sanguine menstru-
 200. 27.
 Lacrimalis caruncula, et eius usus. 283.
 14. & eius tumor. 283. 6.
 λαγονοκλήν. 252. 2.
 Lanosa. 295. 24.
 λαπαροκλήν. 252. 2.
 Lapis in uestica. 54. 26.
 Lapis in uestica quando causa, uel morbus.
 53. 24. 62. 25.
 Lapis in uestica morbi in uia causa est.
 54. 35.
 Lapis in uestica interdum morbus in nus-
 mero. 54. 37.
 Lapis in uestica quomodo morbus in nus-
 mero. scholio. 13. 7. 12.
 Lapis in uestica interdum morbus, & ca-
 usa. 54. 39.
 Lapis in uestica quomodo morbus, & ca.
 54. 39. scholio. 17. 9. 19. & ibidē.
 Laser. 188. 14. (11. 9.)
 Laserpitium. ibidem.
 Lazari morbus. 147. 35. unde dicitur.
 147. 39.
 λαιών. 139. 24. unde dicitur. 134. 11.
 λαιών ἀγρία. 136. 6.
 λείχων .i. lambo. 134. 11.
 Leoniceus contra Plinium. 134. 41.
 Leoniceus primus nostro æuo quæstione
 de causa coniuncta excitauit. 33. 31.
 Leoniceus defensio triplex. 38. 24.
 Leoniceus sententiæ impugnatio. 172. 40.
 Leoniceus error. 127. 12. 173. 18. & 28.
 Leonina lepra. 149. 18. & 25.
 Leonū anhelitus, et uiscera foetēt. 145. 15.
 Leontiasis. 143. 12. 149. 25.
 Leontiasis nomen quadruplici similitudi-
 ne. 144. 32.
 Leontiasis ad Leonem quadruplex simili-
 tudo. 145. 19.
 λέπρος .i. squamosa. 129. 38.
 λέπρις .i. squama. 129. 36.
 Lepra. 54. 28. 102. 9. 130. 6. 133. 3.
 149. 27. 180. 26.
 λέπρος. 128. 30. 139. 21. 130. 6. 132. 16.
 Unde dicitur. 129. 37.
 λέπρος Græcorum. 124. 5. 133. 10.
 207. 9.
 Lepra Græcorum eiusdem generis cum
 psora .i. scabie est. 124. 10.

Lepra Græcorum, et Arabum quo disse-
 rant. 147. 33.
 Lepra Arabū. 124. 6. 207. 9. 246. 30.
 Lepra Arabum morbus est rarissimus.
 207. 18.
 Lepra Arabum, & Hebreorum. 139. 34.
 Lepra Latinorum. 124. 5.
 Lepra secundum Haliabbatim. 246. 39.
 124. 6. 133. 7.
 Lepra Haliabbatis, Augustini, & Autho-
 ris scholiorum. 140. 8.
 Lepra Iudeorum. 133. 11.
 Lepra Constantini. 133. 21.
 Lepra Constantini, Græcorum elephantis-
 asis. 148. 21.
 Lepra Constantini cur lepra dicta, si
 Romæ fuit ratio triplex. 148. 30.
 Lepra Constantini causa dignitatis Eccle-
 siæ, & Pontificatus. 149. 1.
 Lepra Constantini Idolatria. 149. 9.
 Lepra Diui Augustini. 133. 8.
 Lepra, & psora quid. 124. 20.
 Lepra, & psora quibus medicamentis in-
 digent. 129. 29.
 Lepra, & scabies quomodo differunt.
 124. 24.
 Lepra, et scabies eiusdē generis. 124. 35.
 Lepra fortis scabies. 126. 23.
 Lepra quantumuis leuissima, scabie ta-
 men peior. 129. 20.
 Lepra quam Christus sanauit. 133. 16.
 Lepra Leonina. 149. 18. et. 25.
 Lepra Vulpina. 149. 17.
 Lepra in Elephantiasim cōuerit prompta
 est. 131. 14.
 Lepra in Elephantiasim transire solet.
 139. 40.
 Lepra folius cutis affectus. 124. 17.
 Lepra pro albedine præter naturam fas-
 cia. 132. 1. & 39.
 Lepra ex pituita. 132. 39.
 Lepra nomen, & morbus antiquissimas.
 129. 17.
 Lepra nomen æquiocum. 133. 24.
 Lepræ nomen æquiocum Arabibus, &
 Græcis. 123. 40.
 Lepræ materia. 126. 12.
 Lepræ causa pituita. 132. 31.
 Lepræ causæ materiales apud Aui. quin-
 q; 140. 19.
 Lepræ species an quatuor, ut Gregarij
 Medici dicunt. 149. 11.
 Lepræ color tandem albus. 131. 21.
 Lepræ squamæ insunt. 138. 5.
 Lepræ squamæ quales. 130. 30.
 Leprificatur. 132. 10.
 Leprosus Homo ex sanguinis menslruu mi-
 no

tio quo tempore fit. 197. 13.
 Leprosi à generatione. 199. 28.
 Leprosi à generationis initio occultam oris
 ginem capientes. 202. 30.
 Leprosi origo ex mèstruo sanguine quoz
 modo secundum Azaraium. 206. 17.
 Λεπρόν. 132. 13. 16.
 Λεπρόντων. 132. 9.
 Λεπτόν. 252. 15.
 Λεπτόν. 252. 18.
 Λεπτόμαλον. 252. 34.
 Leithargus eandem partem, quam phre-
 nitis occupat: materia uero contraria.
 28. 22.
 Leithargi causa nonnūq; atrabilarius hu-
 mor. 28. 23.
 Leuca. 140. 18 = 142. 12.
 Leuce. 140. 9. et 24. et 25 = 142. 12 =
 133. 2.
 Leucæ materia. 146. 3.
 Leuce, et leuca unde dicitur. 140. 41.
 Leucæ nomen à similitudine. 141. 1.
 Leucæ nomen à colore. 141. 21.
 Leuce ob alimenti uitium. 141. 8.
 Leuce pilos facit albos. 142. 23.
 Leuce ab alphis quo differunt. 142. 18.
 Λευκαίνω. 132. 14.
 Λευκαίνωνται. i. dealbantur. 132. 13.
 Λεύκη. 140. 6. 28.
 Λεύκη. i. alba. 141. 5.
 Λευκή. 246. 4.
 Λεύκη Populus Arbor est. 141. 1.
 Λεύκη species uiliginis. 140. 39.
 Λευκόν φλέγμα. 261. 21.
 Λευκοφλεγμοπία. 114. 8.
 Leucoplegmatia. 257. 28 = 260. 26 =
 258. 30.
 Leucoplegmatia propriè intercus apud
 Celsum. 157. 32.
 Leucoplegmatia seu leucoplegmatias
 Unde dicitur. 257. 35 = 261. 21.
 Leucoplegmatia cur propriè magis in-
 tercus dicitur. 257. 38.
 Leucoplegmatia quomodo fit. 261. 17.
 Lex Græcis omnibus comunis. 271. 16.
 Libri de oculis locus. 296. 15.
 Lichen. 133. 31.
 Lichen duplex. 136. 1.
 Lichen Iumentorum. 130. 15.
 Lichen Asini. 130. 25.
 Lichen in penis. 134. 12.

Lichen an in oculis. 134. 23.
 Lichen Agrestis furfuracea. 130. 13.
 136. 7.
 Lichen mentagræ impositum à similitu-
 dine est. 134. 7.
 Lichen in lepram transire solet. 139. 38.
 Lichen Græcorum. 126. 39 = 127. 32 =
 192. 36.
 Lichen Græcorum quid. 129. 40.
 Lichenes ex pituita. 132. 33.
 Lichenes ante Claudium. 135. 1.
 Lichenes nomen latissimum. 137. 3.
 Lichenes rotundo schemate. 137. 10.
 Lichenes nullibi Celsus nominat. 138. 10.
 Licheni pruritus inest. 138. 4.
 Lichenis origo prima. 133. 35.
 Lichenis si phicis salua remotiua ē. 137. 5.
 Lichenum squamæ quales. 130. 9.
 Lichenū mentio apud Hippocrate. 135. 2.
 Lichenum species duæ. 137. 17.
 Lien quod ex humoribus trahit. scholio.
 23. 14. 4.
 Lien, & iecur ad scirrhum opportunis-
 sima. 104. 8.
 Lien quare ad scirrhum promptum est.
 140. 12.
 Lienteria quandoq; apostasis dicitur.
 19. 29.
 Ligamenta sensus expertia. 158. 2.
 Lilinie. 294. 28.
 Linacri error. 114. 16 = 271. 1.
 Liuida. 100. 7.
 Liur ex ictu in oculis. 111. 35.
 Liures. 100. 8.
 Liures frequentius pueris, mulieribus, &
 albis. 110. 20.
 Locustæ. 141. 25.
 Lorum. 270. 8 = 272. 16.
 Luluma. 294. 28.
 Lumbrici rotundi. 55. 17.
 Lumbrici terrestres. 162. 35.



Acrid error. 147. 7.
 Magistratus
 uirum ostens-
 dit. 8. 3.
 Magnitudo an
 semper uitie-
 tur in aposte-
 mate. 75. 30 = scholio. 21. 12. 33.
 Magnitudo pro genere quātitatis. 272. 38.
 Magnitudinis causa humorum copia, et
 quomodo scholio. 14. 7. 22.
 Malum in oculo. 293. 19.
 Mamillæ in porcorum gulfure. 231. 14.
 Mammarum ad uterū consensus. 200. 24.
 Manantia capitis ulcera. 171. 5.

Manardi error. 119. 18 = 190. 2. et 302.
 195. 1 = 296. 11.
 Manilius Cornutus mentegra uexatus.
 136. 32.
 Marcelli Romani locus. 214. 40.
 Marcelli Virgilij error. 209. 11 = 10. 10 =
 226. 27 = 244. 25.
 Marcelli Virgilij error, et inconstantia.
 227. 1.
 Marcelli Virgilij error duplex. 210. 23.
 Marisimi passio. 162. 14.
 Martiani Rotæ error. 47. 21.
 Matricis pruritus, uehemens coeundi des-
 fiderium. 162. 9.
 Meatum cause coniunctæ. 51. 37.
 Mecacalium. 228. 7. 27. 14.
 Medicina sciētia non est, sed ars. 15. 32.
 Medicina neq; in theoricam, neq; in pra-
 cticam distinguitur. 15. 33.
 Medicinæ diuisiones. 15. 19.
 Medicinæ finis sanitatis possessio. 33. 14.
 Medicus q; aliter, q; philosophus rei na-
 turam considerat, quinque exempla.
 67. 4.
 Medicus cuncta sensu uestigat. 102. 40.
 Medicus septuagenarius a uariolis inte-
 remptus. 203. 33.
 Medicorum Grægariorum error. 149. 11.
 Medicorum theoremata ut plurimum ue-
 ritatem habere sat est. 265. 18.
 Medium Geometricum. 91. 29.
 μέγεθος pro genere quātitatis. 172. 38.
 Mel hybleum. 168. 17.
 Mel hymettium. 167. 20. et 39.
 Mel terminibinatum. 168. 18.
 μέλαινα. 104. 28.
 μέλαινα, pro, μέλαινα. 104. 35.
 μέλαινα χολή. 88. 35 = 105. 11.
 Melancholica apostemata. 32. 14.
 Melancholica apostemata quomodo, et dis-
 ci eadem phlegmatica possunt. 253. 36.
 Melancholicus humor. 85. 34.
 Melancholicus humor, pro, atra bili. 88. 32.
 Melancholicus succus propriè. 89. 29.
 Melancholicus humor an à calore tempe-
 rato generetur. 90. 36.
 Melancholicus humor in corpore natura-
 li gignitur. 91. 35.
 Melancholicus humor frigidus. 93. 7.
 Melancholicus humor, et atra bilis sæpe
 confunduntur. 108. 13.
 Melancholicus humor quomodo in atram
 bilem feruore, nō congelatione conuer-
 titur. 180. 2.
 Melancholici humoris generatio à calore
 temperato,

ēperato, et excedētī quomodo. 91.18.
 μελας. 140.39.
 Melas. 142.13.
 μελασμα. 110.5.
 Melasmatia, seu nigrores senibus frequē-
 tiores. 110.10.
 Meliceria. 169.19.
 Meliceria quid secūda Celsum. 169.35.
 Meliceria a meliceride apud Celsum dif-
 fert. 169.22.
 Meliceria saniei species aliquando apud
 Celsum. 169.23.
 Meliceria apud Plinium an pro ulceribus,
 an pro abscessibus frigidis. 170.34.
 Meliceria locus frequentior. 170.1.
 Meliceria tuberculorum species. 220.6.
 Meliceria species secunda. 170.13.
 Meliceris. 180.26 = 54.27.
 Meliceris quid, et eius materia. 85.5.
 Meliceridis causa materialis. 85.16.
 Meliceris frigidus tumor. 169.21.
 Melicerides. 54.27.
 Melicerides membranula continentur.
 221.16.
 Meliceridos signa quae. 83.3.
 Meliceridum tunicula. 241.20.
 μελικήρια. 169.20 et 26.
 μελικήριος. 82.39.
 μελικήρις. 84.40 = 169.20 = 82.39.
 μελικήριον. 169.26.
 μελικήριος. ibidē.
 μελιταγρος. 135.22.
 Mellisaium. 84.40.
 Membranula in strumis, meliceride, ste-
 atomate, atheromate incisa, renascendi
 occasio est. 221.17.
 Membra omnia ex sanguine nutriuntur,
 et augentur. 200.10.
 Membra quomodo feruere dici queant.
 204.16.
 Menstruum impurum semē est, et indi-
 get confectio. 200.22.
 Menstruum Antiquorum purius. 205.1.
 Menstrua geniturae admixta generant.
 200.24.
 Menstruus sanguis, et semen genera-
 tionis nostrae principia prima. 200.39.
 Menstruus sanguis etiam actiuam facul-
 tatem habet, non solum materialem.
 200.41.
 Menstruus sanguis generationis, et nu-
 tritionis materia est. 200.5.
 Menstruus sanguis quomodo embrionem

generet, et nutriat secundum Aben-
 zoarē. 201.40.
 Menstruus sanguis quomodo generatio-
 nis materia. 202.13.
 Menstrui sanguinis malitia quomodo in
 embrione remaneat. 201.27.
 Menstrui sanguinis mala quae priā quali-
 tas in embrione remanere solet. 201.9.
 Menstrui sanguinis impura portio embri-
 onem non generat. 201.36.
 Menstrui sanguinis purior, et perfectior
 pars foetum generat, et nutrit.
 202.2 = 201.8.
 Menstruo ex sanguine generatio, nutritio,
 et incrementum Foetus fit. 200.34.
 Menstrualis infectio a Mundi prima ori-
 gine. 204.35.
 Mentagra. 130.13 = 136.6 = 139.25 =
 174.33.
 Mentagra nomen uitiosum, minimeque La-
 tinum. 134.16 = 136.14.
 Mētra an ueterrimis incognita. 134.31.
 Mentagra morbus nouus Claudij tempo-
 re. 135.38.
 Mentagra ex Aegypto, indeque Medici.
 136.30.
 Mentagra quod ab Impetigine differt, Mara-
 celli sententia. 136.36.
 Mētrae origo prima. 133.41 = 134.33.
 Mētrae natura. 134.36.
 Mētrae nomen apud Galenū. 135.22.
 Mētrae inualefcentia. 136.26.
 Mētrae remedium. 137.6.
 Mente turbati uoluptatem non sentiunt.
 Mesenterij struma. 228.40. (160.31.
 Mesenterij glandulae plures. 229.1.
 Mesire. 94.33.
 Metamorphosis. 142.11.
 μετρίω. 167.36.
 Michaelis Bēni correctoris Varronis in
 aduertentia. 225.20.
 Miglarinum, seu miliarinum. 192.34.
 Miliare ibidem.
 Miliaris herpes unde dicitur. schol. 25.15.
 34. et 41.
 Miliaris herpes etiam ex bile, sed minus
 calida, et acri, quā aliae duae species.
 schol. 25.15.35.
 Miliaris herpes tertia species est. schol.
 25.15.34.
 Miliaceae exasperationes. 194.8.
 μίλον. 298.18.
 Mina. 31.23.
 Molle quid. 110.29.
 Mollientia proprie quae scirrhis medetur.
 106.40.

Molorticulum Veneris. 154.29.
 Montui error. 69.24 = 70.15. et 26.
 Morbus quid, causa et symptomata.
 34.26.
 Morbus in principio, et fine eiusdem spe-
 ciei. 21.32 = 50.9.
 Morbus affectus constans, et quomodo.
 34.14 = 59.23.
 Morbus affectus est permanens, primo, et
 perse laedens actiones. 39.18.
 Morbus an semper sit affectus permanēs,
 et quomodo. 59.16.
 Morbus triplex. 39.9.
 Morbus ex morbo saepe nascitur, et quo-
 modo intelligendum sit. schol. 17.
 10.18.
 Morbus ex morbo quomodo oritur. schol.
 17.11.24.
 Morbus idem, et passio, secundum diuer-
 sas partes. 45.39.
 Morbus, et sanitas ex permanentium nu-
 mero. 46.28.
 Morbus, et sanitas specie differūt. 51.11.
 Morbus morbi causa esse potest, sicut sym-
 ptoma symptomatis. 51.20.
 Morbus quomodo morbi causa. 53.13.
 Morbus idem, et causa respectu diuersarū
 actionum. 53.13.
 Morbus in uiuentibus est. 70.20.
 Morbus quandoque insensibilis. 75.1.
 Morbus dum occultus adhuc, licet morbo
 non dicatur, quia non sentitur eius le-
 sio. 75.2.
 Morbus si insensibilis, quomodo laedat.
 75.4.
 Morbus Sancti Lazari. 147.35.
 Morbus Endemius. 205.28.
 Morbus fiens. 51.18.
 Morbus fiens duplex. 47.5.
 Morbus fiens, et fiens morbus an differ-
 rant. schol. 12.6.28.
 Morbus fiens non est simpliciter pathos,
 neque morbus. 45.41.
 Morbus fiens a facto in quo differt.
 49.22.
 Morbi fientis duplicis exemplum. 46.5.
 Morbi fientis curatio mista. 35.24.
 Morbi. 34.1.
 Morbi qui. 18.25 = 54.30.
 Morbi latitudo. 51.8.
 Morbi conditiones tres. 49.19.
 Morbi in alium transitus quandoque ab
 Hippocrate apostasis dicitur. 19.30.
 Morbi, et passionis differentia. 33.39.
 Morbi nomen a causa interdum. 55.17.
 Morbi rationem ingredientia tria. 64.10.
 Morbi plures noui, et alij nobis incogniti
 quid

INDEX

q Veteribus cognit. 205. 12=196. 17.
 Morborum genera tria. 13. 1=39. 9=45. 13.
 Morborum q ad 40^m. diē perueniant diē finitio. scholio. 17. 8. 33.
 Morborū generatio quomodo ab animantium generatione differt. 50. 1.
 Morborum terminus primus, actionis lēsis est. 51. 33.
 Morborum in numero differētiē. 53. 31.
 Morbum esse eiusdem speciei in principio, & sine quomodo intelligendum. 51. 1.
 Morbillus. uide morbilli.
 Morbillus tumor calidus. 196. 19.
 Morbillus morbus naturalis. 198. 3.
 Morbillus sēpe epidemius morbus. 194. 16.
 Morbilli. 32. 26=33. 10=138. 37=139. 15=192. 40=195. 11=183. 4.
 Morbilli exātibematum species. 193. 32.
 Morbilli, & Variolę aliquo modo noui affectus sunt. 193. 39.
 Morbilli, & Variolę ex menstrui sanguinis infectione. 194. 20.
 Morbilli in senectute. 207. 9.
 Morbilli, et Variolę cur a ueteribus non descripti. 196. 7.
 Morbilli, et Variolę cur nostra ætate frequentiores. 196. 11.
 Morbilli, et Variolę presertim i infantia, et ad 7^m. usq; annum. 193. 27.
 Morbilli non solum ex uitio mēstrui sed, etiam lactis. 193. 16.
 Morbilli, Variolę, et Rubecula non semper ex sanguinis menstrui uitio. 198. 31.
 Morbillis quomodo quispiam bis, et ter affligi queat. 203. 37.
 Morbillorum generatio purgatio ē. 203. 6.
 Morbillorum, et Variolarum generatione quomodo corpus expurgetur. 204. 11.
 Morbillorum materia. 194. 30=196. 18.
 Morbillorum forma, et ortus. 195. 4.
 Morbillorum ortus quomodo, et a quo fit. 198. 18.
 Morbillorum generatio. 202. 20.
 Morbillorum generationis causę. 198. 23.
 Morbillorū generationis causę tres apud Auicennam. 198. 40.
 Morbillorum materia calida. 209. 34.
 Morbillos, et Variolas omnes habent secundum Auer. 198. 1.
 Morphea. 142. 4.
 Morphea Arabum est Græcorū albos. 141. 39.
 Morphea uulgarium. 142. 2.
 Morphea ab albata quo differt. 142. 18.

Morphea nigra quonodo ab albata nigra differt. 128. 7.
 Morphea nigra non habet squamas. 141. 37.
 μορφῆ. 141. 41.
 μορφῶμα seu μορφῶσις. ibidem.
 Mortis, et ruine causa nil aliud est, q; iustitię absentia. 8. 10.
 Morum. 264. 11.
 Morum apud Arabes apostema. 19. 23.
 Morum album super lingua. 264. 14.
 Morum in palpebris. 164. 24. et. 29.
 Morum, et thymus quandoq; apud Auic. differunt. 264. 38.
 Mori in pedis talo historia. 264. 31.
 Mulieres mensibus carentes steriles sunt. 200. 16.
 Multitudo. 114. 17.
 Multitudo erectionis. 161. 21.
 Multitudo erectionis, uelut priapismi nuntius est. 161. 28.
 Multitudo desiderij coitus. 162. 4.
 Muralis herba, pro Celsi papulis. 137. 41.
 Musaragi. 298. 8.
 Mascalis cornę ruptura. 298. 12.
 Muscæ sterces in uermiculos conuertitur. 171. 39.
 Musci caput. 298. 6.
 μυοκέφαλον. 298. 5.
 Myocephali a phylæanis in oculo differētia. 298. 14.
 Myrmecia, et myrmecium. 177. 31.
 Myrmecia unde dicitur. 177. 37.
 Myrmecia quid secundū Celsum. 178. 19.
 Myrmecia ex mutatione solidarum partium fit. 180. 25.
 Myrmecia thymo humiliora, et duriora. 178. 20.
 Myrmecia, et acrochordon in quo differūt. 177. 36.
 Myrmecia ex humore crasso. 182. 33.
 Myrmecia tumor frigidus. 182. 34=183. 20.
 Myrmecię causa efficiens, et materialis. 182. 35.
 Myrmecię materię. 183. 20.
 Myrmeciarum magnitudo. 180. 18.
 Myrmecijs paratus locus. 178. 26.
 Myrmecides. 181. 14.
 μυρμηκία. 177. 30= schol. 34. 19. 32.
 μυρμηκία nomen a similitudine sumptum. 179. 12.
 μυρμηκίων. 177. 32.



Ascentia qd. 217. 40.
 Natura sēs per aiām materiabus nuenit. 22. 26.
 νέκρωσις. 94. 12.
 νέμεσθαι hoc est, pascere. 119. 32.
 νεφέλιον in oculo quid secundū Aesculapium. 296. 1.
 Nephelion Pauli quid. 297. 13.
 Neutra simpliciter frequentius inueniuntur. 206. 8.
 Neutralitas. scholio. 18. 12. 3.
 Neutralitas quomodo detur, et quomodo non. 69. 27.
 Neutralitatis latitudo. 51. 8.
 Neutrum corpus quod est. 46. 11.
 Neutrū simpliciter tertij significati quomodo pellendi uim sibi referuat ad tempus. 199. 27.
 Nicandri locus. 132. 27.
 Nicoli error. 195. 36.
 Nicomachi obesitas. 78. 8.
 Nigra bilis. 89. 23.
 Nigra deiectio est humor melancholicus. 105. 10.
 Nigredo sub oculo. 111. 24.
 Nigrores. 110. 6.
 Nihilipendere. 84. 20.
 νηστοκλή. 252. 12.
 νηστόμφολον. 252. 32.
 Niuis usus in senectute lesionem ostendit. 203. 30.
 Niuis usus quam lesionē inferat. 203. 9.
 Nocturna. 187. 35.
 Nocturnus tumor. 185. 22.
 Nodi. 85. 13.
 Nodi melancholici. 32. 26.
 Nome nec ulcus, neq; putredinem per se significat, sed pascentem putredinem, siue cū ulcere, siue absq; illo. 119. 35.
 νομή. 119. 17=288. 9.
 νομή quid. 119. 31.
 νόμῃ, ὁ καὶ δ' ὧν, φάγεται αὖτα quomodo differunt. 119. 38.
 Nominum significatio cæteris præferenda. 153. 17.
 Nominibus usitatissimis uti, doctrinæ perscriptio, et claritas est. 271. 14.
 Nominibus utendum, ut plures. 271. 19.
 Nominis usitac transumptio facilior, q; fingere

INDEX

finger aliud nouum. 271.20.
Nominum transumptio quomodo facienda.
271.22.

Nubecula in oculo quid secundum Aetium. 296.1.

Nubecula Pauli quid. 297.14.

Nutrimētum triplex quomodo. 69.16.



Obesitas. 33.8.
78.3.
Obesitas sans
guineus humor.
79.10.
Obesitatis causa
coniuncta. 79.
12.

Obesitatem non numerauit inter apostemas
matu Aui. 78.16.1

Obesi corporis temperamentum. 78.19.

Obesi corporis solutio continui. 78.20.

Obesi corporis tumor. 78.33.

Obesi corporis laciones, & pericula.
78.25.

Obesum corpus ad euacuationes ineptum.
79.2.

Obesum corpus turpe. 79.5.

Obiectionis difficillime solutio de erysipelate. 97.34.

Obstructio. 53.3.

Obstructio quid, & que apud Fuchsum.
um. scholio. 17.9.35.

ὄχέω. 179.18.

ὄχρᾱ .i. pallida, seu crocea. 97.3. et. 9.

ὄχρῶδες .i. pallidum. 146.12.

ὄχρῶδες .i. tuberosum. 146.9.

ὄχρῶδες nomen Galeno qd. 146.37.

ὄχθος qd significat. 146.12.

Oculus largus. 134.28.

Oculus pullinaticus. 215.28.

Oculi actio non amplitudo pupillae, sed
uisio est. 57.1.

Oculi humores. 293.24.

Oculi ulcera superficialia quae secundum
Aetium. 296.9.

Oculi ulcera quae superficialia, uel profunda
secundum Arabes, & Authorem
rem libri de oculis. 296.22.

Oculi ulcera septem. 296.7.

Oculi ulcera quatuor. 294.19.

Oculi exitus, siue egressio. 297.25.

Oculi prociencia. 297.29.

Oculi prolapsus. 297.34.

Oculorum sanguine suffusio. 111.34.

Oculorum anguli. 183.9.

Oculorum tunicae quatuor sunt. 293.4.

Oedema. 113.6. 115.19. 138.26.

Oedema quid. 113.10.

Oedema duplex morbus, & symptoma.
113.15.

Oedema morbus ex pituitae influxu.
113.21.

Oedema symptoma diuersorum morborum
ex spiritu flatuoso. 113.25.

Oedema in aqua intercute symptoma.
114.3.

Oedema quomodo gignitur. 116.13.

Oedema symptoma, & emphysema, quibus
differunt. 116.29.

Oedema secundum Arabes apostema.
19.26.

Oedema in scirrhum aliquando uertitur.
111.2.

Oedematis causa continens. 42.3.

Oedematis materia. 117.16.

Oedematis materia duplex, licet semper
eadem tangenti forma. 113.23.

Oedematis species duplex. 114.28.

Oedematis cum aneurismate conuenientia,
& differentia. 113.8.

ὄγκος. 217.18.

ὄγκος quid significet. 18.5.

ὀϊδμῶς. 89.2. 115.13. & 19.

ὀϊδμῶς duplex. 113.19.

ὀϊδμῶς quid significet. 18.5.

ὀϊδμῶς. 115.20.

Omentibernia. 242.7. & 14.

Omentintestinibernia. 242.21.

Omentumbilicatio. 250.29.

ὄνιξ. 284.34.

ὄνιξ sanguineus, calidus, & humidus
tumor est. 287.37.

ὄνθος latine fimus. 208.27.

ὄνθιλένιν quid. 208.28.

ὄνυχια quid. 285.1.

ὀφίαισις. 142.3.

Ophtalmia. 149.29.

Opitulatorum. 236.18.

Ophtalmia. 283.39.

Ophtalmia quomodo a sebel differt.
290.31.

Ophtalmiae nomen qd significet. 218.7.

Orbicularis uuae casus. 298.24.

Ordo partium libri Auicennae. 16.36.

ὄρεξις. 118.14.

Organicarum compositio. 75.17.

Oribasii error. 180.11.

ὄσχεον. 233.34.

Os simile cornu natum in dorso. 25.2.

Os natum in dorso Abenxoari. 25.4.

Os cordis Equorum. 130.36.

Ossa possunt apostemari. 22.24.

Ossa apostemantur. 24.12.

Ossa pblegmone simili affectu uexari
queunt. 23.10.

Ossa interdum primò, interdum 2º. in-
flamantur. 23.23.

Ossa non possunt apostemari secundum
Serapionem. 23.35.

Ossa quomodo ingrossantur secundum A-
benxoarem. 24.28.

Ossa sensus, & arteriarum expertia.
25.30.

Ossa apostemate etiam bilioso affici que-
unt. 28.13.

Ossa ex omnibus succis apostemari possunt,
licet magis ex arabilario. 28.25.

Ossium apostemata. 75.38.

Ossium apostematis probatio ex sectione.
27.34.

Ossium canernulae spongiosae partes dis-
cuntur. 21.21.

Ossium pblegmone, uel inflammationi si-
mile. scholio. 3.3.7.

Ouarola. 229.22.

ὄλον. 262.31.

ὄλον quid, & unde dicitur. 262.4.

ὄρανοσκόπος. 220.14.

ὄντια. 35.30.



Achyfarcia.

78.2.

παχυσαρκία

78.2.

παχυσωμα

πᾶ. 78.2.

παχυσωματῶτατος. 78.5.

παλμός. 156.22.

Palpitatio colis. 156.22.

Pampbilus medicus mentagrae. 136.27.

Panaritium. 33.9. 283.3.

Pani. scholio. 4.3.18.

Panis unde dicitur. 225.11.

Panis apud Celsum. 222.19.

Panis, quem comedimus, figura, & no-
men unde. 225.24.

Panicula. 219.22. 225.33.

Panniculus carnosus. 78.21. 101.16.

Panniculus unde dictus. 225.31.

Pannus unde dictus. 225.31.

Pannocchia

Panocchia. 223. 32.
 Pannus. 223. 21. & 31.
 Panus Plinij. 222. 16.
 Panus apud Plinium quid. 219. 33.
 Panum Plinius non descripsit. 222. 17.
 Panus Plinij, generalior, q̄ Celsi panus.
 226. 11.
 Panus Plinij & etiam phygeiblon cōpre-
 hēdat, probatur ex Dioscoride. 226. 35.
 Panus Plinij, & phymata comprehendat,
 probatur ex Dioscoride. 226. 17.
 Panus Plinij & simul cōprehendat phy-
 mata, & phygeiblon, probatur ex
 Dioscoride. 226. 39.
 Panus Celsi, Græcorum phygeiblon.
 219. 35.
 Panus apud Celsum quid. 222. 19.
 Panus apud Celsum generatim capi quos-
 modo potest. 225. 41.
 Panus Græcæ φυγεῖβλον. 225. 12.
 Panus unde dicitur. 225. 13.
 Panus tumor unde dictus est. 225. 10.
 Panus propriè fili glomer est. 225. 23.
 Panus tumor à Textricū glomere dictus.
 225. 32.
 Panus speciatim secundum Celsum.
 226. 1.
 Panus pro phygeiblo Romanis multis.
 226. 6.
 Panus multorum generum apud Plinium.
 226. 7.
 Panus aliquis difficilis cōtionis. 226. 10.
 Panus propriè in alijs ab inguine glanz
 dibus. 228. 1.
 πᾶν. 288. 31.
 παρὰ φροσύνη. 184. 24.
 Papillæ. 171. 10. 172. 36. 173. 12.
 Papillæ in capite quid. 282. 18.
 Papula agrestis. 136. 21.
 Papula Celsi. 136. 19.
 Papula Celsi ieiuna salua sanescit.
 137. 31.
 Papulæ. scholiō. 4. 3. 18.
 Papulæ Celsi. 192. 35.
 Papulæ Celsi Græcorum lichenes.
 129. 12.
 Papulæ Celsi & sint Græcorum liches-
 nes, Indicia septem. 137. 7.
 Papulis Celsi pruritus inest. 138. 6.
 Papulæ Celsi, & Plinij. 139. 26.
 Papulæ Plinij. 138. 29.
 Papulæ Plinij à Celsi papulis differentes.
 138. 14.
 Papulæ Plinij quid significant. 138. 16.
 Papulæ rubentes. 207. 40.
 Papulæ rubæ. 138. 31.

Papulæ feruentes. 138. 38. 173. 27.
 Papulæ nigre. 138. 39.
 Papulæ à pituitæ eruptionibus differunt.
 139. 11.
 Papulæ sudorum. 192. 12. & 17.
 Papularum genus duplex. 138. 21.
 Papularum genus duplex apud Celsum.
 137. 19.
 Papularum eruptiones. 138. 29. 139. 11.
 παρὰ. 262. 30.
 παρὰ φύσιν. 178. 9.
 παρὰ φύσιν. ibidem.
 παρὰ τὸν quæ. 236. 34.
 Parastatæ duplices. 236. 14.
 Parastatæ quatuor. 236. 30.
 παρὰ τὸν quæ. 236. 34.
 Parastates uaricosi nerui non sunt. 237. 1.
 Parastates glandulosus neruus non est.
 236. 41.
 Parechysis. 255. 10.
 παρὰ φύσιν. ibidem.
 Paristhmiæ. 273. 27. 162. 36.
 παρὰ φύσιν uario modo sumpta apud
 Autores. 273. 28.
 Paristhmiæ secundum Galenum quæ.
 273. 32.
 Paristhmion unde dicitur. 274. 5.
 παρὰ φύσιν unde dicitur. ibidem.
 Paristhmiæ cuius partis inflammationes
 sunt. 274. 21.
 Paristhmiæ nonnunq̄ anginæ principiū.
 274. 23.
 Paristhmiæ interdum pro partibus affect-
 tis, non pro affectu. apud Galenum.
 275. 2.
 Paristhmiæ secundum Hippocratem quæ.
 276. 8.
 Paristhmiæ pro particulis apud Hippo-
 cratem. 275. 32.
 Paristhmiæ, & Antiades apud Hippocra-
 tem pro eodem. 275. 36.
 Paristhmiæ secundum Galenum ab an-
 tiadibus diuersa. 276. 5.
 Paristhmiæ secundum Galenum quid.
 278. 28.
 Paristhmiæ Galeni à Veteribus Romanis
 sub faucium nomine comprehensa
 sunt. 278. 29.
 Paristhmiæ Galeni, & Aetij quibus con-
 ueniunt, aut differunt. 278. 38.
 Paristhmiæ secundum Celsum glādulæ.
 276. 14.
 Paristhmiæ quod glandularum genus eos-
 rum quæ in collo. 277. 10.

Paristhmiæ Pauli, Celsi, & Hippocratis
 à paristhmis Galeni differunt. 278. 32.
 Paristhmiæ apud Paulū quid. 276. 27.
 Paristhmiæ tumores calidi. 279. 40.
 Paristhmiorum usus capiendō pro glanz
 dulis. 277. 17.
 Paristhmiorum materia. 280. 2.
 παροδύτης. 262. 11.
 παρονχίς. 288. 41.
 Paronichia. 33. 9.
 Paronichia quid. 289. 3.
 παρονχίς herba quædam. 289. 18.
 παροπς. 262. 12.
 παρὰ φύσιν. 262. 13.
 παρὰ φύσιν unde dicitur. 262. 30.
 Partes omnes ex sanguine nutriuntur, &
 augentur. 200. 10.
 Parulis quid. 262. 14.
 Parulis an phlegmone tantum sit, an ac
 postema. 163. 17.
 Parulis ab epulide bisariam differt.
 262. 24.
 Parulides, et epulides tumores sunt sangui-
 nei, et per hoc calidi. 262. 39.
 Passio à causa dupliciter oriens. 44. 7.
 Passio quid, & quomodo dependens esse
 habet. 59. 23.
 Passio celer quæ. 57. 9.
 Passionis, & morbi differentia. 33. 39.
 Passionis causam dari coniunctam, nullus
 est, qui negat. 39. 17.
 Passionis causa continens datur. 45. 23.
 Passiæ. 195. 7.
 πᾶσι quid. 45. 22.
 πᾶσι quæ. uel ἑνὶ ὧδι
 283. 37.
 πᾶσι quid. 45. 22. & 38.
 πᾶσι pro morbo. 114. 18.
 Pauli error. 99. 18. 237. 37. 239. 5.
 & 10. 186. 34.
 Pauli Crassi error. 217. 11.
 Pauli, & Galeni contradictio. 110. 25.
 Pauli cum Galeno concilium. 267. 25.
 Pauli Græcus locus. 178. 10.
 Pauli Latini ab Andernaco traducti locus.
 178. 16.
 Pauli locus. 83. 4. 237. 35. 239. 10.
 268. 23. 280. 29. 288. 17.
 Pauli interpretum error. 237. 35.
 Pauli confusio. 237. 40.
 Pauli diminutio. 248. 29. & 31.
 Pauli inconstātia, et contradictio. 262. 41.
 Pauli contradictionis solutio. 263. 5.
 [Pauli alia

Pauli alia contradictio, et solutio. 263. 18.
 Pauli, et Aetij concilium. 265. 13.
 Pauli contradictio. 272. 10.
 Pauli contradictionis solutio p^a. 272. 13.
 Solutio secunda. 272. 34.
 Pauli excusatio. 271. 36.
 Paulus Galeno repugnat circa κίονος
 nomen. 271. 36.
 Paulus in anatome parum exercitatus.
 238. 9.
 Pausilypi mons à Cocceio perforatus.
 8. 41.
 Pediculus Pharaonis. 174. 1.
 Pediculi ferale. 174. 8.
 Pediculi causa. 125. 25.
 Pegæ. 183. 32.
 Πελος quid significet. scbolio. 24. 21.
 10. 14.
 Πελιδνα. 110. 7.
 Πελιδνα. 268. 15.
 Penis caernofus neruus est. 155. 2.
 Penis anatome secundum Vesaliū.
 156. 40.
 Penis corpus duplex. 157. 1.
 Penis substantia, et figura. 157. 12.
 Penis uenæ, et arteriæ. 157. 19.
 Penis Tauri, et Arietis substantia. 158. 6.
 Penis Hominis substantia. 158. 13.
 Penis sanguis qualis esse debet. 158. 41.
 Penis Mustellarum. 159. 21.
 Penis Canum. 159. 20.
 Pennula. 284. 33.
 Pessilis verruca. 178. 30.
 Pergula. 290. 19.
 Περικράσιον. 293. 20.
 Pericranios membrana. 286. 27.
 Περικράσιον. 293. 19.
 Periosteos membrana. 286. 27.
 Περικράσιον. 268. 16.
 Peripneumonia nomen quid significet.
 218. 7.
 Permanens duplex, et quomodo intelli-
 gitur. 59. 21.
 Perpendicularis. 270. 16.
 Persarum consuetudo. 132. 22.
 Pertico. 223. 21.
 Pestificæ. 195. 7.
 Pestitia à peste sic dicitur. 195. 10.
 Petigo, et unde dicitur. 134. 13.
 Φαγέδαινα. 117. 36.
 Phagedæna ibidem.
 Phagedæna quid. 119. 9.
 Phagedæna ulcus, et tumor. 117. 40.

Phagedæna Ap^a. 118. 31.
 Phagedæna quomodo æquiuocū, et quomodo
 modo uniuocum nomen. 118. 39.
 Φαγέδαινα, νομὴ σημεῖον quomodo
 differunt. 119. 37.
 Phagedæna species nomen nō est. 119. 18.
 Phagedæna interdū sine putredine. 119.
 20. 27.
 Phagedæna cancri species apud Celsum.
 120. 10.
 Phagedæna tripliciter capi potest. 120. 30.
 Phagedæna dupliciter, communiter, et
 proprie. 120. 15.
 Phagedæna quæ in carne. 120. 25.
 Phagedæna quatuor significata, quorum
 primum est pro excedenti ulcere. 118. 5.
 Phagedæna significatum secundum pro
 uehementi appetitu, et esu. 118. 7.
 Phagedæna significatum tertium pro
 Apum lue. 118. 30.
 Phagedæna significatū quartum de Iu-
 mentorum uermes. 118. 36.
 Phagedæna uentriculi signa. 118. 15.
 Phagedæna nomen à symptomate.
 118. 2.
 Phagedæna, et phagedenicorum ulcerū
 materia. 119. 12.
 Phagedæna materia. 120. 40.
 Phagedæna materia media inter eā, quæ
 herpetum, et quæ cancrorum. 119. 15.
 Phagedæna species. 120. 2.
 Phagedænica ulcera quæ. 119. 8.
 Φαγεῖν. i. edere. 117. 36.
 Phania Physicus. 226. 41.
 Pherecides Poeta pediculari morbo mor-
 tuus. 174. 12.
 Philippi excusatio, cur. s. Barbaros inter-
 pretatur. 14. 36.
 Philippi in scribendo propositum. 15. 36.
 17. 1.
 Philippi scopus. 13. 31. 14. 15. 6.
 Philippi sententia de Arabum esseris.
 188. 31.
 Philippi sententia de uariolarum origine
 contra Ferneliū. 197. 37.
 Philothei error. 218. 16.
 Philoxeni pertinacia. 74. 18.
 Φλέγμα λευκόν. 255. 27. 258. 28.
 261. 21.
 Φλέγμα λευκόν. 73. 35. 80. 21.
 Φλέγμα χροῖον. 80. 28.
 Phlegmatica apostemata quomodo ea-
 dem, et melancholica dicuntur.
 253. 34.

Phlegmone. 80. 20.
 Φλεγμονή. 80. 21. 223. 40.
 Phlegmone non est apostema proprie.
 21. 15.
 Phlegmone apud Arabes apostema. 22.
 38. 19. 24.
 Phlegmone omne apostema calidum.
 32. 20.
 Phlegmone absq; tumore lædente sæpè
 est. 73. 9.
 Phlegmone quid secundum Antiquos.
 73. 19.
 Phlegmone semper cum tumore morbo ē.
 73. 31.
 Phlegmone proprie in qua tumor morbus.
 74. 2.
 Phlegmone erysipelacea. 77. 2.
 erysipelatoīa. 77. 3.
 œdematosa. ibidem.
 scirrhusa. ibidem.
 Phlegmone frequentius contingit. 80. 16.
 Phlegmone communiter. 80. 25.
 Phlegmone nomine generis. 80. 29.
 Phlegmone à spiritu solo non fit, neq; po-
 lysarcia dicitur. 80. 31.
 Phlegmone quomodo ex laudabili symme-
 tria sanguine. 88. 23.
 Phlegmone, seu apostemati facto per pa-
 ulatinam congestionem non congruit
 repercussio. 25. 41.
 Phlegmones generatio, et causa. 21. 23.
 Phlegmones causa continens. 42. 2.
 Phlegmones nomen unde. 80. 24.
 Φλεγμονώδης quid aliquando signifi-
 ficet. 282. 36.
 Φλεγμονώδης dispositio quæ. 20. 6.
 Phlegmonose dispositiones quæ. 20. 5.
 Φλόγωσις. 80. 22.
 Φλυκταίναι. 101. 28. 293. 33.
 32. 35.
 Phlyctæna. 98. 39. 194. 40.
 Phlyctæna à psyracis differt. 184. 1.
 Phlyctæna quid in oculo. 294. 8.
 Φλυκταίναι unde dicitur. 184. 7.
 Phlyctæna tumor calidus. 185. 19.
 Phlyctæna oculi in qua parte fit. 292. 19.
 Phlyctæna in qua tunica oculi parte fit.
 294. 11.
 Φλυκτίδες. 293. 33.
 Φλυκτίς quid in oculo. 294. 5.
 Φλυκτίς unde dicitur. 184. 7.
 c Phlyctis

INDEX

Phlyctis quid. 294.4.

Φλύκω. 184.7.

Φλύκω. 184.8.

Φλύκω. 184.9.

Φλυζάκιον. 184.3.

Phlyzacion. ibidem.

Φλύζω. 184.8.

Phrenitis quid. 22.31.

Phrenitis ab atra bile gravissima. 93.15.

Φρίσις quæ. 113.27.

Phrysis etiam sine pituita interdum. 113.39.

Φρόν quæ. 113.26.

Φθόρο. 41.10.

Phygethlon. 219.35=222.18=223.22.

Φύγεθλον unde dicitur. fch. 46.23.32

Φύγεθλον quomodo ab alijs phymatibus differt. fch. 46.23.30.

Phygethlon quid. 223.34. & 39.

Phygethlon nomē quid significet. 218.7.

Phygethlon Celsi. 223.1. & 3.

Phygethlon Celsi idem, cum Plinij pano. 219.35.

Phygethlon apud Celsum generale nomen esse potest. 225.35.

Phygethlon speciatim secundum Celsum. 225.2.

Phygethlon quomodo à phymate differt. 224.3.

Phygethlon calidior tumor est phymatibus, bubone, & furunculo. 224.17.

Phygethlon tumor durus, non altus, & quare. 225.2.

Phygethlon secundum aliquos specialius nomen. 227.17.

Phygethli definitio apud Celsum. 225.2.

Phygethli, et phymatum materiæ diuersæ. 227.25.

Phygethli materia. 227.30=224.24.

Phygethla. 222.29=228.13.

Φύμα. 218.31=220.11.17. & 30.

Phyma. fch. 44.33.8.

Phyma dupliciter. 120.23.

Φύμα dupliciter sumitur communiter, & proprie. 217.4.

Phyma quadrupliciter sumitur. 222.5.

Phyma communiter quid. 217.35.

Phyma communiter quid secundum Hippocratem, & Alios. 218.26.

Phyma secundum Hippocratem largè. 224.4.

Phyma specialiter quid. 218.1.

Phyma speciatim captum ex calidis succis gignitur. 219.19.

Phyma affectus inflammabundus. 217.2.

Phyma unde dicitur apud Galenū. 217.8. & 40.

Phyma nomen quod neq; causam, neq; sedem affectū representat. 218.4.

Phyma unde dicitur apud Philotheum. 218.13.

Phyma nomen affectū particulam subins dicans. 218.5.

Phyma quid secundum Galenum. 218.25.

Phyma Galeni sub Celsi pano, seu phygethlo comprehenditur. 226.3.

Phyma ut in libro de tumoribus tumor ē calidus. 222.14.

Phyma Celsi à furunculo octo differētijs differt. 219.21.

Phyma apud Celsum quid, & quomodo à phymate Hippocratis, et Galeni differt. 219.24.

Phyma Celsi. Plinij panus. 219.33.

Phyma Celsi diuersum ab Hippocratis, & Galeni phymate. 221.29.

Phyma Celsi quibus ætatibus familiaris. ibidem.

Phyma Celsi quid. 219.36.

Phyma quod est, quod furunculo comparate. 222.12.

Phyma celerius phygethlo suppuratur. 224.39.

Phyma panus etiam dici potest. 226.13.

Phyma Dioscoridis speciale à Plinio sub pano comprehenditur. 226.16.

Φύμα Dioscoridis & speciale sit probatur. 226.22.

Phyma etiam apud Dioscoridem aliquādo generatim. 226.26.

Phymatis materia. 227.25.

Phymatis temperamentum. 222.14.

Phymatis uentriculus. 220.28.

Phymata. 222.29.

Φύματα. 220.10= fch. 43.17.

Phymata affectus inflābundi. 211.32.

Phymata potissimum quæ dicenda sunt, et quæ largè. 217.27.

Phymata bonā quæ. 217.35.

Phymata quæ uocantur. 217.14.

Phymata propriè quæ secundum Galenum. 218.40.

Phymata citra ulceris occasionem nascētia. 218.3.

Φύματα in renibus, q̄q; Theodorus non rectè traducit panos. 29.1.

Phymatum propriè dictorum loca ut plurimum. 218.41.

Phymatum, et phygethli materiæ diuersæ. 227.25.

Phymatum genus duplex. 138.21.

Pia mater cerebri tenuior membrana. 292.26.

Picis splendor. 86.22.

πῦμα. 283.32.

Pilifacere. 84.1.

Pilus Ceruinus. 188.35.

πῦμα. 84.36.

Pingues partes ex sanguine generantur. 200.6.

Pituita alba. 255.27.

Pituitæ humor est non aded naturæ alienus, ut aqua, & uentus. 260.40.

Pituita diminuit costus sanguis est. 260.40.

Pituita alba quid, et quæ generatio, et quare sic dicitur. 261.32.

Pituitæ eruptiones. 138.29=139.11.

Pituitæ eruptiones à papulis differunt secundum Plinium. 139.2.

Pituitæ falsæ generatio in Hydropicis unde. 259.10.

Planta noctis. 33.7=191.3=209.22.

Plaustrum conuicijs onustum. 44.40.

Plenitudo quomodo causa continens, & quomodo morbus, & causa. scholia. 16.8.6.

Plenitudo multorum affectuum causa continens. 42.1.

Plenitudo causa continens non est febris. 42.10.

Plethora quomodo nonnunq; fit. 69.28.

πλεθώρα quid significat. fch. 3.3.3.

πλεθώρα pro latere generaliore signis catu. schol. 3.3.5.

Pleuritis nomen quid significet. 118.7.

Pleuritis ex omni humore fit, licet phlegmone sit. 173.18.

Plinius an Dioscoride uetustior, an illi cōtemporaneus. fch. 32.19.4.

Plinij defensio. 135.32.

Plinij locus expositus, atq; notatus. 214.38.

Plinio ascripti libri locus. 232.41=233.2258.14.

πλησμονή. 47.27.

πληθος. 53.18.

πληθος. 154.17.

πνευμάτωσις. 115.7. & 14.117.4.

πνευμάτωσις

πνευμάτωσι: duplex. 115. 16.
 πνευμάτωσι: Latine spiritusificatio.
 116. 4.
 Pneumatoſeos species tres. ſ. emphyſema
 utriq; ſ. dematisq; species quæ ſymp-
 toma eſt. 116. 17.
 πνευμάτωσι: tres species continet.
 116. 39.
 πνευμάτωσι. 241. 33.
 πνευμάτωσι. 250. 36.
 πνευμάτωσι. 241. 33.
 Pneumocelæ materia quæ, et temperamē-
 tu. 254. 32.
 πνευμάτωσι. 250. 36.
 Pneumomphalon. ibidem.
 Pneumomphali materia quæ, et tempera-
 mentum. 254. 32.
 πνευμάτωσι. 13. 19.
 Podagra hæreditaria. ſch. 41. 21. 37.
 Podagrici hæreditarij. 199. 28.
 Podagrici hæreditarij quomodo qualitatē
 occultā multis annis retinent. 202. 28.
 Podagrici quomodo filius comunicat mors-
 bum, quem à Patre non ſumpſerunt.
 205. 37.
 Polybi, ſ. Hippocratis loca expoſita. 132.
 Pollucis error. 187. 11. (36.
 Pollucis excuſatio. 187. 13.
 πολυπόδιον. 84. 4.
 Polypus. 280. 5.
 Polypus quandoq; hominem ſtrangulat.
 280. 22.
 πολυπόδιον uide dicitur, et qd ē. 280. 7.
 Polypus Scorpioni aſſimilatur apud Albu-
 caſum. 281. 13.
 Polypus quidam mitis, quidam malignus.
 281. 20.
 Polypus tumor carneus. 282. 29.
 Polypus tumor frigidus, et humidus, et pi-
 tuiſus interdum. 282. 31.
 Polypus aliquando melancholicus tumor
 frigidus, et ſiccus, aliquando cancero-
 ſus calidus, et ſiccus. 282. 33.
 Polypi cum ſuis cruribus incrementum.
 280. 23.
 Polypi morbi ad Polypum piſcem ſimili-
 tudines quatuor. prima. 280. 10.
 ſecunda. 280. 13.
 tertia. 280. 23.
 quarta. 280. 27.
 Polypi deſinitio apud Celſum. 281. 36.
 Polypi deſinitio apud Celſum quomodo qn-
 q; Hippocratis ſpēs cōprehēdit. 282. 1.

Polypi generatio maximè Auſtro, uel Ku-
 ro flante. 281. 40.
 Polypi ad inflammationem prompti prop-
 ter locum. 282. 38.
 Polyporum color, et ſubſtantia. 280. 13.
 Polyporum propagines, rami uel. 280. 18.
 Polyporum difficilis, ualidaq; compre-
 ſio. 280. 29.
 Polyporum species quinque apud Hippocra-
 tem. quarum prima. 281. 28.
 ſecunda. 281. 28.
 tertia. 281. 30.
 quarta. 281. 32.
 quinta. 281. 35.
 Polyporum generatio prima unde. 282. 27.
 πολυπόδιον unde ſic dicuntur. 280. 19.
 πολυπόδιον. 78. 1. 36.
 πολυπόδιον calidi, et humidi. 79. 30.
 πολυπόδιον plus adipis habent, q; tem-
 perati. 79. 38.
 πολυπόδιον quibus magis. 80. 2.
 πολυπόδιον. 78. 2.
 Pomum in oculo. 298. 19.
 Porcetia quæ. 230. 40.
 Porcorum gutturis mamillæ. 231. 15.
 Porcorum adenoſi tumores. 231. 10.
 Pori ratione cōtemplabiles ſunt, in offibus
 autem ſenſui manifeſti. 21. 19.
 Porocela. 239. 26.
 Porocela ramiciſ species. 239. 37.
 Porocelæ materia, et ſpecies quæ. 254.
 29.
 ποροκήλη. 239. 24.
 πορομήλον. 250. 33.
 Poromphalon. ibidem.
 Poromphali materia, et temperamentum
 Porretti. 181. 7. (quod. 254. 32.
 Porri. ibidem.
 Poruli ratione cōtemplabiles. 115. 25.
 Prauo dogmate alitiſ geminū tempus re-
 quiratur. 14. 25.
 Præcedere quid. 60. 35.
 Præſidium nullum ſic alicui proprium,
 quin alteri conferat. 210. 33.
 Præter naturam quatuor. 33. 40.
 Priapus ſecundum Aetium Satyr eſt.
 154. 11.
 Priapus à Satyris diuerſus contra Aetiū.
 154. 15.
 Priapus hortorum Deus, Bacchi, et Ve-
 neris filius. 154. 15.
 Priapiſcos. 154. 28.
 Priapiſmus quid. 154. 160. 11.
 Priapiſmus quid, et unde. 165. 1 = 154. 8.
 et. 21.

Priapiſmus pro Satyriſmo apud Gale-
 num. 153. 32.
 Priapiſmus, et Syvariſmus an idem, an
 diuerſi affectus ſint. 153. 24.
 Priapiſmus, et Satyriſmus aliquando pro
 eodem apud Galenum. 154. 40.
 Priapiſmus cauernoſi nerui repletione
 fit. 155. 2.
 Priapiſmus non tantum cauernoſi nerui,
 ſed arteriarum quoq; repletione fit.
 155. 10.
 Priapiſmus dupliciter. ſ. cum colicis affec-
 tu, et ſine ipſo. 155. 12.
 Priapiſmus quadrupliciter. 165. 20.
 Priapiſmus qd a ſpiritu in tumorem attols-
 lentz fit. 155. 15.
 Priapiſmus ſub Satyriſmo. 160. 8.
 Priapiſmus Pauli à Satyriſmo maximè
 differens. 161. 11.
 Priapiſmus firma, et permanens erectio
 penis eſt. 161. 26.
 Priapiſmus Mulierum ſecundum Auic.
 161. 31.
 Priapiſmus tantum uirorum ſecundum
 Galenum, et Paulum. 161. 36.
 Priapiſmus Mulierum ſecundum Razē.
 162. 10.
 Priapiſmus nomen æquiuocum. 161. 38.
 Priapiſmus an cum dolore. 165. 6. et. 32.
 Priapiſmus pro Satyriſi apud Priſcianū.
 164. 30.
 Priapiſmus ſi non curatur ad tetanum, et
 flegmonem permutatur. 165. 34.
 Priapiſmi cauſa materialis, et continens.
 154. 38.
 Priapiſmi cauſa continens. ſch. 14. 7. 30.
 Principiorū ſermo longus habendus. 19.
 Priſciani locus expoſitus. 164. 34. (14.
 Priſciani error duplex. 171. 16.
 προσηγορία unde dicatur. 36. 13.
 προσηγορία unde dicatur. ibidē.
 Procidencia umbilici. 249. 18.
 προσηγορία quid. 36. 19 = 60. 36.
 προσηγορία. 34. 24 = 36. 11.
 Proptofis Celſi. 297. 26.
 προσηγορία Pauli qd. 297. 20.
 Proptofis Pauli à proptofi aliorū differt.
 Proptofeos ſpēs multæ. 298. 3. (298. 2.
 προσηγορία. 43. 13. 18. = 61. 24.
 Proſedamum. 154. 31.
 προσηγορία quid. 236. 38.
 Protarchi remedium. 129. 5.
 Pruna. 85. 30 = 212. 6.
 Pruritus quo à ſcabie differt. 125. 18.
 c. 3. Pruritus

INDEX

Pruritus cause. 125. 38.
 Pruritus leuior scabie, & lepra. 126. 29.
 Pruritus Serapionis. 127. 4.
 Pruritus ex piluita. 132. 34.
 Pruriginis materia. 126. 11.
 Πύσος. 185. 132. 209. 5.
 Πύσος. 178. 6. & 8.
 Πύσος. ibide.
 Pfora. 123. 35.
 Πύσος. 123. 35. 124. 16. 130. 4. 139. 21.
 Pfora solius cutis affectus. 124. 17.
 Pfora, & lepra quid. 124. 16. et. 19.
 Pfora, & lepra quo differunt. 124. 24.
 Πύσος & υψοακία. 184. 17.
 Phydracia. 124. 33. 176. 5. & 7.
 Πύσος & υψοακία. 173. 23.
 Phydracia capitis. 173. 5.
 Phydracia pustulae sunt. 173. 38.
 Phydraces. 172. 36. 180. 21.
 Phydraces notissime Galeni tempore affe-
 ctiones. 183. 23.
 Phydracion. 183. 29.
 Πύσος & υψοακία. 184. 3.
 Πύσος & υψοακία unde dicitur. 184. 13.
 Phydracion à phlyctænis differt. 184. 1.
 Phydracion apud Celsum quid. 184. 21.
 Phydracion pustula. 184. 34.
 Phydracion ob pituitæ putredinē calidus
 fit tumor. 185. 19.
 Phydracion in naso mendacij signum.
 185. 6.
 Phydracion ex calido, & frigido missus
 tumor. 185. 17.
 Phydracij locus communis toti. 185. 2.
 Phydracij humor. 185. 14.
 Πύσος & υψοακία. 184. 38.
 Phydrax. 183. 29.
 Πύσος & υψοακία unde dicitur. 184. 13.
 Phydrax nota affectio. 210. 1.
 Pterygion. 40. 33. 53. 37. 62. 34.
 Πτερυγιον. 284. 31. & 33.
 Pterygion morbus in numero. 54. 5.
 Pterygion quomodo uisum impedit. 57. 32.
 Pterygion oculorum. 285. 33.
 Pterygion in oculis diuersus ab ungue af-
 fectus. 284. 35.
 Pterygion oculi quid. 286. 23. et. 34.
 Pterygion quandoque totam pupillam con-
 tingit. 287. 5.
 Πτερυγιον digitorum. 285. 30.
 Pterygion digitorum quid, & ubi pre-
 sertim fit. 288. 2.

Pterygion digitorum duplex, mitis, & ma-
 lignum. 288. 4.
 Pterygion digitorum sedari ab ungue si-
 ne dolore non potest. 189. 30.
 Pterygion unguum. 285. 30.
 Pterygion diminutiuum nomen ab ala.
 284. 33.
 Pterygion Græcorum, Celsi unguis.
 285. 28.
 Pterygion simpliciter apud Plinium quid
 significet. 285. 34.
 Pterygion nomen æquiuocum. 286. 8.
 287. 32.
 Pterygion substantiæ ratione alienum à
 natura non est. 286. 32.
 Pterygion carneum ad calidum uergit.
 287. 35.
 Pterygion secundum Aetium carnea quo-
 que interdum excrecentia est. 287. 11.
 Pterygion superne, & inferne originem
 duxisse potest. 287. 14.
 Pterygion nerueum melancholicum, &
 frigidum, & siccum. 287. 34.
 Pterygia in toto etiam corpore fieri que-
 unt. 286. 2.
 Pterygi in oculis causa. 286. 37.
 Pterygi cause plures. 287. 13.
 Pterygi principium, & finis. 286. 38.
 287. 2.
 Pterygi differentie plures. 287. 24.
 Pubertas ætas, in qua magnæ mutationes
 fiunt. 206. 28.
 Pubertas, in qua calor effulgescentiæ sunt.
 206. 29.
 Pubertatis tempus quod est. 206. 32.
 Pudendorum motus naturalis. 155. 29.
 Puls. 84. 3.
 Pultatio. 83. 33.
 Pulticula ex quibus fit. 84. 5.
 Pupilla. 175. 11. & 30.
 Pupilla quadrupliciter à naturali statu re-
 cedit. 55. 37.
 Pupillæ. 176. 6.
 Pupillæ angustia ex siccitate, sicut am-
 plitudo ex humiditate. sch. 8. 5. 2.
 Pupillæ magnitudinis, & paruitatis cau-
 sæ coniunctæ. 55. 23.
 Pupillæ tam angustia, quæ amplitudo dupli-
 ci de causa aduenire potest, et quomodo.
 sch. 8. 5. 7.
 Pupillæ magnitudo semper mala, parui-
 tas uero quandoque bona. 55. 38. 56. 2.
 Pupillæ angustia quando difficilioris cu-
 rationis. sch. 8. 5. 3.
 Pupillæ amplitudo quomodo peior, uel mi-
 nus mala, quæ angustia. sch. 8. 5. 14.

Pupillæ paruitas non semper morbus.
 56. 18.
 Pupillæ angustia semper deterior ampli-
 tudine cæteris paribus. sch. 8. 5. 26.
 Pupillæ angustia, uel amplitudo quæ pe-
 ior sit. sch. 7. 4. 22.
 Pupillæ amplitudo sua ratione mala.
 scholion. 7. 4. 34.
 Pupillæ amplitudinis, et angustie cau-
 sæ. scholion. 7. 4. 38.
 Pupillæ morbi qui. 57. 20.
 Pus. 54. 27.
 Pustellæ. 137. 37.
 Pustula, uide pustulæ.
 Pustula genus ad multos paruos tumores.
 139. 9.
 Pustulæ. 32. 34. 71. 31. 139. 7.
 Pustulæ ulcerosæ. 194. 5.
 Pustulæ nomen tribus affectibus commu-
 ne. 184. 33.
 Pustularum eruptiones. 139. 8.
 Pustularum genera apud Celsum plura.
 193. 2.
 Purulentia. 284. 36.
 Putreoli renouati. 8. 33.
 Putredo an causa continens. 64. 31.
 Putredo præcedens febris causa à Galeno
 uocata. 38. 39.
 Putredo causa continens non est. 64. 36.
 Putredo quomodo coniuncta causa dici pos-
 test. 65. 7.
 Putredo quomodo coniunctæ causæ defi-
 nitionem meretur. 66. 7.
 Putrida fuligo an causa coniuncta. 64.
 32. 65. 8.
 Putridi humores an causa coniuncta. 65. 7.
 Putridum omne an causa coniuncta secun-
 dum Aui. 65. 10.
 Putridis humoribus ablati non propterea
 febris putridæ causa remota est. 70. 4.
 Πύσος. 284. 36.
 Πύσος apud Definitionum Authorem.
 274. 37.
 Πύσος apud Aetium nomen commu-
 ne ad unguem, et hypopyon. 284. 40.

 Vadraus homo quæ.
 79. 28.
 Qualitas uitiosa
 quomodo pluribus
 annis per-
 durare potest.
 202. 27.
 Quintus Licanus
 Bassus carbunculo mortuus. 214. 36.
 Quinti Sereni locus. 269. 37.
 Quis morbus in apostemate primus. 72. 26.
 Radicale



Radiale humidū
idem numero a
principio usq;
ad finem. 202.
24.
Radix furuncu-
li. 221. 4.

ῥακωδης. 81. 20.
ῥαδισ. 81. 13.
ῥαγοειδης. quæ. 23. 32.
ῥαγοειδης tunica. 292. 20.
ῥαγοειδης tunica quare sic dicta est.
292. 33.
Ramex. 233. 18.
Ramex quas species sub se continet. sch.
47. 23. 40.
Ramex, & hernia an differant. 239. 23.
Ramex apud Plinium commune nomen
ad omnes herniæ species. 239. 41.
Ramex aquosus. 240. 19.
Ramex simpliciter secundum Celsum.
243. 38.
Ramicis proprie dicti species quatuor se-
cundum aliquos. 239. 36.
Ramicis species apud Celsū duæ. 239. 40.
Ramus. 270. 17.
Rancidus color. 168. 24.
Rantheres. 283. 31.
ῥανθης. ibidem.
Ratio uictus Antiquorum modestior.
204. 27.
Ratio uictus Antiquorum exquisitissima.
205. 1.
Raucedo suum apud Arist. 232. 16.
Raucedo porcorū cur sic dicitur. 232. 25.
Razis locus. 30. 108. 2. et. 5. 295. 27.
Razis æquiuocatio circa formicæ nomen.
182. 22.
Razis error. 182. 25. 188. 12.
Razis confusio, & error. 212. 14.
Razis confusio circa elephantis uocabu-
lum. 247. 3.
Rediui. 289. 1.
Reduui. 288. 41.
Reduui neglecta, in malignum pterygion
conuertitur. 288. 11.
Reduui pro serpentium exuijs. 289. 17.
Refrengi. 163. 9. et. 21.
Regio Hippocratis temperatissima. 204. 40.
Reluuium. 289. 1.
Renitens tumor quomodo ætiones lædat.
Retiformis tunica. 293. 2. (74. 6.
Retina. ibidem.
ῥεῦμα. 31. 3.

Rhagades. 124. 31.
Rhagoidis foramen quadrupliciter a natu-
rali statu recedit. 55. 37.
Rheas unde fit. 284. 9.
Rheas encanthidi opposita. 284. 2.
Rhecoma. 82. 11.
Rhyas. 62. 33.
Rigoris materia. 126. 14.
Robelia. 209. 29.
ῥοις quid. 283. 26.
Rosarum ungues. 268. 15.
Rossalia. 194. 19. & 33. 195. 12.
Rossalia tumor calidus. 196. 19.
Rossaliæ materia. 196. 18.
Rossaliæ materia calida. 209. 34.
Rossaliæ generatio. 202. 20.
Rossania. 194. 33. 195. 12.
Rubeola, & eius definitio. 195. 18.
Rubeolæ Variolarū, et Morbillorū gene-
rationis causæ tres apud Auic. 198. 41.
Ruptura. 240. 9. 251. 19.
Ruptura siphac. 240. 14.
Ruptura in partibus etiam supra umbi-
licum. 151. 17.
ῥυς quid. 284. 9.



secundum Abenzoarem quot morbos
comprehendit. 175. 3.
Sabafati. 33. 6. 172. 2. 185. 20. sch. 33.
Sabafati apud Serapionē. 172. 5. (19. 22.
Sabafati apud Razem. 172. 18.
Sabafati apud Auic. 172. 34.
Sabafati apud Auic. septem morbos osten-
dit. 172. 35.
Sabafati unde dicitur. 172. 9.
Sabafati sicca. 175. 33. 172. 29.
Sabafati sicca impetiginis species. 172. 7.
Sabafati sicce materia. 174. 30.
Sabafati humidæ. 172. 6.
Sabafati humida quæ sub se continet.
175. 1.
Sabafati dupliciter, speciatim, et gene-
ratim. 172. 25.
Sabafati incipiens quid. 172. 39.
Sabafati, & impetigo quomodo differunt.
174. 35.
Sabafati nomen ab asaf, id est sudore.
Sabaphati. sch. 33. 19. 26. (292. 20.

Sabafce. 265. 4.
σαβω. 143. 22.
Saluberrimum simpliciter semper corpus
rarissimum. 206. 4.
Salubre simpliciter multum aliquando in-
uenitur. 206. 6.
Salubria simpliciter corpora uitij immu-
nia sunt omnibus. 203. 17.
Sancti Lazari morbus. 147. 35.
Sancti lazari morbus unde dicitur.
157. 39.
Sanguis feruens in quæ conuertitur. 96.
Sanguis mortuus. 111. 26. (40.
Sanguis dupliciter, pro quarta substantia,
& pro toto aggregato. 112. 31.
Sanguis inter humores nobilissimus.
80. 17.
Sanguis in conceptione spermatis alimen-
tum. 200. 19.
Sanguis menstruus inconcoctus a semine
concoquitur. 202. 6.
Sanguinis mensui malicia quomodo in
embrione remaneat. 201. 26.
Sanguinis e uase eruptio. 111. 36.
Sanguinis fœx duplex. 104. 21.
Sanguinea suffusio. 112. 14.
Sanguinhermia. 241. 32.
Sanguinumbilicatio. 251. 1.
Sanies. 81. 30. 166. 39.
Sanies in siphac, seu sub siphac, uel post
corneam. 285. 19.
Sanies in cornea. 285. 24.
Sanies sub cornea. 285. 25.
Sanitas, et morbus specie differunt. 51. 11.
Sanitas ex permanentium numero. 46. 28.
Sanitatis latitudo. 51. 6.
Sara. 189. 22.
Sarcocela. 239. 22.
Sarcocela ramicis species. 239. 36.
Sarcocela secundū Celsum quid. 234. 20.
Sarcocela unde dicitur. 234. 6.
Sarcocela secundum Paulum, et Haliaba-
batem quid. 234. 31.
Sarcocela melancholicus tumor. 254. 5.
Sarcocela frigidus tumor. 254. 6.
Sarcocela. 233. 1.
Sarcocela ubi fit. 236. 19.
Sarcocelæ generatio. 234. 11.
Sarcocelæ causa. 234. 40.
Sarcocelæ materia. 254. 1.
Sarcocelæ definitiones quedam imper-
fiæ. 235. 13.
σαρκωδης. 233. 11. & 41. 234. 6.
σαρκωδης βλασηματα. 262. 32.
σαρκωδης πτωκωδης. 239. 28.
c iii

INDEX

σαρκωμα qd .282.24.
 Sarcoma Pauli .281.12.
 Sarcoma Pauli, et Definitionum Autho-
 ris.281.20.
 Sarcoma tumor interdum pituitosus, fri-
 gidusq; & humidus.281.31.
 Sarcoma interdum melancholicus tumor,
 frigidus, & siccus. quondamq; caceros-
 fus calidus, & siccus.281.33.
 Sarcoma carnosus tumor.281.19.
 σαρκωμα φαιλον.250.35.
 Sarcomphalon.250.35.
 σαργξ.234.6.
 Sataculi.270.19.
 σαθρ.154.25.
 σατρ.154.24.
 Satyr unde dicitur.154.25.
 Satyri. qui.152.31.
 Satyri mitissimæ naturæ.152.34.
 Satyri à Priapo diuersi.154.15.
 Satyri pro Dijs siluestribus apud Veteres.
 152.35.
 Satyri nemorum.154.16.
 Satyri cornua circa tempora portant.
 Satyri testiculus.154.27. (152.6.
 Satyriasis.143.12=145.25.
 Satyriasis unde.154.13.
 Satyriasis unde dicitur. ratio p^a.143.14.
 Satyriasis, & satyriasmus unde dicitur.
 ratio secunda.143.18.
 Satyriasis, & satyriasmis nominis. ratio
 tertia.143.26.
 Satyriasis an principium tantum elephā-
 tiasis ostendat.143.33.
 Satyriasis quando uere dicitur, & saty-
 riasmus.144.7.
 Satyriasis, & satyriasmis octo significa-
 ta.152.21.
 Satyriasis significatum primum pro ele-
 phantiasis.152.24.
 Satyriasmis significatum 2^m. pro exos-
 sationibus.152.26.
 Satyriasmis significatum 3^m. pro priapif-
 mo.153.5.
 Satyriasis significatū 4^m. pro sperma-
 ticorum uasorum inflammatione.161.5.
 Satyriasis significatorum quatuor epilo-
 gus.162.25.
 Satyriasis significatum quintum pro glā-
 dularum exteriorum tumore.161.31.
 Satyriasmis significatum 6^m. ex Prisci-
 ano pro insatiabili ad uenerem desi-
 derio.164.22.
 Satyriasmis significatum 7^m. ex Cælio
 Aureliano.164.38.

Satyriasis significatum 8^m. ex Oribasiz-
 olo pro uerruca.185.12.
 Satyriasis Oribasiioli ex pituita .165.17.
 Satyriasis apud Hippoc.163.15.
 Satyriasis Pauli.156.28.
 Satyriasis apud Fuchsum.156.26.
 Satyriasis penis idem cum priapismo se-
 cundū Galenum.154.35.
 Satyriasis materia.144.22.
 Satyriasis, & Priapismus apud Aliquos
 differunt.153.23.
 Satyriasmis.218.18.
 Satyriasmis phymatum species.217.21.
 Satyriasmus.149.25.
 Satyriasmus nomen æquiucum.152.18.
 Satyriasmus, & satyriasis pro priapismo
 apud Aliquos.153.21.
 Satyriasmus osium eminentia.152.5.
 Satyriasmis an spermatis cum uoluptate
 eiectione fiat.160.20.
 Satyriasmus.143.14.
 Satyriasmus pro priapismo apud Gale-
 num.153.27.
 Satyriasmus nomē à similitudine.153.36.
 Satyriasmus unde.154.21.
 Satyriasmus sub priapismo.160.3.
 Satyriasmus quomodo mentem perturbat,
 neruosq; tendit.160.14.
 Satyriasmus secundum Galenum idem,
 quod priapismus.3^a. significatione.
 161.1.
 Satyrion herba.154.26.
 Satyrion Veneris concitatio.154.30.
 Satyriscos.154.27.
 Satyrorum procacitas.143.29.
 Satyrorum cornua.152.29.
 Satyrorum tubercula sub auribus.163.19.
 Satyros uidit Diuus Antonius.152.26.
 Scabies.32.27=33.7=102.9=183.4= (180.26.
 Scabies quid.123.35.
 Scabies lepræ affinis quo differt ab ea.
 142.23.
 Scabies, & lepra quid.124.19.
 Scabies, & lepra quo differunt.124.23.
 Scabies apud Vulgares largè.124.28.
 Scabies, & lepræ eiusdē generis.124.35.
 Scabies apud Auic. largius nomē.124.36.
 Scabies fœda quæ.125.11.
 Scabies quo à pruritu differt.125.17.
 Scabies leuior lepra.126.22.
 Scabies apud Celsum quid.128.35.
 Scabies fera.128.40.
 Scabies capitis.275.10.
 Scabies ex pituita.132.33.
 Scabiei materia.124.40=125.5=126.12.
 Scabei species duplex.125.7.
 Scabel, seu schebel.239.40.

σκελετός.113.40.
 Scinifex morsus.173.31.
 σκίρξ q̄ os.103.29.
 Scirrhus.103.30=138.27.
 Scirrhus duplex.104.2.
 Scirrhus secundum Arabes apostema.
 Scirrhus frigidus.32.13. (19.26.
 Scirrhus melancholicus.32.16.
 Scirrhus ex humore melancholico.88.21= 93.12.
 Scirrhus ex melancholico fuceo natura-
 li.105.23.
 Scirrhus qualis affectus.93.12.
 Scirrhus in exterioribus.102.9.
 Scirrhus lienis, & hepatis.104.4.
 Scirrhi causa duplex.103.32=105.25.
 Scirrhi materia duplex.106.28.
 Scirrhi generationis origo prima duplex.
 106.18.
 Scirrhi ubi potissimum fieri solent.107.1.
 Scirrhus prompta quæ.104.7.
 Scirrhus emollientia congruunt.107.36.
 σκληρὸν, φλεγμονή.184.25.
 σκληρόμα.103.29.
 σκληρόπιδ.102.9.
 σκληρότης.103.29.
 Sclerotica tunica.192.10.
 Scotulum.188.35.
 Scrofa quæ.230.29.
 Scrofula.230.38.
 Scrofula cur sic dicitur.231.2.
 Scrofula nomen apud omnes Arabes ob-
 seruatum.233.7.
 Scrotum.233.34.
 Sebel.289.40.
 Sebel quomodo ab ophthalmia, et taraxi
 differat.290.31.
 Sebel quid.290.4.
 Sebel causæ.290.6.
 Sebel quare panniculum uocant Arabes.
 290.9.
 Sebel ægritudo, quæ in hæredes transire
 potest, et contagio insicere.290.24.
 Sebel tunicam Arabibus ostendit.260.12.
 Sebel uenæ an sint nouæ, an uetres.
 290.34.
 Sebel ad pterygion oculi reducendum.
 261.18.
 Sebel unde emergit.191.20.
 Sebel à pterygio quomodo differt.291.23.
 Sebel temperamentum quod, et eius matre-
 ria.191.28.
 Sebbernia.239.27.
 Sebum.84.37.

Secunda tunica cur sic dicta. 292. 28.
 Secundina tunica quæ. 23. 32 = 292. 29.
 Selaa. 85. 14.
 Semē formatrice, ac genitrice uirtute ope-
 ratur, purius ad se, perfectiusq; trabēs.
 scholio. 40. 21. 21.
 Semen, et sanguis prima generatiōis prin-
 cipia. 200. 37.
 Semen cum uoluptate eijcientes, perturba-
 ti mente non sunt. 160. 32.
 Senectus cruda, et semicana quæ, et eius
 terminus. 207. 4.
 Sequendum in Græcis nominibus Græ-
 cos, i. Latinis Latinos, in Barbaris Bar-
 beros. 187. 40 = 188. 17. (baros. 22. 4.
 Sera in nocte. 188. 13.
 Serapion Græcus Empiricorū sectæ in-
 stitutor. 130. 21.
 Serapionis locus. 150. 8.
 Seria, et seriæ. 188. 17.
 Serpētis ulceris, quem herpeta Græci di-
 cunt, species tres. scholio. 25. 15. 16.
 Serpigo. 134. 14 = 137. 12.
 Σεργειναι. 143. 21.
 Seuatio, et eius causa materialis. 84. 35.
 Seuum. 84. 37.
 Sextus digitus morbus in numero. scholio.
 Sibila. 289. 40. (13. 7. 11.
 Siccitas an semper causa continens. sch.
 sideratio. 94. 16 = 216. 11. (5. 8. 1.
 Sideratio secundum Arabes apostema.
 19. 24 = 22. 39.
 Sideratio nō semper apostema, neq; ulcus.
 Siderationis origo. 113. 5. (21. 29.
 Σιδιου. 188. 14.
 Simiæ epiplocelam, sicuti et Homines, pa-
 tiuntur. 242. 15.
 Simile non est idem. 183. 41 = 192. 39.
 Sinus causa quæ. 81. 12.
 Sinus inter apostemata quando enumera-
 ri potest. 81. 14.
 Sinus inter ulcera quando enumerari po-
 test. 81. 16.
 Sinus materia quæ. 81. 28.
 σινωδων, φαρμακων, νομων
 quomodo differunt. 119. 38.
 σινωδων cum ulcere, et sine ulcere.
 Siphacis passiones. 240. 15. (119. 24.
 Sirengi. 173. 10. et. 17.
 Siraſis. 162. 17.
 Solidæ partes etiam ex sanguine secun-
 dum Arist. 200. 7.
 Solutio continui in omnibus apostematibus
 est. 72. 5.
 Solutio continui in apostemate. 72. 35.

Solutio continui in apostematibus semper
 morbus. 74. 36.
 Solutio continui in apostemate duplex.
 18. 31.
 Solutio unitatis in omni tumore uel manis
 festa, uel occulta. 72. 10.
 Soranus medicus metagrá curas. 136. 29.
 Soretes acruialis sermo. 46. 33.
 σφακλος. 94. 16.
 Sphacelos secundum Arabes apostema.
 19. 24 = 22. 39.
 Sphacelos quid, et causæ. 21. 33.
 Sphacelos nō semper apostema, nec ulcus.
 Sphaceli origo. 113. 5. (21. 29.
 σφαλλειν. i. percutere, et aberrare
 111. 38.
 σφαττειν. i. iugulare, et icidere. 111. 36.
 Sperma ex sanguine fit. 154. 15.
 Spina. 211. 24.
 Spina, et telum causæ coniunctæ non sunt.
 62. 41.
 Spina, et telum causæ extrinsecæ sunt.
 Spiritibernia. 241. 35. (63. 3.
 Spirituificatio. 115. 32.
 Spirituificatio propriæ tres spēs continet.
 Spiritus flatuosus qd. 117. 19. (116. 39.
 Spiritus flatuosi generatio. 117. 33.
 Spiritus flatuosi materia. 113. 37.
 Spiritus uaporosi ex caloris imbecillitate.
 113. 41.
 Spiritus innatus quomodo idem numero
 a principio usq; ad finem perseueret.
 202. 34.
 Sputi facilis, aut difficilis, causæ quot, et
 quæ. scholio. 9. 6. 10.
 Squamæ lepræ quales. 130. 10.
 Squamæ lichenum quales. 130. 8.
 σφυλα. 266. 14 = 270. 20.
 σφυλα secundū Arist. 267. 28.
 σφυλα secundū Galenū qd. 267. 35.
 σφυλωμα. 291. 34 = 299. 17.
 Staphyloma. 292. 21 = 298. 17.
 Staphyloma proptoseos Pauli species.
 297. 20.
 Staphyloma absq; cornæ ruptura in quo
 loco fieri queat. 299. 3.
 Staphyloma duplex etiam apud Celsum.
 299. 15.
 Staphyloma duplex etiam apud Paulum.
 299. 19.
 Staphyloma duplex etiam ex Galeno col-
 ligitur. 299. 25.
 Staphyloma quid secundum Paulum.
 299. 23.

Staphylomatis definitio apud Aetium.
 298. 41.
 Staphylomatis modus duplex. 298. 40.
 Staphylomatis causæ. 299. 1.
 Staphylomatis species quomodo abinuicē
 differant. 299. 34.
 Staphylomatis temperamentum, et causæ
 diuersæ. 300. 13.
 Staphylomatis causæ. 297. 18.
 σφυλοφορον apud Arist. 267. 24.
 σφαρ. 84. 37.
 Steatomatum tunicula. 241. 21.
 στεατοκήλη. 239. 27.
 στεατωμα. 84. 34.
 Steatoma. 184. 28.
 στεατωματα. 82. 38.
 Steatomata. 180. 26.
 Steatomata membranula cōtinētur. 221. 15.
 Steatomatis notæ quæ. 83. 14.
 στεφανον. 292. 7.
 Steriles feminae quæ. 200. 17.
 Stoicorum opinio de cā continente. 66. 1.
 Stoicorū de nominibus sententia. 153. 18.
 Stomachus quid. 274. 27.
 Stratum Toletanum siue Toletum quo iēs
 pre primam originem sumpsit. 8. 36.
 Struma quæ. 223. 36.
 Struma an pus generet. 228. 35.
 Struma an cum febre. 228. 37.
 Struma secundum aliquos quid, et male.
 230. 29.
 Struma sceleratus, turpisq; morbus. 230.
 Struma Ciuitatis. 230. 32. (31.
 Struma quando est morbus in magnitudi-
 dine. 230. 20.
 Struma tumor frigidus. 220. 28.
 Struma tumor frigidus, et pituitosus,
 uel atrabilarius. 230. 27.
 Struma morbo porcis familiaris. 231. 39.
 struma apud Arist. 232. 10.
 Struma Gulosi Hominibus familiaris.
 232. 4.
 Strumæ. 210. 13 = 218. 18. et. 37.
 Strumæ apud Virgilium Marcellum.
 scholio 4. 3. 29.
 Strumæ Phymatum species. 217. 21.
 Strumæ non facile matureſcunt. 219. 3.
 Strumæ non sunt phymata propriè dicta.
 219. 2.
 Strumæ inflammationes non sunt. 219. 4.
 Strumæ membranula cōtinētur. 221. 15.
 Strumæ matria quæ. 228. 26.
 Strumæ in mesenterio. 228. 40.
 Strumæ i mesenterio septuaginta. 229. 13.
 Strumæ

Struma secundum Aetium ex Leonida
quid. 229. 37.
Strumæ quomodo ex mutatis glandulis
fiunt. 229. 40.
Strumarum loca. 228. 38.
Strumarum materia quæ. 230. 28.
Strumarum duplex origo. 230. 1.
Strumarum definitio secundum Galenum.
230. 13.
Strumarum generatio. 234. 10.
Strumarum tunica. 241. 21.
Stuporis causa quomodo frigiditas est.
scholio. 8. 6. 4.
Subcartilaginiberna. 252. 9.
Subcartilaginorame. 251. 41.
Subocularia. 111. 10.
Subocularis. 103. 34 = 111. 14.
Subruptio. 111. 36.
Subtilis uicæ procidentia. 298. 19.
Subunguium. 112. 20.
Sudamina. 191. 33 = 192. 16 = 209. 25.
Sudamina quid. 192. 3.
Sudamina acerrima. 191. 39.
Sudorum papule. 192. 12.
Suffusio. 62. 34 = 108. 30.
Suffusio morbus in numero. 62. 28.
Suffusio non causa morbi inuia, sed mor-
bus in numero est apud Galenum.
57. 23.
Suffusio quomodo uisum impedit. 57. 33.
Sugillata. 103. 32 = 111. 11.
Sugillatio. 108. 32.
Summiramex. 252. 4.
Summicordium. 179. 10.
Summicuticeps. 179. 21.
Superficie causa coniuncta. 51. 27.
Supergingiuum. 262. 1.
Suppuratio. 81. 7 = 218. 31.
Suppuratio apud Plinium quid. 20. 30.
Suppuratio erysipelatis mala. 224. 41.
Suspendicula. 236. 19.
Suspendoria. 235. 40.
Suum morbi tres. 232. 14.
συκοις. 264. 25.
Sycofisci paræ proprius morbus, an cō-
munis. 175. 15.
Sylla Dictator pediculari morbo mortuus.
174. 11.
Sylvanij error. 179. 38 = 136. 12.
Syluester Imperatorem alepra liberauit.
149. 8.
Sylvius Mesues, et Catinarie interpres.
Symptomata. 34. 2. (4. 37.
Symptomata quæ. 18. 28.
Symptomatum genus triplex. 34. 18.
συρεχόν. 43. 13 = 61. 24.

συρεκ πικόν. 43. 13 = 61. 23.
συρεκ πικόν quid, et unde. 61. 1.
συρεγξ. 81. 35.



195. 2218. 25 = 259. 35 = sch. 25.
Tabula. 31. 37.
Tarsi. 112. 12.
Taxus. 266. 5.
Telephium ulcus, idem et Chironium ex
Paulo, Aetio, & Auic. 122. 6.
Telephium ulcus unde dicitur. 122. 17.
& 33.
Telephium ulcus ab Achille, idem quo-
modo Chironium dici potest. 122. 39.
Telephium ulcus sub Chironio uidetur es-
se nam Princeps intellexisse. 123. 22.
Telephium ulcus spontaneum, quo Tele-
phus consenuit, idemq; Chironium.
123. 8.
Telephus Nisiorum Rex. 122. 32.
Telephus ab Achille uulneratus, et sanat9
ab eodem. 122. 34.
Telum, & spina non sunt causæ coniun-
tæ morbi. 70. 26.
Telulæ. 282. 20.
Temperamenta formæ substantiales ses-
cundum Galenum sunt. 93. 5.
Tenesmus quādo apostasis dicitur. 19. 29.
τέρμινθος. 174. 25.
τέρμινθος phymatis species. 228. 9.
Terminibus. 228. 14.
Testes ex glādarū genere sunt. 235. 25.
Testes Mariam penduli. 236. 1.
Testes Foeminei erythroide uacāt. 138. 29.
Testium substantia an sentiat. 235. 23.
Testium, eorumq; operculorum anatome.
Testium muscoli. 236. 1. (135. 18.
Testium auxiliarij qui. 236. 36.
Testium tunica. 236. 18.
Testium contractio a quibus. 238. 15.
Testib9 supergenita tunica quæ. 241. 17.
Thaim, & thaun. 212. 19.
θαλασσοεργον. 284. 9.
Thebegi. 115. 22 = 117. 2.
Thelul in naso. 282. 16.
Thelulæ. 282. 20.
Theodori Gazæ error. 232. 17 = sch.

4. 3. 35.
Theodori Prisciani error. 171. 15.
Theonis mordacitas. 39. 21.
Theres. 163. 25.
Therioma. 214. 31.
θλαί. 173. 14.
θλαί in capite quid. 282. 18.
Thimotbei consuetudo. 14. 28.
Thoim. 228. 5.
θρόμβοι. 113. 3.
Thursios. 228. 14.
Thymion uerrucæ species. 181. 18.
Thymion apud Celsum nomen æquiuocū.
263. 34.
Thymion pro uerrucula quid. 263. 41.
Thymion, et thymos unde dicitur. 264. 2.
Thymion myrmecys minus dolet. 265. 31.
Thymion, uel thymos tumor est utpluri-
mum sanguineus, uel mistus. 266. 6.
Thymion nomen æquiuocum, sicut et thym-
Thymij magnitudo. 264. 3. (mos. 266. 3.
Thymij loca. 264. 5.
Thymium ulcus. 272. 39.
Thymos. 262. 32 = 263. 31.
θύμος quid. 263. 33.
θύμος, & θυμός quo differant. ibide.
Thymos duplex, mitis, & malignus.
264. 21 = 265. 9.
Thymos tumor non semper thymi herbe
colorem præferre debet. 265. 33.
Thymos tumor si nō colore, saltem figu-
ra thymi herbe corymbis similis sit.
265. 33.
Thymos herba, et thymon. 265. 40.
Thymos nomen æquiuocum etiam ad glā-
dem. 265. 41.
Thymos adensa caro in superiori thorac-
cis parte. 266. 1.
Thymum. 178. 19.
Thymus sanguinem effundit. 265. 9.
Thymus quomodo sanguinem fundit.
264. 3.
Thymus a moro quomodo interdū apud
Auic. differt. 264. 28.
Thym9 duplex mitis, et malignus. 265. 9.
Thymus mitis quis, et eius indicia. 265. 11.
Thymus malignus quis, & eius indicia.
265. 28.
Thymus tumor est calidus utplurimum.
266. 9.
Thymus quandoq; ad frigidum uergit.
266. 11.
Tinebone. 223. 41.
Tinea 171. & quid. 175. 11.
Tinea unde dicitur, ratio triplex. 171. 32.
Tinea sicca



Tinea sicca. 172.32.
 Tinea humida. 172.33.
 Tinea fauosa. 175.13.
 Tinea ficiosa. 175.15.
 Tinea apud Haliabbatem. 175.2.
 Tinea apud Constantinum. 176.10.
 Tinea nomen quot morbos comprehendat secundum Haliabbatem. 175.8.
 Tinea a capitis ægritudine differi apud Mulieres. 175.39.
 Tinea sagro grauior morbus. 175.41.
 Tineæ nomine tripliciter usi sunt multi, Nam alij specialius, alij generalius. 172.1.
 Tineæ species quinq. 175.12.
 Toletanum stratum. 8.36.
 Toletum unde dicitur. 8.6.
 Tolles tumorem significat. 276.16.
 Tonfillæ. 233.39.234.37.
 Tonfillæ unde dicuntur. 276.16.
 Tonfillæ in homine tantum, in sue glandule. 278.18.
 Tonfillæ quæ glandulæ sunt. 277.16.
 Topheria. 239.24.
 Thophiramex. ibidem.
 Torini error. 237.14.
 τὸ πῖ πω. 217.10.
 τρεῖς ὁὐδὲν τὰ. 132.12.
 Trebel. 113.20.
 Tremoris causa continens. 42.2.
 Trina dimensione recedere pblegmonæ, aliosq. tumores. 19.7.
 Triplex in apostemate morbus. 18.30. et. 37.2.34. per totam.
 Trygocela. 254.36.
 Trygocelæ materia quæ, et temperamentum. 254.36.
 τρυγοκέλη. 241.32.
 Trygomphalon. 254.36.
 Trygomphali materia, et temperamentum quale. 254.36.
 Tubera. 220.26.
 Tuberculum. sch. 4.4.23.17.
 Tuberculum dupliciter sumitur, communiter, et proprie. 217.5.
 Tuberculum dupliciter sumitur, generatim, et speciatim. 220.21.
 Tuberculum genericum nomen. 220.2.
 Tuberculum quod phyma nominatur. 220.9.
 Tuberculi nomen unde. 220.26.
 Tubercula Græcè ἐπὶ φύματι scholio. 44.23.19.
 Tuberculorum eruptiones. 139.14.

Tumor quid. 743.2.
 Tumor quid significet. 18.6.
 Tumor morbus ex tribus morborum generibus. 18.8.
 Tumor nisi actiones impediat, morbus non est. 19.9.
 Tumor quando morbus, et quando symptoma. 73.14.
 Tumor præter naturam, etiam si neq. magnitudo, neq. figura deprauetur. 76.1.
 Tumor ex sola intemperie impossibilis. 74.30.
 Tumor siens symptoma, seu patbos est. 73.36.
 Tumor durus, et dolens. 184.28.
 Tumoris essentia, et ratio quæ prima est. scholio. 20.12.26.
 Tumoris essentia in qua consistit. 214.23.
 Tumores flatuosi. 76.32.
 pblegmonosi. 76.33.
 erysipelatosi. ibidem.
 cedematosi. ibidem.
 scirrholosi. 76.34.
 aquosi. 76.35.
 Tumores in elephático diuersi. 151.40.
 Tumores omnes Galenus perturbasse dicit in libro de tumoribus. 300.19.
 Tumores alij sunt, quos Galenus uel alibi scripsit, uel penitus ignorauit. 300.39.
 Tumorum uarietates. 76.31.
 Tumorum nomen à dominante, cognomine à subdominante humore. 77.1.
 Tumorum exteriorum generatio unde. 222.2.
 Tunica supergenita quæ. 241.17.
 Turmufios. 228.12. et. 15.
 Turpitudine in uerbis nulla est. 153.20.
 Tursios. 228.12.
 Tusios. 228.13.
 Tassus. 285.6.
 Tympania. 114.7.255.28.
 Tympanias quæ. 160.15.
 Tympanias à minori frigidityte fit, si ascites. 260.12.
 Tympanites quæ. 160.15.
 Tympanites, et ascites proprie parecchyæ ses. 255.15.
 Tympanites, et Tympanias unde dicitur. 206.18.
 Tympanites uentosus tumor. 261.49.
 Tympanitis materia uentus cum aqua. 257.3.
 Tympanitis, et ascitis generatio qualis. 260.23.
 τυφοκέλη. 252.27.
 Tyria. 149.20. et. 29.

Aginalis tunica. 239.3.
 Valentia morbi Gallici principii. 205.1.
 Valeriolæ error. 55.24.57.22570.3. et. (22.69.23).
 Vardenigi. 284.24.
 Vardinegi. 284.25.
 Vari, unde dicitur. 209.3.
 Vari, unde nomen uariolæ. 208.36.
 Vari notæ affectiones. 209.1.
 Vari tumores frigidi. 209.38.211.27.
 Vaxorum materia. 211.29.
 Varices. 244.32.48.2.
 Varices quæ. 243.2.
 Varices in cruribus frequentius, et quæ. 243.32. (re. 243.7).
 Varices in uentre. 243.32.
 Varices crurium uiro frequentius, siemil nis rarius. 243.7.
 Varices ulcerum. 244.15.
 Varices nigra. 245.32.
 Varices ante pubertatem fieri non solens. 245.35.
 Varices caluitium sanant. 245.38.
 Varices insaniam solunt. 245.21.
 Varices quare in cruribus magis. 245.34.
 Varices magnæ caluit non fiunt. 245.36.
 Varices ex alijs succis, et uiciosis quiddam præter sanguinem. 245.39.
 Varices dicuntur à quibusdam uites. 246.22.
 Varices quibus plurimū contingant. 246.6.
 Varices quæ incurabiles. 246.13.
 Varices similes arborū uaricibus. 246.20.
 Varices an calidi, uel frigidi tumores sint. 247.30.
 Varicum causa, celer. sanguinis fluxus. 244.8.
 Varicum materia, et generationis modus. 245.9.
 Varicum materia ex Aui. 246.2.
 Varicum origines diuersæ. 246.8.
 Varicibus curatis, interdum melancholia corripui sum est. 245.17.
 Varix quid. 244.5.
 Varix in uarijs corporis partibus. 244.11.
 Varicula. 244.5.
 Varicoramex. 243.39.
 Varicosi parastatæ. 236.25.
 Varicosi parastatæ nerui non sunt. 237.11.
 Variola. uide uariolæ.
 Variola unde dicitur. 208.26.
 Variola sæpe epidemius morbus. 194.18.
 Variola tumor calidus. 196.20.
 Variola mors

INDEX

- Variola morbus naturalis.** 189. 3.
Variolæ. 33. 10. 138. 36. 139. 15. 182. 41
Variolæ interdum sine febre. schol. 43.
 22. 36.
Variolæ dicuntur à uariis. 192. 40.
Variolæ exanthematam species. 193. 32.
Variolæ, et morbilli aliquo modo noui affe-
ctus sunt. 193. 39.
Variolæ, et morbilli etiam in uisceribus.
 195. 39.
Variolæ, et morbilli cur à uetribus non
descripti. 196. 7.
Variolæ, et morbilli cur nostro æuo no-
tiores. 196. 11.
Variolæ, et morbilli an ex menstrui san-
guinis uitio generationis principium
habeant. 196. 25.
Variolæ præsertim in infantibus, et ad
septimum annū usq. 197. 27. 203. 31.
Variolæ, et morbilli non solum ex uitio me-
strui sanguinis, sed etia lactis. 198. 14.
Variolæ, et morbilli, et rubeola non sem-
per ex menstrui sanguinis uitio.
 199. 31.
Variolæ anno sexagesimo quibusdam, et
septagesimo. 203. 32.
Variolæ quomodo nouus morbus dicuntur,
ita et morbilli. 205. 7.
Variolæ qua etate frequētiore. 207. 36.
Variolæ in senectute. 207. 8.
Variolæ, et morbilli, et rossaliæ exanthes-
matum species. 209. 28.
Variolarum materia. 194. 30. 196. 17.
Variolarum, et morbillorum, et rubeolæ
ordo in nascendo. 195. 27.
Variolarum forma, et ortus. 196. 1.
Variolarum ortus quomodo, et à quo fit.
 198. 18.
Variolarum generationis causæ. 198. 23.
Variolarum generationis causæ tres apud
Auc. 199. 40.
Variolarum origo ex menstruo sanguine
secundum Arabes. 199. 1.
Variolarum generatio. 202. 20.
Variolarum generationi, et morbillorum
cur feruor inest. 199. 32.
Variolarum, et morbillorum generatione
quomodo corpus expurgatur. 204. 11.
Variolarum tempus idem omnibus non ē.
 203. 30.
Variolarum tempus indeterminatum, ita
et morbillorum. 204. 22.
Variolarum, et elephantiæ differentia.
 203. 21.
Variolarum materia calida. 209. 32.
Variolas, et morbillos omnes habent ses-
cundum Auer. 198. 1.
Variolas nouum esse morbum, sex conie-
turæ. sch. 33. 20. 23.
Variolas qui euadit, quasi Dei filius dici-
tur, ita morbillos, et rossalias. 206. 1.
Variolis quare quedam corpora non ue-
xantur, rationes tres. 203. 15.
Variolis, quemodo bis, et ter quispiam af-
fligi queat. 203. 36.
Variolis, et morbillis generandis necessa-
ria febris, et feruor. 208. 15.
Varronis locus. 225. 19.
Vasa deferentia originem à darto contras-
xerunt. 238. 11.
Vasa deferentia quomodo dici etiam poss-
sunt suspensoria. ibidem.
Vassei error. 238. 34.
Vassei, et Andernaci error. 238. 25.
Vatini scelera. 230. 35.
Vatini struma. 230. 37.
Venæ albeben. 290. 40.
Venæ arteriosæ apud Paulum. 237. 28.
Venæ quæ in sebel apparet quomodo ge-
nerantur. 291. 5.
Venarum uteri ad mammas consensus.
Venenum subtile. 166. 40. (200. 24.
Venerea lues quæ, et unde primam origi-
nem sumpsit. 205. 19.
Venti generatio. 117. 23.
Venti generatio non sine aliquo calore fit.
 260. 22.
Ventosi status generatio. 155. 6.
Ventosum apostema. 115. 4. 117. 3.
Ventriculus furunculi secundum quosdā.
 220. 41.
Ventriculus furunculi quare sic dicitur.
 216. 28.
Ventriculus furunculi an sit. 220. 29.
Ventriculus furunculi quid. 221. 2.
Ventriculus furunculi, uel phymatis quid.
 221. 13.
Ventriculus in furunculo non inuenitur.
 221. 22.
Ventriculi abscessuum optima ruptio. 23. 1.
Ventumbilicatio. 250. 37.
Ventus ad nutritionem ineptus. 260. 22.
Verbis turpitudine non inest. 153. 20.
Verducæ uestes. 180. 41.
Veretri inflatio. 162. 13.
Veritas intellectum allicit. 14. 31.
Veritas bonum intellectus. 14. 31.
Veritatis defendendæ causa, propria etiā
impugnare licet. 5. 32.
Verruca. 181. 2.
Verruca proprie quid. 180. 35.
Verruca pensilis. 178. 30. 181. 28.
Verruca in lapillis. 180. 39.
Verruca seffilis. 181. 28.
Verruca secundum Celsum. 181. 20.
Verruca formicans. 181. 28.
Verrucæ. 32. 28. 33. 3. 195. 11.
Verrucæ nomen à similitudine. 180. 33.
Verrucæ uestes. 180. 41.
Verrucosa loca quæ. 180. 36.
Verrucula. 181. 2.
Verum Vero consonat. 13. 28.
Vesalius Græcorum, Arabumq; massix,
Razis tamen interpret. 14. 39.
Vesalius contra Galenum. 156. 31.
Vesali error. 158. 28. et 39.
Vesali defectus. 158. 38.
Vesicæ. 32. 35. 98. 39. 101. 28. 194. 48
Vesicæ lapis quando causa, uel morbus.
 53. 26.
Vesicæ in oculo quæ. 293. 41.
Vesicalis uicæ casus. 293. 24.
Vesicalis uicæ procidentia. 298. 28.
Vestes verrucæ. 180. 41.
Vestigia nigra. 111. 26.
Vestigia percussione. 111. 28.
Vestigia sanguinis. 111. 26.
Vibices. 111. 31.
Vicinitraba. sch. 24. 14. 23.
Vicinitræctum. sch. 24. 14. 24.
Vinum Hippocraticum. 201. 6.
Vinum claretum. 201. 17.
Vini aromatici odor, et uirtus quomodo in
phiala remanet. 201. 16.
Vini uirtus quomodo lac coagulet. 201. 21.
Virgæ stillatio quæ. 162. 2.
Viscerum procidentia in uariis abdominis
partibus esse potest. 251. 3.
Vitæ causa nil magis, q; inflicta. 8. 11.
Vitellina bilis. 89. 23.
Vites. 246. 22.
Vitium carbunculus. 215. 34.
Vitium elephantiæ. 247. 7.
Vitina quæ à generatione uel inseparabilia,
uel non sine difficultate maxima.
 199. 20.
Vitiliginis. 54. 28.
Vitiligo simpliciter. 140. 9.
Vitiligo alba. 140. 10.
Vitiligo nigra. 140. 11.
Vitiligo unde dicitur. 140. 12.
Vitiligo genus. 140. 38.
Vitiligo genus ē tribus speciebus comane.
 140. 32.
Vitiliginis species tres. 140. 29.
Vitreus humor oculi. 293. 28.
Vitutorum morbus. 27. 17.
Vitus à Matera crassissimus. 78. 14.
Vlcerosæ lassitudinis materia. 126. 11.
Vlcus cacothæ. 120. 3.
Vlcus corrodens se. 119. 28.
Vlcus thy

Vlcus rhymium. 163. 39.
 Umbilici procidentia. 249. 18.
 Umbilici exitus, aut eminentia. 249. 18.
 Umbilici eminentia, ruptura, seu exitus, uel egressio. 249. 39.
 Umbilici eminentia, et uariæ eius causæ secundum Auic. 250. 1.
 Umbilici augmentum. 249. 41.
 Umbilici acumē. 249. 3.
 Umbilici uitia plura, sed rara. 249. 6.
 Umbilici prominentis causæ quinq; , aut sex ex Celso, aut etiā septem. 249. 9.
 Umbilici prominētis causa octaua ex Paulo, & Auic. 249. 24.
 Vndimia. 113. 19.
 Unguis. 40. 33 = 53. 38 = 284. 34.
 Unguis in oculo. 134. 26.
 Unguis in oculo, morbus ī numero. 54. 5.
 Unguis in oculo secundū Celsum. 284. 31.
 Unguis in oculo diuersus à pterygio oculi. morbus. 284. 35.
 Unguis in oculi adnata unde sic dictus. 286. 12.
 Unguis sub cornea unde sic dictus. 286.
 Unguis super ungue. 288. 36. (17.
 Unguis æquiuocū nomen est. 286. 10.
 Ungues rosarum. 286. 15.
 Ungues leprosi. 131. 8.
 Ungula. 286. 20.
 Unguiculi quid, & quomodo, à suppuratione differunt secundū Actiū. 285. 2.
 Unguiculorum siue unguium oculi generatio prima. 285. 8.
 Vniuersalia particularibus perpetuò præponenda. 17. 22 = 70. 40. et. 41.
 Volatica. 130. 2 = 133. 31 = 139. 25.
 Voluulus. 252. 16.
 Voluulbernia. 252. 19.
 Voluulumbilicatio. 252. 35.
 Vranoscepos. 220. 15.
 Vrinarius uesicæ meatus. 157. 8.
 Vrinarius meatus in erectione tumescit. 159. 3.
 Vrinarij meatus constructio. 158. 36.
 Vteri ad mammas consensus. 200. 24.
 Vtricularis unde dicitur. 259. 28.
 Vua. 266. 14.
 Vua secundum Arist. quid. 267. 22.
 Vua morbi, non partis nomen apud Galenum. 267. 34.
 Vua apud Arist. , & Archigenem uis uer salius, q; apud Galenum. 268. 1.
 Vua secundum Hippocratem quid. 268. 14.

269. 1.
 Vua unde sic dicta est. 268. 20.
 Vua tumor rotundus , & liuidus, tandēq; niger fit. 268. 25.
 Vua apud medicos uulgares qd. 268. 40.
 Vua an partis nomen apud Hippocratem contradictio. 269. 10.
 Vua, et uuula in quibusdam Galeni tractatibus male. 270. 35.
 Vua tumor sanguineus, et calidus. 273. 14.
 Vuæ morbi genuratio rara. 267. 39.
 Vuæ nomen non solum pro morbo, sed pro particula. s. gargareone apud Romanos usitatissimum fuit. 269. 24.
 Vuæ nomen apud Arabum interpretes quomodo in usu. 269. 41.
 Vuam pro parte capientes Galenus deri-
 uatio. 291. 35. (det. 268. 6.
 Vucæ. 298. 17.
 Vucæ tunica. 292. 20.
 Vucæ tunica quæ. 23. 33.
 Vucæ tunica cur, & unde sic dicta est. 292. 33.
 Vucæ tunica unde originē sumit. 292. 26.
 Vuæ exertio in quo loco fieri potest. 298. 34.
 Vuigera particula uenosa. 267. 22.
 Vuifera secundum Arist. 267. 28.
 Vuula secundum Trotulam. 269. 40.
 Vuulæ nomen apud Arabum interpretes. 270. 1.

X αἰθὴν ἢ flaua. 97. 7.
 ξανθόπερον. 97. 28.

Y δατ ὁ δες. 240. 30.
 Y δα τοειδης humor oculi. 293.
 Y δeros. 255. 1. (29.
 Y δeros proprie. 255. 14.
 Y δeros eis αἰμίδα. 257. 24.
 Y δωρ. 255. 5.
 Y δράκτα. 184. 17.
 Y δρενπεροκλή. 241. 24.
 Y δρενπεροεπιπλοκλή. 241. 11.
 Y δρωα. 172. 12 = 191. 32 = 192. 16 = 209. 25 = sch. 33. 19. 27.
 Y δρωα qd. 192. 4.
 Y δροκλή. 240. 19. & 41.

υδροκιροκλή. 241. 38.
 υδρομυφαλον. 150. 31.
 υδρωπισ. 255. 1.
 υδρωψ. 151. 1.
 υδρωψ εις αἰμίδα. 257. 24.
 υδροσσεροκλή. 241. 41.
 υπεικων. i. cædens. 110. 32.
 υποχοιροκλή. 241. 41.
 υποχορέω. i. locum exhibeo. 110. 33.
 υπονιχον. 112. 19.
 υπονομα quid. 81. 22.
 υποφθαλμος. 108. 33.
 υποπιν toto genere præter naturā est. 186. 33.
 υποπινon quid est. 111. 19. et quomō ab υποπινon alia dictione differt. 285. 4 = 111. 15.
 υποπινon oculi est affectus. 111. 20.
 υποσείνη. quid, et unde. 262. 4.
 υποσσεκιδιος. 258. 31.
 υποσσεκιδιος υδρος. 114. 8.
 υποσσεκιδιος quid, & unde, et quæ eius materia. 260. 36.
 υποσφαγμα. 111. 32.
 υποσφαλμα. 111. 37.
 υωπια. 111. 10.

πωπινon. 111. 14.
 υπωπινon faciei affectus. 111. 22.
Z Achi. 258. 24.
 Zanzalæ. 173. 39.
 Zebel. 289. 40.
 Zebel quid secundum Auer. 291. 1.
 Zimia. 113. 20.
 Zoili è medicis euadentes. 44. 41.
 Zona Græcorum herpes. sch. 25. 15. 6.
 Zona etiam Circinus dicitur. scholio. 25. 15. 7.
 Zona, & Circinus unde dicitur. scholio. 25. 15. 13.
 Zonam seorsum ab igne sacro Plinius determinauit. sch. 25. 15. 8.
 Zoster quid. sch. 25. 15. 12.

F I N I S.



REGISTRVM

† A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

AA. α B. a b c


Omnes sunt Terniones præter α quaternionem.

NEAPOLI

Excudebat Matthæus Cancer.

Septimo Idus Aprilis.

1552.





NOVIT medicorū lucerna, fulgētissimūq; sidus, **GALENVS** ^a
 librū opus'ue quodpiā enarrātis interesse, dūtaxat, quā obscuritatē habet
 dictiōes elucidare. Quāq; vulgares (quos passim inspicimus) interpretes mi-
 nimē id obseruat: uerū quoq; et ea quā dicuntur, ī libris (in quos cōmentaria
 parāt) asruūt, et demonstrāt. Vtinā uerō id tantū agerēt: uenia nāq; digni, perutilia tāgētes,
 essent: Cū Galenus ipse, ob eū quoq; morē, et his quos nō probauit, cōsentire cogeretur: Maxi-
 māq; ex parte ad ea, quā qdē explicatiōe īdigēt, sententiā suā prodere, et afferre, demonstratio-
 nesq; (uti uidere nō semel cuiq; fas est) adiūxerit. Verū et illi (quod tēdiosum super pōdiū ē)
 suis ī enarratiōibus, sophisticas (quā discētes ipsos ad finē artis nullo pacto iuuare possūt) su-
 persemināt quāstiones. ^b Cōtrā tamē Galenus ipse cūctorū dux, atq; lucidū exēplar agebat:
 Sēper enim quā cōmodissima sūt, prosequi moliebatur. **CONSIDERANTES** igitur quā
 ā nugace Dinulo, diuisorēq; potius (hoc ī libro) q; interprete, multoq; minus Speculatore gē-
 tili, (si tamē ipse est, fuliginatis, n. stylū seruare nō uidemus) cāterisq; chirurgiculis aceruā-
 tur, nō sophisticas modo minimeq; utiles lucubratiūculas: et ubi res nō postulat (ut Galeni
 uerbis utar) cōmorātes, inuenimus: Verū ēt, ijs omīssis quā nō parua caligine, simul ac fal-
 sitate obruta diutissime lucē exoptarūt, unico uerbo, insipide, satisq; ineptē pertrāsētes, sicco
 (ut aiūt) pede, ac ueluti super farinā mures, dicēdo patet, planum'ue ē. Quod autē peius arbi-
 tramur, nosq; mirū ī modū perturbat, id ipsum est quoniā duplex cū sit interpretis, scopus
 (Galeno ^d authore) ut simul & cōsentanea cū scriptore, & uera dicat: q; alterū tantū obser-
 uat, hōc est reprehēdendus, q; dimidiū labefactauerit totius: ijs prāsertim q; uera tantū dicat.
 placuit nāq; interdū Galeno, ^e ut potius iuxta sententiā auctoris loquamur, cū alterius doctri-
 nā prosequimur, enarramusq; q; q; fuerit falsū n. Interpres uerō, q; neq; uera dicat, neq; cōsentā-
 nea cū auctore libri, maximē cōsēdus est peccare: Quāadmodū nō semel, aut iterū chirurgi-
 culorū (ut existimāt) proton dinutiū, cuius qdē (ob aliqua ī senectute cōscripta lōgē perfectio-
 ris farinā cōmentaria ē) qbus altissimā famā nō immeritō adeptus est) rudibus pariter iuue-
 nilibusq; cōpositiōibus tā temerē attribuūt, ī numerosq; eiusdē classis īterpretes ad lapidem
 offendere quotidiē cernimus. Si uera prādicē, perge, & quācūq; dixerimus ī dies perlibra-
 to. Verū nāq; (philosopho ^f authore) sibi oī ex parte cōsonū est. **VISA** deinceps Auicēnā
 (quē barbari suū ueluti Principē nō īmeritō uenerātur) caligine, atq; ī plurimis falsitate, cū
 rudi indigestaq; interpretū mole: ad eius dictorū enotiōes pro nostrā sciētiolā mēsura, cō-
 litus īspirōne obtēta, ī pellimur. Hūc īterim morē obseruātes: ut quā doctē, uel ē priscorū sen-
 tētia dicta sint, hilari corde, ac ex illorū monumētis cōprobarimus. Sic. n. (ueluti Galenus &
 edocuit) ijs q; antiquorū placita enarrāda suscipit, ea amicē magis definire, q; morosē redar-
 guere debet. Quā uerō ab illis ineptē, aut perperā albasen trāscripserit: ex eorū quoq; ac prā-
 sertim Galeni, pauliq; (ā qbus exscribere conatus est) uerbis respuere enitemur: quā obscu-
 ritatē habet dictiōes dūtaxat elucidātes. In his uerō quā perse iā uel medicinā cādidatis aper-
 ta sūt, minimē tēpus frustra cōterētes. Simpliciū quoq; medicaminū qbus īnumeri cōtingūt
 errores, nō a solumodō tāgētes: qbus qdē magna ex parte passim cū grāci, tūm latini, arabesq;
 ac nostri corruptē uulgares frēquentiori usu rē indigitāt. Deinceps eorū tēperamēta horūq;
 ordines gradus'ue, ac solas deniq; ad eius morbi de quo sermo fiet propositū pertinētes, et op-
 portunas

d. 21. de rōe uie.
 ī morb. acut. com.
 p. in probae. 3.
 aphor. 27. p. reg.
 acut. cō. 8. ideo 6.
 aphor. cō. p. cir-
 ca mediū iam ui-
 deor expleuisse
 expositoris officiū.
 um. & c.

b. uide 21. de rōe
 acut. ī morbis acut.
 com. 2.

c. 31. de morbis
 uulg. cōmentario
 p. comē. 4. ante
 medium.

d. 31. de morbis.
 uulg. cōmentario
 p. com. 4. circa
 medium & libel-
 lo de comate post
 prin. & in prin.
 21. de respiratiōis
 difficultate.

e. p. prādic. cō.
 4. in alterā lōgiō
 ri enarratiōe.

f. p. ethicorū. x.

g. 21. de sympto-
 matū causis cap.
 3. post medium.

portunas uires : Dioscoridis præsertim, Galeniq; (si qdē tali de re locuti fuerint) Serapionis quoq; ac Principis sæpiculē testimonio, nōnunq; uerò Pauli, atq; Aetij decretis describētes. Ne scripta nostra apud nasutulos cēsores malē audirēt, nomēq; nostrū sugillationis cōtagio, uel ingrati animi suspitione pollueretur, si sine testimonijs ageremus. tametsi nusq; loca (ne fastidiū parerēt) interseruisse libuerit. Id ipsum uerò perpetim seduloq; obseruādū duximus, ut id de quo aliās præactū iam sit (ne repetita crābe miseros legētes interficiat) minimē repetamus. In calce demū cuiuslibet curatiui capitis curādī methodū, atq; nobis familiaria, & uel quotidianis experimētis cōprobata, uel ab alijs fidedignis experta (pro perfectiori doctrina) subiungemus. Galeni, Pauliq; loca interim quæ difficultatē habent enarrantes.

b. in prin. præfationis.
i. in prin. expōis
pi. libri. de fractu
rit.

Q V O D si uis, atq; munus explanationis est (perinde atq; antea^b præactū fuit) obscuras dūtaxat dictiones elucidare, fieri tamē ab oībus ferē expositōribus (Galeno quoq; i referrēte) cōsueuit, aliqd uidelicet eorū quæ scripta sunt, aut uerū esse demonstrare, aut falsum cōuincere, aut si captiosē qspia accusarit, defendere: licet separatū qd ab explanatione iam eē uideatur. Nos itaq; cōmunē usum insequemur, inutilibus interim quæstionibus omissis, ut nō

k. 4. meth. 4.^o.
in fine & 2. præ
dictionū. cō. 16.
l. pi. aphorif. cō.
p.^o. circa finē.

tātū exponētis, uerū ēt addētis, annotātisq; offitio fungamur. Q V A N V I S autē exq̄ sita indulgētes breuitati: nōnihil tenebrarū nouello lectori offundere: ipsiusq; mētis acie, quæ minus attēta est, ac parū huiusmodi dicēdi breuitati assueuerit, caligine quadā retūdare, ac hebetare, primo statim obtūtu, scripta nostra uideātur: Deinceps tamē, re iam exactius perpēsa: apo

m. 7. meth. cap.
3. in fine.

phthegmatisq; et laconismis, priscorū academiæ (Galeni testimonio^k) familiaribus, iā libratīs, exq̄ sitaq; recognitis, nō mediocrē usū cōferēt. ut quæ præ cæteris qdē cōmodis, adhuc facil

n. lib. de peccatorum animi notitia atq; medela ante medium.
o. lib. 2. cap. 3.
p. 6. ethicorum cap. 3.

Obiectio.

limē, breuiorīq; tēporis interuallo, memoriæ cōmendētur. Nā talis doctrinæ modus (Galeno^l ēt cōsulēte) & ad primā disciplinā, & ad illa quæ didicerimus memoria retinēda: uel si fortē obliuio interciderit, ad memoriā reuocāda utilissimus est. H A V D Q V A Q V A M tamē nos ipsos præterit, laborādū plus multo his fore, q qdē Principis, arabūq; dogmata iam aliās professi fuerint: atq; in prauæ doctrinæ secta sint aliti: Geminū nāq; tēpus (Galeno^m ēt docēte) requirūt: Alterū in quō prauas opiniones dediscāt: Alterū uerò in quō melioribus sese exercesant. Dedocēdi quoq; tēpus prius est, qn grauius q; docēdi: præsertimq; si triginta annis, uel

Responsio.

pluribus, calloso animi scirrhus (ut Galeniⁿ uerbis utar) occupatus homo sit. propter quod thimothēū clarū i arte tibiariū ferūt duplices ab ijs, quos alius instituisse solitū exigere mercedes: ab eis simplices (ueluti Fabius^o testatur) q rudes traderētur. Ei nihilominus magnoperē cōfidēdū duximus, quod ueritas intellectu (cuius bonū est^p) allicit. Est autē & deus ipse optimus maximus sūma ueritas, quæ nostrā mentē & allicere, & lustrare dignetur. A T maximum undiq; strepitū terga nostra lacerantē audituros iam cōcipimus: fatuū. s. hac tēpestate fore, barbaros exponēdo, tēpus ineptē cōsumere. hac inq; tēpestate, qua græcis uniuersa fides (neglectis barbarorū phāstmatibus) adhibetur. Satiū nāq; foret Gal. uel Hippocratis, aut Pauli, q; arabū monumēta enarrare: si pluribus gratiora cōponere intēdimus. Verū si iuste me increpāt: Iustius me Hercule Syluiū nō me fues modō cōmētaria interpretatē, sed Cæstina

riæ quoq; mēdēdi methodos Galeno annectentē: Albanū quoq; turinū: multoq; magis i trepidū nō dico arabū, sed græcorū quoq; mastigē, oēsq; barbaros nauseantē Andreā Vesaliū (q Razis nōnulla interpretari, ornatis uerbis, enitūtur) increpabūt. Quos tamē uiros alioq doctissimos tātū abest ut arguā: ut maxima potius laude dignos existimem, ueluti & Ioannē quoq;

buyerinum

Buyerinum campegium quædam Auerrhois collectanea latinū in idioma cōuertentē: si modo ex proprio illorū idiomate in latinū trāsferret. Minus enim ornatas dictiones in elegantiores traducere, parūq; cōgruas in eas quæ cōgruitate polleant orationes uertere: uel rhetorū, uel grāmaticorū potius q̄ medici munus arbitramur. Itaq; utiliū lōgē fuerit Arabicis literis cōsummato cōfidentes, eorū difficultates, ex q̄bus tāscripserūt authoribus enucleare: medicūq; nomē, q̄ pedagogi gloriā nācisci. Nos autē ultra q̄ græcorū, & latinorū quoq; monumēta elucidabimus: ijs qui adhuc præduro callosq; cordis tumore obstatē, ac nostra præsertim in regione, talē barbaris fidē adhibētēs, ut euangelica dicta reputēt, cōtendere decreuerūt: medelā, suo præ cæteris ex Principe, intendimus. C V M uerō nōnullæ quæstiones dubitatūculæq; à Dinello agitentur: Ne à rudibus & sciolis barbaris nouā hāc, quin antiq̄orē potius, rediuuiam nihilominus doctrinā minimē olfaciētibus mihi detrahatur: Mutulusq; (si eas omiserim) atq; inutilis existimer: pro enucleandis illis, Galeni quoq; uenia (perinde ac antea¹ præassumptū iā est) interpretū abusum quadātenus cōsequi cogar: ac præcipuē ut Dinutij, Gētilisq; illū in cōsultē emulātis, & aliorū ferē oīum innumeræ chirurgicorū dementiæ, (parcāt quorum aures offendūtur, ubi de re utili sermo fiet) deleantur.

q. circa prin. huius præfationis.

Dini dubium primum.

r. lib. p. de officiis.

s. in hippia minore: et in Alcibiade po. et in sophista speciatim uerō in protagora. t. p. metho. 3. et lib. de salubr. ad trasibulū cap. p. u. 4. p. cap. p. in fine.

x. comm. 13.

Quærit itaq; Dinulus hic prius (tametsi importunē, cū chirurgici liber hic minimē sit) quid est chirurgia? quoniam omnis notitia (uelut Cicero^r atq; ex Platone^s Galenus^t quoq; affirmat) eius de quo sit disputatio, à definitione proficiscitur, indeq; exordiū sumit. pro cuius quidē definitionis enodatione, medicinā (quā cū Auicēna sciētiam supponit) in theoricā, practicāq; præsecuit. Deinceps uerō practicā subdiuidēs, in eā quæ præsentē tuetur sanitatē, ac eam quæ absentē (detruso morbo) recuperat. Sub secūdo utriusq; diuisionis mēbro aptiū collocandā chirurgiā duxit. Adeo ut nō temerē tertiā terapeutiā partē affirmare possimus, si pro habitu quidem intelligimus propriē sumpto, nos ipsos rectū ad opus dirigēte. Sini placeat de manuū factione sermocinari, tertiū dicemus medicorū opus. Conātur siquidem hi sola uictus ratione, si fieri quidē pōt (Principe scribēte^u non oēm morbū suo perpetim indigere ut expellatur, cōtrario: uerū satis superq; interdū esse unica dūtaxat uictus ratione deceter uti) quō prospera cū damasceno cūcta succedāt, affectibus obsistere. Hac uerō neque untes ad medicaminū usum trāscendunt. Quo adhuc impotentes, inuiti ad manutigiū impellūtur. Verū enim uerō nobis circa hęc spatari, uagariq; minimē uacat: ut ostendamus cū Rege medicorū Galeno, philosophorūq; protogymnasiarcha Aristotele, nec nō suo fido (in q̄bus potuit) achate Auerrhoe: qn & ipso arabū medicorū Principe, (inuitis suis expositoribus) Auicēna, medicinā neq; scientiā esse, nisi cōmuniter: Sed artē propriē. Neq; in theoricā ac practicā uerē distingui. Cū præcipuē satis superq; nostris in artē medicā cōmentarijs determinatū sit: præter ea quæ amissim ac perpulchrē uir nūq; satis laudatus Ioānes manardus, nosler olim præceptor, suo primo in eandem cōmētario, x tetigit. Certū nāq; nobis est itā uel in omnibus procedere, ut uerē, ac meritō de nobis dici nequeat, q̄ à charta sumpserimus in papyrū trāscribentes. uerē inq; ac meritō: fortassis enim aliquādo nō temerē, at opportunē id fiet. Boni tamē æqui ue Dino fecerimus: cū iuxta sui (quē interpretari conatus est) Auicennæ uerba, famosāq; apud eius interpretes, intentionem loquatur, ut oēs ferē Arabum interpretes suā ipsius opinionem comprobātes habeat. Verum hinc, ab utroq; expositoris munere destitutū esse, liquet. Principis. n. sententia Galeno minimē repugnat:

A ij ucluti

Secundum.

y. lib. 7. in fine
prohemij

z. 3. de compo-
sitione medicamen-
ti

notat y. vii
cap. x. circa me-
dium libri.

a. in principi. 5. et
7. libri.

b. errato aduers-
forum. 5.

Tertium.

c. errato. 4. et. 7.

d. in prohemio
7. libri.

e. in prin. 7. ad
alman.

Ordo partiū
libri.

f. infra cap. 12.
§. 5. in fine comē.

ueluti fusi loco suo demonstrabitur. Hi uero tū falsa, tum a suis (quē interpretantur) authoris
mente aliena turpiter aceruant. Ad secundū uero ipsius quæsitū permeantes, an. f. hic liber,
in tertiā uidelicet, & quartā fen (quas ipse iam exposuisse credidit) atq; etiā quintā distin-
ctus (omissis interim prioribus, posteribusq; tractatibus) chirurgia possit appellari: Respo-
dentem uidimus, haud falsò, à cōmuniter uidelicet loquētib; posse, exquisitiū uerò Pauli se-
xtus: Celsi septimus, & octauus, atq; Albucasis uterq; nec nō quīta huius fen, chirurgia nū-
cupabitur. in qbus seorsum qdē rectus manutigiij modus exhibetur. ubi. n. se medicinæ partes
diuiserint, huic parti ea relinq autumat Celsus, in qbus uulnus fecit medicus, nō accipit: &
in qbus uulneribus ulceribusq; plus perficit manu, q̄ medicamēto: tū q̄qd ad ossa pertinet.
Princeps uerò chirurgiā nō uocauit hūc librū, ut nobis huiusce quæstionis ansa relinquatur. OI
Quod si nomēclaturā hāc alicubi, quod nobis minimè occurrat, attribuisse cōtigerit: nullam in
nōinibus uim uestigātes, nūcupādī modū hūc (improprie licet, largiusq; loquēdo) admittimus:
Si qdē Galeno adhæserimus, dicēti: mutūā opē medicinæ partes regere, tū quæ manu tū
quæ medicamētis, tū et quæ uictu medetur: Maximeq; illā quæ manu curat reliq; duabus in-
digere: à quā nihilominus nomen propriē chirurgus trahit (Celsus etiā docet) ut q ab ea plu-
rimū præstat. Eoq; magis nomēclaturā hāc admittēte cogimur: q̄ chirurgici tumorū omniū
curationes sibi (ob multorū medicorū imperfectionē, ignauiamq;) usurparūt, raptimq; uēdi-
carūt. At prolixius in secūdo nostræ Iatrapologiæ uolumine sermonē de his habuimus.
Quoniā uerò annexas oēs medicinæ partes, curatiuæ inq; uoluit tā Celsus, q̄ Galenus: perfa-
cile fuerit ad tertiū quoq; à Dino propositū dubiū respōdere, quot. f. sufficiāt, necessaria ue-
sint, ad hoc ut aliq; perfectus existat chirurgicus. Ea etenim quæ iam physico nūcupato ne-
cessaria in eodē quoq; Iatrapologiæ secūdo recitauimus, ipsi etiā chirurgus nō utilia modo, ue-
rū simpliciter etiā necessaria, ad perfectionē fere cōcludemus. præterea uerò esse chirurgicus
debet (Celsi d. documēto) adolescēs, aut certē adolescētiæ propior, manu strenua, stabili,
nec unq; intremiscētē, eaq; nō minus sinistra, q̄ dextra proptus, acie oculorū acri, claraq;
animo intrepidus: immisericors: Sic ut sanari uelit eū quē accipit: Nō ut clamore eius motus,
uel magis q̄ res desiderat, properet: uel minus q̄ necesse est, secet. Sed perindē faciat omnia,
ac si nullus ex uaginibus alterius affectus oriatur. Pleriq; tamē eorū q̄ hāc exercēt artē, &
dicūtur restauratores (ut Razis ad almāforē uerbis utar) nō benē eā exercēt, neq; sapiēter,
neq; sub certa radice, ad quā redditio fiat. Immo maior eorū pars casu operatur, & sicut ab
alio edocti fuerint: Raroq; inuenies eorū aliquē, q̄ huius artis libros legerit: aut q̄ eam à ma-
gistro literas noscētē didicerit. Immo q̄ maxime eam exercēt, sunt idiotæ, & rustici, & stoli-
di: (perinde ac hodiē Neapoli rudis qdā, primasq; missæ respōsiones ignorās, ordinis minorū
frater, maximæ apud uulgus authoritatis est) Ideoq; propter suā stoliditatis causam, ægri-
tudines pessimæ in hominibus generātur. **LABORAT** deinceps in sudatq; Dinellus, ut
ordinis rationē perscrutetur. Accipiat q uolūt, Ego uerò superuacaneū reor: Cum nō possit
certa ordinis ratio, perpetuò, ad finē usq; libri, obseruari (q̄q; in plurimis adamussim adapta-
ri queat), quāobrem & ipsemet nōnunq; f. Auicēnæ ordinem reprehendere coactus est.
Sed ne (quod turpe ex Catonis monumento est) nugacium expositorum culpa nos redar-
guat, in his quidem plus q̄ par sit commorantes: Principem loqui exordientem, attento ani-
mo, arrectisq; auribus, ac ueluti ab eius ore pendentes, audiamus.

ALRAIS ABVHALI

ALHASEN, EBEN HALI, EBEN SINA,

DE TVMORIBVS PRAETER NATVRAM.

TRACTATVS PRIMVS.

CAPVT PRIMVM.

IAM LOCVTI FVIMVS IN LIBRO PRIMO de apostematibus, & speciebus eorū, et curis ipsorum, sermonem uniuersalem: ad quem redire oportet illum, qui uult audire quod nunc loquemur. In hoc autem loco loquemur de eis, sermonem particularem.

COMMENTVM PRIMVM.



QUANTOQVAM barbarè scripta ipsius Auicennæ uerba sunt. Maioris tamē fidei gratiā, ne grāmatici nomenclaturam desiderantes, inutiles interdum in barbarorum nominum libramento atq; examine euadamus (ueluti præsens commentum ponderanti liquere perfacile potest) non secūs ac antiquitus traducta ex arabico in latinum sunt, recitare ad finem usq; decreuimus. Sic n. & Leoniceus, & Manardus, Mattheus

Curtius, ac Fuchsius, & demum omnes latini græciq; idiomatis peritissimi, & aliorum arabum, & Principis etiam uerba in medium adducere consueuerunt: ne calumniam, aliter uertendo, paterentur: cum Arabicæ linguæ penitus expertes extiterint. Nihilominus tamen deprauatos interim contextus (ubi occurrerint) ex bellunenſi ut plurimum: quādoq; uerò ipsius met ex aliqua Principis alibi dicta sententia, uel à quo transcripserit authore, rectiorem authoriq; conformiorem semper sensum eligentes, quēadmodum & ex uarijs codicibus eius doctrinæ propinquare determinantes, omni semoto liuore, corrigere prò uiribus enitemur. **INTENTIONEM** ergo simul (ut ad propositū cōuertamur)

ordinemq; tum scribendi: quem ipse obseruauit, tum etiam discendi: quem nos quoq; scitari debemus, exhibuit. Intentio quidē huiusmodi est de uocatis apostematibus particulariter determinandum. Ordo uerò, quem in scribendo iam obtinuit, est ab uniuersalibus ad particularia procedere. Cui quidem nos quoq; adhærere debemus. Quadere ad ea quæ

20 primo in libro ^a uniuersaliter dicta sunt, eum reuerti præcipit, qui quæ hic dicenda sunt percepturus est. prænarratum uerò à nobis iam alibi ^b est non in theoricis modo, at practicis quoq; factiuisq; artibus idem perpetuò obseruandum: ut ab uniuersalibus inq; ad particularia permigremus. **QVO** autem singula iuxta authoris prius (quem interpretamur) mentem: deinceps uerò iuxta ueritatem perpendantur: ad ea quæ primo iam libro uniuersalius pertractata sunt, reuersi: multa quidem non posterganda inuenimus. Secunda nanq; primi libri fen, ^c de passim uocatis ab ipso apostematibus, eorumq; speciebus: perinde ac deinde, fen eiusdem quartā, ^d de curationibus ipsorum, sermone quidē uniuersali locutus est. Prius inq; de apostematibus, eorumq; speciebus, ab ipsorum essentia exorsus. Etenim

A iij quia

Intentio libri
& ordo tonus

a. fen. 2^a doc. p^a.
cap. 5. & fen. 4^a.
p^a. cap. 25. & fen.
quonibus.

b. p^a. lib. i. arapoz
logiæ cap. 5. et in
collegio medicorū.

Eorū quæ pri
mo lib. dicuntur
repetitio.

c. tra. p^a. cap. 25.
d. cap. 25.

de quo. tr. sequenti
cap. 2. com. pri.

Apostema se-
cundum Aui.

Quid?

e. in hoc eodem
commēto.

f. 4. simplicium
medicamē. p. &
lib. de inæquali in-
temperie. 6. et p.
de sympt. cau. cap.
6.

quia tria sunt morborum prima genera (prout uniuersa Galeni, cæterorumq; medicorum
schola reclamatione) intemperies , uitiata compositio , atq; unitatis continui ue solutio , Non te-
merè statim ambigere quis possit , quò eius de quo loquimur essentia pernoscat : sub quo
genere uocatum ab arabicis apostema à græcis uerò (si nomen significatu compar ueliga-
rimus) uetustioribus quidem οἰσμήνη : nunc uerò passim ὀνκος atq; à latinis cōmuni dictio-
ne tumor , comprehendatur ? Cui protinus ab initio necessariò enodandæ difficultati satisfac-
cisse uolens , non simplicem morbum esse hunc , quem & cognoscere & curare nunc inten-
dimus , ait : ac per hoc neq; illorum unico sub genere comprehensum . Sed ex triplici iam di-
ctæ morborum differentia compositum : intemperie inq; , mala compositione , atq; continui solu-
tione . Intemperie quidem calida , uel frigida , humida , uel sicca : uel quæ ex ijs commixta
sit : calida inq; & sicca , calida & humida , frigida & sicca , seu demum frigida & hu-
mida : humori , à quo quidem oriunda est , proportionali . Vitiata uerò compositione : figu-
ra uidelicet , cum tumor præter naturā auctus , ob aceruatos humores , uel aliquid illis pro-
portione respondens , factus sit : adeò ut affectæ partis actiones impediatur : quarum tumorē
continentium causarū ratione , tum repleti obstruiq; , uel condensari meatulos , tum etiam si
quæ amplior membro capacitas insit , eam diminui necessum est : quin & asperam natura
superficiem extensione interdum leniri , lenem uerò tumoris inæqualitate exasperari non
infrequenter contingit . Nonnunq; uerò numerus quoq; deprauatur : ut in oculi pterygio
(quem nostri unguem indignant) præsertim apostematis nomine latius iuxta principis de
creta (perinde ut infra demonstrabimus) assumpto . Siq; animalcula quædam , in ipsa tumo-
ris apostematis ue cauitate , generentur : sæpiculæ autem & uniuersi affecti membri magni-
tudo augetur : Nonnunq; uerò articulum intercidentis cuiuspiam substantiæ ratione , situm
quoq; partis lædi contingit . Vel omnia igitur ad organicorum compositionem pertinentia ,
uel horum plurima offendi , atq; in magnis præsertim effatq; dignis tumoribus apostematis-
bus ue , necessum est . Quorum nihilominus uisiorum , quæ primò ac perse actiones impediunt ,
ea per semet in morborum catalogo computanda , componentiumq; morborum numerum cu-
mulantia sunt . Quòd si alterius à se inducti ratione offendunt , ad causarum gregem redu-
cenda : quemadmodum si obesse neutiq; ualeant , ad symptomatum syndromen aceruum ue
transferenda fuerint . Sed ne in his quidem duobus duntaxat uisiorum generibus tumor
apostema ue lapsus est , simplicium inq; primarumq; partium intemperie , atq; organicorū
compositione : uerum & in ipsa utrisq; partibus communis unitatis , uel abdita , uel rudi-
bus etiam propalata dissolutione : præcipueq; si exquisitiùs dictum græcorū apostema (què
abscessum nuncupamus) extiterit . Abdita inquam , ea uidelicet quæ uehementioris uni-
uersimq; & uiolentia quadam inuadentis caloris , uel frigoris , uel etiam siccitatis dolorem ,
hac media (Galeni sententia f) inlucentium ratione accidit . omnibus autem uel rudibus
pernota , ea quæ , ob extensionem ab humore , uel spū , uel quouis alio replete , partesq;
intercedēdo abinuicem abscedere cogente , facta est . Eoq; magis quò ad uigorem tumor
propinquius accedit : Quo quidem tempore maxima , ob feruentis materiæ (siquidē calida est)
dilatationem : uel saltem (si non calida sit) copiam , extensio maximusq; deinceps , plenioris
utris instar , renixus superuenit . Itaq; haud simplex morbus nominari quiuis tumor potest ,
quod apostematis nomine Princeps indigitat : uerum ex triplici genere (ipsius dogmate) cō-
positus .

positus. Quam profectò sententiam idcirco minimè reijciendam duximus: quoniam Galeni quoque medicorum phœbi fuisse (præter apertam rationem) cognouimus. Qui quidem uel in phlegmone (præter intemperiem) tensionis lacerantis ratione dolorē cōtingere ait: & Adeò ut in pleuritide membranæ inq̃ costas succingentis inflammatione, doloris utranq̃ causam, uidelicet intemperiem, ac manifestā unitatis solutionē, medicè magis, & clariùs (ut alibi ^b ostendemus) loq̃ uolens, assignauerit: præter quas à naturali quoque habitu in quantitate recedere affecta mēbra, Eugenianū docēs ⁱ declarauit: secundū oēs scilicet dimēsiones longū, latū, & profundū: adeò tamē ut naturæ actionibus officiat, perinde ac de oībus præter naturā tumoribus sermonē habens ^k indigitat. Aliter enim symptoma nō morbus tumor ipse (quē ¹⁰ admodū & cūcti præter naturā facti lapsus functionibus minime obstātes) existere ab eodē alibi ^l declaratur. Ex tribus ergo morborū generibus cōpositū esse Arabū principis apostema, tumorem uē (ipsius met sententia uel à Galenō comprobata) demonstrauimus.

QVONIAM uerò diuinissimi Platonis præceptū extitit nō tantū à Galenō, ^m sed Auerroē ⁿ quoque recitatum, de principijs q̃dem lōgum haberi sermonē oportere: paruus n. error in principio (philosophorū spirarchi ^o testimonio) causa est maximi erroris in fine. Idcirco superfluum uidetur minimè, quin operæpretium potius, quid sit apostema, quid uē apostematis nomēclatura (abscessum latini uocant) apud græcos, atq̃ arabū interpretes, intelligēdum, & prolixius, & clariùs, aliq̃ calle incedētes, enodare. Diuersos n. (quod barbaros ferè omnes, cum physicos, tū chirurgos latet) hosce auctores à se inuicem offendimus. Multò nanq̃

²⁰ largius hoc nomine Razēs, atq̃ Auicēna, cōteri q̃ post ipsos barbari usi sunt, q̃ græci: cum illi nomē id (ueluti prætactū iam ^p est) capiant, pro quolibet præter naturā tumore: cui maiora qualitas, & cōtinui dissolutio cōnectuntur. Adeò ut ad carnis incremētum additionē uē (prout est ab his uocatū morum) formicasq̃, & acrochordonas extendāt. Quāobrem & propriè dicta phlegmone, erysipelas, herpes, gangræna, sphacelos sideratio uē, ac cōteri demū (id genus) tumores, ab Arabū principe (omīssa reliquorū caterua) in apostematū catalogo cōnumerantur: quēadmodum œdemata quoque, ac scirrhi, quin & ipsi etiam dracunculi. At uerò secus à medicorū lucidissima stella, cōterisq̃ græcis habetur. Quauis enim largius, improprieq̃ loquēdo, & ὁστροῖς (abscessum latini uertūt) interdū ^r pro euacuationibus etiā per effluxū acceperit Hippocrates, ut dysenterias, tensesmos, hēterias, aluiq̃ fluxiones: nō ³⁰ nunq̃: uerò pro morbi alicuius in aliū trāsitu: ut quū ex alijs febribus ac morbis abscessus in quartanas factos esse pronūtiabat. Propriè tamen apud græcos idem est, quod ὁστροῖς, tumorq̃ præter naturā intelligitur, in quo spatium intermediū, uacuum uē quodpiam fit: ad quod q̃dem ueluti ad sinum quendā materia colligitur. Adeò ut quæ prius se cōtingebant, corpora nunc abinuicem distent. Idipsum uerò dubellet, uel cum articulo aldubellet: ac dubellati similiterq̃ aldubellati nominat Princeps. Ex quo Galeni, Pauliq̃, & reliquorum deniq̃ græcorum ὁστροῖς, latinorum uero conformiter abscessus; Auicennæ dubellet, siue aldubellet est (quemadmodum apud ipsum ^t perpendere licet.) Vt autē quod diximus elucescat, inutile quidem haud fuerit, uel ab re Galeni uerba recitasse: cū præcipuè nouum quoddam id portentum barbarolatini nebulonibus nihil profundè speculanti- ⁴⁰ bus appareat. Inquit ergo medicorum imperator Galenus (Expleto iam de scirrhosis, inflatisq̃ tumoribus sermone) Iam tempus opportunum occasio uē est, ut transcamus ad ab-

scessuum

g. 2. aphorif. com. 47. 2. reg. acut p^o. commēto. b. infra cō. ultimo huius pⁱ. capitis.

i. 13. meth. ap^{ri}n.

k. lib. de tumor. præter naturam. cap. p^o.

l. lib. de morborū differentijs cap. 12.

m. pⁱ. simplic. 21.

n. 3. de aīa cō. 4.

o. pⁱ. cæli 33.

Apostema secundū græcos, atq̃ arabes.

p. supra in hoc eodē cōmē. ex 2^a. pⁱ. doc. p^a. cap. 5. q. ut infra. capitibus proprijs islorū p³.

r. p^o. de morbis. uulg. cōmentario 2. tex. 35. 36. s. ibidem. tex. 21.

t. infra cap. 21. & 2^a. pⁱ. doc. p^a. cap. 5. & 12^a. 3. cap. 9. in prin. & 14^a. 3. tr. 3. cap. x. in prin.

u. 2. ad Glaucōnem. 7.

scessuum tractationem : Sic aut nominant eas dispositiones, in quibus inuicem distant, quæ prius se inuicem contingebant corpora. Spatium uerò uacuum in medio fieri necessum est: Quod aliquam substantiam spirituosam, flatuosam ue, aut humidam, aut mistam ex utrisque comprehendit : Ad hoc uero ex inflammationibus quædam atque ex erysipelatosi & inflammatis phlegmonosis ue non pauca transmutantur (erysipelatosi & inflammatis phlegmonosis ue dispositiones) (ἐρυσιπέλας τῶ δ' αἵματος græcè, καὶ φλεγμονώδεις) appellat, mistas ex utroque humore inæqualiter, bili inque, ac sanguine : primas .s. in quibus bilis, secundas uerò in quibus sanguis ipse superabundat. has enim, prout infra uidebimus x, erysipelatosi erysipelaceas ue inflammationes : illas uerò inflammata phlegmonosa ue erysipelata nuncupare græcorum consuetudo est. & si ex alijs quoque humoribus uni, uel duobus, aut etiam tribus complicari admisceri que tum sanguinem, tum bilem sæpiculè contingit : ut erysipelatosi œdemata, scirrhus ue, aut phlegmonosis hosce itidem affectus intelligere queamus.) Sine his uerò etiam abscessuum apostematum ue dispositio consistit, ex superabundantia excessu ue quorundam humorum, aut spirituum uaporoformum : siue in ipsis patientibus partibus in medio generentur, aut ex alijs confluant : earatione qua fiunt illa, quæ decubitus, ἀποστήματα græcè uocantur (catharros Arabum Principis traductor y appellauit) Nominant uerò sic huiusmodi dispositiones : quum qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto ad alterum transmutantur. Quocumque uerò modo fiat abscessus apostema ue, id spatium, quod abscedentes interiacet partes, humiditatibus, quæ ipsum faciunt, impletur : Quæ ubi aliquando perdurauerint, plures habent alterationes. Nam & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, atque carbombonibus, & limo, & sorditiei balnei, feci, siue amurcæ, & multis alijs talibus similia in abscessibus corpora contineri inueniuntur. Quamquam iuxta Pauli sententiam aptius id nomen prioribus abscessibus dedicatur. ijs inque qui ex inflammatione, aut inflammatis erysipelaceis ue tumoribus oriundi sunt : ueluti Principem quoque posterius innuere demonstrabimus. Duplex igitur (siquidem rectè perceperis) apostematum abscessuum ue genus prædictum est, perinde ac ab eodem quoque aliàs non semel didicimus : unum quum phlegmone in pus uersa, pus ipsum tanquam in finem aliquo est collectum. Atque id ipsum duntaxat author libri definitionum medicarum intellexit, quum ait : apostema est mutatio corporis ex inflammatione in pus, Pliniusque similiter, dicens, suppurationibus quæ græci uocant apostemata, idem quoque genus indigitare uidetur : tametsi non necessario quodlibet apostema suppurationem esse concluditur. par enim sermo esse, ueluti si quispiam dixerit & hominibus, quæ animalia dicimus & potest. In eam nihilominus ego sententiam magis inclino, ut latinorum suppurationem idem cum græcorum apostemate fuisse Plinius : quemadmodum & Medicarum definitionum author, intellexerit. id quod nonnulli quoque græcorum crediderunt. Quauis oppositum plurimi (Galeno referente) uelint. Eos .n. qui in consuetum bonumque pus immutantur, abscessus appellandos minime censent : Sed illos duntaxat qui in aliam quandam corruptionem conuertuntur. Alterum uerò apostematū genus est : quum nulla præcedente phlegmone humor aliquis statim ab initio, isque aliàs specie alius, cæterum omnino acris, in parte aliqua colligitur. Porro excoriat hic circumposita corpora : spatium uidelicet sibi moliens, uel inter duas tunicas, uel sub certis membranis. Excoriat autem omnino apostema,

x. com. 13. huius
pi. capitulis.

y. 1^a. pi. doc. p^a.
cap. 5. post. principi.

z. lib. 6. cap. 37.

a. infra cap. 21.
tex. 3.

Apostematum
genus duplex.

b. uide 14. meth.

cap. 12. lib. de tu-
mo. præternat. 4.

c. post medium.

d. lib. 20. cap. 3.
circa medium,

e. lib. de tumor. præ-
ternaturam cap. 3.

„ apostema, copia distendens: interim uerò putredinem quandā tempore contrahens. De
 „ utroq; autem apostematis genere simul intellexit Paulus f, ipsum communiter hoc pacto f. lib. 4. cap. 18.
 „ definiēs: ἀπόστημα τοῦτον ἐστὶ φθορὰ καὶ μεταβολὴ σαρκῶν, ἢ τοὶ σαρκῶδες οἶον uersus finem.
 „ μὲν, φλεβῶν, ἀρτηριῶν. hoc est. Apostema ergo abscessus ue est carniū, seu car
 „ nosarum partium, nempe musculorum, uenarum, arteriarū corruptio, mutatioq;. Si quis
 „ autem refractaria Minerua præditus, anceps adhuc fuerit, An Principis dubellet seu du
 „ bellati hoc idem importet, quod à græcis apostematis nomine indigitari, & à Galeno g de g 21. ad glauco. 6.
 „ finitum ostendimus: ipsum met inferius h perlegat: quū de exitura locuturus dicit: Qua h. 14. meth. cap. 12.
 „ si nomen aldubellati cadat super omne apostema existens in loco uacuo uel concauo, ad quē h. cap. 21. in pri.
 10 effunditur materia aliqua: & remanet in eo quæcunq; materia sit. Exituram uerò ipsi
 „ us dubellati speciem esse uolens, ait i, ex summa esse dubellet, quæ collectionem faciunt: i. ibidem: & 24.
 „ eam. s. speciem quæ calida est, non frigida, pusq; aggregat: quū interdu generis nomi pi. doc. p. 4. cap. 5.
 „ ne talem exituram indigitans, ut quū de mamillarum, k atq; stomachi l, & hepatis m aldu ante mediū &
 „ bellati collectionem faciente, pusq; aceruante loquitur, ansam pluribus dederit exituram clarius secundum
 „ dubellati æqualiter cōfundere. Iam igitur liquet nec phlegmonem, aut erysipelam, neq; bellunēsis tradu
 „ herpetem formicam ue arabum, ac cæteros id genus maxima ex parte cutaneos tumores, ctionem.
 „ apostemata, græcorum more loquentibus, dici posse: Nam in phlegmone non coacerua k 12. 31. cap. 9.
 „ tur ad concauum sanguis: Sed ad primorum (uti Galenus n ait) corporum spatiola (poros l 13. eiusdem
 „ græci nominant) quæquidem sola ratione (ipsius eiusdem autoritate o) contemplamur: tr. 4. cap. 9.
 20 licet ea quæ interaneis ossium partibus existunt, sensui quoq; manifesta ob duritiem (uel m. 14. eiusdē tr.
 „ ipsomet p, præter experimentum, teste) uideantur. ex quo spongiosas illas ossium partes 3. cap. x.
 „ chirurgicorū uulgus appellat. Ad primorum inq; corporum spatiola poros ue sanguis, par n. de inæquali in
 „ tim per uenarum ora, partim per tunicas transmissus, effunditur, resudatq;. Replentur temperie cap. 2. et
 „ ergo illa prima corpora, nerui. s. ligamenta, membranæ, caro ipsa, tendonesq;, cutis, & ossa, 4. 14. meth. 2. p.
 „ anteq; hæc arteriæ, & uenæ, instar lanæ, & spongiæ, humore aliquo infusæ: atq; (ut idem prognosti. ultimo
 „ quoq; medicorum Spirarchus ait q) cuilibet carnis particulæ roris modo immiscetur. Idem & de tumo. præ
 „ quoq; de igne sacro, quod erysipelas græce dicitur, herpeteq; determinandum. (quanuis hi ter naturam. 2.
 „ affectus à flaua bili oborti magis q; propriè dicta phlegmone ad cutim uel cuticulam uer o. 6. aphorismor
 „ gant) grangrænam pariter, ac siderationem sphacelon ue, nec semper apostemata, neq; (pro rum com. 20. 13.
 30 ut nonnullos inconsultè machinatos esse deinceps ostendetur) ulcera confitebimur: nisi quū meth. dist. p. 4. cap.
 „ abscessus, aut ulcus eorum principium existit. tunc enim seruare ad finem usq; apostema 2. in principio &
 „ tis uel ulceris naturam potest: Galeno met alibi r docente, morbu in principio & fine eius 9. de usu partium
 „ dem esse speciei. Adhuc autem nil aliud uel gangræna, uel sphacelos est, q; mortificatio, p. 0. circa medium
 „ hæc quidem facta, illa uerò fiens. Quæ si ex obstructione sola, uel ab extrinsecò adstringen & 4. de ratione
 „ te, uirtutisq; animalis transitum, quin uitalium spirituum, nutrimentiq; aduentum prohibēte, uic. acut. com.
 „ succedat, uel à lurido quopiam perniciosoq; aconito, aspidis ue, aut cuiusuis ueneno. anima 21. post. p. 4.
 „ lis morsu, qualitate duntaxat ijs sæpiissime enecantibus, originem duxerit, apostematis nos p. de inæquali in
 „ menclaturam sibi uendicare nequaq; poterit. Ad nos itaq; reuersi, concludamus apostema 2. 9. de
 „ tis nomen cōmuniori, q; græcorum modo, in præsentī textu, ueluti & in barbarorum omni usu partium po.
 40 bus traductis monumentis assumptum: Ni traducentium garrulitate contingat, quod nihilo uersus medium.
 „ minus q; minimi fore momenti arbitramur: Satis. n. superq; nobis impræsentiarum extiterit, q. lib. de tum. præ
 „ passim ternaturam 2. in fine & 14. meth. cap. 2.
 „ r. p. de locis af sec. cap. 2. & lib. de particularibus morborum tempo ribus cap. 2.

Not.

s. lib. ad bonas artes exhortate post medium.

t. lib. de salubri an ad gymnasticā pertineat. cap. 32. u. ibidem.

Bothor quid?

x. 2^a. pi. doc. p^a. cap. 5. in princ.

y. ubi supra.

z. p^a. 31. tra. 3. cap. p^a. circa pri.

a. 7^a. 31. cap. p^a. post mediū.

An cerebrum

et ossa possint

apostemari.

b. 71. aphori. 73.

sexti. 45.

c. 71. aphori. 54.

d. ibidem.

e. 71. apho. 50.

f. xi. metho. 18.

in prin. & 41.

de locis affectis p^a.

et 31. 5. et 31. 3. et.

2. de sympt. cau-

sis. 7. post mediū

4. de præsagi. ex

pulsibus cap. 9^a

prin. & uide p^a.

prorrheticorū cō-

mētario p^a. cōm.

p^a. & sæpe.

g. 31. 6. 7. et. 8.

h. sexti. 25.

i. lib. curationum

cap. 9. x. & xi.

k. pi. 13.

l. lib. diuisionū.

cap. 6.

m. 2^a. pi. doctri-

na p^a. cap. 5. p^a.

3. tr. 3. cap. p^a. in

prin. & cap. 4.

& 5.

n. 4. colliget

ca. 4. 6. post medi.

o. 9. theor. cap. 4.

passim uagantes barbarorum contextus græcis atq; latinis comparare. uerum enim uerò nō de nominibus certare, præter necessitatem, à nasutulis carpi timerem (oportuit enim hucusq; sermonē protelasse, quò rerum differentias nōnūq; pernouerimus) proculdubio barbaros respuerem. Sequendum nanq; in græcis nominibus græcos, non barbaros, in latinis uero latinos, atq; in barbaris barbaros, & lippis & tonsoribus liquet. cum unicuiq; propria in arte (Galeno^s et docente) cedendum, uelutiq; peritiori confidendum magis sit. Quaderè, cum præcipuè nihil eruditum de nominibus in medium adduci posse, in uniuersum Galenus pronuntiarit, siue assyriorum linguæ uocabulum sit: ab ipsis assyrijs rem discendam esse, cui nomen illud indiderunt: siue sit persarum linguæ, aut indorum, aut arabum, aut æthiopum, aut omnino aliorum quorundam, illos percunctari oportere, thrasybulum admonuit. ^u Quo-
quidem consilio deinceps conducti ab ipsomet Arabum Principe nominis Bothor significati-
onem efflagitabimus, paruum nanq; apostema esse: quemadmodum & hoc simpliciter pro-
latum, Bothor magnum indigitare ait: x quod simpliciter dictū Bothor, sequenti cōtextu, pu-
stulæ uoce (ut uidebimus ostendit) apostema reliquum absolute pronuntians. Hæc de apo-
stematis, atq; Bothor eminentiæ ue (ut aliqui interpretantur) tum nomine, tum essentia,
in tantum dicta sint. QVIBVS præostensis (ut ad ea, quæ uniuersaliter primo libro dicta,
de ipsorum quoq; speciebus differentijsq; sunt, complenda reuertamur) communi penes
affectam sedem distinctione princeps usus est: Quoniam uel mollem. s. partem, ut carnes
ipsumq; etiam cerebrum (perinde ac alibi ratione quoq; comprobans adiunxit ^z uel duram,
ut ossa, speciatimq; (ueluti & aliàs, Galeni quoq; demonstratione, confirmat^a) dentes. ²⁰
Quibus quidem & mediam pariter adiungere, subintelligereq; debemus, ut neruos, mem-
branas, ac tendones, quin cartilagine, & ligamenta tumor ipse apostema^a ue obsidet. Quā
profectò distinctionem, sententiam ue ex medicorum quoq; protoplasto Hippocrate^b, eiusq;
protogono Galeno^c elegimus. qui & ossa (ut à duris exordiamur) nonnunq; abscedere,
uerumq; apostema pati consentitur. considerandum nanq; (dicebat Galenus^d) si possibile
est illud quod dicit: Noscentibus nobis, q; uiam semper materiebus inuenire naturam Hip-
pocrates opinatur, quando ualida fuerit: & si illæ sint crassiores, & per angusta forami-
na debeant permeare: quando & per ossa fieri inquit abscessus. Alibiq; etiam cerebrū
gangrænā pati: quod ibi sphacelari (largius capto nomine) dixit Hippocrates, nedū phleg-
mone uexari posse, pro comperto supposuerunt. quam quidem cerebri inflammationē phre-
nitidem, uel phrenitidis causam esse quamplurimis in locis Galenus ipse f exprompsit. cum
s. suis membranis in recipienda inflammatione consentit. Quem deinde medicorum impe-
ratorem, & Paulus^g, & Aetius^h: anteq; hos Oribasiusⁱ, & Alexander^k, absq; li-
uore infectati sunt: quin & Razes^l, Arabumq; Princeps^m Auerrhoesⁿ quoq; & ha-
liabbas^o, ac demum tota & græcorum, & arabum schola confirmat. tametsi Oribasius,
Paulusq; & Aetius, atq; ipse etiam arabum Princeps, præter eam cerebro & membranis
communem phlegmonem, phrenitidis causam existentem: ipsius duntaxat similis substan-
tiæ cerebri phlegmonē seorsum à phrenitide pertrahant. Quam profectò phlegmonem,
gangrænāq; quin ipsum quoq; sphacelon siderationem ue apostematis nomine barbarorum
caterua sæpe sæpius indigitare consueuit. Atq; alijs quidem locis uel currentibus (ut ita
dixerim) oculis, obiterq; serè uisis: sedulo tamen, ac maturè Galeni uerba de iniqua intē-
perie

oi

20

30

40

„ perie sermocinantis, perlibrato, quum ait. ^p Ac quæ in uentriculum incidunt abscessionum ^{p. cap. 3. post me-}
 „ optima est, quæ in sinum eius internum abiit: in quem etiam plerūq; se aperiūt: Mala ue- ^{dium.}
 „ rō quæ sub peritonæum. Pari modo in ijs quæ circa cerebrum existunt, bona est quæ in prio-
 „ res eius uentriculos abscedit: mala quæ sub inuolucro eius, item quæ in posticum eius uen-
 „ trem se recipit. Qui uerò circa costas abscessus colliguntur hi in capacitatem erumpunt
 „ thoracis &c. quo quidem in loco si recte perlibraris, & cerebri, & costarum abscessus, ne-
 „ dum phlegmonē fieri supponit. Quam porrò dentes etiam aliquādo suscipere, uel ipsi phleg-
 „ moni quippiam simile pati, iam alibi ratione ^q quam princeps (uti uidebimus^r) transcripsit
 „ comprobare, nedum simpliciter proferre offenditur. Quo etiam loquendi modo (ut phlegmo-
 „ ni .s. per similem affectum in ossibus concedamus) de fractis aliquando ossibus loquens ^s
 „ usus est. Nec sanē miror, inquiens: si phlegmones quidam simile etiam ipsis fractis ossi-
 „ bus ad portionem accidat. Quamobrem de mollium simul, durarumq; , & mediocrium par-
 „ tium tumoribus præter naturam, speciatimq; de phlegmone sermonem habens, ^t ait. Quod
 „ uerò omnis quoq; caro (cuius iam maximeq; affectio est inflammatio) repleti fluore san-
 „ guineo uideatur, & color, & tumor ipse ostendit. quare & humida omnis & madescēs,
 „ uti lana & spongia apparet. Huius rei testis est, quæ effluit sanies: quum inflammatio ho-
 „ stiolum habet. Iurē autem arbitror & ipsa cutis unā cum tumoribus eorum quæ subiacent,
 „ attollitur, & circumtenditur, & interposito tempore ipsa etiam de fluore aliquid accipit. uti
 „ uasorum quoq; tunica. sic etiam & ipsæ, quæ in inflammata parte sunt, membranæ: quin
 „ etiam ipsi nerui, & tendines, tempore procedente ipsius inflammationis participant. In-
 „ terdum tamen uulneratis ipsis aut aliter affectis, ex illis ipsis primò ipsum malum incipit.
 „ uniuersaliter uerò nihil inflammatae parti, secundum naturam, exacte se habere perseue-
 „ rat, quum mora inflammationi est. sed omnia cum carne de fluore fruuntur: ut nōnunq; ip-
 „ sa quoq; ossa attingat. quemadmodū ex ipsis promouetur interdum primò affectis &c. Cu-
 „ ius quidem Galeni uerba satis superq; cōtemplatum esse Principem (si recte perlibraueris)
 „ liquet. QVONIAM uerò serapio^u tam Hippocrati & Galeno, q̄ eos insequentibus
 „ omnibus barbaris nedum græcis aduersari, Marte proprio uisus est (tametsi apostema in
 „ cerebro, & frigidū & calidum proposuerat. ^x) sic exquisitiū postea loquens: Et quā-
 „ do accidit in cerebro: nō oportet ut iudicetur, quia est in ipso cerebro: immo in uelamine du-
 „ ro continente ipsum; quod nominatur menynga. & est illud ex quo nascitur uuea tunica
 „ & secundina (tenuem per hæc membranam intelligens, quæ χοροειδής, choriformis à Ga-
 „ leno ² nuncupatur, à barbaris uerò secundina. à qua quidem χοροειδής, uuea .s. tunica
 „ oculorum exoritur. quaderē sic legendum fortassis est & ex quo nascitur uuea tunica, & est
 „ secundina & subditq; deinceps: Quia nos scimus q̄ in omni membro, in quo fit tensio, acci-
 „ dit apostema: Sed non est in natura cerebri, ut recipiat tensionem, propterea quia est hu-
 „ midum currens. Et similiter non est in natura ossis ut recipiat tensionem, propterea quia
 „ est frigidum & siccum, & durum ualdē. Est ergo necesse ut non accidat tensio nisi mē-
 „ bris quæ sunt inter id quod est in fine duritiei, & inter id quod est in fine lenitatis: Sicut
 „ sunt panniculi, & ligamenta, & nerui, & lacerti, & caro, & quæ sunt illis similia.
 „ Talem igitur Serapionis phantasiā sufferre noluit Princeps, ubi communiter loquebatur
 „ prius, ita exordiens. ^z Apostemata præterea membrīs accidunt mollibus, & est etiam quum
 „ ossibus

q. 5. de compo.
 med. secundū loz
 ca. cap. 4. ante me
 dium.

r. paulo infra.
 s. 6. meth. cap. 5.
 circa medium.
 t. libr. de tumor.
 præterna. cap. 2.
 uersus finem.

Caro.

Cutis.

Vasorū tuni-
cæ.

Membranæ.

Nerui.

Tendines.

Ossa.

Serapionis

opinio.

u. p^o. breuiarij
 cap. 20. in prin.

x. ibidem. cap.
 17. in prin.

y. 8. de usu par-
 tium cap. 8.

Serapionis

locus.

z. 2^a. pⁱ. doc. p^a.
 cap. 5. post. prin.

ossibus accidit res, quæ apostemati similatur, per quam eius ingrossatur magnitudo, & eius
 augmentatur humiditas. rationemq; huius extemplo adiungens inquit. Neq; est mirum
 aut extraneum, q; recipiens augmentum additionem uel cum nutrimento, recipiat eâ. s. addi-
 tionem cum superfluitate: quoniam in ipsum penetrauerit, aut in ipso acciderit. Tam deflus-
 xui, q; paulatim aceruatæ materiei relatum apostema, ijs ultimis uerbis (quicquid nonnul-
 li sônauerint) indigitans. Deinceps uerò, tametsi de cerebro loqui intenderet: de utrisq;
 tamen, cerebro inq; mollibusq;, ac ossibus duris uel omnibus (repetita Galeni rursus ratio-
 ne) sic expressius contra Serapionem ait. ^a Non enim est quemadmodum quidam existi-
 mant medicorum, q; cerebrum ipsum non apostematur: sic ratiocinantes. Nam quod est
 lene sicut cerebrum, & durum sicut ossa, non extenditur: Et quod non extenditur, non
 apostematur. Hic autem sermo est erroneus, & illud idèd, quoniam lene uiscosum extendi-
 tur, & ossa etiam apostemantur. Et Galenus illud confessus est. ^b Et nos monstrabimus
 sermonem de eo in capitulo dentium. ^c Immo dicimus quod omne quod nutritur, extendi-
 tur, & augmentatur cum nutrimento. Et similiter est possibile q; extendatur & augmen-
 tetur cū superfluitate: Et illud est apostema. Exequitur autem quod promiserat (ne men-
 dax inanisq; reputetur) quoniam de dentibus sermonem particulariter habuit, Galeni adhuc
 rationem repetens, ^d ijs uerbis. ^e Et quandoq; accidunt eis, s. dentibus species apostematū.
 Et illud quidem non est mirum: omne n. quod recipit extensionem cum augmento nutrimen-
 ti, non elongatur quin recipiat extensionem cum superfluitate. Nam si non reciperent ma-
 terias penetrantes in eis, augmentantes eos, non fierent uirides, & denigrarentur. Illud
 n. est, propter penetrationem superfluitatum in eis: Et dentes quidem creati sunt recipien-
 tes augmentum & additiones semper. ut sit eis illud loco eius quod conteritur. Ita q; dēs
 oppositus, loco eius qui cecidit & eradicatus est, augmentatur in longitudine cum sit addi-
 tio conueniens ei, & non opponatur ei contritio. Quæ qdem uerba (uelut prædiximus)
 è medicorum phœbo transcripta sunt: ubi priuatim de dentibus loquebatur: quem pari pa-
 zto referre (quod ipsius Auicennæ furtum liqueat) minimè grauabor. Sic ergo inquit:
 Si uerò luidi per omnem suam substantiam facti appareant dentes, nihil mirum est ipsos qd
 inflammationi simile pati, Cui rei ex eo quis amplius fidem habeat, quod ex nutrimento
 ferè per omnem animantis ætatem incrementum accipiant. Id quod euidenter, sæpenu-
 rò apparet in his dentibus qui exemptis oppositi sunt, ut potè qui semper augeſcunt. Quā-
 diu uerò augeſcunt, tantum in ciborum manu deteruntur. Quoniam uerò impossibīle
 sit incrementum accipere citrà nutrimentum: omnino duabus affectionibus, & his contrarijs
 obnoxij erunt, inopiæ uidelicet, & redundantie alimentum quod eis suppeditatur. Inopi-
 pia igitur aridiores, & macriores, alimentumq; non sentientes, & ob id tenuiores eos red-
 dit. Redundantia uerò consimilem in eis affectionem excitare potest, qualis est circa car-
 nosas partes inflammatio &c. Cui deinceps medicorum Spirarcho, & græci, & arabes
 omnes, præter Serapionem assentiunt. præsertimq; Abenxoar: cuius uerba perlegere ne-
 pigeat, quoniam ait: ^f Et ingrossantur quandoq; ossa in sua superficie ab humoribus mordica-
 tiuis, qui infunduntur in ipsis ossibus, aut à sanie grossa quæ transit super ipsa, unde conca-
 uantur, & corroduntur, & ingrossantur. Iterumq; latius deinceps: ^g Ingrossantur
 quandoq; ossa præternaturam, propter grossum regimen inordinatum subito factum, & nō
 successiue.

a. p. 3. tr. 3. cap.
p. in prin.

b. s. de cōpone.
medicamē. scū
dum loc. cap. 4.
post prin.

c. 7. 3. cap. p.

d. ubi supra s.
7. 3. cap. p.
post medium.

e. s. de compo.
med secundū loc.
cap. 4. uersas me-
dium.

f. 2. theisyr. tr.
6. cap. 2. in prin.

g. ibidem cap. 5.
in prin.

„ successiue. Et iam audiui dici à patre meo, q̄ cuidam uiro uidit nasci in dorso suo os, ad si
 „ multitudinē unius cornu: quod erat minoris duritie ossis naturalis. Et ipse pater meus purga=
 „ uit humores grossos in ipso: Et postea posuit medicinas exiccatiuas super os: ita q̄ cecidit
 „ dictum os: sicut cadunt cornua cerui in uere. Et mihi etiam fuit ortum os unum su=
 „ per dorsum, magnum mihi inferens dolorem. Et purgaui me ab humoribus grossis,
 „ Et posui super ipsum resolutiua &c. Quod si aliud adnasci, extendiq̄, & augeri
 „ post ortum concesseris, multo magis me hercle naturale os nutrimento quidem extensi=
 „ bile, superfluis quoq̄ crassescere, maiusq̄ nonnunq̄ fieri posse confiteberis.

QVONIAM uero Galeni ratio de dentibus, à primo naturæ ortu, ad finem usq̄

10 uitæ (ni cadat) augefcētibus, prolata est, Princeps autē ad cerebrū, cæteraq̄ ossa, incrementi
 duntaxat ætate, ad statum usq̄ adolescentia, dilatare illam uoluit. Idcirco non temerē

1^a. nōnulli ambigūt, q̄a in cōsistenti ætate, magisq̄ deinceps in decremento neutiq̄ fieri posse, cum
 in cerebro, tum in ossibus apostema uidetur. nec. n. amplius nutrimento tūc tēporis augētur, q̄n

2^a. uix possunt, deficiēte ætate, nutriri. Adhuc dētes haud secūdū oēs dimēiones: at (ueluti ex
 Galeno, ^b Principeq̄; ⁱ ac ipso ēt Aristotele, ^k colligitur) secūdū lōgitudinē dūtaxat augeri

3^a. uidētur. Sic igitur & apostemata in illis fieri cōtingeret. Neq̄ uidetur ēt præassumpta ra=
 tio ualere. Quicq̄. s. nutrimento increfcit, id ipsum superfluis quoq̄ augeri posse. Illud. n. natu=
 ra nutrimentū ad se dulciter trahēte, ac post cōctionē apponēte, incrementū fit: hoc uero fieri
 nō posse uidetur. Cū uel exterius, tanq̄ naturæ molesta, superflua remaneāt, minimē q̄dem

20 ab ipsis mēbris attracta: uel si à fortioribus uolēter impulsæ sint, nō sic cuilibet minimæ par=
 ticulæ adhærēat, ut membrū ijs increfcere queat. Hæc igitur obiecta nōnullos adēd pertur=
 barūt, ut inconstantes uarieq̄ titubātes, nūc horsum, nūc uero illorsum, ceciderint. At minimi
 me hercle momēti sunt: Galenumq̄ lōgē minus q̄ Auicennā torquere uidētur. qui nō hāc esse
 principalē rationē supposuit: uerū eam quæ experimēto cōprobatur, oculisq̄ cōspicitur: liuē=
 tes. s. per oēm suam substantiā factos dentes. quāobré corrūpente quopiā humore sic plenos
 esse opinandū: uti caro sanguine (quoties phlegmone uexatur) infarta est. Illi ergo q̄piā si=
 mile patitur (humoris tamen crassitie, calorisq̄; cū frigida pars affecta naturali temperamē=
 to sit) paucitate, præter colorem ibi magis rubeū, hic uero magna ex parte liuidū, à carnis na=
 tura calidæ affectu differēs. quin et dolore, pulsationeq̄; (q̄uis horū causæ, effectū quoq̄; no

30 minibus ab Hippocrate ^l designatæ existāt) cū & sensus, & arteriarū expertia ossa sint.
 Ex eo uero quispīā habere huic rei fidē posse subiūxit: q̄ ex nutrimento ferē per omnem ani=
 mantis ætatē incrementū accipiant. Declarare igitur id quod apparet facilius ex incremen=
 to, præsertim rudioribus ambigēbusq̄; ualemus. Penitiū uero contēplantibus: haud in aug=
 „ mēti, sed in nutritionis ui ratio cōsistit. Quaderē statim Galenus subdit. ^m Cū uero impossi=
 „ bile sit incrementū accipere citrà nutrimentū: omnino duabus affectionibus, & his cōtrarijs
 „ obnoxij erunt, inopiæ uidelicet, & redundantiæ alimēti quod eis suppeditatur. Inopia igitur
 „ aridiores, & macriores, alimentūq̄; nō sentientes, & ob id tenuiores eos reddit. Redundan=
 „ tia uero cōsimilē in eis affectionē excitare potest, qualis est circa carnosās partes inflammas=
 „ tio. Post quæ curationem adscissens, repellentibus (ut in carnis exordiente iam
 40 phlegmone) occurrit: Non cōgessione, paulatimq̄; facta coaceruatione, cui repulsio mini=
 mē congrueret: Sed defluxu fientē affectū insinuās. Quoniā uero Princeps totā incrementū ui

B detur,

Obiectiones.

b. .5. de compo.
 med. sec. ndū loc.
 cap. 4.
 i. 7.3. tr. 3. cap.
 p^o.
 k. .5. de genere
 animalū ultimo.

Ad primū.

l. .2. aphorif. 6.
 & lib. uulnerib.
 bus capitis tex. se=
 cundū uidiū. 38.

m. ubi supra. .5.
 de cōpo. med. se=
 cundū loc.

detur, apud nonnullos interpretes, rationis uim (quā saepius repetit) exhibere: propterea ex-
 sitius adhuc uestigantibus, male ab his percepta principis mentem liquebit. Qui nutritionem
 prius, dein uero incrementum supponit. In qua quidem nutritione, tum extensione, tum incrementum
 quodammodo fieri perpendemus: quatenus uidelicet diminutioni, nedum siccitati, ipsamet nutri-
 tionis actione, uel in ultima quadantenus decrepitate, perditā instaurando substantiam, cōsump-
 tamque renouando obfistitur. Quod si non amplius post uicesimum quantum, uel tricesimum annum augē-
 tur: uirtutis (non maius: at uel æquale, uel minus deperdito reficere, instaurareque; coquendo po-
 tētis) imbecillitati, haudquaquam uero siccitati, aut duritiei attribuendum. Cum multae adhuc partes
 tunc temporis molliores longè sint, quā ossa, dentes uel in suae natuitatis exordio extiterint. Quin de-
 tes ipsi pluribus quidem ossibus duriores, siccioresque; ad finem usque (deducto impedimento) augen- 10
 tur. Verū enim uero toto aberrant caelo, quod non trina dimensione ueroque; incremento augeri dentes
 existimant: quāuis prima naturae intentio (tā philosophiⁿ quā Galeni^o testimonio) iuxta longitudi-
 nem, perfecto adoleſcētia tempore, augmentum facere sit, propter eam quae mādendo fit detritio-
 nem. Etenim si non secundum latitudinem extendi propter facilitatem; uideatur. Alteruter utriusque po-
 situs impedimento saepius est. Quāobrem nonnullis quorum dens aliquis ceciderit, dentes utriusque; adeo
 crescere nonnunquam; uel in adultioribus, quoniam senibus (tamen si minus, rariusque;) nedum adoleſcētis-
 bus, in quibus me hercle frequētius, cōspeximus. Ut cadētis uacuum derelictum locum repleuerint.
 nullumque; inde cecidisse ostendant. Vim quoque; non minus argumentum habet de superfluo, quā
 de attracto nutrimento cōcludere. Licet enim, hoc attractum apponatur, substantiamque; adglutine- 20
 tur, coalescatque; illud tamē impulsum, rorisque; instar membro prius inspersum, deinceps uero ue-
 lut à pāno quoduis liquidum, sic à membro imbibitur. adeo nihilominus ut uerū augmentum (instar
 illius) non efficiat: quoniā id minimis particulis minimè appositum coalescit. Sed in porulis dun-
 taxat retentum, tumore inde praeternaturā nuncupatum attollit. Nil ergo aliud aduersorū raz-
 tio cōcludit, quā uerè incrementum dici non posse, haud uero fieri nequiuisse tumore: à corruptio-
 neque; deinceps apostema, demonstrat. Oborta uero tota huiusce rei difficultas est, maximeque;
 apud oēs barbaros adoleuit: adeo ut uarij uaria effinxerint, ob eum phlegmonis tum aposte-
 matis propriè dicti ignorantia. Quorum tamen de finitiones si ex praenarratis cognoueris, longè
 propius quā; ego tibi enarrare uerbis ualeā, ipsorum deliria pernotaueris. Cerebrum itaque; phleg-
 mone, atque; erysipelate uexari (tamen si raro) absurdum tamē impossibile uel minimè est. Quin 30
 tum phlegmones, tum erysipelatis antesignana inditia, atque; et demonstratiua Oribasius, P Pau-
 lus, Aetiusque;, ac Princeps, ostenderunt. Apostemate autem abscessu uel licet rarissi-
 me nonnunquam; tamen, & maxima quidem ex parte, tribus paucioribus uel hominē diebus per-
 necante cerebrum ut organum est occupari cōtingit. Id quod Panhormi quaedam publici agrotan-
 tium hospitij cadauera priuatim, exercēdi studio, dissecantes, experimento nonnunquam; cōfirmaui-
 mus. Atque; hic rursus Neapoli, anno 1548. caput cuiuspiam incurabiliū morborum hospitio pra-
 mortui, publicè (ob suspensum penuriā) incidētes, totā cerebri supra uentriculos substantiā, pra-
 cipueque; anteriore multa puris copia infartā, praeter utraq; membranam similiter affectā, inueni-
 mus. Quinimo duos aquosos abscessus olēti sanie ichore uel plenos, uesicula uidelicet membrana
 uel quadā circūuolutos, in corniformi callosoque; dextri cerebri processu, non sine astantium admi-
 ratione, strepituque; offendimus. Fieri autem ex cerebri substantiae corruptione, atque; in pus con- 40
 uersione calidum abscessum, non uidimus, haud tamen impossibile ipsius aliquando princi-
 pium

Ad 2^m.n. quinti de gene-
ratione animalium
ultimo.o. xi. de usu par-
tium cap. 3. et 5.
de cōpōne. med.
secundū loc. cap.
4. circa medium.Ad 3^m.

Nota.

c. supra fo. 18.
19. 20. 21.p. lib. curonum
cap. 9.
q. 3. cap. 7. et 8.
r. lib. 6. cap. 25.
26.
s. p. 3. tr. 3. cap.
4. et 5.

pium fore (in extremis præcipue partibus) arbitramur : haudquaquam uero ad uigorẽ nisi rarissime peruenire : At statim circa talis corruptionis primordia maxima ex parte ob partis principalitatem perneare . nullatenus uero in corde uerum apostema incipere posse demonstrabimus .¹ Idipsum nihilominus interdum proprijs oculis conspeximus , ob maximum in capite factum uulnus incisionemque , adeo quidem ut cerebri etiam substantiam effatu dignam penetrauerit , uel obliqua transuersa uel dissectione peracta , cerebri frustum dimidiæ ferè nucis compressæ tamen magnitudine semotum omnino sit , tamque uulneris et sanguinis è uulnerata parte defluxus , quæ alterantis aeris ratione , multam deinceps ipsius cerebri substantiam perinde corruptam , ut puris uice , quolibet medici opere , capitisque dissolutione , de-
10 flueret . Qui nihilominus uulnerati quindecim diebus , plus minus uel iam uixerunt . Quin etiam aliquos adhuc hodie uiuentes integraq; sanitati uel opera nostra restitutos agnouimus . quorum tamen Cerebri substantiam lupini , aut parue fabæ magnitudine , proprijs manibus , utpotè incisam corruptamque abstulimus . ambigentibus interim , ob anatomes imperitiam , chirurgis : an cerebri substantia , an mucosum pituitosum uel excrementum esset . Verum de hoc aliàs . Id nobis impræsentiarum satis est , ut apostema fieri posse in cerebri substantia credamus : quoniam semota nedum corrupta cerebri parte , uixisse conspeximus . Id quod demum de frigidis præsertim apostematibus , aquosisque ex eo quod uitulis accidere maximeque in Siciliæ Lilybæo audiuius . Hæc . n . animalia præsertim quæ tenella sunt endemius quidam morbus inuadere consueuit . alibi . n . contingere non audiuius . quod si euenit non om-
20 nibus in locis . qui et epidemius esse à nonnullis creditur . quamobrem ab alijs euestigio segregant , ne illa pariter afficiat . firrum ibi uulgares nuncupant , quod nomen illis in gyrũ factam reuolutionem præsefert . circũuoluuntur . n . uituli statim atque morbo illo affliguntur . quorum quidam confestim , ac repente apoplecticorum instar intereunt , quidam triduum , ac diutius quoque uiuunt . quibus non aliud remedium inueniunt . quæ macellũ . ex quo fit (cum assiduus hic morbus ibi sit) ut uitulinas carnes frequentius comedant , quæ ipsi præsertim domini cuperent . Mortuis ergo aut morbi ui , aut macellariorum gladio uitulis , in cerebri uentriculis , præsertimque anterioribus maximã uiscidæ , uel tenuis etiam aquæ copiã , uel membranula contentam gallinacei oui molliori adhuc putamine cooperti instar inueniunt . adeo ut in planta manus nonnulli accipientes , ut prædictũ ouũ aqua plenũ uarijs hominibus indigitarẽt . Quod , aut
30 id maius extiterit , eò magis cerebri substantiam deficere obseruarunt : ampliusque abscessui spacium derelinquere . adeo ut interdũ uix tertiã cerebri partẽ inuenerint . ex quo cerebrũ corrodere talẽ abscessũ aiunt : forte quia in eã apostematis aquã corrupta cerebri substantia cõuertatur . E quibus oĩbus patet cerebrũ uero apostemate , præsertimque frigido occupari posse , necessario tamẽ ad mortẽ perducẽte . At nostrũ ad cadauer quod Neapoli ut diximus publicẽ dissecui-
mus reuertamur . Cuius quidẽ cadaueris , et septẽ (si recte memini) locis craneũ , et pluribus tum pectoris ossa , tum ipsum quoque sinistra partis iugulũ , et nonnullæ et costæ manifestissimis apostematibus à morbo gallico exortis oppressæ fuerant : tumoribus inque in ipsa ossium substantia abortis : quibus deinde ruptis , apertisque , puris copia huiusque grauiter olentis emanabat . quo quidem illinc defluxo patula ossis cauitas , multaque interaneorum partium putrefactio quibuslibet uel alongè conspicientibus apparuit . Vt hoc solum cadauer satis
40 superque idoneum fuerit , pro huiusce quæstionis , contra Serapionem , claritate .

paulo infra.

Sed quid est quod tantoperè admiremur, si apostematis propriè nuncupati essentiam perspe-
ctam ex prænarratis habuerimus? Vbi. s. partes quæ inuicem prius unitæ fuerant, nunc
(humore quopiam imbibito, intermediâq; parte, quæ prius extrema coniungebat, putre-
facta iam, carieq; oppressa) dislent. tam cum euidenti extrinsecus tumore, q; sine illo. Sa-
tis. n. est q; in penitioribus ossium partibus tumor moles ue præter naturam existat. A deflu-
xu quoq; nedum paulatim facta aceruatione desumpto exordio. Quauis. n. à maximis ad
paruas, ac demum ad capillares usq; uenas, defluxus fiat: illis tamen immodicè plenis, res-
sudat uel sanguis, uel quiuis alius à fortioribus ad imbecilliores partes transmissus, aut ab ijs
fortasse attractus, aut (perinde ac inferius ostendemus^u) obiter admissus humor, rorisq;
uice prius tam neruosis partibus, q; ossibus, nedum carnis imbibitur, porulos quidem nutri-
menti instar (uelut antea^b tetigimus) ingrediens. quamobrè & repellentibus ab initio sta-
tim in dentium affectu, quemadmodum in exordiente carnis phlegmone, Galenum^x deflu-
xui obistere prædiximus. ^c Quid deniq; impedimento fuerit ex bili, tam cerebrum, q; ossa
apostema nedum inflammationem suscipere? cum facilius, promptiusq; humor hic, tum in
glutinofam compactamq; cerebri substantiam (haud. n. sic fluida liquida ue, uti Serapio ma-
chinatur, cerebri substantia est) tum in osseam, duramq; penetrare, q; alij succi. (uel Ga-
leno^y princepsq; & comprobantibus) perspicua ratione uideatur. præsertim si ad defluxu
inflammatio referatur. Quamobrem de phrenitide sermocinans Paulus: ^a ubi cerebrum quoq;
phlegmonem unâ cum membranis experiri posse prædixerat, causam morbi esse adiunxit,
uel sanguinem superantem, uel biliosum humorem, nonnunq; & flauam bilim perustam,
adeo ut in nigram degenerauerit. Deincepsq; iterum habitò tum phlegmones tum erysipela-
tis cerebri sermone: ^b de lethargo demum ait, ^c locum eundem quem phrenitis, nempe cere-
brum occupare, materiam uerò mali contrariam esse, pituitam. s. atq; etiam atram bilim. ue-
luti ante ipsum Galenus^d expressit, Princepsq; ^e illi ascripsit, tametsi Paulus nihil de atra
bilario succo meminerit. Ex omnibus igitur humoribus, tum in cerebro, tum in ossibus
apostemata fieri posse: (inuitis nonnullis interpretibus) tum græcorum, tum arabum om-
nium (quos uidimus) testimonio, contra Serapionem concludemus. Nec adeo dura adaman-
tinaq; ossa existere ut extendi, eiusdem phantasmate, nequeant. Idipsum nihilominus ue-
rum esse confitentes: si paulatim. s. proprijsq; alimentis (ut par est) superfluitate aceruata
generandum apostema sit: proculdubio cerebrum expituitoso, aquoso ue ossa uerò atrabila-
rio ex succo promptius illud susceptura. AT PAUCA de corde hic etiam obiter percurre-
ramus. Etenim quia neq; ut ossa durum, neq; ut cerebrum molle est, dubio procul aposte-
mari posse uidetur. Ea q; præsertim ex Galeno^f præassumpta, nec non à Principe^g ob-
seruata ratione, quoniam augeri nutrimento ualet, igitur & superfluitatibus increcere,
ac tumefieri nonnunq; posse consonū est. Oppositum uerò à Galeno^h perlegimus, dicēte.
τὸν καρδίαν δὲ αὐτὸν ἀσθενεῖν ἀδυνατοῦν ἀποστήματα παθεῖν. quod est, Rursus autem cor
apostema abscessum ue pati impossibile est. Quamobrem & Aristoteles i philosophorum de-
cus ait. Cor solum uiscerum, atq; omnino partium corporis nullum uitium patitur graue.
Idq; recta ratione. Cum. n. principium corrumpitur, nihil est quod cæteris quæ inde pen-
deant, præbere auxilium possit. Inditum ut nullum affectum cor patiatur, quod in nul-
la hostia cor ita affectum uisum adhuc est: ut in cæteris uisceribus aliquando cernitur.

Renes

u. cap. 2. cō. 9. et
cap. 19. cō. p^o.
b. supra fo. 26. i
responsione ad 3.
x. s. de compo.
med. secundum
loc. cap. 4.
c. supra fo. 25.
in fine & 26. in
prin.

y. 6. aphorif. cō.
33.
z. p^a. 3. tr. 3. cap.
7.
a. tertij. 6.

b. cap. 7. & 8.
c. cap. 9.
d. lib. de atra bi-
li cap. 5.
e. p^a. 3. tr. 3. cap.
7.
Contra Matheū
de gradis. 9. alia
fo. cap. de phreni-
tide.

An cor possit
apostemari.

f. s. de cōpo. med.
secūdu loc. cap. 4.
g. 2^a. pⁱ. doc. p^a.
cap. 5. & p^a. 3.
tr. 3. cap. p^o. i pri.
& 7. 3. cap. p^o.
h. pⁱ. de loc. affe.
s. circa finem.
i. 3. de partibus
animaliū cap. 4.
iuxta finem.

„ **Renes.** n. sæpenuerò calculis, & panis, & papulis referti uidentur: atq; etiam iecur,
 „ & pulmo, ac potissimum lien &c. Pro huius ergo nodi, atq; à nonnullis in Galeni etiam
 scriptis reputatæ contradictionis dissolutione: quia. s. interdum^k admittere, nonnunq;^l ue
 rò (uti præassumptum iam est expressius abnegare inuenitur: in memoriam reuocare oportet
 quæ de apostematis noie penès græcos atq; arabes præscripta iam sunt. ^m Etenim phleg
 mone uel erysipelate uulneratum cor, (siquidem uulnus ad uentriculos usq; minimè pene
 tret, in quo sub nimio sanguinis effluxu confertim interire hominem necesse est) tentari
 posse certum est, & à Galenoⁿ etiam, pauloq;^o ipsum (præter barbaros) transcribente
 admissum. Itaq; iuxta nomenclaturam barbarorum, phlegmonem quoq; & erysipelam
 10 ipsam, quinetiam scirrhus, ac œdemata (ueluti prædiximus^p) apostematis nomine digna
 tum, apostemari cor, apostemate^{ue} comprehendendi, tuta fronte pronuntiare possumus. Ve
 rum autem & exquisitiùs desumptum græcorum ἀποστήμα abscessum^{ue} pati minimè
 potest. Haudquaquæ uerò intelligimus, quia si apostema in corde fieret, animal interfice
 ret. Sic n. phlegmone, atq; etiam erysipelate, quin (ut uno uerbo expediam) largè as
 sumpto etiam apostemate comprehendendi nequiret. Cum illicò priùs q̄ augeantur huiusmodi
 affectus (Galeno^q comprobante) animal corrumpatur. ita etiam quod de cerebro decla
 rauimus^a falsum esset, ipsum uidelicet propriè capto apostemate abscessu^{ue} aliquando
 uexari posse. quoniam. s. animal perimeret. uerùm hic non aliter apostemari cor, quin ip
 sius etiam ueri apostematis abscessus^{ue} principium primum suscipere, q̄ cælum nostro di
 20 gito pertingi, dum in terra degimus, impossibile fore determinamus. Frigidum nanq; in
 ipsius substantia tumorem, scirrhum inq; uel œdema gigni (cum fons & origo caloris sit,
 continuoq; moueatur) perinde quidem difficile reputamus, ut phænice rariùs contingere
 posse credamus. Ab initioq; statim strangulare, priùs q̄ ad exquisiti apostematis exordia
 perducere intendat. Calidum uerò quod ex inflammationibus (tametsi frequentius fr
 gido quouis tumore cordi aduenire potentibus) oriri consuevit: ijs uidelicet suppuratis, atq;
 spatium inane producentibus: ut quæ priùs se continebant partes, nunc abinuicem disce
 dant, impossibile quidem penitus est. Oborta. n. phlegmone, priùs q̄ ad hoc perueniat, ci
 tiùs longè q̄ frigidi tumores perimit Etenim cum cor ipsum non toleret ut apostemetur (be
 30 ne Princeps ait^r) quomodo ergo tolerabit ut collectio & saniofitas in ipso fiat? Idcirco per
 bellè Aristoteles inquit^s, in nulla immolatarum hostiarum cor, quemadmodum alia uisce
 ra, graui quopiam uitio deprehensum esse inuentum est. Longinquius ergo non temerè ab
 ipsomet arabum principe^t dicitur ab hoc, ut toleret solutionem continui (ut in ueris aposte
 matibus fieret) q̄ apostema. intellige penès ipsius loquendi modū, phlegmonē, aut erysipelā
 &c. Quibus exquisitè perpēsis, Galeni uerba rursus trutinare debemus. quādo impossibile q̄
 dē ait^u cor ἀποστήμα παθῆναι, hoc est, apostema pati. Haud. n. & sustinet & ueluti co
 pus interpretatur, ait, ut intelligamus abscessum quidem cordi aduenire posse, Hoc tamen
 illud minimè suslinere: quia. s. ab eo trucidetur. At impossibile cor apostema pati Galenus
 inq̄t. adeò ut nunq; hmoi enuntiatio uera sit & apostema cor inuadit & multoq; minùs hæc. & apo
 stema cor affligit & uel & cor apostemate cruciatur & exquisitè inq̄ apostematis noie desumpto.
 40 Nā si largius, & propieq; unā cū barbaris apostema ceperimus: ita calido q̄ frigido (licet hoc ra
 rius) apostemate, seu exquisitiùs loquētes tumore tētari posse dicemus. Id quod de frigidis prop

Solutio.

k. ut. s. de locis
affectis cap. p.
post medium.

l. ut p. eiusdem
s. circa finem.

m. fol. 19. 20. 21.

n. s. de locis aff.

p.

o. lib. 3. cap. 34.

p. fol. 19. 20. 21.

q. s. de locis affe.

p.

a. supra fol. 28.

r. n. 3. tr. p.
cap. 2.

s. 3. de partibus
animalium. cap.

4. circa finem.

t. ubi supra.

u. p. de locis aff.
s.

z. 5. de locis aff.
fec. p^o.

y. 11^a. 3. tr. p^o.
cap. 2. & tr. 20.

cap. p^o.

z. 2. breuiarij
cap. 23. i prin.

a. 2ⁱ. apbor. 42.

b. lib. diuisionū

cap. 58. cir. prin.

c. 3ⁱ. lib. cap. 34.

Razis locus.

d. 2. breuiarij
cap. 27. 28.

e. 9. theorice
ca. 23. post mediū

f. lib. de appropria-
tatis cap. ulti.

g. 3. colliget. cap.
25. circa mediū.

h. 2. art. med. tr.
de uenire cō. 25.

& uide cō. 31.

i. p^o. theysir. tr.
12. cap. p^o. in fine.

k. conciliatoris
differentia 97. in
fine 4ⁱ. doctorū.

Ad arg. tum
pm. & 2^m.

l. fen. 2^a. doc. p^a.
cap. 5.

m. 2. ad glauco.
2. in prin.

tereā admittimus: quoniā Galenus cū cordis affectus à forti eius intēperie, aut uenenoso humore nōnūq; ab erysipelate, aut phlegmōe fieri protulisset x illicō adiunxit; aut alio quopiā praternaturā tumore & per hęc uerba fieri posse frigidos etiam tumores (ut arabum Princeps & Serapio z exposuisse uidetur) intelligere Galenus pręfēfert. nisi herpetem, atq; anthracem intellexisse contenderis. Impossibile autem non uidetur eam aquositate, quę in cordis operculo comprehenditur, interdum in ipsa cordis substantia imbibī posse, atq; œdematosam quādā, aut scirrhosam dispositionē excitare: uel atrabiliarīū defluentē sanguinē hanc secundā producere. Quibus nihilominus affecti frequenter, & fortiter, absq; causā manifesta (ut Hippocrates ait^a) exoluti: & si diutius, q; qui à calidis tumoribus comprehēsi sunt, uiuere queant: repente tamen deniq; moriuntur. Sic ergo Razes, b arabum, s. in modum locutus, apostema, sicuti disruptionem, & intemperiem confirmatam, à Paulo c (ut patet) transcribens, acceptare uisus est, impossibiles tamen ad curandum esse subiungens. & Impossibiles & n. legendum est: ubi ait & non faciles & ut tūm ex Paulo, à quo transcripsit, liquere perfacile potest: tūm ex ijs quę dein subdit, quę signa dolorum mortem inferentū, non alicuius salutaris adiungat. Itidemq; ex eo quod in oppositum subdit, confirmatur. dū ait & Quod autem ex eis curatur est caliditas cordis confirmata & c. & Quę prędicta iam fuerant tria, in quorum numero apostema primum ponebatur, curari neutiq; posse ostendens. Eodem quoq; loquendi modo & Serapio, d & Haliabbas, e ipsēq; etiam barbarorum euangelista Mesuas, f nec non Auerrhoes g & Hali Rhodoan h usi sunt, ut animal interficere cordis apostema protulerint. Quamobrem & Abenxoar i eius principia fieri posse concedens, ait. quando uult fieri apostema in corde: anteq; confirmetur, moritur patiens omnino & deficit. Vnde Apponēsis k quasdam distinctiones chimariizare coactus est. ut apostema in principio non confirmatum cor pati posse uelit. Itidem curationi rebelle apostema mortemq; inferens: haud uerō quod medici opere sanetur. Adeo ut cor tolerare apostema, & non tolerare, simul pro contradictionum concordia pronuntiarit. Tolerare (inquit) quoniam, aliquantisper, uita adhuc durante, apostematis principia suscipere queat. Non tolerare autem: quia curationem nullo pacto admittens, medico medium unguem porrigit. Verū enim uerō cuncta hęc superuacanea extitisse uel una tam gręcorum q; barbarorum apostematis cognitio exquisitissime indigitat. prehendi. n. phlegmone, uel erysipelate, aut fortassis œdemate, uel Scirrbo cor possibile quidem est: apostemate uerō abscessuue ne alongē quidem tentari posse dicendum: cum antea uita penitus destituatur animal, q; ad apostematis mænia iam appropinquare tumor queat. Quāuis proprię substantię, medię inter durum & molle existentis ratione, perinde incrementum suscipere superfluis excrementis, ut proprio nutrimento, facillimē posset. HÆC intantum de communi penēs affectam sedē distinctione, in primo libro l (ad quem reuerti nos pręcipit) posita, dicta nunc sint. Aquā quidem deinceps Galeni uerba, mentemq; transcribens, ait. Et omne quidem apostema, quod causam non habet primitiuam, uel exteriorem: et eius causā corporalis monstrat materiam de uno membro ad aliud quod est sub eo fuisse mutatam: uocatur catarrhus. Galeni autem uerba, mentemq; fuisse prędiximus ad Glauconem talia scribentis. m Est igitur una quędam apparentium inflammationum causā, quę non admodum occulta est, quę flu xio appellatur (catarrhum princeps, uel principis traductor appellat) Nisi quandoq; illis coniungatur,

„ coniungatur, quæ aliqua alia ex causa factæ uidentur. Quando n. nulla ex his præceden-
 „ te, membrum confestim patitur inflammationem, ea quæ hanc passionem causa generat,
 „ fluxio (græcè autem ἐκίνα) uocatur. Ipsa uerò passio, dispositio fluxionis. Post hæc
 „ autem Princepsⁿ diuersam causarum dispositionem, atq; uariam mouendi originem, modūq;
 „ demonstrat. Quoniam, s. uel prius uitiosi iam humores erant, à sanguine tamen (quarta
 „ inq; substantia) aded ueluti fræno temperati, coactiq; & obtusi, ut nullum potuerint, suæ
 „ qualitatis ratione, uirtutem stimulans atq; irritans nocumentum inducere: Deindè uerò
 „ euacuato nimium sanguine, quouis quidem uacuationis modo, siue inq; naturali: ut in mē-
 „ struis purgationibus, hæmorrhoidibus uel siue non naturali, ac (ut rectius dixerim) præter
 10 „ naturam, ut in uulneribus, detecti iam, solutiq; & propriam acrimoniam nacti uitiosi hu-
 „ mores, naturam ad sui expulsionem stimulant: ut uel extrà corpus, uel saltem ad imbecil-
 „ liores partes, extremamq; cutim eijciantur. Tumq; demum apostemata, seu Bothor, pu-
 „ stulas uel aut eminentias dictas, pro humoris multitudine, uel paucitate, uariaq; natura,
 „ producat. Quæadmodum erysipelata non semel, præsertimq; in superioribus partibus, à sangui-
 „ nis defluxu superuenire conspeximus. HIS ergo in prima illius capitis parte reuicis, ex-
 „ peditisq;. Primò, s. ipsius apostematis essentia. Secundo eiusdè penès magnitudinē, ac Tertio
 „ penès affectā sedem distinctione: & Quarto qdem loco fluxionis, rheumatis uel ab ea quæ
 „ exteriori ex causa oriunda est, differentia. Quintoq; deinceps uaria motus humorum ori-
 „ gine: & cur aliquando quieti consistant, dein uerò agitentur humores. Vt demum uel Bos-
 20 „ thor, uel apostemata in exterioribus, interioribus uel progignant. Ad alia in memoriam re-
 „ uocanda reuertamur, quæ in Secunda illius capitis parte declarantur. Quæ pro faciliore
 „ quidem, promptiori q; memoria, ad octo iam numero reducentur. Primò igitur apostematum
 „ à causis corporalibus sumptas differentias ostendit, pro quatuor uidelicet humorum, flaz-
 „ tuosiq; spiritus, ac serosæ demum aquositatis diuersitate. Sex n. hæc dicta corporalium cau-
 „ sarum naturam suscipere ait. Quamobrem in eam peruenire bimembrem diuisionem (quæ
 „ post hæc uerba declarabimus^o) necessum est, & omne s. apostema & Bothor uel calidum,
 „ uel non calidum existit. & Nec interim ob stare credideris, quoniam præter hæc sex: lapi-
 „ des quoq; limum, pilos, ligna, carbones, arenam, balnei sordiciem, amurcam, cæterasq;
 „ id genus uarias effigies præferentes substantias, apostematum corporeas, abditasq; cau-
 30 „ sas dissecando (ueluti præactū iam est) inuenerimus. Hæc nanq; uel à pituita, uel atra bi-
 „ li, sanguine uel crassiori, aut horum aliquibus admistis, primam originem duxerunt: ut ad
 „ illas sex, reliquæ necessar.ò relucantur. Secundo tumoris tum sanguinei tum biliosi pro-
 „ pria nomina ostendit. ut illum, phlegmonem: hunc uerò erysipelam (apostemata interim
 „ utraq; more suo supponens) nuncupet. perinde ac si componantur humores, composita
 „ quoq; nomina sortientur. Cumq; ad collectionem, puris uel generationem peruenient & Exi-
 „ turæ & ueluti si adenosas laxasq; partes infestauerint, Malignæ interim, corruptiuæq; exis-
 „ stentes & tabun, uel althein & barbara uoce, nuncupantur. De quibus tamen fusiùs loco suo
 „ determinabimus.^p Tertio uocati ab eo apostematis, quatuor tempora (Galeni q dogmate,
 „ tametsi præuè interpretum nonnulli perceperint) ab ipso floris exordio primo, ad declina-
 40 „ tionis usq; terminum descripsit. De quibus quidem, quia longior sermo sequenti capite
 „ habendus rursus est.^r Idcirco (ne repentina crambe legentes, ad nauicam perduxerit) si cō-

morari

n. ubi supra.

l.

o. com. 2.

Obiec. nis solu-
tio.

2.

3.

p. inf. cap. 17. 18.

q. lib. de tot. mor.

bi tēpori. cap. 3.

r. com. x.

s. cap. sequenti
tex. 6.
Dubitatio.

Responsio.

t. tr. sequenti.

u. ibidem.

De quibus uide
infra cap. 13. cō.
p^o. & 2^o propter
aliquas contradic-
tiones.

Auicennæ
loca.

x. cap. 7. & 8.

y. 7 fen. 4. tr. 3.
ca. 12. & 13.

Expositio
textus.

z. fen. 2^a. doc.
p^a. cap. 5.

morari nequeas, quæ ibi dicuntur perlegito: deinceps uerò hinc alacri fronte reuertaris, & calidorum duntaxat apostematum, quas phlegmonas græci (uel ipsomet arabum principe inferius teste) nuncuparunt. Haud uerò frigidorum quatuor tempora describentem offendes. Non temere igitur post hæc ambigens, huiusce rei causam uestigato: Cum & principium, incrementumq; & uigorem, ac deniq; (ni commoriantur) declinationem, instar calidorum, sortita fuerint. Quod proculdubio uerum esse pernosces: adeò quidem obscura, nec non distinctu, præter longitudinem, difficillima: rarissimæq; ni medicamentorum ui discutiantur, ad inclinationem perse reducta inuenies: ut à Galeno prius, dein uerò ab ipso principe neglecta, & sub ipsis calidorum temporum descriptionibus inclusa, sub intellecta; ratioabiliter extiterint. His autem perpensis, quartò: Non calidorum frigidorum uel apostematum, quadrimembrem distinctionem adiunxit. quoniam s. uel melancholica, uel phlegmatica, aut aquosa, aut uentosa existunt. Melancholicorumq; statim trimembrem diuisionem, in scirrhum uidelicet, duritiem uel, cancrum, & glandularum genus. quæ Sigillatim quoq; proprijs capitibus infra declaranda iam sunt. Quintò melancholicorū apostematum differentias, pro illustriori illorum notitia posuit: quibus s. tam glandularum species, nodi inq; & scrophulæ q; cancer à scirrho manifestè distinguuntur. Sextò phlegmaticorum pariter apostematum, quibus abinuicem secernantur, diuersitates enucleat. quorum nihilominus contemplationem, perinde ac & aliorum omnium, proprijs deinceps locis brandam resexauimus. Septimò aquosas, quemadmodum & Octauò demum uentosas apostematum species enarrat. QVIBVS expeditis ad bothor apostematum uel paruorū species, in Tertia capitis parte descendit. Eas. s. pro humorum diuersitate, flatuosas uel spiritibus, aut aquositate, uariari non minus q; magna apostemata affirmans. Earum. n. Bothor eminentiarum uel, Aliæ sunt sanguineæ, sicut uariolæ. Aliæ sunt ex cholera rubea pura, sicut effusæ cholericæ: & desudationes (melior. n. uetustior codex est, qui desudationes habet, q; nouus qui miliarem formicam, ex bili pituitæ admixta obortam, pro desudationibus, pura exquisitaq; ex bili genitis, emendat.) Et aliæ sunt ex eis permixtæ, sicut morbilli & scabies: Aliæ sunt ex bili admixta phlegmati, ut formica miliaris. Aliæ sunt melancholicæ, ut clauī, & uerrucæ. Sic. n. potius legendum duximus, omnino deprauatam literam opinati, q; impie adeò claram falsitatem & contradictionem in Auicennæ scriptis, ubi saluari facillimè potest, sufferre. Falsitatem inq; cum uetustiori litera formicas, & clauos, atq; uerrucas ex bili sanguini admixta generari existimantes. Contradictionem uerò: quoniam formicas infra, & uel ex pura cholera, uel phlegmati, aut etiam melancholicæ admixta: clauos autem & uerrucas atrabilario ex succo, uel assiccata pituita generatione sciipere ostendet. Præter has uerò. Aliæ Bothor eminentiæ uel, aut pusulæ à quibusdam dictæ sunt aquosæ, sicut uesticæ. ΦΛΙΝΤΑΪΝΑΙ Quandoq; sunt uentosæ, sicut inflaturæ: intellige quum paruæ sunt. Pro quibus iterum ad septimam quarti libri fen. ueluti de apostematibus ad tertiam (quam præ manibus exponendam habemus) particulariùs uidelicet, distinctiusq; determinandū nos remisit. ITA QVE & iam locuti fuimus in libro primo de apostematibus & tam. s. magnis, q; paruis, Bothor paulò antè nuncupatis & speciebus ipsorum & biliosis inq; sanguineis, pituitosis, melancholicisq; nec non aquosis, & deniq; uentosis, uel uario modo ex horum duobus, pluribus uel compositis: itemq; alijs speciebus, penès uarios distin-

rios distinguendi modos. Quos infra^a colligendos omnes reseruauimus. Vbi quidem alio
 rursum calle, per diuisiones inq̃, species apostematum cunctas in primo libro prædictas re-
 petemus. & Sermonē uniuerſalem: ad quem redire oportet illum, qui uult audire quod nunc
 loquemur. In hoc autem loco loquemur de eis sermonem particularem & de eis intellige apo-
 stematibus ſen præſenti, perindeatq; de bothor quibusdam, ut formicis, acrochordonibusq;,
 & efferis arabicè uocatis, de pluribus autem ſen huius quarti libri ſeptima^b ut ſunt ſaba-
 ſati ab ipſo dicti, & impetigo, bothor lactei, ſcabies, deſudatio ſeu haſeph, planta noctis
 ſeu benath, uerrucæ, clauī, & cornua, itemq; excedens corporis obſeſtas, aut alicuius
 partis tumor ſuperfluensq; magnitudo, & deniq; paronychīa, quod corruptè panna itium
 10 uocant, præter hæc autem de uariolis quoq; ac morbillis prima ſen huius libri quarti^c præ-
 dictum eſt. Quæ quidem omnia (ut nil de tumoribus præter naturam deſideretur) ubi oc-
 curret hoc in noſtro commentario interpretabimur. Quoniam uerò non ſatis eſt morbum, ſpe-
 cies ue, & cauſas cognouiſſe: at curationem medico propriam, (ut medicinæ finem, ſa-
 nitatis inq̃ poſſeſſionē nanciſcamur) inquirere neceſſum eſt. Idcirco reuiſa etiā uniuerſali
 curandi methodo, in quarta (ut dixi^d) ſen primi libri declarata: ad quam ſimiliter redire
 oportet eum, qui uult audire quod nunc loquemur. Noſq; inferius, ^e ante particulares
 cuiusq; curationes, ad memoriā reuocabimus: ſingulatimq; deinceps proprias curandi
 methodos enucleabimus. **QVAESTIO DE CAUSA CONIUNCTA**

VERVM ENIM VERO quæ tū de primitiuis exterioribus ue ac maniſeſtis cau-
 20 ſis, tū de intrinſecis abditisq; ſanguine inq̃, bili, ac cæteris prænarraſis mētio facta eſt.
 Quas barbarorum cætuſ in antecedentes iterum, coniunctasq; ſecernit. Recentiores ue-
 rò, qui præſertim Galeno ſe uenditarunt, coniunctam, continentem ue cauſam (iuxta Ga-
 leni, quæ proculdubio ueriſſima eſſe ſupponunt, dogmata) ſummoperè deridentes condem-
 nant. Propterea opæ prætium fore arbitrati ſumus eam ſecundum ueritatem priuſ, mox
 autem, pro Galeni dogmatibus, ueſtigare. Vbi .ſ. uelimus nolimus admittēre, atq; ubi
 prorſus interdiciendam cogemur. Deinceps uerò arabes, eorumq; ſectatores, ne ueniali
 quidem (ut ſic dixerim) peccato, nedum mortali criminandos fore, quin laudandos potiùs, ut
 rerum differentias, claritatēq; in hoc, inani nominum impoſitioni præferentes. Ut igi-
 tur cuncta, pro noſtris tametſi imbecillimis uiribus eluceſcant. Ea præ omnibus contem-
 30 planda, quæ continentem cauſam à Galeni dogmatibus prorſus alienam indigitant, perſua-
 dentq;. In primis ergo Nicolai Leoniceni ante alios hanc noſtro æuo quæſtionem excitan-
 tis, uelutiq; nouum quoddam portentum in medium adducentis, & in epidemiæ libello, &
 in Antiſophiſta medico Romano ſuo diſcipulo attributo, poſitionem, fundamentaq; tetigiſ-
 ſe decreuimus. Tametſi cum primus Galeni mentem emedullare inceperit: paucis con-
 tentus eſt. Quibus tamen deinceps alij poſteriores, (cum facile ſit, eiùſdē Galeni ſ. atq;
 Ariſtotelis & trito monumento, inuentis addere) plurima ſuperadiunxerunt. Præ cæte-
 ris igitur Leonicenus Galeni locum perpendebat, qum medendi methodum ueſtigare, con-
 trā eos qui ſe iniuſſe methodicos nuncupari præcipiebant, omnibus neruis intendit. ^h Vbi
 n. paſſionis à morbo differentiam præoſtenderat: ut hic factus iam ſineq; cauſa perdurans:
 40 Illa uerò ſiens, & à cauſa dependens exiſtat: Deincepsⁱ autem à quatuor præternaturā
 inuentis (generatim loquendo) affectibus exorſus: Affectu inq̃ morbo ue ſic etiā propriè
 nuncupato

a. cō. ſequenti.

b. trac. 3. cap.
p. uſq; ad 14. in
cluſiue, & tr. 4.
cap. 5. 6. 7. 8. &
9.c. tr. 4. cap. 6.
uſq; ad 12.d. ſupra: circa
principia huius
com. primi.
e. in principio
capitis 3.f. x. de uſu par-
tium cap. 3. ante
medium & 14.
methodi cap. 17.
poſt mediū & in
nuitur p. apbor.
com p.
g. 2. elenchorū
ultimo.
h. p. meth. cap.
7 quod ſuſius 2.
eiùſdem. 3.
i. ibidē cap. 3. p.

nuncupato, actiones per se primò atq; immediatius lædente, functionibusq; ipsis læsis, quæ insignia (græcè ἐξάρετα) Symptomata nominabat: Alijsq; tum proprijs & familiaribus, tum etiam sorte quadam incidentibus Symptomatibus, casibusue: Atq; denuò à morborum ipsorum causis. Tribus deinde sigillatim præostensis, de ipsis deniq; causis hoc pæto subiunxit, Τεταρτον δ' ἐστὶ τῶνδε γένος Τίθεσθαι τὸ τῶν νοσούντων αἰτίων, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐν αὐτῷ τοῦ ζῶοντος σώματι συνιστάμενα, προηγούμενα καλεῖται, τὰ δ' ἐξωθεν προσπίπτοντα, προκαταρχοντα. Hoc est, uerbum uerbo reddentibus, Quartum uerò præter hæc, genus statuito quod insalubrium morbosarumue causarum sit. Atq; harum quæ quidem in ipso animalis corpore consistunt, præcedentes nominet: quæ uerò extrinsecus, præincipientes. Hæc Galenus. illa. n. uerba & internas & externas, nisi malit, ut nunc uulgus medicorum insueuit & interpretis, non Galeni existunt. E quibus me herclè Galeni uerbis phæbo clarius est, antecedentes præcedentesue causas duntaxat internas supposuisse: quæ & esse unà cum affectu, morboue (perindeut paulò prius enuntiauerat) & abesse etiam ab illo possunt: Cum affectus ipse morbusue constans, permanensq; sit: quemadmodum alibi comprobat. Id quod coniunctis minimè congrueret: ut quæ unà cum morbo, & esse, & abesse necessariò debeant. Secundò librum de morbis & Symptomatibus tertium Leoniceus considerasse uisus est, cui uolumini de Symptomatum differentijs ipse etiam Galenus titulum præbuit. ubi quidem triplex Symptomatum (generatim uniuersimq; sumpto nomine) genus, pro dicendorum claritate, uelut stigans: sub quibus & morbum, & actionem læsam, & quæ uelut umbra corpus, ita morbum uel necessariò consequuntur, uel sorte quadam concomitantur Symptomata, spætim uidelicet sumpta, nec non quasdam passionēs, quæ. s. præter naturam sunt, atq; ipsas etiam causas inclusit: Ea deinde singillatim omnia definiens, causam quæ morbum præcedit, græcè similiter προηγούμενον, nullam de continente coniunctâ ue mentionem faciens, bis eodè capite determinauit: sic (ut iudicandi cuiq; libertas offeratur) exordiens. His sic se habentibus ac definitis. Cum morbus affectus quidam sit præter naturam, lædens actionē, fieriq; possit ut morbum ipsum alter præcedat affectus dispositio ue, qui & ipse quidem sit præternaturam, neq; tamen suapte ratione, neq; per se, sed interueniēte morbo lædat actionem. Τὴν τοιαύτην διαθεσιν οὐ νόσημα καλεσόμεν, ἀλλ' αἰτίαν προηγούμενον νοσήματος. quod est, hunc affectum non morbum uocabimus, sed causam morbi præcedentem. Quod si accuratè mentem adhibueris, hunc affectum causam uocare potes, eò quod actionē uiuat, non per se tamen, neq; primò, sed per accidens & secundò tum impediri tum lædi per ipsum dixeris actionem: at à morbo ipso sui ipsius ratione, & primò. Itaq; dicendo Morbum esse corporis affectum, qui impedit functionem, ijs qui subaudiunt primò & per se satisfacit oratio. Verum ob rudiores & rixosos, addendum est & primò & ut huiusmodi reddatur sermo. Morbus est affectus (διαθεσιν græci dicunt, cui uel affectum, uel dispositionem latini reddunt) corporis actionem aliquam impediens primò. Affectus uerò qui hunc præcedunt, non appellantur morbi. Quod si alij quidam affectus superuenerint coincident ue, sequentes ueluti umbra, ne hos quidem morbos uocabimus, sed Symptomata casusue. Itaq; non quicquid in corpore præter naturam fuerit, id protinus morbus nominari debet. Sed quod primò lædit actionem, morbus: Τὸ δὲ τούτου προηγούμενον, αἰτίον

μὲν

k. eodem. f. cap.
8. circa. prin.

l. 2. eiusdem. 3.
& lib. de sympt.
differentijs cap. p.
2^m.

m. cap. p. post
medium.

„ μὲν νοσήματος . idest : hunc autem morbum præcedens , causa quidem morbi , non morbus
 „ appellabitur . Si uerò alius quispiam affectus in corpore morbum sequatur , ipse sympto-
 „ ma duntaxat nominandus est : quis functionis quoq; noxa , symptoma sit animæ . & c.
 Quæ quidem omnia sic ad uerbum referre decreuimus : cum ut præcedentis causæ determi-
 nationē exquisitiùs neoterici perpendant , tum ut idipsum interim aduertant : cōmuniter . s.
 generatimq; sumptum ~~ἀφ' αὐτοῦ~~ , latine affectus , dispositionis uel nomen , de causis etiam , sym-
 ptomatibusq; , nedum ipsis morbis (de quibus tamen propriè sumptum duntaxat dici pluri-
 3^m . mūm solet) Galeni etiam dogmate prædicari . At ad Leonicenum primū quæstionis motorē
 conuertamur . qui quidem deinceps Galeni libellū de contentiuis cōtinentibus uel causis seor-
 10 sum , & ex proposito disputantem perlibrauit . Cuius uerba referre nequimus : quia talē
 librum habere , nec græcè , nec latine licuit . ipso autem Leoniceno referente causas contenti-
 uas nullo pacto dari , uel rationibus probat . præsertimq; quoniam morbi affectus permanē-
 tes sunt , absq; causa consistere potentes , factiq; iam : Quaderē coniunctæ causæ definitio mi-
 nimè congrueret . quæ est ut ablata causa , morbus statim remoueatur : quemadmodum ea
 posita , positus extemplo est . Adeò ut pluribus in locis Galenus ⁿ causam fientis morbi ab-
 scindere priùs : pro futuri . s. præuisione cautelaq; præceperit : dein uerò ad eam quæ facta
 iam est ægritudinē , à qua operationes primò & per se læduntur , uereq; morbus est , perue-
 nire docuerit . Cuius intentio statim remota causa cessaret , euanesceretq; , si cōiuncta con-
 tinens uel fuisset . Alibiq; ^o nomine suo scribens Leonicenus Galeni sententiam eodē in præ-
 20 tacto libello refert : philosophos uidelicet stoicos primos contentiuas causas nominasse scriben-
 tis , & Athenæum Attaleū , propter eam quam habuisset cum Possydonio philosopho con-
 4^m . suetudinem , primum cæpisse de causis contentiuis in medicina loqui . Demum artis medi-
 cinalis locum librabat . quē de fiente quoq; morbo sermocinans , & in præseruatua , &
 „ curatiua intentione cōtineri , præscribens , ita subdit . ^p Eius autem quæ adhuc sit ægritu-
 „ dinis , quod quidem factum est curare opus est , quod autem futurum , prohibere ne fiat .
 „ Prohibebitur ^q autē , sublata ea dispositione affectu uel , quem sequi natura apta est . Talis
 „ autem dispositio affectus uel causa antecedens appellatur . Facta autem ægritudo curabitur ,
 „ soluta ea dispositione , à qua primum ea quæ secundum naturam læditur operatio : quam qui
 „ dem & ipsam morbi essentiam dicimus esse . Sic . n. ipsemet Leonicenus textum correxit ,
 30 pro ἀπὸ τοῦ , οὐκ ἀπὸ τοῦ legens . tametsi alij uel corrigendi , uel interpretandi modi sint : quos
 proprio loco (deo dante) propalabimus . Vbi uel cæcis apparet Galenū præcedentem dū-
 taxat causam cognouisse , continentem coniunctam uel uti nullo pacto existentem dimittendo .
 Quam si dari somniasset : proculdubio alicubi remouendam , quin multò magis q̄ antece-
 dentem præcepisset . Hæc sunt quæ Leonicenum prorsus coniunctam causam abnegare
 (Galeni dogmate) commonuerunt . (coniunctam dico morbi , actionis uel huiusmodi coniuncta
 causa ipsemet morbus , uel Galeni testimonio , ^r existit) Nihil obstare subdentem , uel de pul-
 suum causis librum : qui coniunctas quoq; continentes uel causas fientis , atq; in motu peni-
 tus existentis passionis , non morbi , qui permanens affectus est admittit . ^s Neq; ulterius
 Introductorij authorem contra nos ualere : Cum spurius illegitimusq; Galeni liber existat .
 40 Hæc . n. duo duntaxat aduersari posse primus aduertit . Verumenimuerò quia per facile
 quidem est inuentis (prout ex Aristotele , Galenoq; prædiximus ^t) addere . Idcirco plurimi
 deinceps

Nota.

Affectus de
 omnibus rebus
 præter natu-
 ram prædica-
 ri solet.

n. ut . 3. art. med.
 4. 1. et 2. aphorif.
 22. 8. meth. p^o. xi.
 eiusdem . 2. 4. 8.
 x. et 13. eiusdem.
 2. 2. 6.

o. lib. de epide-
 mia ut Motuus , ac
 Brasauolus refe-
 runt hoc n. lib. care-
 mus . uide tamē in
 fra argumēto 10.
 ex . 2. de natura
 humana.

p. tex. 33. lib. 3.

q. ibidē tex. 34.

r. lib. de symp.
 differentijs cap. p^o.
 et pⁱ de locis aff.
 2. & p^o. & 2.
 methodi.
 s. lib. p^o. de pul-
 suum causis cap.

p^o.
 t. supra fo. 33.
 uersus finem.

deinceps hanc litem ruminantes, plurima hinc & inde obstantia subiunxerunt. Ut autem quem exorsi iam sumus ordo conseruetur: quæ. s. (Galenī mente) negandam indigitant: & loca, & rationes perlibrare. propterea & alia deinceps prosequamur. Librum ergo de morborum causis non semel percurramus. ubi (& si non alijs in locis) determinasse omnino oportuerat: Nī mancus imperfectusq; omnino esse decreuerit. Attamen antecedentes tan-

u. cap. 2. infine.

2b. 2ul. 2ul. 2ul.

2ul. 2ul. 2ul.

2ul. 2ul. 2ul.

Nota.

x. in probæio
primi libri & sc
pe.

y. ibidem.

z. ex cap. 2. eius
dem infine.

6m.

Contra mu =
sam.

a. cap. 2. secun-
dum nost. am ue
rò diuisione. 12.

7m.

b. circa medium
libri cap. 9.

tum hoc pacto declarauit, dicens: "Redeamus igitur ad id quod propositum nobis erat, nem-
pe ut singulorum simplicium morborum causas explicemus præcedentes, usq; ad præinci-
pientes. Neq; n. fuerit absurdum inutileue eos qui ita earum appellationes (dilucidioris
doctrinæ gratia) distinxerunt, imitari: Eas. n. quæ in ipso animali consistunt, siue affe-
ctus dispositiones ue, siue motiones præternaturam, causas nominant præcedentes (græcè
προηγούμενας) morborum: quæ uerò extrinsecus adueniunt, & alterant, immutantq;
uehementer corpora, præincipientes causas, & præinceptiuas (græcè προκαταρχοντα,
καὶ προκαταρχικά & ἰτ' α) appellant. Vtroq; n. nomine græci externas haud teme-
rè describunt: à uerbo. s. προκαταρχεσθαι, quod sic principium primum, & incipere si-
gnificat: ut quemadmodum in musicis, & canentium choro sit: in quibus choreæ dux pri-
mam carminis modulatus partem, reliquum uniuerso choro, silens ipse, canendum reliquit.
Sic in huiusmodi motu principium exteriores causæ (quas nonnulli Celsus^x imitati euidē-
tes nuncupant) exhibere apparent: quibus deinde cessantibus, internæ (quas abditas idē
Celsus^y appellat) motus alterationis duces esse consueuerunt, neq; n. προηγούμενα aliud
significat, q̄ in itinere, in acie, in omni demum agenda re, ducem, & præuium esse plu-
res autem non esse Galenus ipse, in eiusdem libri calce, ijs uerbis adiunxit. Atq; ut summa
tim dicam omnes huiusmodi morborum causæ aut extrinsecus irruunt, aut ex ipso corpore
oriuntur. Extrinsecus quidem adueniunt, quæ uulnerare, aut collidere possunt. A cor-
pore prodeunt immoderati, & incompositi motus animalis, & humores quidem depraua-
ti, qui erodendi uim habent. quos motus, dispositionemq; præcedentes causas (si quidem
quæ prænarrata iam iam sunt^z reuolui) nuncupabat: eos in hoc æmulatus, insequensq;
qui (clarioris doctrinæ gratia) præcedentes internas, externas uerò præincipientes nomi-
narunt. Maximum quoq; huiusce positionis inditium firmissimamq; coniecturam esse nō-
nulli uolunt quoniam liber cui titulus ē de causis procatarctiis & inest, de præcedentibus an-
tecedentibus ue nonnunq; meminit: de coniunctis uerò nullam penitus mentionem faciens.
Quem nihilominus librum non semel uniuersum percurrrens nullam de præcedentibus etiam
causis mentionem fecisse nominatim inuenire unq; potui: nisi de procatarctiis semper (quas
erastriatus ineptiq; illius æmuli morborum causas esse negabant) Acriter disputantem.
quarum occasione, causas rerum omnes, tam materiales, q̄ finales, instrumentalesq; quin
& eas, quæ per accidens causæ existunt, nedum efficientes percurrit. Nisi uelis antece-
dente propterea nominaſſe: quia semper cuicumq; febris, phlegmonem (erastriati placitis)
antecedere aliquādo narrauit. ^a quo tamen in loco, tum quia græco quidem codice caremus,
tum etiam quia nec præcedentes neq; coniunctas causas nominare intendit, sed erastriati
duntaxat opinionem à se reprobendam recitare: nil proposito nostro conducens eligere pos-
sumus. Ad alia igitur properemus: librumq; aduersus Iulianum speculemur. quo in loco
^b manifestum est continentem causam, in his, quorum esse absolutum est (cuiusmodi morbos
necessario

40

necessario fore praediximus^c omnino respuere. Vbi & stoicorum quoque sententiam extis-
 tisse ait. continentem causam & ponere, & tali nomine significare. Contra quos tamen libro
 de plenitudine^d acriter (ut uidere perfacile est) arguetur, ad impossibile illos infinitumque,
 & ab omni ratione semotum perducens. Præter hæc autem, & Quartum Salubrium uolumen
 8^m. percurrentibus euefligio quæ præscripta iam sunt, ualidiori neruo roborantur: ubi sponti-
 narum lassitudinum causas indigitare uolens ait. Causa uero unde ea nascitur (.f. lassitudo,
 quæ nil aliud, q̃ affectus morbi ue symptoma ē) affectus lassitudinis, lassitudinaceus ue (ut
 sic dixerim: græcè κοπῶδης) est: Porro huius rursus ipsius (.f. affectus morbi ue) causa hi-
 fariam scinditur: Aut enim intra ipsum animalis continetur corpus: καὶ ὁνομάζεται τῆς
 10 νικάντα προηγούμενον αἴτιον. id est, & uocatur tunc præcedens causa. Aut omnino non
 inest, καὶ καλεῖται προκαταρκτικὸν αἴτιον. Hoc est: & uocatur præincipiens causa.
 Verba enim nos illam internam, hanc externam nō incōmodè uocemus: interpretis, nō Ga-
 leni sunt. Quam diuisionem deinceps paucissimis rursus interiectis repetit, ne somno quidem
 coniunctam imaginans: Quemadmodum Quarti quoque libri de acutorum diæta loquentis Au-
 thorem enarrans: quum uidelicet legitimi causi uniuersa symptomata percurrit: passionis inq̃
 significatiua, assidentiaq̃: nec nō præcedentia, & exteriora: Sic demum cuncta recolligens,
 15 subdit. f. οὕτως αὐτάρκως γέγραπται τινά. τῶν γάρ τοι λελεγμένων, ἐνικαμέν ἐστι
 παθολογικὰ συμπτώματα τῶν καύσων: Ενία δὲ συνεδρεύονται. τῶν γεννῶν
 τῶν δὲ αὐτῶν, τὰ μὲν ἐστὶ προηγούμενα: τὰ δὲ προκαταρχοντά γε καλούμενα ὑπὸ
 20 τῶν ἰατρῶν. πάντων γοὺν ὧν ἔδον συμπτωμάτων ἐξέτι σοι τὸν κατάλογον
 ὡς ἀνέθελοις, ποιῆσθαι. ἀλλ' ὅγε γράψας τὸ βιβλίον, ἤρξατο μὲν ἀπὸ τῶν προ-
 γοιμένων. τὸ γὰρ ἀναξερανεῖναι τὰ φλεβία, προηγούμενον αἴτιον ἐστίν. quod est, sic
 abunde, sufficenterq̃: scripta quædā sunt. Eni uero eorū quæ dicta sunt, quædā incenditū passio-
 nū significatiua sunt: quædā uero assidēt. Generatiū uero has, Alia qdē præcedētia, Alia ue-
 25 rō præincipiētia à medicis uocata sūt. Oīum tamē, quæ dixi, symptomatū potes tibi, ut lubet,
 catalogū facere. Sed q̃ librū hūc scripsit à præcedētibz fecit exordiū. Venulas etenim exicca-
 ri præcedēs causa est. Quo qdē in loco nullā pariter de cōiuncta causa, tanq̃: neutiq̃: inuenta
 mentionē habuit. Id ipsum interea notatu dignū est: in uerbis illis: omniū tamē quæ dixi sym-
 30 ptomatū: ab aliquo fortassis incauto scriptore additū esse: προηγούμενων. & ut dicatur: præ-
 cedētū symptomatū: quod uerbū sic in cōsultē adiectū: oēm penitus sententiā, apud emunctæ
 1^o. naris uiros, perturbabit: Prægrediēs enim præcedēs ue symptoma unū dūtaxat, ex libri au-
 thore, prædixerat: uenularū inq̃: exiccationē. Alterū uero, biliosi tenuissimiq̃: succi ad easdē
 uenulas à ualidioribus mēbris reiectionē, ipsemet adiunxerat. Quid igitur sibi uult: & omnium
 prægredientiū symptomatū: & (tametsi causas quoque symptomata generatim nūcupari posse
 2^o. & inficias ire quiuerit nemo.) Præsertim quia statim subdit: & Sed qui librū hunc scripsit à
 3^o. prægredientibus fecit exordiū. & At ne alia quidē, pathognomonica inq̃, & assidentia, uel
 exteriora symptomata προηγούμενα, hoc est, prægredientia, præcedētia ue nūcupāda unq̃
 ueniūt. Sic igitur tuta fronte legito: & Omniū autē, quæ dixi symptomatū: hoc est passionis si-
 40 gnificatiuorū, assidentiū & tam exteriorū præincipientium ue, q̃: præcedentium, & potes tibi
 ut lubet catalogum ordinem ue facere: ab exterioribus uidelicet, aut à pathognomonici-
 cis, uel alijs quibus uis exordiendo. & Huius uero libri author à præcedentibus fecit exor-
 C dium

e supra fo. 34. in
 fine argumenti
 p. ex lib. de sym-
 ptom. differentiis
 cap. p^o. & 2. me-
 thodi cap. 3. & li-
 bro etiam primo.
 d cap. 4. secun-
 dum nostram di-
 uisionem.
 e post principiū.

f com. 4. circa
 medium.

Galeni locus.

g ex lib. de symp-
 tomatum differen-
 tiis cap. p^o.

dium & quæquidem & si generatim symptomata nuncupare queamus, sp̄atim nihilominus
 causas, atq; has iterum præcedentes appellare medicorum, ac præsertim Galeni, consue-
 tudo est. Sed alia deinceps pro maiori prædictorum, de continente coniuncta ue causa, cō-
 10^m firmatione, perpendamus. Secundo igitur de hominis natura commentario, illius uolumi-
 b com. primo. nis (quisquis fuerit) authoris prima uerba enarrans^b & quos. s. repletio parit morbos, eua-
 cuatio curat & Nō idē est (inquit) si dicas morborū esse continentem causam repletionem, &
 uacuationē singulaq; insequentia: atq; ex repletionem oriri, aut alia ex re. Etenim uerum est
 quosdam morbos generari ex repletionem, uel à repletionem (nihil. n. interest hoc an illo modo
 loquere) At falsum est morbi continentem causam esse repletionem. Sic. n. græcē ad uer-
 bum inquit: οὐκ ἄλλῃθες δὲ συνεκτικὸν αἷτιον εἶναι νόσηματος πλεονομήν. paucisq; rur
 10 sum interpositis hæc adiunxit: Quæ ob interpretum diuersitatem, quin rectius dixerim, con-
 fusionem, suo quoq; Galeni idiomate recitabimus. ἰσως ὅν λεγεται καὶ τῶν ποιοῦντων
 τὰς νόσους, ὅν μόνον αὐτῶν τῶν ἡδὴ γεγενημένων νόσων. εἰ δὲ τῶ κρείων καὶ αὐτῶν
 ὀνόματι χρῆτο τὸς, προηγούμενα τῶν νόσων. ἐρεῖ τὰ τοιαῦτα τῶν αἰτίων,
 ὥσπερ ἀθηναιος, ὅφ' ὅν δὲ πάλιν αὐτὰ τὰυτα τὰ προηγούμενα γίνεται, προκα-
 20 ταρκτικὰ τε καὶ προκαταρχοντὰ καλεῖσθαι. quod est curatio igitur dicitur etiam eorū,
 quæ morbos efficiunt, nedum ipsorum generatorum iam morborum. Siquis uero nomine
 horum proprio utatur, morborum præcedētes id genus, causas dicet, quemadmodum athenæ-
 us. Aquibus autem rursus hæ ipsæ præcedentes fiunt, originem ue trahunt, præincep-
 tiuas, & præincipientes nominabis. In quibus quidem uerbis negare iam expressius ui-
 20 detur, nedum sub silentio coniunctam causam prætermittere. ut cæcis etiam liqueat prorsus
 abnegandam, & à causarum catalogo delendam, id genus, causam, Galeni dogmate, fore.
 Simulq; athenæū præcedētes causas, haud uerò continētes nominaſſe, ex Galeni uerbis li-
 30 quet. quanuis eum Leoniceusⁱ primum de continentibus causis, propter eam, quam ha-
 buisset cum Possydonio consuetudinem, scripsisse retulerit. Ni aut alterū Athenæum: Aut
 2^a. eundem diuersis tamen temporibus: uidelicet senectutis tempore, causas continentes, ob il-
 3^a. lius consuetudinem appellare demum incepisse dixerimus. Vel tertio de prauatam Galeni li-
 teram contenderimus: ut præcedentium loco continentes habere debeat. Id quod non pe-
 nitus quidem à ratione alienum uidetur: quoniam actu facientium morbos causarum cura-
 tionem, ut in aphorismo^k etiam dicitur, inquit. Quicquid tamen sit, litera quam habemus
 11^m præcedentes id genus causas, ipsius ēt athenæi testimonio, nuncupat. Quæ obrē & multitudine,
 & lentitiē, crassitiemq; præcedētes obstructionis causas haud cōtinentes aliquādo appel-
 11. meth. cap. lat^l: propriam oppositionis rationē præferre uolēs. Quas tamen (si quæ cōtinentis causæ
 13. in prin. nomenclaturā merita sint) nullo unq; pacto tali nomine deſutuendas esse, nulli nō phæbo cla-
 rius esse opinamur: ut quibus taliū definitio perbellē cōgruat: cū eis uidelicet positis, ob-
 structio ponatur: ablati uerò, q̄ primum & ipsa dispereat: perinde ac auctis, cōminutis ue, eā
 12^m iā præactū ē, προηγούμενα αἷτια, hoc ē, præcedētes causas (cōiunctarū nomē abhorrēs) no-
 minauit. Pariterq; putredinē ab oībus barbaris cōtinētē cōiunctā ue causam dubiō procul ap-
 pellatā Galenus nō cōtinētē, sed præcedētē uocauit^m dicens. ἡ σήπιδὼν τῶν χυμῶν,
 40 αἷτιον τι προηγούμενον τοῦ πυρετοῦ. i. putredo humorū, causa quædā febris præcedēs.
 m xi. meth. cap. 9. in fine. Quibus

Quibus quidem & Aristotelis philosophorum sine calumnia principis auctoritatem adiunge
 re possumus: quum effectiuas causas formalibus comparans, ait: " Mouentes quidem igitur
 causæ ὡς ἀπορροιαὶ καὶ ὅτι α, quod est, uelut prius factæ genitæ ue existunt: quæ
 autem ut ratio: simul. Quando n. sanatur homo, tunc sanitas est: & figura æræ sphaera,
 simul & ærea sphaera. Formā igitur Formalem ue morbi rationē, coniunctæ causæ nomen:
 Efficientes uerò (quas impræsentiarū uestigamus) prægenitarum, ac per hoc præcedentiū
 prægrediētium ue appellationem sortiri, uel philosophi (præter Galenum) dogma esse, li-
 quiddo cospeximus. Sed ne ratione quidē ultra ea, quæ præscripta iam sunt, huiusce opinionis
 sectatores destituuntur. Triplex n. cū sit (Galenī quoq; sententia^o) morbus, aut. s. factus, aut
 10 fiens, uel demum futurus fieri. Facti causam ponere cum absolutum iam sit, dementis es-
 set, Futuri autem si causam assignare contenderis: præcedentem hāc esse, haudquāq; uerò
 coniunctam, ni iotario stolidior, ipsorum quoq; barbarorum monumentis admittes. Sin siēs
 adhuc morbus sit, duplex ipsius fiētis pars est: facta uidelicet, ac futura fieri: factæ ut
 diximus causa non amplius est, futura autem præcedens. Nil ergo remanet cuius coniun-
 ctam aliquam causam proferre queamus. Quod si fiens non in partes dissoluere libuerit: at
 ipsum fiens, quatenus fiens est, considerasse mauis, id utiq; morbus non est: sed Pathos.
 Cuius coniunctam dari causam nullus est, qui abneget, præsens autem sermo ipsius morbi,
 nequaquā uerò passionis, aut symptomatum, causas uestigat. Qui, profecto morbus perma-
 nens est, non factus modò affectus, primò ac perse functiones offendens. Cuius continentē
 20 assignari causam (morbificam nonnulli uocant, coniunctam ue) perinde recentiorum plu-
 rimi abnegant, ut eos qui hanc admittunt immedicabili theonis mordacitate, rabieq; admo-
 deant. Quibus tamen morsibus hi quamplurima obstantia exacteq; & satis superq; suc-
 currētia præsidia admouisse opinati, maiori deinceps rabie retaliando sic remordent: ut
 Aesculapio indigentia uulnera, nedum Hippocrate, impegisse machinati, cælum uocife-
 rando concutiant. Famofum nanq; ac ueluti axioma penes oēs ferè tam græcos, q; latinos,
 atq; arabes, tum philosophos tum medicos est, cōiunctā causam, effectui propinquā, nominare.
 eamq; omni penitus abiecto scrupulo admittere. Cum præcipuè Medicorum arabum Prin-
 cept^o Hanc non definierit modò: eam. s. tali nomenclatura intelligens, inter quam corpore-
 am iam existentem & morbum nulla alia media est causa. Verum exemplis quoq; demò
 30 strarit: ut putredo quidem, febris: & humor porulos ingrediens, obstructionis: & obstru-
 ctio, cæcitatē. Si nanq; inter ipsam causam & affectum alia interponatur: antecedens
 ab ipso dicitur. quemadmodum repletio, febris, & receptaculorum oculi: ad quem descen-
 dere, obstructionem factura, talis repletio potest. E qua deinceps oppilatione cæcitas quoq;
 generanda sit. Ab ipso autem Arabum medicorum Principe nullus ad nostrum usq; æuū
 deflexisse uisus est. Adeò ut famofum existens, omni ex parte falsum opinari nouissi-
 mum sit. Eoq; maiori hoc admiratione dignum foret: quoniam ingeniosissimus cum fue-
 rit & philosophus & medicus Princeps, rē adeò falsam proculdubio aduertisset, à ueròq; phi-
 losophorū dogmate alienā condemnasset: Etenim distinctionibus medico potius, q; philosopho
 cōgruis Galenus magis: perinde ut physico decentioribus ille frequētius utitur. Quid si Auer-
 40 rhoē perpēdamus, arabū quoq; philosophorū nō iniuriā spirarchū? Hic. n. Auicēnæ distinctio
 nē interpretās, eā ut uerā, absq; ullo prorsus scrupulo, permisit: eamq; definiēs (q. s. ablata,
 & ipsa

13^m.
 n. 11. metaphy.
 tex. 16.

14^m.
 o. 3. art. med.
 tex. 32. & . 2. az
 phorif. 22. 8. me
 th. cap. p^o. & ali
 bi sæpe.

In opp.^m.

p^m.
 p. 2^a. p. doc. 2^a.
 sum p^a. cap. p^o.
 & p^a. parte can-
 ticæ canticorum
 tex. 177.

2^m.
 q. p^a. parte can-
 ticæ canticorum
 cō. 176. & 177.

Et ipse morbus auferatur) exemplo declarauit: sicut putrefactio (dicens) quæ est causa
 caloris extranei. Sin barbaros fortasse, in maioris momenti syntagmatibus alius, nausean-
 do respuas, ad nostros quæso latinos conuertere. In quorū catalogo satis superq; fuerit prin-
 cipem (ueluti & inter arabes obseruauimus) Cornelium re, nedum cognomine, Celsū con-
 sulere. Quem sic, absq; titubatione, loquentem inuenies. Igitur hi, qui rationālē me-
 dicinam profitentur, hæc necessaria esse proponūt. abditarum, & morbos continentium
 causarum notitiam, deinde eidentium, &c. & iam rationalium medicorum esse coryphæ-
 um Hippocratem prædocuerat. Verum quia solos hodie græcos, eorumq; monumenta se-
 ctari uniuersus ferè orbis profitemur: neq; id temerè, cū omnis inde perfectio emanarit: Hæc
 obrem omisissis, neglectisq; latinis, nedum arabibus barbaris ue authoribus, ad græcos con-
 fugere (uelimus nolimus) res met ipsa loquens impellit. Inter quos nobis propinquior, omni-
 busq; ferè pernotus occurrit Ioanitiū monachus (ut aiunt) cretensis: qui quidem Isagogis
 cum ad artem medicam opus conficiens, deq; causis demum loquens, ait, ^s Modi occasionū
 infirmitatem facientium tres sunt: Nam aliæ sunt quæ uocantur primitiue, quæ exterius
 accidunt corpori: ut calor & frigus. Sunt & antecedentes, quæ admouentur intrinse-
 cū in corpore: ut repletio, & inanitio. Sunt & aliæ, quæ uocantur coniunctæ: quæ
 dum adsunt, adest infirmitas, & abeuntibus his, infirmitas abest. Ut putredo in febris
 bus. Quia græcis eius uerbis caremus: idcirco ut traducta antiquius sunt, sic ea recitauim-
 mus. Ab hoc uerò philotheum perlege, sic proprio idiomate scribentem: ^m τὸ δὲ αἰτιολο-
 γικὸν διαγίνεται τὰς προκαταρκτικὰς αἰτίας, αἵς προηγούμενα, καὶ αἵς συνεκτικὰ.
 Quod est: pars autem causarum ratiocinatio diuiditur in præinceptiuam causam, in præ-
 cedentes, & in continentes. Sed neq; his duntaxat quiescendum, ad Definitionum ergo
 medicarum authorem (quisquis ille fuerit) conuertamur: antiquus n. græcus est. & si nō
 Galenus, uel saltem non totus eius legitimus sermo sit: hic tamen unā cum præscriptis con-
 tinentem causam admittens ait. ^m causa est quæ in corpore quidquam facit: ipsaq; incorporea
 est. Alia uerò procatarctica præincipiens ue est (nonnulli antegressam, uel externam
 uertūt) Alia cōtentiua, seu continēs, aut cōiuncta. quædam uerò antecedēs, seu præcedens
 (uarijs, n. nominibus singulas dictiones, aliqñ græcis semper easdem, describunt) Sic igitur
 græcè ait: ^m ἐστὶ δὲ τὸ μὲν προκαταρκτικόν, τὸ δὲ συνεκτικόν, τὸ δὲ προηγούμενον.
 Singulasq; deinceps definiens, ait. procatarctica est quæ cōfēto opere discessit: uelut canis,
 quū momordit: & scorpius, cū ictum inflixit: & inuslio à sole, quæ febrē parit. Cōtentiua,
 seu continēs, coniuncta ue est, quæ quū adest præsentē cōseruat mortū sublata uerò tollit. ut
 calculus in uestica: in oculo aquila, unguis alā ue græci ^m τρεῖς ὧν uocat, & encāhis &c.
 alijsq; multis interpositis uerbis ita rursus ait: cōiuncta causa est (male n. antecedēs & græ-
 cè, & latine, legitur) ea qua præsentē adest affectus, & aucta augetur, & minuta minuitur,
 & sublata tollitur. Cōmunē uerò causæ continētis apud rationales medicos opinionē exti-
 tisse Introducōrij quoq; author: siue (ut nonnulli uolūt) Herodotus, siue quiuis alter: aut ipse
 etiam (aliqbus tamen spurijs interiectis) Galenus manifestissimè testatur: dū præpositis, &
 empiricorū & methodicorū sententijs ita de rationalibus cōclust: ^m Quemadmodū rationa-
 libus causæ, licet ipsi nihilominus, tum affectus, tum cōcursus ingrāt: totū aut causis attribuit.
 Causarū autē nonnullæ procatarcticae (quas euidētes interpres uertit) Aliæ cōtinētes, quædā
 coadiuuantes

^m
 r. in probæ. p.
 post. prin.

s. cap. 40.

^m
 t. p. aphorismo.
 com p.

u. ante medium
 libri.

Libri. Def.
 Medi. Locus.

^m
 x. cap. 8. post
 prin.

coadiuuantes, aliquæ concausæ: reliquæ præcedentes dicuntur. Omissis autem aliarum
 definitionibus: ita coniunctas determinauit. συνεκτικὸν δὲ αἴτιον ἐστὶν, οὗ παρόντος,
 παρῆστι καὶ τὸ νόσημα, καὶ ἐξαίρουμένου, λύεται, ὡς σκόλοξ, καὶ βέλός.
 quod est: continens autem causa est, qua præsentē, præsens est morbus, & ablata dissolui
 tur: ut spina, & telum. Quod si præscriptos authores neglexeris dioscoridem profectō ma
 ximi, apud Galenum quoq; nominis uirum neglexisse non debueris. hic igitur continentē
 quoq; causam admittit. Quauis. n. ex methodicorum opinione distinctionem præposuerit,
 aliquas. s. procatarcticas, aliquas uerò coniunctas esse dignissimè ponentium: quibus ambas
 bus definitis: ab utriusq; natura derelictum à morfu uenenum, corruptionemq; faciens
 10 (φθοροποιὸν græce uocant) perinde secerni uolunt, ut causam nuncupare minimè suffe
 rant. Ipse tamen Dioscorides, ad improbandam illorum phantasiā, præassumpta causæ
 definitione: quodcunq; s. agit operaturq; causam in singulis eorum quæ in corporibus fiunt,
 se se ostēdere: sic deniq; cōclufit: Quoniā autē causarū differētis gaudent, alias cōtinētes, alias
 uerò præincipientes, appellantes: dicendum ipsis est, alterutro istorum modorum, Proca
 20 tartticam. s. præincipientem uel dici causam: q̄ effectum præcedit, quodq; corporis cōpagem
 præoccupat: Continentem uerò q̄ præsentibus passionibus, adest & ipsa: remotaq; ea, se
 mouentur. quæ cum ipsa eueniunt. Mortiferam itaq; uim, à uenenosorum animalium de
 morfu corporibus illapsam, continentis causæ exemplum (cum illius definitio sibi cōgruat)
 Dioscoridis anaZarbæi testimonio fuerit. Verum qui Galeno penitus se uenditarunt, illiq;
 20 addicti, magis, q̄ suis dominis serui sunt, altius uocem eleuant, Galenum id genus causæ
 alicubi numerantem uel conuictis efflagitantes: Idcirco Galenum quoq; medicorum non in
 iuriā Phæbum contēplemur: quem boni Imperatoris more, ceu magis strenuum, in ulti
 ma acie collocauimus. In fronte igitur libri, in quo pulsuum causas inquirat, statim conti
 nentes generationis causas posuit: quemadmodum alterationis, tum euidentes, tum præce
 dentes causæ sunt. à quibus uniuersalem sermonem agens, non in pulsibus modo, sed in alijs
 cunctis, triplex causarum genus esse statuit: quorum primum & præcipuum est id, quod
 quidem continens appellant. cuius inde nomen deductum est, q̄ illorum essentiam (quorum
 s. causa est) continet. Atq; id ipsum (ueluti iam iam in pulsibus prædixerat) generatio
 nis causa existit. Continentem igitur causam uniuersaliter in omnibus admisisse uidetur. Id
 30 quod pluribus etiam in locis particulariter confirmat: quorum singula percurramus: Ab eo
 quidem primum sumentes exordium: ubi spumosa pituitæ, spumosorumq; ob ipsam excre
 40 mentorum causas uestigat, inquit: fieret autem quandoq; & in ipso uentriculo, unam
 habens (ut quispiam dixerit) causam contentiuam, quomocunq; excernatur, aut fiat:
 antecedentes uerò plures. Est autem huius pituitæ causa contentiua flatuosus spiritus, dum
 humori commiscetur, uehementem habens motum, & inæqualem: ita quod & ipse disrum
 pitur, & pituitam frangit in multas partes & paruas &c. Præterea contra Iulianum
 scribēs, Asclepiadēq; Galenus, cōtinētē causam admittere potius, q̄ respuere (siqdē exq̄si
 tius cōtēplabimur) apparet: tametsi cōtra Iuliani argumentū prius loquēs, quo Hippocratis
 aphorismum ille corrigere nitebatur, plenitudinē continentem esse causam abnegarit: de
 40 inceps tamen Asclepiadis sophisma soluere uolēs, quo probabat plenitudinē, cōiunctā causam
 dici nō posse. Præmissa duplici plenitudinis distinctione: sic demum subdit: ostensum à nobis

8^m.
 y. lib. 6. cap. 35.

2^m.
 z. lib. p^o. de can
 sis pulsuum cap.
 p^o. in prin.

10^m.
 a. 7. apberis. cō.
 30. in prin.

11^m.
 b. l. b. cōtra Iu
 lianum cap. 9.

est i his comētarijs in qbus symptomatū causas enarrauimus: atq; ubi tumores præter naturā tractauimus, conuulsionem interdum, tremorēq; ac in uniuersum phlegmonem, & erysipelas, idq; quod à recentioribus medicis œdema uocatur: aliosq; præterea affectus plenitudinis inniti hypothesi. tū si plenitudinem euacuet quis, ad naturalem q̄primū statum redire membrum. Vbi conuulsionis, tremorisq; (symptomatum) atq; etiam phlegmonis, erysipelatis, & œdematis, (morborum, ut uidebimus, compositorum) talis modi causas ponit. Quibus ablatis q̄primū, cū morbi, tū symptomata tolluntur. Quauis autem ex stoicorum placitis esse, & nomen, & rem adiunxerit. Distinctione tamen deniq; adiuncta (ne de nominibus contendere uideatur) in his, quæ absolutum esse habent, continēt causam prorsus abnegat. adeo ut plenitudo febris absolutum quidem esse habentis coniuncta continens ue causa non sit. In his uerò quæ in generatione suum esse habent, ab ipsaq; causa omnino, tū in esse tū in conseruari, dependens, eā utiq; admittit. Quamobrē phlegmoni tumoribusq; alijs præter naturam (ueluti posterius longiori discursu elucidabimus) coniunctam subesse causam inueniemus: qua profectō posita tumor fit: eaq; rursus ablata, q̄primū & tumor ipse, uel talis tantusq; existens ut functiones perse ac primò offenderit, euanesceat. Quibus sic se habentibus tam Iuliani q̄ Asclepiadis fundamēta ruent. *Quid quod Hippocratis etiam aphorismus huiusmodi causæ astipulari uidetur, dicens: 'Quicunq; morbi ex repletionē fiunt, facietate ue, curat euacuatio. haud enim curaret euacuatio morbum: nisi coniuncta causa repletio esset: Qua remota, statim & morbus ipse deletur. Aliàs remota repletionē, oporteret ad morbi curationem peruenire. illius ergo re-* 10

motio non curatio foret: sed futuræ duntaxat partis præseruatio. At alia Galeni loca percurramus. De symptomatum nanq; causis, proprio iam loco sermocinans, continēti de causa meminit: quū sic ait. ^d Molestia quidem est pupillæ paruitas, quæ præter naturam accidit: bona uerò quæ innata est. At amplitudo innata quidem uitiosa est: neq; uitio caret nonnaturalis: sed hæc minus mala est, q̄ angustia: ἡ μὲν γὰρ, (ὡς αὖ ἐστὶ τῆς) αἰτίας συννεκτικῆς τῆς γενέσεως αὐτῆς, τῆς ἐστὶ τῶν ῥαγοειδῶν χιτῶνος, ὡς περ αὐτῆς μικρότητος ἢ χαλᾶς. quod est causa. n. (ut quispiam dixerit) coniuncta, cōtinens ue generationis huius. s. amplitudinis, tentio est rhagoidis tunice, quam latinē uueam dicimus: quemadmodum rursus, paruitatis causa, eiusdem relaxatio est. Sed ne semel quidem in eo- 20

dem uolumine coniunctæ causæ meminisse contentus est. stuporis nanq; deinceps generationem enucleare uolens: præmissisq; iam exterioribus, quas procatarcticas diximus, causis: ita demum conclusit. ^e Τὸ μὲν οὖν συνεχὸν αἰτιον, ἢ συνεκτικόν, ἢ προσεχὲς, ἢ ὁπὸς αὐτῆς ὀνομάζου ἐστὶν, τοιαῦτα τῆς ἐστὶν ἐν τῷ νέρῳ ἢ διαθείσῃ, ὡς ἐμποδίζεσθαι τὴν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιπεπομένην αὐτῷ δύναμιν. hoc est. Igitur continua causa, aut contentiua, aut adhærens, uel quoquo modo quis nominare uelit, talis quidam est in neruo affectus, ut facultatem ipsi à principio transmissam impediat. Impeditur autem (pro ut statim adiunxit) facultas hæc, si neruus meatu aliquo præditus (uti manifestē in oculorum neruis uidere licet) uel obstructus est, uel compressus. si uerò meatum non habet: idē illi eueniet, si uel constringitur, uel refrigeratur, seu comprimitur. Stuporis ergo continēt causam, obstructionem aliquando, uel compressionem, aut constrictionem, seu fri- 30

gefactionem in neruis factam posuit. Quin horroris quoq; aut rigoris continentem alibi cau- 40

sam

c. 2 aphorif. 22.
12^m.

13^m.
d. lib. 1^o. ante
mediū. 2. capitis.

14^m.

e. ibidem cap. 5.
post prin.

„ sam admisit. ac praesertim ubi de illis sermonem facere aggressus est, qui cum in balneo se
 „ lauant, horrore tentantur, haec subdens. *ἢ μὴ μὲν γὰρ αὐτοῖς ἐστὶν (ὡς ἀνέκδοτοι τῆς)*
 „ *αἰτίας συνεκτικῆς τοῦ γινόμενου συμπτώματος. ἀλλὰ δὲ κείνης πλείους προηγούνται*
 „ quod est. Vna etenim his est (ut quispiam dixerit) causa continens excitati symptomatis:
 „ aliae uero quae hanc praecedunt, multae. Post quae deinceps & continentem prius (roden-
 „ tium. s. excrementorum confertim actorum citatiorem motum) aliasq; demum explanando
 „ prosequitur. Praeterea quis à Galeni dogmatibus tam alienam continentem causam opinetur
 „ cum in prognosticis quoq; tametsi ex aliorum denominatione, haud tamen falsam esse exi-
 „ stimans, quin rem ipsam ostendat, quam nominare continentem consueuerunt, sic dicens. *ἢ*
 10 „ Cæterum ea ipsa materia, si admodum tenuis, & aquosa est, uix sreatur: ut quae in
 „ pulmone circumfluitet. *τὸντο γὰρ ἐστὶ τὸ πρῶτον αἴτιον τῆς ἀναγωγῆς, ὃ πρὶ καὶ*
 „ *προσεχὲς ὀνομάζουσι.* Id est. Hæc. n. prima causa educlionis, quam etiam adhærentem
 „ nominant. Sed ne admireris quidem: quia *προσεχὲς* latine adhærentē haud *συνεκτικόν*
 „ id est continentem dixerit: ut aliam intellexisse causam suspiceris. Idem nanq; superius, *ἢ*
 „ ex eiusdem quoq; uerbis, continuum, continentem, & adhærentem esse (græcè *συνεχόν,*
 „ *συνεκτικόν,* & *προσεχὲς*) ostendimus Id genus ergo causam adherentis nomine intellexisse
 „ uoluit, quam hoc loci uestigamus. Quin ut communiori barbarorum quoq; uocabulo
 „ utamur, *προσεχὲς* coniunctā, siue adiunctā latine significat. duplexq; (uelut statim sub-
 „ dit *i*) prima causa est, tum materiae uitium, tum etiam id quod initium habet motus. Quam
 20 „ sententiam in comentarij rursum processu *k* comprobauit: quous & eiusdem sputi priuationis,
 „ aliā non adeo primam adiungens, aliquando *l* tres esse causas protulerit. Vbi. s. con-
 „ tinentis pulmonem membranulæ densitatem adhibuit. quemadmodum aliās *m* dolorem quoq;
 „ posuit. Ex quo quatuor dici possunt sputum prohibentes causæ: duæ tamē primæ, atq; conti-
 „ nentes, siue maius dicere adhærentes. Huic autem Galeni loco atq; alteri statim scriben-
 „ do innixi quidam continentem causam, adeo firmiter inuenisse machinantur: ut nulla pro-
 „ sus dehinc ambiguitas remansisse nostris pectoribus debeat. Est ergo alter q̄ primū sc-
 „ duloq; perpendendus Galeni locus: *n* ubi aduersus methodicos disputans, & morborum spe-
 „ cies iuxta causarū actionis numerū examinans, præmissis tum in gustu, tum in tactu exem-
 „ plis, ad tertium deniq; penes uentriculi concoctionem peruenit, sic dicens. Proponatur
 30 „ itaq; iam quemadmodum uenter malè concoquens corrigendus nobis sit. Verba autem
 „ faciemus non solum contra methodicos, sed etiam contra eos rationalium, qui non cognita
 „ ipsius actionis prima causa, *ἢν δὲ καὶ προσεχὴ καλῶν ἐπὶ ὁρατοῖς*: hoc est, quam adhæ-
 „ tem etiam coniunctā ue nominare sunt soliti, methodo quadam, ac ratione constitui posse
 „ artem putant. Equibus manifeste constare iuniorum nonnulli aiunt Galenum non semel
 „ coniunctæ, nedum continentis causæ (quas confundi uoluit) non tam ex sua q̄ aliorū sen-
 „ tentia meminisse. id quod rationibus rursum confirmare non desistunt. Quas tamen ut nul-
 „ lius uel q̄ minimæ efficacæ momentū existentes infra, seorsum quidem ac singulatim cō-
 „ siderabimus. Itaq; nunc Galeni loca prosequamur in quibus coniunctā continentem ue
 „ causam indigitat. Quauis enim primo de patientibus membris uolumine id genus causam
 40 „ nullo prædictorum epitheto nominarit: Eam nihilominus ex definitione intellexisse uidetur,
 „ quū ait, *o* Id quo tangente nos, passio fit, separato uero quiescit, causam esse, omnes
 „ iam

f. x. meth. cap.
10. post prin.

16^m.

g. .2. prognost.
com. 43. uersus
medium comēti.

h. argumēto. 14.
ex p^o. de sympto-
matū causis cap.
5. post prin.

i. ubi supra. f. 2.
prognostico. 43.
k. ibidem com.
67. post mediū.
l. ibidem cō. 60.
post mediū com.
m. com. 43. cir-
ca prin.

17^m.
Est Valeriola de
morb. differ. cap.
.2. com. ultimo.
n. .2. meth. cap.
4. ante mediū.

18^m.

o. p^o. de locis af-
fectis cap. 2. ante
medium.

iam homines confitentur. Sic enim & ignem ustulationis, & gladium sectionis causam esse credimus. atque de singulis alijs similiter dicendum est. Ergo uacuum humorem infestantis passionis causam fuisse, quo tempore in particula continebatur, putandum est. Apprimè igitur coniunctæ causæ definitio, in humoribus quoque, nedum igne, aut gladio, liquet: Quāobrem & iterum post aliqua subiunxit: quippe nonnunquam à causa quapiam oritur passio: sed ita oritur, ut separata causa, haudquaquam iam permanentem habeat dispositionem affectumue. Interdum uero partim iam factus est affectus, partim etiam dum fit. Sic. n. dictionem ἡ δὲ γὰρ οὐκ ἀδύνατον ad ἀδύνατον referendam arbitror: uelut postea Fufius enucleabimus. Perinde uero atque iam dicto loco: alibi quoque aduersus methodicos symptomatica quidem inutilia ad curationem fore contententes acriter disputans, eorumque in symptomaticis facto argumento: in morbis eodem utens Galenus, ita causas morbis coniunctas supponit, ut hi symptomatibus. quemadmodum uidelicet ablatis affectibus morbisue, quāprimum una & symptomata euanescent: ita remotis quoque causis affectus ipsos discedere: quē admodum & illis positis hos constitui uoluit. Exemploque rursus à phlegmonis ac febris etiam causa desumpto comprobatur, dicens. Multitudine igitur pereuacuationem subtracta, si mul & genus per eam morbus tollitur. Sed non propterea quod simul cum efficiente causa morbus recedit, auxilium morbo aduersari dicendum est. Firmari autem coniunctæ causæ opinio potest ex philosophorum coryphæo quoniam de actu operantibus, effectiuisque causis atque ijs quæ secundum potentiam, loquitur, sic scribente, differunt autem intantum quod operantia quidem actuue efficientia, & singularia simul sunt, & non sunt, tum ipsa tum ea quorum causæ: ut hic medens, cum hoc quod sanatur: & hic ædificator cum hoc ædificio, quodue edificatur. Quæ autem secundum potestatem, non semper: Corruptitur. n. non simul domus, & ædificator. Quid uero aliud esse continentem causam diximus, quæ eam quaquidem posita ponatur effectus, remotaque discedat: ut simul sint, & non sint. Sed quid opus est uerbis? Nonne decantata uel à logiculis propositio est, causam & causatum (ut nomina iuxta philosophi quoque decretum finxerimus) correlatiua esse quorum quidem natura est, ut posita se ponant, peremptaque se perimant. Simul. n. natura & tempore, simulque nota passim prædicantur. Hanc ipsam ergo uerè causam dicimus, uerèque sic effectum continentem, ut posita ponatur, ablata uero quāprimum tollatur. At ne pluribus ac opus est immoremur: doloris ut symptomaticis coniunctam continentemue causam esse (à quo dependet) morbum, continui uidelicet solutionem, uel intemperiem, adeo quibuslibet pernotum est: ut probare superuacaneum sit. Hic autem dolor, quoties perinde increfcit: ut uires prosternat, nedum functionibus officiat, morbi rationem subit, curandi ad se intentionem (Galenus documento) retrahens: tunc ergo eandem tametsi auctam causam habens, quam prius dum symptoma dicebatur, non morbus, sed morbum insequens, retinebat: eam proculdubio coniunctam adeo possidebit, ut ablata, dolor hic tollatur, aucta, uel comminuta increfcatur, uel diminuitur, quemadmodum posita, obortus quoque ipse est. Quoniam uero nunc morbus iam est. Morbi ergo continentem causam, & philosophorum, & medicorum, tam græcorum, quæ latinorum, aut arabum, non Galeni modo placitis designari posse satis superque demonstratum esse apparet: Vsq; adeo, donec morbi quidam uenenosè remordeant, plaustaque conuictijs onusta, aduersus oppositum contententes afferant ac Zoili demum è medicis euaserint.

Nos

19.^m
p. libro de optima
secta ad trasti-
bulum cap. 23.

q. infra cap. 25.
eiusdē et uide si-
mile de tum. præ-
ter nat. cap. 2.

20.^m
r. 5. metaphysi.
tex. 3. in fine &
2. physicoꝝ tex.
37.

21.^m
s. in prædictis
cap. de adal. quid.

22.^m
t. 12. meth. cap.
p^o.

NOS autem inter acerrimos hinc & inde litigatores, mutuis adeo se inuicem obiurgijs, in
 numerisq; derisionibus lacerantes (nec aduertentes demum se de nominibus frustra qua-
 sitionem, ac tantum deinde rumorem agitare) medium tenere decreuimus: & causam con-
 tinentem necessariò in quibusdam morborum speciebus dandam esse (modo coniunctæ causæ
 non aliam definitionem q; omnibus concessam, & uel Dioscoridi, nedum Galeno, alijsq;
 iunioribus pernotam admisserimus. In plurimis uerò speciebus (inuitis eam ponentibus) ne
 per somnium quidem talem causam, uerè proprièq; loquendo, exhiberi confitendum.
 Haud graui tamen peccato notandum esse arabum Principem, aliosq; largius, & medicor-
 um more locutos, arbitramur. Quod quidem ut exactius elucidetur, ita exordiendum est.
 10 Vitiorum genera eadem sunt (Galeno^u docente) his quæ uirtutem complent: temperatu-
 ra quidem in consimilibus: numerus autem, & formatio, & magnitudo, & situs in in-
 strumentarijs, utrisq; uerò communis unitas, quam & ipsorum continuitatē appellamus.
 Quamobrem & tria morborum prima genera sunt: primum quod in simplicium, primariq;
 partium intemperie consistit: Secundum quod in organicorum deprauata compositione: ter-
 tium quod in soluta utròrumq; unitate fit. quod siue unitatis, aut unionis solutionem dicere
 malis, siue unitatis corruptionem, aut continuitatis solutionem, aut quomodolibet aliter no-
 minare uelis, nihil referre ait Galenus, x qui nullum horum nominum à uetustioribus acci-
 piens, ipse primus præscriptis dictionibus indigitauit. Itaq; primum ultimumq; morborum
 genus. quoties uerè morbi sunt (affectus inq; permanentes actionibus primò, ac per se offi-
 20 cientes) continente causa destitui prorsus determinandum. Ni alterationem ipsam ue sol-
 uendi dissecandiq; passionem consideres: quæ morbus non est, sed ueluti iam omnibus ex
 Galeni monumentis pernotum est, τὰ πάθη, καὶ τὰ πάθη, latine passio dicta existit. Cu-
 ius causam continentem inueniri nullus est uel ex aduersantibus qui neget. Siue n. calidus
 morbus sit, ut febris: siue frigidus, humidus ue, aut siccus: uel ex horum aliquibus com-
 positus, per se consistens morbus est, siquidem expeditus perfectusq;, nullam dum efficien-
 tem causam pro suo esse expostulans. Nisi conseruans aliqua causa sit, quæ ad naturale
 dispositionem potius reditum impediat, nouam semper alterationem regenerans. Cuius alte-
 rationis passionis ue causa continens, non morbi erit. Nec n. uerum esse potest id quod è re
 centioribus nonnulli proferunt: conseruantem morbi causam posse (propriè loquendo) con-
 30 tinentem appellari: Enim uerò nec ea posita, quæ primum & morbus ipse ortus est, multoq;
 adhuc minùs ea recedente statim euanescit (quantq; facilius tunc huius curatio deducto iam
 impediante fit) Cōseruationis tamen continens dici causa nō temerè potest: qua remota cō-
 seruationem ilicet deficere necessum est. ea uerò cōseruatio nil aliud ē q; actio, quæ alia
 quoq; ratione pathos dicitur. Morbus autem alijs adhuc extrudendus præsidijs remanet. Hæc
 inq; si expeditus perfectusq; iam ipse morbus est. Sin uerò futurus omnino extiterit, præ-
 cedentem duntaxat assignari causam posse, ut præseruatio non curatio morbi necessaria sit,
 omnibus pro confesso habetur. Quid si fiens morbus sit? Neq; huius, quæ morbus est: tametsi
 eius fieri, alterationisq; quam passionem Galenus appellat, græce τὰ πάθη, continens cau-
 40 sa inuenitur. Etenim quæ fiens, passio est, quantq; ut operationes primò & per se lædens
 ac secundum partem consistens, morbus est. Haud n. quod in consulti nonnulli proferunt,
 uerum simpliciter est, fientem s. affectum non uerè morbum, sed pathos esse. Nam hoc
 posito

Opinio pro-
pria.

u. 2. art. med.
tex. 4.

Tria morbo-
rum genera.

x. lib. de const.
art. med. cap. 6.
circa prin. lib. de
morb. cau. cap. ul-
timo circa prin. et
13. meth. in prin.
Si morbus fa-
ctus est

Intemperie,
ut morbus est
nulla causa cō-
tinens.
Cōtra Vale-
riolam.

Causa cōser-
uans nō est cō-
tinens.

Si morbus
fiens est.

Contra Fuch-
sum.

Exemplum
fientis.

2. 2. methodi cap.
3. post prin.

2. ibidem Pau-
lo post.

a. ibidem post.
aliqua.

b. cap. 9. uersus
finem.

c. libro 1^o. in
prin.

posito fiens febris, putrida uidelicet, ipseque etiam comburentissimus causus morbus minimè
esset. Cum uel rudes idiotæque oppositum primo intuitu statim aduertant. Veluti nec uerum
quoque protulerit quispiam, si fientem febrem, aliam uel quam uis intemperiem morbum esse,
attico uultu, determinarit. Distinctione igitur, exquisitiùs speculari cupientes indigebunt.
Nam uel fiens est, quia nunc. s. generationis exordium sumit: quemadmodum (ut res ex
plo clariùs elucescat) si quispiam calere præternaturam incipiat: Deinceps uerò usque adeò.
Calor ille increseat: donec functiones impedire manifestè queat, tuncque morbus sit: Verbi
gratia ad tertium usque gradum. Antea uerò: siquidem circa primordia adhuc existens talis
alteratio sentiri penitus nequeat: sub sanitatis latitudine contineri liquet. Sin uerò mani-
festari deinceps occipiat, nondum tamen à consuetis functionibus distrahere, atque impedire,
cubandi necessitatem inducens, queat: Neutrum fieri (iuxta medicorum, Herophili distin-
ctione utentium, decreta) recenscimus. Quo tempore uniuerso, fiens febris est: quoni-
am in generatione essentiam habet. Morbus tamen adhuc non est. Quamprimum. n. anchoras in-
ijcere primas coepit, alteratio passio uel (à medicis, omnia sensu iudicantibus, negligenda)
fuerat. ab hac uerò neutralitas. At ne huius quidem fientis morbi partes duas desi-
gnare possumus, factam scilicet, ac futuram: cuius facta pars morbus existat. Verum to-
tus adhuc fiens, quia morbus, futurus prorsus est. Actio etenim (Galenique testimo-
nio) quæ & eadem passio est, ex eorum numero non est, quæ esse absolute dicuntur: aut
certè non similiter, sicut iam comprehensa (tumor uidelicet mollis œdema uel, aut phlegmo-
ne: redundantiaque sanguinis, & pallor) siquidem nullo temporis spatio manent eius par-
tes: Sicut profectò nec sermonis, nec etiam motus ullius: Sed horum quilibet in ipso fieri
esse suum obtinet. Ac omnis quidem actio motus est actiuus, omnis alteratio, eius quod
alteratur, motus est passiuus, patitur namque quod alteratur. Ergo affectus dispositiones uel
dum alterantur, mouentur (motu quidem non locali, sed alterationis) Quæ à motu cessauer-
int: iam alterati sunt: non autem amplius alterantur. Sanè & alteratur is qui nigrescit,
aut calefit: alteratus est qui iam obnigrui, siue (ut sic dixerim) nigrefactus, uel calefa-
ctus est. Itaque alteratio generatio est qualitatis, aut affectus, aut quomodocunque appella-
re uelis. Ac sanitas quidè, et morbus & quæcunque symptomatum, causarumque affectus, uel habi-
tus sunt, ex permanentium constantiumque numero sunt. Actiones omnes, alterationesque
in quacunque re fuerint, in ipso fieri essentiam suam possident. Et corpus secundum quodcumque
mouetur, secundum idem patitur, motusque eius pathos, siue passio est. Huiusmodi ergo
fientis iam, atque essentiam suam in generatione habentis morbi, quin (ut rectius absque so-
rete ac erualiter sermone loquamur) passionis adhuc existentis continentem assignare cau-
sam astringimur: quatenus uidelicet fiens est, & ueluti prædictum est, in generatione suam
essentiam habet. Quæ nihilominus causa tametsi continens generationis morbi est: haud-
quaquam tamen continens morbi, qui adhuc non est, dici quodammodo potest. Posita namque illa,
positus adhuc morbus non est. Quatenus igitur morbus, quia sic futurus duntaxat est, præ-
cedentem habere causam proculdubio determinandum est. Quæ quidem semota, eius ut
futuri generatio prohibebitur. De huiusmodi quoque in generatione suam essentiam ha-
bente morbo intellexit tum libro aduersus Iulianum, tum uniuersalius de pulsuum causis
loquens, continentem. s. obtinere causam admittens: adeò ut non in pulsibus modo, sed in
omnibus

10

20

30

40

omnibus alijs triplex causarum genus concedens, primum atq; præcipuum continens esse propalauerit. De huiusmodi etiam fiente morbo, (si peregrina mente perlibraris) medicorum pater Hippocrates^d, enarrante Galeno, locutus est, dicens. Quicumq; morbi ex repletione, facietate ue fiunt, curat euacuatio: & quicumq; ex euacuatione, repletio: & aliorum contrarietas. Bifariam nanq; cum dici fiens morbus queat: hoc est, quia nunc iam fit, essentiamq; suam in generatione adhuc habet, nil facti hucusq; possidens: quemadmodum is est, quod pathos antea nuncupauimus uel partem aliquam iam factam (adeo ut functionibus obesse ualeat) ostendens: ita dum fit, ut alteram futuram præseferat. Primum uetustissimus author fientis genus intellexit, uacuatione curandum esse proferens: Etenim quia totam in ipso fieri essentiam suam retinet, ipsaq; in generatione: sic à causa dependet, ut ablata, statim & ipse tanq; solis lumen dispereat. Secundi uero generis curatio ab euacuatione compleri minimè poterit, quin operæpretium est abscessa causa ad factam morbi partem (uel Galeni f monumentis) deuenire. Id quod clarioris doctrinæ gratiâ ex ipso met medicorum phœbo intelligas, proprio sic idiomate, scribente. *ὅτι καὶ τὸ γινόμενον ὑπὸ πλεονασμοῦ, οὐδέ ὅτι οὐκ ἔστι οὐκ ἔστι, εἴ τι μέντοι, τὸ τοῦτο ἰσχυρὰ καὶ ἐκείνου: ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τὸν αὐτὸν γίνεται χρόνον ἐπιχειροῦμεν ἰσχυρὰ, καὶ ἐκείνου χρόνον.* quod est. Nō quod adhuc fit à repletione, facietate ue (quouis. n. modo uertas & πλεονασμὸν ἔχει) haud impræsentiarum curauero) Neq; non amplius ipsa existente, si quid remanserit, id euacuatio sanabit: uerū quæcunq; eo ipso, quo fiunt, tempore, curare molimur, uacuatione indigent. Quibus quidem uerbis toto pectore perpensis, Galeni mentem ab interpretibus (multoq; minus à Martiano rota negationem. præter Galeni phantasiâ addente) præuè perceptam extitisse, liquet. Dicens. n. *ἔτι γινόμενον*, & id quod factum est minimè intelligit, sed fiens: uel (ut clariùs loquamur) quod adhuc fit. ubi τὸ ἔτι, nō superfluit: sed uim suam (si exquisitiùs aduerteris) hoc in loco præsefert. ut illud fiens indigiret, quod quidem partem habet factam, adhuc tamen fit: Quasi dicat: Et si factum est, adhuc tamen fit. Sic nanq; artis medicæ cōmentario, *fiens* græcè uocabat: quod à iam factō & futuro fieri (trimembri salubrium causarum distinctione præposita) separabat, dicens: *ἀλλὰ καὶ ἐστὶν ὑγιεινὰ τῆς ἡδὴ γεγενημένης δυσπραξίας, ἀλλὰ δὲ τῆς ἔτι γενομένης ὥς πῶς καὶ τῆς γενομένης ἀλλὰ.* quod est: Aliæ quidem sunt salubres causæ eius intemperiei, quæ iam facta est, Aliæ uerò illius, quæ adhuc fit: quemadmodum & aliæ sunt eius quæ futura est. Idipsum ergo fiens in Aphorismi enarratione statim exordiens abnegabat, ⁱ illud fiens, uel quod adhuc fit euacuationem non sanare dicens. Illud. n. duplici intētionē curandum ordinauerat: abscindendo scilicet causam, deinceps ad factam partem perueniendo. Adeo ut ex præseruante, & curante commixta intentio sit. Quoniā uerò fieri, de factis quoq; uulgò intelligi consueuit. Perindē ut dicere mos est: Citharæ quæ fiunt à Ioanne, uel quas facit Ioannes, optimæ sunt, ac sonoræ. de factis iam intelligendo. Idcirco & pro illis subdit & Neq; non amplius ipsa existente, si quid remanserit, id euacuatio sanabit & De futuris autem Hippocratis uerba intelligere non decet: cum pura præseruatio, non curatio futuri morbi, causæ abolitio sit. Hanc obrem ueluti clarissimum dimisit, duos alios uerisimiliores sensus expressē reprobans. Reliquum est igitur quartò, fientes, eos intelligere: quorum nil factum adhuc est, sed in generatione totam essentiā possident.

d 2. aphorif. 22.
e ibidē in cōmē.

f 3. art. med. 34.
4.1. et 4. meth 4.
ante medium &
uersus finē 8. p.
circa finem unde
cimi 2. 4. 8. &
x. decimi terij 2.
& 6. & sæpe.
g 2. aphorif. 22.

Cōtra Rotā

b libro. 3. tex. 32

i 2. aphorif. com.
22. i prin. cōmēti.

fident. Ideoq; rursus adiunxit uerum quæcunq; eo ipso, quo fiunt, tempore, curare mor-
 limur. Nam quia nil adhuc facti habent, quod secundum causæ recessum persistere queat:
 Illicet hac semota, ipsum fieri, pathosq; remoueri, & euanescere necessum est. De hoc
 ipso nihilominus fiente, cuius uidelicet nil adhuc factum demonstrari potest, de morbis curā
 dis octauo^k loquebatur: quum primam curandi intentionē à præsente morbo sumendam edo-
 cens, quolibet excessum à contrario semouendum concluderat: Sic exemplis demum enar-
 rans: Ut si iam factæ febres sint (ut uerbum uerbo reddamus) causa uerò quæ eas exci-
 tauit, iam desiit: harum curandarum scopus intentio ue, refrigeratio tantum fuerit. Quæ
 re quærenda nobis talis materia est, quæ cum redundante calore, paria refrigerando faciat.
 γιγνομένων δ' ἔτι τῶν πυρετῶν, τὴν προύσταν αὐτοῦς αἰτίαν ἀναρετέον. quod est,
 fientibus autem adhuc febribus (quæ uerba clarioris doctrinæ gratia non temerè linacer
 uertit: at si in generatione adhuc febris est:) efficientem has causam summouendum est.
 Quod autem de hoc fiente intelligat, quod totam adhuc essentiam in generatione possidet: ter-
 tium diuisionis membrum, apertissimè ostendit, quum subdit. ἃ δὲ τὸ μὲν ἥδη γεγὼς ὡς
 τῶν ἔτι, τὸ δ' ἔτι γίγνεται τὸν συναμφοτέρου στοιχείου. hoc est. Si uerò pars earū
 facta iam sit, pars autem adhuc fiat, in generando ue sit, utriq; consulendum est: Primū
 quidem summouendo quæ eas accendit causas: deinde extinguendo, quæ ab hac accensæ
 sunt, febres. At ne obstat quidē, si libro artis medicæ,^l atq; in aphorismi enarratione,^m
 ἔτι γινόμενον, illud siens intelligat, quod alteram partem factam continet, alteram uerò
 futuram. Octauo autem methodi medendi uolumine,ⁿ aliud, quod totam adhuc genera-
 tione suam essentiam habet, & γινόμενον ἔτι & pronuntians: Cum (præter id quod de altero
 fiente subdens, alterius notitiam ostendit) nullibi certam, immutabilemq; nominum legem:
 in quibus aliās sententia liquere potest, imposuerit. Nisi malis & ἔτι & præpositum, ac
 postpositum, uariam quandam uim præferre: ut siens adhuc, ab adhuc fiente differat.
 Quod nihilominus perpetuum esse nequibit: cum in eiusdem aphorismi enucleatione rursus
 adiungat. ἀλλὰ νῦν γε περὶ τῶν ἔτι γινόμενων ὁ λόγος ἐστὶ νοσημάτων. quod est.
 Sed nunc de his, qui adhuc fiunt, morbis, sermo est. de fientibus proculdubio intelligens,
 quorum esse in generatione sit. Id quod ex eo determinatum esse uoluit, quod quidem antea
 præscripserat dicens & uerum quæcunq; eo ipso, quo fiunt, tempore & quemadmodum &
 in principio cōmenti positum participium, ab eo quod deinceps subiungitur, declarari potest
 & ἃ τὶ μέντοι, hoc est, si quid manet & ut commune, tam fientibus, q̃ factis id sit. Quoties
 n. quippiam factum, remanens ue est: siue siens adhuc morbus sit, hoc est aliam artem
 futuram habens, siue penitus absolutus, uacuatione curari possibile non est. Nisi siens eo
 modo sit, quo prædictum est, in generando. s. esse suum obtinens: liquet. n. (ueluti Galenus
 subdebat^o) q̃ unā cum causis ipsos efficientibus destructis, ipsos quoq; morbos destrui ne-
 cessum est. Equibus quidem uerbis tametsi efficientes, atq; etiam continentes generatio-
 nis, fieri ue, aut si mauis dicere passionis causas nuncupari posse elicias: haudquaq; tamē
 morbi continentes coniunctas ue causas proferre poterimus. Fortassis autem græcus Galeni
 codex deprauatus est: quemadmodum Leoniceus existimasse uidetur, dicens & Non si
 quid & litteram iota deficientem ostendens. ut loco illius & οὐκέτι & legendum sit & οὐκ ἔτι
 γινόμενον & c. & quibus uerbis eandē fermē sententiā præferret. Haud. n. dicit, ueluti qui
 dam

h. cap. p. in fine.

Obiectionis
solutio.

l. lib. 3. tex. 32.

m. 2. aphor. 22.

n. cap. p. in fine.

o. eiusdem apho.
cōmē. post prin.

quidam referunt : non quod factum est : uerum : non si quid factum est : quasi dicat non illud fiens, ubi aliquid factum iam demonstrari potest, euacuatio sanat &c. Non ergo (prout alias ipse Galenus inquit) idem est, si dicas morborum esse continentem causam repletionem facietatem ue, atq; ex repletionem, oriri. Etenim uerum est illo modo, quosdam morbos generari ex repletionem, uel à repletionem (nihil enim interest, hoc, an illo modo loquere) At prauum est morbi repletionem, causam esse continentem. Itaq; si fiens adhuc morbus est (ut ad propositum conuertamur) quia scilicet uniuersa eius essentia in generatione sit, nihilq; adhuc factum ostendi queat, continentem eius designare causam necesse est. Verum hæc non morbi (ut qui nondum existit) sed passionis causa proculdubio determinanda uenit. Sin adhuc fiens morbus sit: Quia uidelicet factus iam aded morbus est, ut functionibus obesse queat, ac per hoc morbi nomenclaturam meritis sit, incrementum nihilominus recipiens: quemadmodum putridam febrem, fientem morbum dicimus: cuius altera pars facta sit, altera uero futura. Huius quidem (quem morbum esse statuimus) antecedens tantum, non coniuncta causa, humor (quisquis ille fuerit) existit. De hoc igitur fiente morbo (ueluti præscriptum iam est) tum tertio artis medicinalis, tum alibi non semel, intelligebat Galenus: quum, duplici supposita morbi parte, prius causam abscindere præcedentem, pro futura inhibitione: deinde ad eam, quæ facta est, curandam peruenire operæpretium esse declarauit. Ob id autem hic fiens morbus dicitur, ¹ Quia per se consistens affectus est, ² operationes primò lædēs: ³ A quo etiam prima curandi intentio sumitur: ut non minas absoluto, ac penitus factio, morbus existat. Pro cuius integritate triplex iam dicta conditio satis superq; est. In eo tamē hic fiens, & is qui prorsus factus, absolutusq; est differt, quoniam qui perfectus iam est, ad ultimum, quod potuit, peruenit, ibiq; persistit, incremento carens. Hic autem, & si affectus est, iam aded perfectus, ut lædere operationes possit: in eo tamen statu minimè retinetur: at partibus alijs denuò adiunctis, continuò increfcit. Nec futura quidem portionis, sed præsentis ratione, morbus dicitur. Fiens uero adhuc idem est, quia tametsi factus, aliæ nihilominus partes adduntur. Vterq; igitur (si recte perceperis) factus morbus est: Id quod exemplo aliàs hoc pacto demonstrare consueuimus. Vt uerbi gratia, priusq; perficiatur homo in utero, fiens homo dicitur: quoniam esse suum in generatione adhuc habet: nec homo est. postquam uero perfectus iam absolutusq; in lucem egreditur: homo proculdubio factus est: cum uniuersas hominis partes necessarias quidem obtinuerit. Verumtamen toto adolescentiæ tempore, fiens iterum homo nuncupari consueuit: æquè ac iuuenis homo factus uulgò nominatur, eò quod non ampliùs increfcit. ille autem, quis homo iam sit, quia tamen augetur, multaq; futura quantitas est, fiens homo dici uulgò solet. Perindè igitur de morbo factio, & altero modo, fiente intelligas, ut de iuvene atq; adolescente prædictum iam est. Sicq; febris hectica, à caufa, tertiana, & alijs fientibus differt. Quarum quoq; curatio, ueluti & hectica, non indecenter dici potest. factæ inq; partis ratione At plura in aphorismi atq; cōmenti enarratione (Deo Optimo Maximo permittēte) elucidabimus. Quod si obijceret quispiam, à nobis præpositum exemplum non ualere affirmans: Quia morborum generatio ab animalium principio, generationeq; plurimū (uel Galeno

D docente)

p. 2. de natura humana com. p^o. in prin.q. tex. 34 et 41. r. 4. meth. cap. qua: 10. octau. eiusdem p^o. undecimi 2. 4. 8. x. decimi tertii. 2. 6. & sepe.

Tres morbi conditiones. Morbus fiens est et per se consistens.

Quo differt fiens a factio.

Exemplū duplicis fientis.

Obiectio.

3. libris de morborum temporibus tam particularibus quā uniuersalibus circa prin.
a. lib. de particularibus morbi temporibus cap. 2. in principio.

u. primi de locis affectis 2.

x. cap. 2. i. prin.

a. s. lib. de particularibus temporibus morborum cap. 2. in prin.

b. lib. de totius morbi temporibus cap. 2. in prin.
Galenus locus.

docente³ uariat. Cum his proprium generationis tempus sit, quo omnes ad uitam necessariae partes figurantur, formanturq; : Morborum uero nullum huiusmodi tempus est proprium : Sed à primo statim ingressu augeſcunt : Idq; (ut inquit⁴) ratione probabili. Nam illa, corpora sunt : hi, corporum accidentia. quare figurationem, generationemq; corporum proprietas requirit : accidentia uero ipsis : ut quæ nullam figurationem expectant, primo aditu protinus generationem simul acquirunt, & ad incrementum festinant. Quæ enim inflammationis generatio esse possit ? An qualis est animantis nascentis figuratio ? uel quæ erysipelatis ? uel quæ (uerbi gratia) febris ? Nam unum quodq; horum statim, cum primum ceperit initium, huiusmodi speciem habere uidetur, qualem eius generis maximum habet : deficit autem sola, ab illo, magnitudine. Adeo ut alibi⁵ etiam, quicumq; morbus sit, eiusdem esse speciei, tum in primo generationis initio (etiam si nullo pacto & à medico, & ab ægroto sentiri queat) tum in fine, quum ad suæ naturæ summum peruenerit : pluribus uerbis, atq; exemplo etiam comprobetur. Sed non æquè de animalium generatione, aut domus ædificio contingit. Quam obrem & de totius morbi temporibus sermocinans, ait : Quare morbi principium quatenus aliquando salubri statu corporis labascente inuadit, in omnibus ipsis est sine temporis productione æstimatum : Cum hoc sanè non conceditur etiam cuiusuis morbi generationem esse : sicut in animantibus contemplamur : Non enim ex particulis quibusdam, ut animal ex capite, thorace, & artubus, sic etiam morbi compositi sunt : Siquidem ubi ex naturali habitu decidunt, breuissimo quodam temporis spatio generationem sortiuntur : inde usq; ad uigorem ascendunt. Nam cuius non sunt partes, quomodo hoc temporis spatio generabitur ? Non igitur congruit (si uera Galeni præscripta uerba sunt) fientem, hoc est in generatione adhuc existentem morbum, fientem, generandoq; animali comparare. Cum id clarè suæ generationis tempus manifestum, ac diuturnum habeat : Morbus autem imperceptibile ferè, ac proinde nec effatu dignum, neq; à medico unq; considerabile obtinuit. Nisi esset, quod dubitando, atq; ex aliorum opinione arguendo, Galenus hæc protulit. Quorum nihilominus deinde phantasiā reprobat, statim circa utriusq; uoluminis initia, morborum tempora animalium ætatibus proportionari dicens. Siquidem primo illorum opusculo^a dubitationem inde exorsus ἢ τὰ χαλὰ ἢ ἄν ἰσως δοξῆται. quod est, Forsitan autem uidebitur & c. & Eam deinceps dissoluere aggreditur, ubi subiungebat : ἢ οὐτος ὁ λόγος ἐπινακὴς ἐστίν. latine : Hic sermo contentiois plenus est, & quæ sequuntur. & in quibus demum particularibus de temporibus loquens, principium ab alijs temporibus, proprijs quidem illius inditijs, pro aduersorum confusione, circumscribit. Secundo autem opusculo^b posita rursus (pro aliorum chimæra) obiectione, ibi ἢ ἡ τοίνυν ἀρχὴ τῆς νόσου & latine, secundum Andernaci uersionem, & Quare morbi principium & c. & ubi ex proposito ait & æstimatum & s. ab alijs & cum hoc sanè non conceditur & scilicet ab illis. Sic. n. legendum esse, negatiuè inq; pro ἢ ἀσυνχωρεῖται & id est & si conceditur & ἢ μὴ συνχωρεῖται & quod est, & non conceditur & cuncti sanæ mentis uiri pro confesso habebunt. Denuò respondere uolens, ait : ἢ τὰ ὑτ' ἄρα μοι, Hæc mihi dicta sunt, & statim ab initio (quod est libro primo) respondi & c. & eademq; responsione rursus utitur, æquè in uniuersalibus, atq; in particularibus, principium ab alijs temporibus propria circumscriptione distinguens. Adeo ut, tametsi de locis passis libro

libro primo loquens, eiusdem esse speciei morbum in principio & fine conclusit: Verum, id fore materialiter, ac (ut logici dicunt) fundamentaliter, haudquaquam uero formaliter, lippis & tonsoribus liqueat. Verum nanque proculdubio est calorem in principio eiusdem esse speciei cum eo qui intensissimus est, saltem secundum medicos (Quamuis apud eos, qui gradus speciei differre chimærizant, aliter sentiendum sit) formaliter autem differre nullus est rem exactius intelligens, qui tergiuersari queat: Cum in principio qui nec à medico neque ab ægroto perceptus sit, calor, aut quiuvis alius affectus, sanitatis latitudinem non excedat. Audis uero ut pateat, ac functionibus leuiter officiat, Neutralitatem (iuxta medicorum morem) præferat: quæ denique perinde incrementum, ut hominem cubare cogat, nondum aperte operationibus obstitit, morbum esse negaturum opinor neminem: Veluti morbum quoque à sanitate specie differre. Quamuis igitur (ut ad propositam obiectionem reuertamur) calor præter naturam in corpore exordiat, idemque specie calor, qui deinceps magnus, quin idem numero prius naturalis, deinceps præternaturalis, atque febrilis factus sit (materialiter inquam fundamentaliter uel intelligendo) donec tamen obesse functionibus nequit, morbus dici non meretur. Idcirco in generatione adhuc est: non secus ac embrio, priusque partes omnes, artusque propalentur, animal minimè nuncupari (necum homo) debet. Sed ne absurdum quidem foret fientem hominem hunc, qui scilicet in generatione adhuc est ab homine fiente: atque fientem morbum à morbo fiente (clarioris doctrinæ gratia) secer-
nere. Verum de his obiter, atque intantum hoc loci dictum sit. AD id ergo, unde digressi sumus, iterum conuersi, nullam esse morbi in intemperie positi coniunctam continentem uel causam, firmiter determinabimus. Idemque si morbus tertij generis existat, unitatis inquam solutio, concludemus: Vel n. facta iam solutio: & eius nulla (quicquid Introductorij author expresserit) causa, præter conseruantem est. Vel futura: Cuius tantummodò præcedens. Vel fiens: eademque fientis distinctione, quam in primo genere declarauimus, hic uti etiam poterimus. Et non morbi, sed passionis duntaxat coniunctam causam aliquando inueniemus. Sin uero demum secundi generis morbus existat: in compositionis uidelicet natura constitutus, excepto numero, cuius præcedentem potius causam assignare debemus, Magnitudinis tamen, ac Situs interdum, & Figuræ, Superficieique tam asperæ quæ lenis, Viarum quoque, nec non Receptaculi, Cavitatis uel propriè dictam, ueramque continentem demonstrare causam sæpe sæpius licet. Magnitudinis inquam, siquidem aliqua pars, ob humorum exundantiam, adeo repletur, ut in altum latum uel tumorem uergat: qui tumor deinceps actionem lædat, Quaderè morbus omnino proferendus sit: Actionis n. læsio (prout medicorum phœbus ait^d) terminus earum dispositionum, quæ præter naturam sunt, necum tumorem, existit. Quaderè si ad tantam magnitudinem (uel seruante particula figuram suam) tumor attollatur (quemadmodum alibi^e oppidum quæ bellè protulit) ut ob hanc ipsam functio impediatur, morbus censeri debet: alioqui uel symptoma uel pathema duntaxat, perinde ut & dolor. De qua tamen re uberius infra s. loquemur. Itaque si Magnitudo illius morbus est: Cuius causam (pro Galeni etiam dogmate &) humoris copia nonnunquam esse potest: qua posita, uel phlegmones, uel alterius tumoris magnitudo ponitur (in ipsis enim tumoribus, alibi^h scriptum est, partes à naturali habini in quantitate recesserunt) ea uero succorum redundantia incrementum,
Dij magnitudo

c. cap. 2.
Quomodo morbus in principio et fine sit eiusdem speciei.
Sanitas.
Neutralitas.
Morbus.

Morbus fiens.
Fiens morbus
Solu. nis cæ.
Introductorij error.

Magnitudinis causæ coniunctæ.

d. lib. de tumoribus præternaturalibus cap. 10.
e. lib. de morborum differentiis. cap. 9. & 12.
f. côm. sequenti in declaratione distinctionis primæ & secundæ.
g. lib. de morborum causis cap. 9. & innuitur de morborum differentiis cap. 12.
h. 13. meth. medendi cap. 9.

i. cap. 9. uersus
finem.

Situs causæ
coniunctæ.

Figuræ causæ
coniunctæ.

k. libro de mor-
borum differen-
tiis cap. 7. & de
morbis causis
cap. 7.

Superficiæ
causæ coniun-
ctæ.

l. 2. art. med.
lex. 75.

m. ibidem fine.

Cavitatum et
meatuum cau-
sæ coniunctæ.

n. lib. de morbo-
rum causis cap.
7. & de morbo-
rum quoque differ-
entiis cap. etiam 7.

magnitudo etiam increfcit: ea comminuta & hæc diminuitur: ac demum illa prorsus ablata, hæc quoque protinus aufertur: quis est qui continentem, coniunctam uel causam, huiusmodi succorum abundantiam esse, inficias irer? Id quod libro aduersus Iulianum edito, Asclepiadis argumentum diluere cupiens Galenus comprobasse uidetur, phlegmonem, & erysipelas, idque quod à recentioribus medicis œdema uocatur, aliosque præterea affectus, nondum conuulsionem interdum, tremoremque, plenitudinis inniti hypothefi: Tum si plenitudinem euacuet quis, ad naturalem quæ primum statum redire membrum. quæ continentium dubio procul causarum natura est: ipsis uidelicet ablati, quæ primum eos qui sequuntur affectus euanescere. adeo ut statim affecta pars naturalem ad statum reuertatur. Idem quoque de situ sentiendum est. Cuius nonnunquam coniuncta causa indigitari potest. uerbi causa, quum crassus, gipseus uel humor quispian, uel parus effatu dignus, perinde artibus interponitur, ut hæc uel illæ, posillocatum os impellens, proprium eorum situm uitiet. Quo nihilominus aucto, uel diminuto: positus quoque uitium increfcere, seu comminui necessum est. quemadmodum illo penitus exoleto, huiusce etiam prauitatem euestigio deleri (modò alium circumsistentes partes affectum minimè patiantur) oportet. Sæpius uero eas affici uisum est adeo ut præcedentis potius naturam præscripta iam causa obtineat: Cum ea remota ligamentorum, uel extensio, uel ruptio remaneat. Sed quid de Figura proferendum est? quippe cum actiones hæc lædere nonnunquam (uel Galeni dogmate^k) queat, morbus dubio procul extiterit. Cuius causa, uel luxatio, uel fracturæ partium inepta coniunctio, qui deprauatus quidem situs est (haud enim inconuenit alterius morbi alterum quoque causam esse: Perinde atque symptomatis symptoma) quibus cum coniunctæ causæ definitio congruat, eandem hic sententiam proferre certum est. Quod si ablata iam luxatione, figuræque concinna reddita, obligamentorum extensionem alium uel affectum, crus, uel tibia, seu brachium, aut artus quicumque sit, rectè adhuc moueri nequeat, ob id negare non debemus eam luxationem deprauatæ figuræ continentem adeo causam extitisse, ut ea remota, diminuta, uel aucta, quemadmodum posita, hanc remoueri, diminui, uel augeri, ueluti & poni necessum sit. Quod si asperam lenem uel præter naturam cuiuspiam partis superficiem contemplabimur: eius pariter continentem aliquando causam inueniemus. Verbi gratia cum asperam arteriæ tunicam interiorem quis ita patiat, ut asperam æquè uocem exprimat: uel ita lenis uenter sit, ut cibum ad coctionis usque perfectionem continere non ualeat. Illius enim siccitas: huius uero humiditas coniuncta causa est. Quamobrem uocis asperitas (Galenus medicorum Phœbi^l testimonio) quæ actio quidem læsa est arteriæ asperitatem, ut eius continentem causam, sine medio, præsert. Quæ nihilominus asperitas læsæ actionis contentiua causa existens, morbus est. Huius autem causa (quam quærimus) continens eiusdem arteriæ siccitas est. Differentijs uero naturalium uocum hæc, quæ ex affectu aliquo fiunt, perficiunturque, sunt (Galenus etiam docente^m) proportionales: quæ & ipsæ indicia sunt causarum à quibus oriuntur. At cavitatum quoque & meatuum morbi fiunt: quum uel omnino pereunt, uel læduntur. quorum causæ contentiue sunt, uelⁿ coalitio (quæ præternaturalis unio est, causam aliam præcedentem & hæc obtinens, internæ uidelicet meatuum faciei ulcerationem:)² uel caruncula, siue quoduis aliud tuberculum, aut scirrhus, (Galenus etiam dogmateⁿ) aut phlegmone, aut abscessus in ipsis instrumentorum corporibus oborta,

ubi cum

ubi cum prehendam tumor præter naturam internam concavitatem, fit ut meatus constipe-
tur: ³ uel crassi uiscoli uel humores, aut callus aliquis aut grumi, quodcumq; demum caui-
tatis medio interpositum obstructionem produxerit. ⁴ Item quoduis extrinsecus incidens,
cavitatem continentia corpora, simul ad interna ipsius, comprimendo impellat. ⁵ Nec mi-
nus constringens frigiditas, aut siccitas in seipsa eadem cavitati circumstantia corpora resi-
dere cogens: coniunctæ causæ (ut quibus definitio congruat) nominari possunt. Meatus
nanq; obstructio, clausio uel (ut ita dixerim) morbus est, sanguinis, uel spiritus, uel cu-
iuslibet alterius rei necessarium consuetumq; transitum impediens ac per hoc functionem pri-
mitus offendens: Aliæ uero morbi (obstructionis inq;) causæ sunt: quæ obstructione (quæ
10 pariunt) media, functionibus obsunt. quarum quidem ratione haud morbi, sed causæ dici
debent: quoniam primò non lædunt. Et si harum quædam, tum per se aliàs, tum ibidem al-
terius (quam primò læderet) actionis gratia, morbi protinus existant: Ex quo morbi mor-
bum aliquando causam esse prædiximus. ¹ Causam nanq; morbum quoq; nuncupare possu-
mus. Vel alterius functionis ratione, uel quia sine medio aliàs morbus esse consuevit. Hæc
inq; quò utrumq; Galeni ^o dictum insimul stare defendamus. morbum. s. ex morbo, æquè
ac ex symptomate symptoma dependere: simulq; etiam absq; omni penitus medio morbum
functionibus obesse. H A V D mirum igitur est, si in uniuerſa corporis habitudine absolute
plenitudo multitudo uel insit (græcè πλῆθος appellatur) contenta in uasis, quam proprie
πλῆθος, hoc est plenitudinē nominant: à quā sic nonnunq; degrauari corpus contingit, ut
20 tensionis etiam accederet sensus: remotiq; deinceps quamprimum plenitudine, quæ cavitatis
amplioris extensæq; coniuncta causa fuerat, liberari hominem euestigio (Galeni etiam
documento ^p) uisum est. Haud nouum quoq; est deducto, aut transposito uesicæ meatum ob-
struente lapide, q; primū & obstructionem (cuius causa & quidem continens lapis erat)
semoueri. qua rursus ablata statim symptoma, urinae inq; retentio, cessauit. Falsū nāq;
est (quod recentiorum plurimi contendunt) lapidem in uesicæ morbum semper in numero
esse. Quauis. n. in ampla uesicæ cavitare contentus lapis, moleq; præsertim magnus, in nu-
mero morbus nonnunq; dici queat, uesicæ contractionē maxime impediens, illiq; ueluti pon-
30 dus iners existens: Nihilominus tamen qui in eius collo, meatu uel urinario consisit, obstru-
ctionis in uia quidem morbi causa, & proculdubio continens est. Vt qua posita, uel ablas-
ta, obstructionem illicet poni uel auferri necessum sit. Quoniam uero ex Galeno, quod pro-
ferunt, comprobare nituntur: computasse uidelicet in libro de morborum differentiis, ¹ cal-
culum uesicæ, inter morbos, qui circa numerum contingunt. Idcirco perpensis Galeni uer-
bis, quantum hac in re dormitarint, facillimè deprehendemus: dum inquit. In numero aut
partium simplicium, ex quibus singula instrumenta constituuntur, duplices inueniuntur
morborum differentiæ: aut. n. deest, aut abundat pars aliqua. Atq; in harum utraq; rursus
aliæ deprehenduntur differentiæ. Nam earum quæ abundant, Aliæ ijs quæ naturali sunt
habitu annumerantur. Vt si cuiuspiam sextus expulset digitus, aut in oculo pterygion
(quam unguem latini dicunt) aut in naribus carnis germen, aut in alio quopiam mea-
tu id genus aliud. Hæc Galenus. Quibus quidem uerbis, posita morbi circa
40 numerum distinctione, alteram deinde, non subdistinctionem, sed uniuersalem quoq;
diuisionem, earum uidelicet quæ superabundant partium adiunxit Nam aliæ ijs quæ

i fo. præc. leni.
Quomodo idē
morbus &
causa esse pōt
o. lib. de morb.
differentijs cap. 7.

p. lib. aduersus
Iulianum cap. x.
ue. sus finem.
Cōtra Fu-
chsiū & Bra-
sauolum.

1. cap. 8.

Galenī locus
ex positus.

D iij naturalis

naturali sunt habitu annumerantur: Alia uerò toto genere præter naturam sunt, de quibus
 postea locuturus est. Ut autem morbos ex superabundantium differentiis eligat: cum aliqua
 obstructionem producentia morborum causæ potius, quàm morbi sint: falsum alicuius intellex-
 itum delere statim cupiens, subdit. Sed horum aliqua inter morbos reputantur: ut un-
 guis in oculo. Nam quum plurimum in creuerit, & pupillam obscurauerit, uisum impe-
 diet. Alia uerò causæ morborum sunt: ut carnis germen, quod meatus obstruit. In primis
 .n. obstructio morbus est, quippe quæ primò functionem offendit. Posset .n. quispiam omnia
 quæ dicta sunt, ex morborum catalogo, qui in numero sunt, intelligere: cum dictum sit,
 & Nam earum quæ abundant alia &c. & subdistinctionem abundantis morbi existimans.
 At aliter ipsa res habet. Quia .n. dixerat, uel abundare, uel deesse partem aliquam, 10
 Idcirco eam dein ostendere uolens, quæ abundat, Superfluentium omnium, quæcunque sint,
 uniuersalem distinctionem adiunxit, dicens. & Nam earum .s. partium (non dico morborum)
 quæ abundant, alia naturalis generis sunt, alia uerò præternaturalis. & Qua quidem po-
 sita diuisione, in utraq; ipsius differentia rursus tum morbos tum causas uestigat: ad eum
 semper scopum attendens, quæ primò functionibus obsunt, morbi sunt: quæ uerò ijs me-
 dijs, morborum causæ dicendæ sunt. Quis igitur, & si coræbo stolidior, fuerit, qui car-
 nis germen tuberculum uel in naribus, aut in alio quopiam meatu id genus aliud obstructio-
 nem faciens, hacq; media functiones impediens, inter morbos, ex Galeni sententia, profer-
 ret? quoniam .s. inter ea quæ superabundant computauerat. Cum tamen interpretum chimæ-
 ras præuidens Galenus, semet ipsum emedullare decreuerit: id ipsum præcipue subiungens, 20
 quæ obstructio morbus est, quicquid uerò superabundans obstructionem produxerit, non mor-
 bus, sed morbi causa existit, Eandem uerò esse de lapide uesicæ meatum obstruente senten-
 tiam, uel ex ijs quæ præscripta ex Galeno uerba sunt, satis superq; liquere arbitror. Atta-
 men quia lapis secundum totum sui genus præternaturam est: hanc obrem sequentia Gale-
 ni uerba perlegamus & ueritatem apertius amplectemur: dum subdit. Quædam uerò toto
 genere præter naturam sunt, ut lumbrici, ascariides, lapis in uesica, grando in oculo (χα-
 λαζιον græci uocant) suffusio, pus, itidem acrochordones, melicerides, atheromata, stea-
 tomata, uirilignes, lepræ, leucæ, calli, præterea quicquid in abscessibus deprehenditur.
 Ne quis uerò hic omnia quæ præter naturam abundant morbos in numero stultè opinetur:
 eandem uoluit his, quam in prædictis expresserat, subdistinctionem adaptare, sic addens. 30
 Quod uerò & ex his ipsis quæcunque operationem primò impediunt, morbi à nobis dicantur:
 sicuti suffusio: quæ uerò non ita, morborum causæ, omnibus constare arbitramur. Itaq;
 recentiores non admirari nequeo, uesicæ calculum, ex Galeni sententia, morbum in nume-
 ro contententes, siquidem obstructio morbus est, lapis uerò, aut callum, aut quoduis tuber-
 culum, obstructionis causa (Galeno etiam alibi ex proposito docente) est. Quamq; inficias
 minimè quidem ibimus, in uesicæ concauo contentum lapidem, à meatu transpositum, posse
 morbum, & in numero, nuncupari, quum uidelicet non obstruit, uerum primò uesicæ con-
 tractionem (præsertim si effatu dignus sit) impedit, illiq; ueluti pondus iners existerit.
 AE quæ ac alium quoq; lapidem anuli instar perforatum, in uesicæ meatu positum, ubi cir-
 cularis musculus urinæ, ante opportunum tempus, exitum, sua astrictione prohibens, loca-
 tus est, & morbum in numero (quatenus uidelicet immediate musculi constrictionem impe-
 diat)

Cōtra Musā
 et Fuchsum.

r libro de morbo
 rā causis cap. 7.

diat) & morbi causam (quatenus aliquam, tametsi non perfectam, obstructionem efficiat) nominare possumus. Obstruere igitur lapidem uesticæ meatum, ueluti & grumos, pus, crassum ue aut lentum humorem, de locis affectis primo³ demonstrauit, ut media obstru-
 ctione ipsius urinæ exitum impediatur: Rursusq; in eiusdem uolumine sexto, in pueris etiā, quos lapis in uestica cruciabat, sæpenuerò urinam retineri uidisse ait, quos resupino si-
 gurato corpore, adeò concussit, ut à meatu lapis dimoueretur, quem scilicet antea obstrue-
 bat: quemadmodum de grumis etiam prædixerat. Sic etiam ut obstructionis causam, la-
 pidem in uestica contentum, libro artis medicæ⁴ demonstrauit: Cuius in præsentī quidem
 transpositionē, integræ uerò sanitatis gratiā, incisionē, et extractionē pro morbi simul remotio-
 ne, edocuit. Vbi nō morbi in numero, sed obstructionis mentionē facturū, uarias eius cau-
 sas iuxta uarias quoq; cavitates meatus ue pernotauit: De morbo nihilominus in numero, ad
 locū propriū, quamplurimis interpositis uerbis, aliorumq; plurium morborum curationis
 bus, determinaturū referuans. Vbi⁵ deinde nil de uesticæ calculo meminit, necessariò ta-
 men ibi, & non in sermone de obstructionibus expressurus, siquidem in numero morbus,
 & nō morbi in uia facti causa existeret. Haudquaquā uerò nobis ob stare potest, quòd Hip-
 pocrates, in aphorismis, calculos inter puerorum morbos numerarit: Cum à causa mor-
 bum nuncupari posse (Galeni² dogmate) liqueat: perinde ac etiam lumbrici rotundi, atq;
 ascarides, magna ex parte, uel talem morsum inducentes, ut continui solutio fiat: uel febrē,
 aut obstructionem: causæ, non morbi sunt. Plura uerò ibidem, atq; in præcedentibus apho-
 rismis symptomata, nedum morbos (nisi uelis à symptomatibus denominatos morbos) sicu-
 ti etiā causas numerauit. Vltra q; morbus ē in numero lapis in uestica esse potest: præser-
 tim puerorum, qui magnus, & in concauo consistere solet. Ex his autem quæ demon-
 strata hucusq; sunt, perspicuum esse opinor, magnitudinis pupillæ (quæ morbus in
 uia non in magnitudine, prout in eptē quidam somniant est¹) quemadmodum oppositæ quoq;
 paruitatis, coniunctas causas² esse illius, tendentem rhagoidis siccitatem, uel quempiam tu-
 morem præter naturam: uel copiosum fortē intus oculum acruatum humore: huius uerò
 (paruitatis inq;) laxantem uueæ humiditatem, aut aquosi humoris, naturaliter crySTALLI-
 no præpositi, defectum siccitatem ue, prout ex ipsomet Galeno⁴ perlegimus: quem sequi,
 ac uelut interpres exponere Barbarorum medicorum Princeps⁶ uoluit: tametsi aliter Pau-
 lus,⁷ Aetiusq;,⁸ atq; etiam Razes,⁹ nedum Celsus,¹⁰ sentire uidentur. Quorum nihilo-
 minus discoloriam alibi examinandam referuamus: Ea duntaxat impræsentiarum exactius
 contemplati, quæ continentem morbi causam (uel Galeni confessione) indigitant. Sup-
 posita nanq; oculi actione, quæ uisio est, crySTALLINO principaliter attribuenda: Cum reli-
 quæ oculi partes usum, haud actionem præsentent. Positisq; tum primi usus instrumenti, tum
 eorum, quæ illi facultatem subministrant, morbis: quibus & actionis læsio immediatè suc-
 cedit: Eorum deinceps, quæ usum aliquem ei conferunt, morbos prosequitur. Quemadmo-
 dum (alijs omisissis) foramen rhagoidis est: quod quatuor quidem modis à naturali statu mu-
 tatur. Nempè uel ampliatum, uel imminutum, uel in aliquam partem detortum, uel rup-
 tum est. Verum ampliatio siue à natali sit, siue post accedat: semper uisui incommodat.
 Imminutio quæ utiq; à natiuitate incepta, acutissimi usus est occasio: quæ uerò post incidit,
 mali. Dictoq; deinceps probatoq; necessario uisui spiritus ad oculum per opticos neruos in
 fluxu:

3 post principia.
 4 cap. 4.

5 lib. 3. tex. 60.

6 ibidē tex. 75.

Obiectionis
 solutio.

Respon. 1^a
 2 3. aphor. 26.
 3 2. meth. cap. 2.

Respon. 2^a.

i Contra Va-
 leriolum.

2 Cōtra Mu-
 sã et Fuchsiū.

a 1^o de Sympto-
 matū causis cap.

2. post medium.

b 3^a fen. 3. tr. 4.

cap. 12. & 15.

c lib. 3. cap. 22.

d lib. 7. cap. 52.

& 53.

e 2. contin. cap.

2. in fine.

f lib. 6. cap. 6.

sec. 37.

g. libro 10. cap.
5. et uide cap. 12.
usq; ad finem. &
uide libro de oculis
lis particula. 2.
cap. 5. & 6. &
.7^a. de decretis
Hip. & Platonis
cap. 4. & primi
prognost. 23. &
3^a. 30.

Nota.

Cōtra Fuch
sum.

fluxu : pro inuestiganda demum causa, ratione uel, propter quam amplitudo foraminis ad per
spicaciam uisus, semper sit noxia : Angustia non semper : Ità demum subdit. Vbi igitur
amplior redditus est pupilla, siue id ex prima statim formatione, siue postea cōtigit : parum
commodè tota animali spiritu impletur. Fundi igitur, dissoluiq; ac dissipari cogitur. Si
cut contrà in minore pupilla colligitur, constringitur, ac densatur. Atqui demonstratum
in libris de particularum usu est & eius collectionem, & constrictionem, ad sensus bonitatem
illi conducere : contrà, dissolutionem, ac dispersionem, ad sensus noxam cedere. Qui
ergo sit, q; pupilla morbi uitio, non naturæ, minor redditus, multo deterior sit, q; mediocris?
An quia uitiosos affectus sequitur : quorū culpa necessariò peius cernit oculus sic affectus,
non propter pupillæ angustiam? Quinam igitur hi sunt affectus? nam hoc etiam disputatio
requirit. Vnus quidem ipsius rhagoidis tunica tantum, Alter humoris tenuis, qui medio
loco, inter ipsam rhagoidem & crystallinum humorem habetur, effusi. Ac tunica quidē
solius, affectus, extensio, relaxatioq; sunt : qualis utiq; in extrinsecus positis articulis
subinde cernitur, quum ligamenta redundant humore sunt perfusa. Humorum uitium in de
fectu consistit. Cuius occasione rhagoides, uacuato interno eius loco, in se concidens, cō
trahitur, ac rugatur. Atq; idcirco pupillam imminuit. Deterius ergo ex talibus affecti
bus cernere contingit : non utiq; propter pupillæ paruitatem, sed propter humoris desiderium.
E quibus Galeni uerbis exquisitè perpensis apertissimè profectò elicitur, pupillæ paruitatē
non protinus morbum esse, at symptoma. Quippè cum morbosos affectus, æquè ac fun
ctionis offensio sequatur : nec ea lædere actionem queat. Eam intelligo paruitatem, quæ
non multum mediocritatem excedit. Quæ n. plurima paruitas est, ea mediū fidiū uisio
ni incommodans, morbus existet. Coniuncta igitur ipsius læsæ actionis causa, quæcunq;
sit, morbus est. Magnitudinem uerò illius foraminis morbum esse liquet : quia primò, ac
perse uidendi actionem offendit & Mala igitur (ut postea subdit) est pupillæ paruitas, quæ
præternaturam accidit & non quia ipsa functioni incommodat, uerum quia causam suam,
aquei uidelicet humoris siccitatem, (quæ morbus in magnitudine comminuta, nedum intē
perie est :) uel rhagoidis, ac totius fortè oculi præternaturalem humiditatem, relaxantē,
ostendit. & Bona uerò quæ naturalis & cum non à paruitate (ut paruitas est) uisionis aëlio
uitietur. & Magnitudo autem eius, nec quæ naturæ lege habetur, bona est : Nec quæ nō
naturalis est & cuius causa coniuncta rhagoidis siccitas extensiuā est, quæ non aliter uisui
incommodat : nisi quia foraminis magnitudinem facit. Hæc igitur foraminis inq; amplitu
do morbus est. Rhagoidis uerò siccitas, uel spatium foraminis atq; crystalli intermedium
replens succus, coniuncta causa est. Quoniam uerò sanari morbus nequit, nisi eius causa
remoueatur. Idcirco prognosticum deinde adiunxit : dicens. Quoniam aut duplici ratione
tenditur : cum utiq; ex suapte natura id patitur, uel siccata, ut corpus simile, uel hume
ctata, ut instrumentale : Siccitas quidem eius difficilè sanabilis est : Humiditas non etiam.
Vbi ad causarum, tanq; continentium (quibus sc̄motis necessariò affectus, suis cum sym
ptomatibus, recedant) sermonem, præter morborum propositum, qui primò & uerius sym
ptomatum causæ sunt, non temerè conuertit. Haud igitur ualet, quod nonnulli, ex aduer
santium recentiorum numero, dicunt pupillæ inq; magnitudinem symptoma esse : cum fun
ctioni (ueluti præscriptū est) officiat. Derisione autem potius q; admiratione dignum est
quod

quod subdunt, id symptoma esse, quæ actio laesa dicitur: cum non foraminis pupillæ uel am-
plitudo, oculi actio sit, sed uisio. Neq; rhagoidis actio dicenda: tum quia, præter innatas
facultates, actione caret: Cum solus illi usus à natura distributus sit: tum etiam quia si ali-
quam habere debet actionem, haud extensio illius est: Cum nec uoluntario motu per muscu-
los, neq; naturali per uillos, aut aliter extendi à semetipsa contingat. Quod si à spirituum
multitudine maior fieri contingat: passio hæc, non actio est. Neq; impedita hæc magnitudo
maiori facto foramine est. Quod item addunt, eo libro, de symptomatum differentiis lo-
quitur: proptereaq; morbos causæ continentis nomine Galenum intellexisse contendunt, quia
uerè bi symptomatum continentem causæ sunt: negligendum pariter censemus. Nam sym-
ptomatum causam inquirens, morbum s. illius adhuc morbi causam uestigare non infrequen-
ter consuevit. Perinde atq; in pluribus obseruari potest. Quin libro de morborum differen-
tiis, tametsi eorum species duntaxat enumerare propositum fuerat, eorum nihilominus ali-
quando causas intermiscet. Itaq; morbos, qui symptomatum causæ sunt, narrantem in-
decens minimè est illorum quoq; morborum causas obiter uestigare. Quò præsertim facilis,
aut difficilis talis morbi curatio, & consequenter symptomatum ablatio pateat. Sed quid
opus est uerbis? cum præter id quod Galeni decursum exquisitiùs abiecta larua contemplā-
tibus patet: sic demum subdit. Quoniam autem non solum qui in foramine rhagoidis sint,
morbos disputatio percensuit, sed etiam aliquos ipsius rhagoidis commemorauit, superq; qui
tenuis sub ea sint humoris: Sequens fuerit, quæ reliqua in ipsis sunt, persequi: quorum ui-
sio uel impeditur uisus, uel omnino aufertur: &c. An igitur in foramine morbi, siccitas
& humiditas sint, an eius angustia potius uel amplitudo: quarum causæ siccitas aut humi-
ditas existunt, adeò uel cæcis pernotum est, ut probare superuacaneum sit. Haudquaquā
tamen alijs assentiendum censemus qui suffusionem foraminis obstructi continentem causam
existimant: Cum in numero morbum (ueluti præscriptum est) Galenus i eam protulerit.
Et quidem rectè, nam sine medio uisionem impedit. Haud.n. pupillæ foramen obstruit, uel
meatū aliquē: quia nil in foramine cōsistit: uerum in medio foraminis & corneæ spatio suffu-
sus humor crassus lentusq; uisuiæ facultatis exitum impedit. Non secus ac si bubulam ue-
sicam quis uirgæ capiti perinde adiungeret, ut urina in eam uesicam recepta retentaq; fo-
ras defluere impedita sit. Tunc.n. obstructum esse penis meatum exprimere ridiculum fo-
ret: Cum omnis morbi expers sit. Bubula uerò uesica, seu quoduis aliud eodem modo uri-
nam recipiens, eius in terram defluxum primò ac per se impediret. Quamobrem quia pri-
mò cernendi facultatis ad exteriora transitum, post rhagoidis foramen, tam suffusio q; ptery-
gion impediens est (Et si hoc extra corneam, illa uerò citra eandem, posita sunt) in nume-
ro morbum utrunq; haud foraminis obstructi causam, quolibet abiecto scrupulo proferen-
dum est. Ea propter benè Celsus^k de suffusione exprompsit, q; s. interdum oculi poten-
tiæ, qua cernit, se opponit. Neq; foramen obstruere ait. **ITAQUE** his omnibus præ-
libatis, ac rursus in unum recollectis, morbi cuiusuis in intemperie geniti, æquè ac in uni-
tate, illius uel opposita solutione, atq; etiam numero continentem designare causam non li-
cet, nisi alterationis, uel ingeneratione existentis solutionis (quæ pathos est) causam consi-
deraues. Magnitudinis autem, Positus, Figuræ, Superficie, Cavitatumq; aut Mea-
num continentem aliquando causas demonstrari posse præscriptum est^l. **QVAS** ob res ut

b uide cap. 7
c. 8.

Contra Vaz-
leriolam.
i. libro de morb.
differentiis cap. 8.

k. lib. 6. cap. 6.
sec. 35.

l. supra fo. 51.
52. 53.

ad nostrum

ad nostrum propositum (unde his hæc originem duxit) reuertamur : ad tumores inq; præter naturam (quæ Princeps communi nomine apostemata uocat) in illis continentem causam perquiramus , exemplo in primis ab ipsa phlegmone desumpto . Etenim quia ex triplici morborum genere compositus affectus est , intemperie inq; calida , tumore , magnitudine ue præter naturam , atq; unionis non occulta modo sed manifesta quoq; interdum solutione , præsertim quoties in abscessum conuertitur : Item quorundam meatuum obstructione , consipationeue , aut compressione , atq; partium interdum inæqualitate : ubi & figura nonnunq; uitiatur : Quoduis istorum ad tale peruenerit incrementum , ut functioni per se ac primò incommodet : morbus dici non iniuria debet , maioremq; compositionis in affecta parte cumulum adauget . Caloris ergo præcedens causa cruor , uel bilis , aut ex utroq; succo admixtus humor est : Qui nihilominus tumoris continens causa est : perinde atq; obstructionis etiam . Solutæ uerò continuitatis præcedens idem uocari debet . Tumor autem inæqualitatis asperitatis ue continens est . Veluti & uitiatæ nonnunq; figuræ . Hæc autem continens aliquid quando compressionis meatus existit . quemadmodum Galenus¹ de curua nasi figura diffinit : cuius compressionis causa etiam continens tuberculum esse (uel ipso met auctore^m) potest . Quibus duntaxat , exempli causa , in medium adductis , enarratisq; , perspicile quidem fuerit , tum causas , & præcedentes , & coniunctas , tum morbos , atq; insequentia symptomata uesigare : id ipsum continuo præ oculis haberi , quodcunq; functionibus primò ac per se officit , morbum esse : quod autem hoc medio , causam : Veluti quæ illum insequuntur , symptomata . Vnum item eundemq; affectum , non modo huius respectu morbum : alterius uero comperatione causam esse : Verum & ad hunc continentis , ad alium uerò præcedentis causæ relationem habere posse . Quæ cum ex prænarratis liquida consint : prolixior hic sermo protendere superpondium foret . Ad Galeni ergo determinationem rursus (ut colophonem imponere possimus) omni rupta mora conuertimur . Quum posita & phlegmones , & erysipelatis causa , plenitudine inq; , qua semota membrum ad naturalem statum redire prædixerat : sic demum (pro Asclepiadis , ac Iuliani etiam confusione) conclusit .ⁿ εἰα μὲν τῶν αἰτίων οὕτω καλεῖσθαι συνχωροῦμεν , οὐμὰ δὲ ὅσα τῶν ἀπλῶν ὄντων ἐστὶν : ἀλλὰ τῶν ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι κακτημένων . ἐν τούτοις μὲν ἡ λύσις ἔσονται σοφίσματος . i. causarum nonnullas sic nuncupari permittimus (hoc est continentes) non per Iouem earum rerum , quæcunq; entia absoluta sunt : sed earum quæ in generari , esse acquisiuerunt . In hoc quidem sophismatis explicatio consilii . Cum igitur intemperies quæuis existens , continuèq; dissolutio , atq; etiam uel superflua , uel diminuta numerus , absolute esse dicantur : adeò ut remota causa , remanere pro aliquo temporis intervallo queant . Immo nonnunq; (si uidelicet habituales factæ intemperaturæ sint) ad finem usq; perdurent . Idcirco continentes causas neutiq; habere dicentur . Obstructionem uerò , Quoniam esse suum à causa necessariò sic dependens , illiq; tum in existere tum in conseruari nedum fieri , annexum obtinuit : Vt ea remota uel diminuta , ipsa quoq; obstructio quam primum , quin eodem instanti remoueat , uel diminuatur : quemadmodum illa posita , atq; adaucta hæc etiam posita , nec non adueta similiter est (quadere suum esse non absolutum sed in fieri , generariq; possidet) Ideò continentem habere causam tuta fronte determinandum est . Idemq; de tumore præternaturam ob suppositos & in altum attollentes succos , aut aliud

l. lib. de morborum differentiis cap. 7. in fine.
m. lib. de morborum causis cap. 7. uersus finem colligitur.

n. lib. contra Iulianum cap. 9. in fine. & dictum fuit supra arguendo in oppositum xi.

aut aliud quoduis, factio, Asperaq; etiam superficie, ac cæteris præscriptis enuntiandum. Quæcunq; uidelicet esse (perinde atq; iam iam ex Galeno prædiximus) ἐν τῷ γίγνεσθαι, quod est in generatione, seu in fieri possident. Et si n. expleta iam sint, adeo tamen à causa necessario dependent, ut nil differant ab ijs quæ nunc iam à causis suis fiunt. Vbi nō temerè perpendenda sunt illa uerba. ἐν τῷ γίγνεσθαι τὸ αἶναι καὶ ταμῆναι; haud. n. dicitur ἐν τῷ γίγνεσθαι uel γινόμεναι; quæ. si adhuc fiunt, quum uidelicet nil adhuc facti demonstrari potest, quod actiones offendat: sed quæ acquisierunt esse, in generatione tamen adhuc: quasi dicat à causa ita dependens, ut illud quod nunc generatur: de qua est Galeni sermo uerificari potest. At illud cum nil adhuc facti habeat, ut functionibus obesse queat: uel nunq; factam partem ostendere poterit (uti sermo & quælibet passio est) morbus quidem dici non debet: A Iuliano autem, atq; Asclepide nō de passionibus, aut alijs: uerum de morbis eorumq; continentibus causis agitata lis est. In illis ergo intelligenda Galeni determinatio est: in qua (uelut subdit) sophismatis dissolutio consistit. Atq; hanc esse proculdubio ueram definitionem opinor, etiam si ad aliud Galeni uerba tendere calumniari, ac tergiuersari quispiam auderet. VERVM enim uerò ambigere aduersarius posset. Cum morbus affectus sit permanens: qui uerò sic à causa dependet, ut sine illa, neq; esse, neq; durare queat, permanens minimè est. Vel igitur Galeni sententia, morbum affectum esse permanentem dicentis, falsa est: Vel obstructio, cæteraq; prædicta, morbi nō sunt. quorum utrunq; à peritiorum auribus procul abesse debet. Quibus profectò promptior est responsionendi occasio, q̄ fuerit dubitandi sollicitudo. Etenim quum Galenus morbum esse affectum permanentem, constantemq; ait: Id ipsum ut huius à passione differentiam ostenderet, aduersus Themisonis, Thessali, Olympici, Iuliani, cæterorumq; Methodicorum phantasiam enuntiare uoluit. Passio namq; solus alterationis motus est, cuius (ueluti præscriptum ex Galeno est) nil remanet, nullaq; pars facta demonstrari unq; potest. Morbus uerò affectus constans est: qui, si factus demonstrari potest, adeo ut functionibus incommodet. Siue autem cum adiuncta sibi causa, siue absq; illa permaneat, satis superq; est, quod factus sit, & permanens, factaq; pars & à medico, & ab ipsomet ægrotante sentiat. Id quod in oppilatione considerari perspicue licet. Haud. n. est ipsum fieri, seu alterari: nō ipsa passio, seu motus, at affectus dispositione permanens, Ab ijs qui in intemperie consistunt, eò duntaxat differens, quoniam illi sine causa stare possunt, cum adepti sint, possideantq; esse absolutum, Obstructio uerò nata sit possideatq; esse dependens, atq; in generatione: ita ut absq; causa sibi coniuncta & ipsum continente permanere nequeat. Quis tamen obstructionem permanere, primoq; & perse actiones impedire posse, tumq; ab ea curandi intentionem sumendam esse (quæ apertio est) inficias ibit? Quoniam uerò sic ab efficiente causa, ueluti prædictum est, continetur: idcirco una eademq; medici intentione, ad causam uidelicet directam, ut auferatur, morbi simul indicatio euanescit: quoniam remota causa, q̄ primum & affectus disperditur. Intemperies uerò, secundum causæ ablationem, adhuc extinguenda remanet. Hæc intantum de continente morborum causa iuxta ueritatem (ut firmissimè credimus) determinata iam sint. GALENVS autem causæ continentis adeo uel nomen abhorruit, ut ipsius etiam obstructionis causam dubio procul continentem, præcedentem quoq; nonnunq; appellarit. Id quod inde ortum esse compertum habeo:

o. ubi supra.

Nota.

Pulchra obie-

ctio:

p. lib. de Sympt. differentis. cap. 1. & 2. meth. 3.

Solutio.

q. quos uide p. meth. cap. 7.

r. supra fo. 46.

s. 2. meth. cap. 3.

Morbus quomodo à passione differt.

Galeni opinio de causa continente.

1. xi. meth. cap.

12. in prin.

Ratio p^a. habeo: Quoniam falsissimam uolebat Stoicorum opinionem prorsus eruere: quiquidem omnia continentem habere causam temerariè contendebant. Donec aerem & ignem cuncta, nedum semetipsa continere: terram uerò, & aquam contineri dixerint. Quemadmodum Herophilei quoque, tametsi nūm aer, an ignis, an utrunque id sit, quod lapides & ligna, aliàque id genus cuncta contineat, ignorare iam se professi sunt: absolute nihilominus facultatem quandam esse pronuntiabant, quæ eiusmodi coerceat omnia. Quando nullo ea cogente, ac stringente dissolueretur, dilaberenturque. Aduersus quos libro cui titulus de multitudine est, Galenus nonnulla obiter attingit: alibi fusius (libro fortassis de causis continentibus, quod caremus) ac præsertim contra Stoicos, se disputasse dicens. Quò, igitur ineptas, rudesque tum Stoicorum tum Herophileorum chimæras euaderet: continentis causæ nomen omittere factius erat. Id quod sic obseruasse integrum quoque fuit: quoniam quod primum præcipueque tam à medico, quàm à uulgaribus quibuscumque idiotis consideratur: operationum læsio est. Primum namque & absolutissimum corporis bonum, quo potissimum egemus: actionum perfectio, ac robur (Galeno met didascalo x) est: Cuius ratione secundarium corporis bonum requiritur, sanitatis uidelicet bonus habitus. Tertiumque deinceps aliud quodam ab illis corporis bonum necessario consequens, pulchritudo est. Non secus igitur & primum consideratu dignum malum incommodumque est, actionum uitium. Cuius ratione deprauatus sanitatis habitus (quem morbum dicimus) perpendendus succedit. Demumque turpitudine peruestiganda consequitur. Quasobres tunc se ægrotare homines existimant: cum actiones offensas habent: tunc enim medicos inquirunt, curationemque efflagitant. Quemadmodum tunc se sanos esse gloriantur, quum partium corporis ministerio, ad eas, quæ in uita necessariae sunt, actiones, absque ullo uitio perfungi (Galeni quoque testimonio y) potuerint. Adeò ut multi ex methodicorum secta functionum læsionem morbum esse machinati sint: perinde ut plurimi actionum robur sanitatem esse declarabant. Apud eos igitur, affectus (quos uerè nos uel sanitatem uel morbum nominamus) tum sanitatis, tum morbi continentes causæ nuncupantur. Quaderè continentes assignari causas perpetuò concedendum foret. tametsi dogmatizantium nonnulli has, tyrannorum ritu (Galeno etiam referente z) neglexerunt. Itaque ne continentis causæ nomine functionum causas, ipsosque met morbos quispiam ab eo intelligi perperam concipiat: aptius esse id genus causam reticuisse opinatus est, morbumque præcedere, pro exactiori quidem notione, protulisse. Atque id ipsum ualidius ad huc roborari potest. Quoniam actione læsa præ cæteris considerata, id quod primum perpendendum sequitur, quod primum & absque ullo medio functionem lædit: hoc autem morbus est: quod uerò morbum præcedit, causa dicitur: præcedit inquit, quia non sine medio, coniunctimque actionibus incommodans. Adeò ut etiam si morbum continens causa sit: ipsum tamen præcedere, functionum relatione (cum hoc medio illis absit) non temerè prolatum sit. Præcedere quoque, græcè προϋειν, iuxta propriam uocabuli acceptionem, quod est ducem, ac in agenda re præuiam esse (quemadmodum antea declarauimus a) aptissime id genus causam, morbo scilicet absque medio coniunctam, proferre possumus. Alia nihilominus ratione cur continentis causæ nomen Galenus despexerit, perfacile ostendi potest. Ex ijs namque quæ secundo de natura humana commentario b Galenus ipse protulit: necessario priscorum nonnullos eiusmodi opinionis extitisse colligitur: ut qui continentes idcirco causas nominarint, quia simul cum morbo functiones

u. cap. 3.

2^a

cc. lib. de salubribus ad trasibus lun. cap. 15.

y. lib. de morborum differentiis cap. 2. in princ.

z. 2. meth. cap. 5.

a. in argumentis ante oppositum argumento. 5.

b. commentario.

4^a

10

20

30

40

ctiones læderent: ut συνέκτινα græcè, latinè autem continentia, quasi dicat, simul tenentia, seu habentia dicantur. Aduersus quam phantasiā sua uerba contexere Galenus cuius exquisitè perpendenti liquet (ni extrā propositum probantem, ac delirantē hōiem cōdēnare impudētē uelis) ubi sic dicebat: Prauū est repletionē morbi causam cōtinentē esse: Nec eam subdit rationē, quā alibi expressit: quia scilicet morbus affectus permanēs, & per se cōsistens est: Verūm aduersus eam, quā tetigimus, aliquorū fortassis sententiā: causam uidelicet unā cū morbo, insimulq; actionibus obesse: atq; illas læsas cōtinere: talē subiungit rationē: Etenim morbus quidē ipse affectio quædā est in animātis corpore, primò actionē lædēs: At repletio primò quæ functionē nihil offēdit, uerūm altero quodā intercedēte uitio &c.

Ex quo sequitur non æquē causam, ac morbū functionibus obesse, ut simul eas tenere dici possint. Præter hæc uerò cōtinentē causam neglexisse melius fuerat: Cū efficiens ad effectum, ac (ut ita dixerim) causa ad causatū refertur. cū quo simul tempore, tanq; suo cū correlatiuo existit. Modò causa effectus fientis, haud eius qui præcessit, absolutusq; est, dici propriè, simpliciterq; (Galenī documento) potest: siens uerò (ut sic) passio simpliciter est. Futuri autē respectu præcedēs, non cōiuncta, seu continens causa nuncupanda potius uenit. Vt ergo causa est suoq; cum effectu coniungitur, aptius morbi præcedens (tametsi passionis continēs) causa dici meretur. Quinq; igitur hisce iam dictis rationibus (ni Galenum impiè condemnare malueris) cur continentem causam, uel ubi neutiq; negari debet, omiserit, uel interdum quoq; rationibus reprobavit, & tibi, & alijs persuadere facillimè poteris.

QVOD autem scilicet Galenus continentem causam nominans & ὡς ἀνέκτικis, hoc est: ut quispiam dixerit & adiungat: Et si quia tale nomen ob præscriptas rationes abhorrebat, eo loquendi modo usum esse uerosimile est. Ex eo nihilo minus id euenisse potius reputo: quoniam aliqui non συνέκτινα, quod est latinè continentē, seu contentiuam, sed συνέχον id est continuam potius: alij uerò προεχēs hoc est adhaerentem, adiunctam uel seu coniunctam (perindē ut antea f. quoq; ipsomet ex Galeno, & declarauimus) nominabāt. Propterea ne incasum circa hæc immoremur, συνέκτινα dicens: ut quispiam dixerit & adiunxit. In prognosticis uerò ait: ὅτι περ καὶ προεχēs ὁνομαζομένη hoc est latinè: quam causam etiam adhaerentem nominant: Idemq; in medendi methodo ait: ἴν δὲ καὶ προεχὴ καλῶν εἰσθασιῶν: quod est: quam adhaerentem etiam coniunctam uel nominare sunt soliti: Equibus hinc inde collectis Galeni uerbis patet, cum uariis sit nominandi id genus causæ modus, mirum nō esse, si unum ex illis nomen accipiēs, quò multiloquium euitet, & ut quispiam dixerit & adiungat. Præsertim ne de nominibus altercari, ac frustra penēs illorum selectum, tempus cōterere uideatur.

HIS itaq; abiecta larua prælibatis, non causæ modò continentis, iuxta ueritatem, nostra determinatio, uerūm Galeni quoq; haud nostræ difformis sententia liquet: tametsi nonnūq; tale nomen potius q; rem ipsam euitare, pluribus iam præscriptis rationibus, enixus fuit. Pro cuius quidem ueritatis, Galenicæq; sententiæ exquisitori cognitione: prius q; ad nostri (quem præmanibus enarrandum assumpsimus) Principis uerba perueniamus: utriusq; partis argumenta perlibremus.

PRIVS enim ante oppositum pluribus Galeni locis id genus causæ uel sub silentio tanq; nullo pacto existens, præteritum esse, uel omnino (reiecta Stoicorum, Herophileorumq; sententia) abnegatū esse, ob eas quas iam id retulimus rationes ad xij^m.

c. lib. de causis continentibus & lib. de sympt. diff. ferentis. 2. et p^o. de locis affectus.

5^a.

d. lib. de sympt. diff. cap. p^o. post prim.

e. ut 7. aphorif. cō. 30. & primi de sympt. caus. 2. & 10. metho. cap. 10.

f. in argumētis post oppositū argumentū 14. cum 16.

g. Ex Galeno p^o. de sympt. cau. 5. h. 2. prognost. 4. uersus mediū comment. i. 2. meth. cap. 4. ante mediū.

Ad arg^{ta} ante oppositū.

Ad p^m. usq;

E rationes ad xij^m.

Ad 13^m. rationes, ostensum est. Arist^m. uerò effectiuas causas formalibus cōparantē, illas uelut prius genitas, effectibusq; præpositas, materialiter, atq; (ut dicunt) fundamētaliter intellexisse, Phæbo clarius est. Ut sic. n. efficiens causa effectui, tēpore, necessariò præponitur. Ratio uerò demum facta, causamq; cōtinentē abnegās, Galenimet ipsius prænarrata distinctione, citrà puluerē dissoluitur: Quoniā. s. uel esse absolutū, ac per se cōsistens affectus obtinuit: atq; huius nulla proculdubio effectiua cōtinēs causa assignari pōt. facti. n. nullā simpliciter ac propriē causam dici posse liquet: Effectiua inq;: Cōseruantē nanq; hēre posse inficias non ibimus. Quæ reditum potius ad propriū habitū impediēs, atq; aliquā passionē actionem uel producēs est, ratione cuius cōseruat: Nō efficiens aut id, quod esse (ut supposuimus) absolutū obtinuit. Huius aut ut futuri præcedēs duntaxat causa dicēda est: quemadmodū fientis, ut sic cōtinens nuncupari posset. at nō morbū uerū passionem, ut fiens est, nominandam esse nulli nō liquere arbitror. Sin esse dependens, atq; (ut sic dixerim) in generatiōe morbus habet. Adeò ut ne instanti quidem semota causa permanere, seruariq; (ueluti de obstructione, pluribusq; alijs prædictum iam^k uberius est) possit: huiusce affectus continētē designare causam (ut cui continentis definitio congruat) uelimus, nolimus, astringimur. QV AE uerò in oppositum adductæ autoritates idgenus causæ perindē audacter, atq; intrepidē ponunt: Ut plures uniuersaliter in putridis etiam febribus, alijsq; intemperiebus, quin & continui solutionibus, affirmant. Quemadmodum & Arabum Princeps, & Auerrhoes, atq; etiam Ioannitius. Quorum sententia tametsi licentiosior, q̄ à nobis præostensa sit: haudquaq; tamen reprobanda, posterius (doctrinæ clarioris studio) cribranda reseruabitur. Nunc uerò (dimissis celsō, ac Phyltheo tanq; ad particularia exempla minimē descendētib; uerū ipsas continētes causas, ubi fortē duntaxat insint, haud in quouis morbi genere admittētib;) definitionum medicarum authorem perpendamus. Hic. n. q̄uis rectē id genus causam definierit: Non omnia tamen exempla rectē assignauit. Lapidem nanq; in uesicæ meatu contentum obstructionis coniunctam esse causam in præcedētib; ostendimus. perindē ut aliū in eiusdē ampla capacitate cōsistētem in numero morbum dici nonnūq; posse declarauimus.^m Aquam uerò in oculo, post pupillam, cornetæ suffusam, in numero morbum esse iam ex Galeno præscriptum est.ⁿ AE quē ac pterygion in aucto numero morbus est. (tametsi non ex toto genere præternaturam sit, Galeni dogmate^o, quod auctum est) uidendi actionem absq; ullo medio impediēs. Quā pariter lædere potest encanthis ipsa, in magnitudine illius caruncula, quæ in maiori oculorum angulo sita est, morbus existens, ipso met authore^p (præter Galeni,^q quem Paulus,^r Aetiusq;,^s & Princeps^t insecuti sunt, leges) definiente: cui quidē Rhyas eiusdē anguli carnis cōsumptio, diminutiōue opponitur. Itaq; tam pterygiō, q̄ encanthis, nedū suffusio, cōiunctæ licet causæ sint læsarum functionū: In morborū nihilominus, non in causarum catalogo numerandæ sunt. Quam obrem eiusdem libri author statim subdit: quæ ponunt medici non in causarum duntaxat, sed affectuum quoq; ratione. & Quod si prædictus author, quisq; ille fuerit, in aliquo defecisse offenderimus: sua interesset quæ ipsemet scripserit, tueri. Quò ad nos uerò spectat, satis superq; est causam cōtinentē ab eo cōcessam, definitāq; fuisse. Ad aliū ergo, Introductorij uidelicet authore cōuertamur. Qui & si benē cōtinētē cām ipse quoq; definierit: falsum nihilominus esse à spina et telo desumptū exēplū perindē cuius

k. supra fo. 51.
52. & sequētib;
Ad arg^{ta}. post
opp^m.

Ad p^m. 2^m. et
3^m. de qbus ite
rū infra fo. 64
Ad 4^m. &
5^m.

Ad 6^m.

l. supra fo. 53.
m. supra fo. 54.
55.
n. supra fo. 57.

o. lib. de morb.
dif. cap. 8.

p. lib. de defini.
med. uersus finē.
q. lib. de tumo.
præter nām. 21.
& 14. meib. cap.

17.
r. lib. 3. cap. 22.
s. lib. 7. cap. 61.
t. 3^a. 3. 11. 2. cap.
16.

Ad 7^m.

40

cuius compertum est, ut à me probari neutiq; desideret. Vnitatis. n. solutio, ut morbus est, Contingente causa desitui præostensum iam est. ^{u. supra fo. 57.} ni soluendi actum, quæ passio quoq; existit, contempleris. Spina igitur & telum exteriores causæ sunt. Quod si præcedentes nominandas fore contenderis: nunq; tamen continentis definitionem illis congruere inuenies. Dioscorides uero sat habuit cum methodicorum opinionem, ex eorū met fundamentis, eruerit: mortiferam. s. uim à uenenosorum animalium demorsu corporibus illapsam, duplici modo causam esse, procatarteticam. s. atq; continentem. An uero passionis, nō morbi causa sit, quia tēperamentū transmutat, corrumpitq; præter ipsius propositum existit. Nosq; ab ipso concessam duntaxat continentis causæ definitionem admitteremus. Galeni uero loca percurrentes, multa nō morborū, sed passionis, alicuius uel motus, aut alterationis causam continentem, uel ab aduersantibus permissam inuenimus. Quemadmodum & pulsabilis motus causam continentiuā, in cordis, arteriarūq; substantia, uitalem facultatem esse, nō ignoramus. Eodemq; modo cuiusuis alterius motus, aut alterationis. Perinde atq; spumificationis quoq; flatuosus spūs humori lento, atq; in minutas partes, uel calore, uel agitante motu effracto submissus, continens talis generationis spumæ causa est. Vbi nihilominus aliquid nostro proposito cōducens annotabis. Etenim spumæ cōtinens causa hic flatuosus spūs est, non generationis modo, sed ipsius etiam substantiæ spumæ: postq; ad ultimum bulla peruenerit, cōsistitq; nec aucta amplius, neq; cōminuta: Cum esse absolutū nō habeat: sed à subincluso spiritu dependens, quo ad esse, & cōseruari. Nō secus ac obstructio ab obstructe uel multo, uel crasso, aut lēto humore depēdens est. Adeo ut nō spumificationis tantum, sed ipsius etiā factæ iam, cōpletæq; spumæ causa prædictus spiritus sit. Quæ autē aduersus Iulianū præscripserit Galenus, in præcedētibus declarata iam sunt, ^{x. supra fo. 58.} eorū uidelicet qui absolutū esse obtinuerūt morborū, nullā posse (præterq; generationis) cōtinētē causam assignari: Cōtrā uero, eorū qui depēdens potius, atq; in generatione adhuc totū esse cōseruandū, postq; expediti iam sunt, ne dum generandū habēt, causam necessariō cōiunctā admittendā, Galeni distinctione esse. Hippocrates uero ex repletionē fieres morbos euacuatione sanari dicēs: dum fiūt, nihilq; adhuc factū ostēdere possunt, intellexisse pluribus quoq; præostensum est. ^{y. fo. 47. 48. 49.} Quemadmodū magnitudinis pupillæ, morbi qdē in uia cōsistentis, tentionē rhagoidis cōtinētē propriē causam esse, uelut ^{Ad. 13^m.} oppositi relaxationē: Demūq; cur eo loquēdi mō ut qspia. s. dixerit: usus ē, demonstrauim⁹. ^{z. supra fo. 61.} Haudquaquā iterim inficias eūtes morbos cōtinētes symptomatū causas tutius nūcupari posse. Vt nōnūq; stuporis, obstructionē: Interdū uero & horroris, & rigoris rodētū excrementorū cōfertim actorū citiorē motū protulerit. Perinde atq; facilis difficilis uel screationis, tum materię uitū obediētiam uel tum id quod initū habet motus adhærētes cōiunctas uel (nō morbi) causas ostēdit. Nō secus uero & actionis cōiunctā causam negligētes increpat, eā admisisse uisus. In qbus tamē ac similibus locis stultē qdē morborū cōtinētes causas ex Galeno concludūt. Etenim aliūde (ueluti nos fecimus ³) eas uenari debēt. Nihil ergo nobis ob stare potest, si nonnūq; continentis causæ definitionē dederit. cum eā in morbis quoq; nedū symptomatibus, motibusq; aut alterationibus reperiri permiserimus. Idipsum nihilominus aduertendū est, quod & si febrem cōtinente causa desitui declaratū est: Minimē tamē Galeni ad ^{Ad. 19^m.} trasylbulū scribētis argumentū nobis ob stare potest. Vbi aduersus methodicos scribēs, eorū fundamenta in febribus id genus causæ admittentium supponit: argumento utens (ut logice dicunt

Ad 20^m. ci dicunt) ad homines . Aristotelis uerò authoritas quæcunq; præscripta iam sunt roborare uidetur : ædificationis uidelicet ut actionis passionis ue cuiuspiam continentem causam

Ad 21^m. acti ædificatorem esse : domus uerò absolutæ iam, neutiq; esse . Sunt autem ædificator & ædificium (eo tempore quo id fit , ac in uniuersum causa omnis cum suo effectu , dum ab ipso dependet, absolutusq; non est) correlatiua: sicq; posita se ponunt : peremptaq; (formaliter inq;) se perimunt : continentisq; definitio in illis inueniri , haudquaq; uerò in absolutis , potest .

Ad 22^m. Qua ratione doloris etiam , non ut symptomatis modo , uerum ut morbi rationem aliquando subeuntis continentem causam abnegare nequimus . At dolor quidem morbi rationem subire nonnunq; potest : uerè autem morbus esse nunq; apud emunctæ naris uiros admittetur . Tria namq; ad exquisitam morbi rationem necessaria sunt : primum . scilicet quod

Tria ad morbi rationem esse iam absolutum habeat : absolutum inq; quod ostendi uidelicet factum queat , siue perse absq; causa , siue cum illa consistere , conseruariq; opus sit : Atq; hac prima conditione designatum esse dolorem , plurâq; alia symptomata uel morbi rationem ingredientia liquet .

Quorum . scilicet nihil factum ostendi quouis modo possibile sit . Reliquas uerò duas conditiones

dolor interdum adeptus morbi rationem suscipere dicitur . Quarum altera est qd actiones manifestè offendat . Quas cum non perse & primò sed per accidens offendat (quatenus . scilicet ad dolentem locum fluentes spiritus , dissoluuntur , extinguuntur ue , ac uniuersum interrim corpus frigit , ueluti ex Galeni^a quoq; dogmatibus apertum esse cuius potest .) nec eam exquisitè habere dicitur . Altera uerò est , quam admittere in illo nonnunq; possumus .

Quoniam . scilicet ad se curandi intentionem , non ut symptoma (à quo nulla curandi , ut symptoma est , intentio sumitur) sed ut morbi rationem subiens , retrahit . Quamobrem non morbum fieri , at morbi rationem subire dolorem à Galeno prolatum esse recolo . HIS ergo exactè (uelut operæpretium esse opinor) pensitatis : ut in unum de hac re sententiam rescolligamus : Causa continens in secundo morbi genere , tametsi non omni eius generis specie , reperiri uerè potest . ut in Magnitudine , ac Situ , itidemq; Figura , Superficie , Cavitatibus ue . quemadmodum antea proprijs singulorū exemplis demonstraui .

In Numero aut & cōtinui diuisione , propriâ inuenire causâ (cui cōtinētis definitio cōgruat) nequimus . A Equè ac in primò genere : quodq; in ipsa intemperie cōsistit . Equibus iterū cuius rem abiecta larua perlibranti cōpertissimū esse reor febris nullâ posse cōtinētē causam propriè loquēdo designari . Quod si Arabū Princeps , Auerrhoesq; & Ioānitius , ac de

mū Barbarolatini oēs interpretes , methodicos quosdā sectati , putredinē , aut humorē (ut alij uolūt) putridū : seu (prout nonnulli malūt) putres fuligines , cōtinētē cōiunctam ue putridæ febris causam admisērūt . Id quod Dioscorides^c etiâ , ipseq; met Galenus^d admisisse nonūq; uisi sunt : cōtemplatione dignū est . Exquisitiū . n. cōtemplati , perindè ut antea præscriptū est^e Febris cōtinētē causam nullâ horū proferre possumus . Cū illius à græcis posita , priusq; à nobis declarata , cōtinētis inq; causæ definitio , ijs minimè cōgruat . Remota . n. putredine , ad partem febris (quæ . scilicet facta est) intendere (uel Galeni^f testimonio) necessum est .

Ni adedò imbecillis , remissaq; pars illa sit , ut natura statim (ob causæ recessum) roborata , hilarisq; reddita superet : donec ad pristinum , propriūq; temperamentum reuertatur . Iuxtà definitionem uerò quam Princeps primo medicinæ libro^g posuit solamq; ibi uelut sibi magis electam , auribusq; suis consonam celebrauit , putredinem febris

coniunctam

b. fo. 51. 52.

Ad p^m 2^m &
3^m.

Arabū et præsertim Auicennæ sentētia de causâ cōtinēte
c. sexxi. 35.

d. lib. de optima secta ad trasibuz
lū cap. 23. & 25.
& lib. cōtra. Iulianū uersus finē ubi bubonē cōtinētē febris causam esse ponitur.

e. supra fo. 45.

f. 11. meth. cap. 4. & 10.

g. 2. primi doc. 2. sum. p^a. ca. p^o.

coniunctam causam esse inficias ire nequimus. Haud enim eo quo ab alijs definitum est modo, coniunctam causam libro medicinae primo descripsit. Vt scilicet ea sit, qua posita penatur affectus, qua remota idem extemplo euanescat, perinde ut aucta, uel comminuta, hic augeatur, aut minor fiat. Sed aliter eam nobis depinxit. Quod scilicet corporea sit inter quam & morbum nihil intersit medium. Modò sic est q̄ inter putredinem & febrē nulla alia causa intercedit mediāq; est. Idcirco non temerè penes eius descriptionem, coniuncta febris causa putredo nuncupari potest. Nec humores putridos coniunctam causam ponebat: neq; fuligines uapores'ue putres (ut inextricabiles quorundā in labyrinthos incidere necessum sit: an s. fumus, uel humor causa coniuncta sit) sed putredinem. Quaderē
10 quoduis putridum, siue humor, siue fumus, aut uapor (ut putridum) coniuncta causa febris est: inter quod s. & febrē nulla media causa existit. Vt putridum inq;: immedata enim causa putredo est. Humor uerò, aut uapor, seu fuligo, intercedente ipsa putredine, febris causae existunt. Quod si in canticis^b græcorum illam definitionem inuise uidetur: dicens. & Quādiu continuatur putrefactio, continuatur & febris putrida & ut per hæc uerba remota quidem putredine, febrē euefligio remoueri præsetulerit: Non ut philosophum exquisitè rei naturam considerasse dicemus: at medicè magis (distinctionis clarioris gratiā) locutum. Vt dempta uidelicet putredine, statim hoc est facillimè, ac breuissimo & uix effatu digno temporis interuallo febris ipsa remoueatur. Aut si maioris
20 eum exquisitissimè locutum, aliorum potiùs opinionem ibi secutū esse respondebimus. Magis n. sibi aliam placuisse inde elicimus, quod eam in loco ubi seriò quidem, ac magis ex proposito, & prolixiùs de causis loquens, assignauit. Pariterq; de Auerrhoe nec non Ioannitio medicè. s. ac largiùs lucidioris doctrinæ causa locutos pronuntiandum. Omissa Galeni atq; Dioscoridis autoritate. ad quos quidem ex ijs quæ suprà ad octauum, & decimū nonum post oppositum dicta iam sunt, responsio liquet. Sed ijs à tergo dimissis (ut ad
30 Arabum præcipuos conuertamur) Vbi nam iuxta Galeni dogmata coniunctam causam describere hi (præsertimq; Princeps) promiserunt: ut ita ab Auicennæ mastigibus reprehendi ueniant? Quia. s. Galeni monumentis repugnent? Quoties. n. Galeni mentem recitare proposuerint: ut recitatores dissoni meritò increpandi uenirent: siquidem illius intentionem rectè non explicent. Quoties uerò sua definitione, alijs inq; uerbis, aut priscorum
40 quoq; largiùs tamen sumptis terminis rem (manifestioris doctrinæ studio) distinxerint: Cur adeò Galeni sententijs addicti esse uolumus: ut hoc solo, absq; ulla ratione, tutamine: solòq; (tyrannorū penè ritu) nostro ipsorū placito, quēuis minimū doctorē, nedum tantos, præsertim in Arabū tūm medicorum, tūm philosophorum catalogo proculdubio Principes cōdenemus? Quia. s. à Galeno id dictum nō est? Complura sunt hodie quæ catholici christiani obseruare debent: et si à CHRISTO redēptore nostro expresse dicta, præordinataq; nō sint: Quæ nihilominus pia, uel à sanctissima ecclesia, ut optima solēta iam sunt. Secus uerò esset si redemptoris nostri præceptis uel minimum contradicerēt. Cum uerò Galeni uerba nō sic obseruanda sint, ut quia ipse dixit omninò admittere debeamus: quēadmodū CHRISTI præcepta, proculdubio, absq; ulla nobis cognita ratione, obseruanda sunt. Idcirco cui
40 iuslibet ratio perpēdēda: Nec oēs æquē (Philosophorū Gymnasiarcha^h monente) cōdenādū. Quid uerò dicendum? quod etiam si perindē Galenum reuereri uelis, ut potiùs mori q̄ illi

b. parte p^a. tex.

177.

Obiectio.

Rn^o. p^a2^a.i. supra fa. 63.
64.

Nota.

k. 2. cali. 34.

E iij aduersari

aduersari consentias: nihilominus tamen Principis electior definitio (ut hunc præ cæteris ar-
 bibus obseruemus, & magis ab aduersantibus saucium consolemur) illius decretis minimè
 contradicit. Videns. n. hic coniunctam causam penès ueterum definitionem aded Galeni
 menti dubiam extitisse: aliter profectò (inter quam .s. causam & affectum nihil intersit)
 definire, lucidioris quidem (ueluti non semel præscriptum est) distinctionis studio, maluit.
 Vel si priorem definitionem admiserit: largiùs eam (ne de nominibus contendisse uideretur)
 intelligens, putredini ascribere uoluit. Quoniam. s. remota putredine, tametsi non sta-
 tim, eodem. s. instanti febris euanescat, Aded tamen imbecillis remanere consueuerit (ni ha-
 bitualis euaserit) ut non effatu digno spatio per se à natura deleatur. Ex quo statim (iux-
 tà medicorum consuetum sermonem) euanescat. Vt clarior hinc doctrina emergat: dum re-
 motam causam, quæ adhuc morbum non producit, antecedentem uocat: actu uerò efficien-
 tem, coniunctam. Ac si dixerimus causam duplicem, remotam quidem, & propinquam:
 uel si mauis aliter dicere: ex propinquo futuram, & præsentem actiue iam facientem.
 Illam Princeps antecedentem: hanc uerò coniunctam uocauit. Galenus uerò illam nondū
 causam simpliciter dixisset, actuq; existentem causam: sed futuram, & dispositam ut
 causa fiat: hanc uerò præcedentem: etiam si effectui aded immediata sit, ut nihil intersit.
 Quod autem Princeps non sic exquisitè coniunctam causam intellexerit: ut remota .s. ipsa,
 quamprimum affectus euanescat: Verum (perindè ut diximus) medicè, ac largiùs: quin
 alteram potius amplexus sit definitionem: quod uidelicet inter ipsam causam & affectum
 nihil intersit: ex eo firmiter elici potest: quoniam dempta iam alterationis causa, ad prius
 intemperiei curationem perueniendum fore, non semel innuit.¹ Sed ne in immensum sermo
 hic nimis prolatur, Galeni uerba perpendamus: quum artis cōstitutionē Patrophilo ex finis
 resolutione ostendebat, ^m inquit: causæ igitur potissimum quidem quum agunt, hac appella-
 tione dignantur. Sæpenumerò tamen & si nondum quidquam agant, ex eo solum quod
 possint, dicuntur. Veluti & incoctio morborum author, perhibetur, quanuis morbum nō
 dum afferat. Incoctionem autem uoco non coctionis tantum in uentriculo frustrationem,
 sed in uasis quoq; & iecore, & mole uniuersa. In quibus quidem Galeni uerbis, quod
 non dum facit, causam uocari apud ueteres posse manifestissimè liquet. Itaq; cum non
 primitiua seu euidens (si abdita corporeæue est) dicenda sit: antecedens præcedens ue nun-
 cupanda proculdubio uenit. Quoniam uerò altera præcedens uicinior est, quæ .s. iam facit.
 reliquum est omnino differentiam nominis aliquam (clarioris doctrinæ gratia) imponere.
 Quam obrem quæ non dum aliquid efficit, disposita nihilominus præparataq; iam est ut agat,
 causa præcedens: Quæ autem aded effectui propinqua est, ut inter ipsam & effectum
 nulla intersit media causa, & actu iam producit, continens seu coniuncta causa nuncupe-
 tur. Qua igitur pœna condemnandus Princeps eiusq; sectatores sunt, si alia definitione
 alijs ue nominibus, ac largiùs, & medicè potius utatur: Non promittens iam prius se iuxtà
 Galeni sententiam sermonem ue locuturum? Immo non ob aliud antiquorum scripta enar-
 rare noluit: seq; ab interpretis offitio immunem liberumq; fuisse gloriatur: nisi quia illorū
 sententias in omnibus prosequi non placuit. Quod si ab ijs recedere potiori fortassis ratio-
 ni quandoq; innixus potuit: Cur aliqua clariori medicoq; utili distinctione uti non licuerit?
 Qua uidelicet, quæ nam causa concoquenda, quæ ue iam uacuanda, uel suo contrario prius
 retundenda

l. 4. p. cap. 2.
 & p. 4. tra. 2.
 cap. 7. & alibi.
 m. lib. de cōst. ar-
 tis. med. cap. 15. in
 principi.

n. lib. p. sufficere
 in probatio.

retundenda sit, distinctis terminis quod primum definiamus. Cum in hoc præcipue docentis uirtus perfectiue consistat: in ipsa inquam orationis claritate. Quaderè qui sic nominare quæque (Galeno etiã exhortate) studet, ut qui discit, clarissime intelligat: is optimus præceptor fuerit. Non ne Galenus medicorum proculdubio phœbus plurima ut philosophus exquisitè uidelicet rei naturam considerans aliter, ut medicus uerò, clariusque loqui desiderans, aliter determinat? Quemadmodum salubres causas in arte medica uestigans, duas in illis, ex^m 1^m quisitiùs, ac secundum rei naturam considerans, intentiones esse habendas admonuit: quantitatē inquam, & qualitatem, tertiam uerò, præter illas, occasionem adiungere superuacaneū ostendit: sepiùs tamē ut medicum clarioris doctrinæ studio ad docendum, ea tanquam tertia intentione uti consueuisse subdit. Quam ob causam concubandi opportunum tempus ibidem post aliqua expressit. Quia itidem ratione Princeps clariorem, scilicet doctrinam imitari decernens, tres non duas in medicatione regulas: quantitatem uidelicet, qualitatem, & ordinandi horam declarauit. Amplius & si febris quælibet morbus est, quia perse, ac primò functiones offendit: nihilominus tamen ut claram ipsique medico utilem eam distinctionem Galenus non semel admisit: febrium, scilicet alteram morbum, alteram uerò casum existere. Præterea nutrimentum ab Hippocrate triplex dictum, aliter à Galeno tanquam philosopho, & exquisitè rei naturam considerante declaratur: ubi quod unitum adglutinatū uel est, nedum appositum, adeò ut iam assimiletur uerè nutrimentum sit: quod uerò unitur uel apponitur, quasi alimentum, & æquiuocè id dicatur: Sanguis autem, & multo magis in uentriculo adhuc existens chylus, aut iam iam deuoratus cibus futurum alimentum nuncupandū ueniat. Ali^m ter uerò ab ipso met ut medico manifestiorē distinctionem eligente nonnunquam dicitur. Vbi, scilicet iuxta triplicem concoctionem, triplex quoque nutrimentum ostenditur. adeò ut chylus in uentriculo existēs futurum alimentum: sanguis uerò quasi alimentum: quod autem apponitur nedum quod unitur uel assimilatur, uerè ac propriissime alimentum nuncupetur. perinde ac in nostra quoque Iatrapologia declarauimus. Deinceps ita sanitatem, atque morbum per contradietoria Galenus aliquando definit: hunc, scilicet nonnaturalem constitutionem: illam uerò naturalem dicens: ut mediam neutralitatem exquisitiùs contemplati minimè inueniamus. Interdum uerò conducentem medico, & clariorem nobis Herophili definitionem assumens, neutram dispositionem, inter sanitatem & ægritudinem, nedum inter salubritatem & insalubritatem, mediam admisit. Quæ uidelicet tametsi læsas functiones obtinet, ut à sanis omnino differat: non adeò tamen, ut cubandi necessitatem inducat, consuetisque ab operationibus impediri cogat. Quid uerò de doloris duplici causa ab ipso tanquam medico posita dicendum? intemperie inquam, continuique diuortio: quas ambas æquè doloris causas, propriasque curationes indicantes, clariùs, ac medicè magis (ut diximus) ostendit. Cum tamen exquisitiùs, ac secundum rei naturam, & philosophicè considerans unam esse perse causam, principalemque unitatis uidelicet solutionem aliquando determinarit. Innumera me hercle sunt id genus exempla, quæ in medium adducere possem: in quibus apertissime Galenum aliter secundum rei naturam sentire, aliter uerò ad medicorum usum, clarioris doctrinæ gratia, de finire liquet. Verum ne totum circa hæc uolumen compleamus, satis superque prædicta iam sint. E quibus denuò infertur & si febris coniuncta causa, secundum rei ueritatem, & exquisitiùs captam continentis coniunctæ uel definitionem, assignari nequeat: Largius tamen ea

o. uide pⁱ de potⁱ naturali cap. p^o p. 2. meth. cap. primo in fine.

q. 3. art. med. 7.

r. ibidem tex. 8.

s. ibidē tex. 18.

t. 4^a pⁱ cap. p^o.

u. ut pⁱ ad glau

co. tertio in fine et

quarto i prim 4ⁱ.

aphorif. 66. 73.

septimi 42. terui

reg. acut. 12. in fi

ne & seve.

x. lib. de alimē

to post princ.

y. ut pⁱ de pot.

natural. cap. ii.

uersus finem.

z. ut p^o de tuē

da ualeud. in fi

ne. 2. art. med.

tex. 69. 2. apho.

17. & quinti eius

dē 39. & terui

de temperament.

cap. 2. uersus finē

a. lib. 2. Iatrapo

logia. cap. 12.

post medi m.

b. ut i principio

libri de morborū

differētiis: & de

par. art. med. doc.

.a. sum. 2. cap. 3.

c. lib. art. med. i

cinale. tex. 7. &

in processu sepe.

& primi. simplē.

cap. 21. & sexto

salubriū post pri.

d. 2. art. med.

tex. 88. secundi

reg. acut. cō. p^o. se

cūdi de loc. affec.

cap. 5. & 4. eius

dē cap. 8. uersus

finē pⁱ. de natura

humana cō. 6. &

21. & 12. meth.

cap. 7. 13. eiusdē

cap. 6.

e. ut. 4. simplē.

cap. p^o. & de i

æquali i. e. ferie

cap. 6. & p^o. de

sympt. cau. ca. 6.

tamen ea definitione assumpta uel alia potius noua ab arabum Principe inuenta pro medicorum usu, lucidioriq; dogmate id genus causæ admittentes arabes, eorumq; sectatores minime condemnandos fore opinamur. Ni refractarius quispiam sit (cuiusmodi plures iam esse intelligimus) qui penes ipsam quoq; rei naturam, & exquisitè sumptam cōtinentis causæ definitionem, febris, cæterarumq; intemperierum uerè continentem, coniunctamue causam assignare, durissima sua ceruice, proteruiat. Idipsum uerò perpendendum sedulo est, Auicennam de coniunctis causis loquentem, tria exempla nobis assignasse. f. quorū aliquod non morbi, sed actionis læsæ causa continens est. quemadmodum obstructio cæcitas. Quæquidem obstructio (prout ex præcedentibus liquet) morbus, non causa morbi est. Quæ in re Principem excusare (nisi uiolenter) nequeo. Cum de causis non omnibus quidē effectuum productiuis, at sanitatis, uel ægritudinis, aut neutralitatis locuturum esse protinus ab initio capitis proposuerit. Obstructionis autem causa uerissimè continens humor obstruens est. febris autem (penes alterum suum definiendi modum, uel non sic propriè at ueluti diximus, pro medicorum usu, clariorisq; dogmatis gratia) cōtinentis causa putredo est. HIS deniq; sic, pro imbecillimis nostris uiribus, domini tamen altissimi præsidio, determinatis, quamplurimi huius atq; illius errores propalantur. Quorum nonnullos, ueluti corollaria quædam, subiecisse libitum est: Equibus & alij plures elucescent. Etenim desipiunt qui ex Galeni etiam sententia, & exquisitè loquentes, putredinem febris continentem causam esse aiunt. Cum & nomen & definitionem Galenus expressè ab ipsa putredine relegarit. Nomen inq; quia putredinem πρὸν γούμμεον, hoc est præcedentem causam uocauit. & Definitionē quoq; cum statim remota putredine, ad factam febrem perueniendum esse non semel admonuerit. b. Hi tamen usq; adeò refractariè, pertinaciterq; contendunt, ut remanentem à putredine febrem non putridam amplius febrem existiment. Eo præsertim argumento deuiçti quoniam Galenus ita interdum arguit & febris putrida est, ergo & putredo. Igitur & prohibita transpiratio & Huiusmodi autem argumentandi formam ne utiq; ualere aiunt, si à putredine febris separari posset. Pluraq; ad comprobendam falsam chimæram adiungunt. Minimè quidem aduertentes Galeni argumentum ab effectu ad causam resoluendo procedere: sic uidelicet inferens & febris putrida est, ergo eius causa putredo est. Itemq; putredo est: igitur eius causa, prohibita transpiratio est. & Rursus uerò ex eiusmet à nobis quoq; præassumptis fundamentis adiungendum est: quod uel fiens ea febris est, uel facta. Siquidem fiens, eius causa efficiens putredo est. Sin facta, eius causa, putredo fuit. semper ergo eius causam putredinem esse concluditur. Et quoniam ibi de fiente loquitur. Idcirco absq; distinctione Galenus subdit & Si febris est, ergo putredo est. & quam prius abscindere oportet, deinceps ad eam peruenire, quæ facta quidem est. At si putrida non est, quæ igitur febris erit? Cum non diaria, quoniam nec à spirituum, neq; à sanguinis feruore suum exordium sumpserit. Multoq; minus hectica, cum habitualis non sit. Reliquum est igitur eam adhuc putridam nuncupare. Cuius potè causa putredo iam, ad cor usq; ascendens, extitit. Verum enimuero exquisitiùs peregrinaq; mente contemplantibus, non ne idem numero calor offeretur? qui diarius, putridus, & hecticus, ob diuersas causas nuncupandus ueniet? Idem nanq; prius naturalis insitus ue existens, in ignem deinceps (iuxta Galeni dogmata) conuersus: Si quidem à spirituum feruore initium assumpserit,

f. 2. pl. doc. p. 4.

sum. p. 4. cap. p. 0.

Ex m. p. 0.

Contra Aui-

cennam.

m

m

3

Corollarium
primum.Contra Car-
danum.

g. 11. meth. cap.

9. in fine: & præ-

dictum antea in

argumentis ante

oppositum 12.

h. ibidem. f. 11.

meth. cap. 4. &

x. & alibi etiam

innuit ut supra

fo. 47. lin. 3.

i. 11. meth. cap.

10.

Nota.

40

assumpserit, diarius: Sin humorum putredo superueniens eum foueat, in putridum conuertetur: Qui deinde usq; adeò progrediens, ut hærenter habitum corporis apprehendat (ueluti Galenus edocuit) hecticus hoc est habitualis nuncupabitur. Cur igitur non eandem remansisse febrem chimærizant? Adeò ut nonnullos audiuerimus perinde conuictos, ut hecticam febrem esse quæ remanserit (quia, s. facta est) impudenter assererent: minimè aduertentes, tantum ab hectica distare, ut sæpenuerò (absq; medici munere) ab ipsamet natura sponte q̄primùm dempta putredine delitescat. Interdum uerò ne in hecticam (ob corporis fortasse promptitudinem, aptamq; dispositionem) labatur, semota iam putredine, ad partem febris factam refrigerantibus occurrere medicus debet. Ex quo nò simul utraq; intentio (prout ineptè declarant) sed successiuè habenda est: prius s. tempore causam præcedentem abscindere (cuius ablatio futuræ partis præuisio est) dein uerò futuram febris partem refrigerantibus extinguere. Nisi febris adeò uehemens sit, ut neglecta interdum causæ intentione, ipsi febrī (pro uirtutis temperamentiue conseruatione) intendendum quopiam temporis interuallo sit. donec uidelicet uirtute robustiore iam reddita, ipsoq; temperamento à nimio excessu mediocritatem uersus recedente: ad regularem curationem reuertamur: Quam quidem à causæ peremptione initium sumere certum est. Quas obres & aliud quoq; delirium esse patet, residuam, s. febris partem symptoma esse. Cum nullus morbus assignari queat, cuius id symptoma sit: nullusq; adeò rudis existat, ut remota causa et morbo, symptoma remanere proferat. Quippè unà cum ipso morbo tanq; causa symptomatum proculdubio continente omnia symptomata q̄primùm tolli Galenus, ¹uniuersaq; medicorum academia reclamationat. Nec minus cum febris putridæ immediatam causam putredinem esse prædictum iam sit, non putridos humores, aut uapores: ¹Hi. n. intercedente mediāq; existente (qua infecti sunt) putredine, febris causæ sunt: Quorundam ²sententiam falsam esse liquet: qui Carybdim euitare cupientes in Scillam inciderunt, fumos uaporesq; à putridis humoribus eleuatos non putridæ febris, at diariæ causam esse. Cum Galenus uapores quidem fuligines ue acres, ex superfluis acribus, haudquaq; uerò putridis febrē diariam in constrictionibus generare ostenderit. ^mQuemadmodum si uaporosum & optimū quod effluit, extiterit: in plethoricam corpus dispositionem incidere consueuit. Cui uerò cutis astricta est: cum prius acriores superfluitates per eam euaporarent: post q̄ retentæ sunt, & coaceruatæ, incidit in febrem (intellige diariam) nulla interueniente humorum putredine. Quin si humorum putredo sit, quæ tamen ad cor minimè ascendat, quia nec humoris aliqua portio, neq; fuligines uapores ue ad ipsum peruenerint, ephemera diariæ ue adhuc febris, non putrida gignetur. Quemadmodum ex bubonibus fieri contingit in ijs n. conclusus in inflammato adene succus cōcalefacit semper partes (Galenomet enarrate ⁿ) continuas, donec usq; ad cor calor febrilis attingit. Non peruenit autem ad ipsum putrida fuligo. Sed ibidem permanet in loco inguinis circumscripta, sola alteratione per continuū facta, usq; ad cor perueniente calore. Equibus quidem Galeni dogmatibus apertissimè (si rectè perlibrarimus) elicitur, quoties putrida fuligo ad cor ipsum penetrarit, minimè uel in bubonibus, uel in alia quauis parte retenta, putridam proculdubio, non. ephemeram gignitura perueniret. Quam tamen haud quia uapor, fuligine, sed ob inditam sibi putredinem induceret. Cumq; putredinem ipsam immediatam febris putridæ causam posuerimus,

k. p. de differētiis febriū cap. 7.

Contra eundē Cardanū & Gentilem.

Cor^m. 2^m.
Cōtra Carda.

l. 2. meth. cap. 3.
12. eiusdem p^o.
Cor^m. 3^m.

1 Contra Conciliatorē, Gentilem, Valeriolam, Montuū, & alios multos.

2 Cōtram Fuchsiū & Musam.

m. primi de differētiis febrium cap. 3. & 5.

n. ibidē p. de differētiis febriū cap. 5. post principiū.

Cor^m. 4^m.

Contra Valeriolam.

fuimus, etiam si humores omnes educti sint, remanentibus tamen uaporibus, putridisq; fuliginibus, non eductam esse causam, at remansisse (cum putredo adhuc perduret) proferendum esse patet. Haudquaquam ergo (ut quidam uolunt) intelligendum est, quod remotis humoribus putridis, ablata fuisse causam Galenus uoluerit, remanente nihilominus putrida fuligine: ratione cuius ad febrem deueniendum fore, dempta causa, praeceperit. Etenim persistente adhuc fuligine, uaporibusq; putridis, causam adhuc persistere, minime uero ablatam esse, Galeni sententia, opinandum est. Quum ergo ait, Semota causa putredine ad febris intentionem perueniendum esse: Expurgatis omnibus uaporibus fuliginibusq; necdum putridis humoribus, intellexit. Adeo ut tota penitus putredo euanuerit. Quam nihilominus euanescente, calidam intemperiem, adeo intensam, ut functiones adhuc impediatur, ac per hoc febris essentiam, nomenq; retineat, curandam remansisse nonnunquam uoluit. Qui tamen inficias non iret adeo imbecilem aliquando eam, amota putredine, caliditatem superesse, ut morbus non sit, at uel neutralitas, uel sub sanitatis latitudine inclusa. Quamobrem semota putredine medicus a secunda intentione liberatur. Id quod cum perpetuum non sit,

Contra Mōtū ut sibi Fuchsius attribuit.

continentis causae definitionem exquisitè captam non meretur. Quod autem aliqui dicere cōsueuerunt, calorem. scilicet putridum febris cōiunctam causam esse, ut falsissimum quidem omittendum est: si de calore putrido in corde, ac membris accessio intelligatur. Cum ipsa met febris essentia calor putridus existat: nisi calorem putridum pro ipsa putredine in humoribus ac ipsis uaporibus accensa, quae causa caloris febrilis est in corde ac membris existentis, intellexerimus. Febris. n. in humoribus dici nequit: Cum impossibile sit sanitatē, aut morbum

Cor. 5^m.

Contra Valeriolam.

fieri carentibus uita. Prout aliàs longiori processu declarabimus. Equibus omnibus quorundam argumentum imperfectum esse constat. quia. scilicet non morbus, nec symptoma humor putridus sit, ergo causa (id quod hucusq; nullus abnegat) cum uero causa sit, morboq; immediatius ac proximè inherens, ergo continens causa dicenda est. Nisi penes alteram Aui-

Cor. 6^m.

Contra Montanum.

cennae definitionem continens cōiunctaue causa definiatur. Demum ut receptui canamus ineptissima nonnullorum responsio est, telum aut spinam unā cum Introductorij authore, pariterq; putredinem continentes causas esse contendendum, quum uidelicet aiunt causas esse illius uel solutionis uel alterationis quae fit, non autem quae facta est. Idcirco illis ablatis tum solutio, tum alteratio quae fiunt euestigio cessant. Solutio namq; dum fit, pariterq; alteratio non morbi, sed passiones sunt: quarum dari continentem causam nullus est qui unquam abnegarit. Et haec satis superq; de continente coniunctaue causa dicta iam sint: ut phlegmones, atq; aliorum praeternaturalium tumorum causae tam externae praecipientes uel, q; internae, quaeq; praecedentes, & quae coniunctae sunt innotescant. Quae intantum repetita nunc sunt, pro ijs quae in primo libro praedicta generatim sunt enarratione, ad quae redire praecipit eum, qui quae in hoc libro declaranda sunt auditurus est. Quae inq; praedicta sunt de uocatis apostematibus, eorumq; speciebus, reseruata interim, de uniuersali eorum

o. in principio capitis tertii.

curatione, curandiue methodo, repetitione. Quam quidem aptius deinceps, ubi de phlegmones curatione sermo incidet, in memoriam reducendam, insimulq; enucleandam reseruauimus. His ergo sic repetitis, exacteq; trutinatis, de apostematibus inq; eorumq; speciebus, sermone uniuersali, ad particularia permigremus, iuxta commune tum philosophorum, tum medicorum omnium axioma, ab uniuersalibus uidelicet ad particularia, (quem-

admodum

admodum ab initio statim^p præsupsimus) perpetuò procedendum . Quaquidem ordien^p di norma neq; hic oblitus est Princeps . Etenim sermoni , quem de apostematibus speciatim huius libri or^pdiens habiturus est , caput hoc quodammodo generale præmisit . in quo quidem apostematis & pu^pstulæ seu bothor diuisiones exprimantur . VISA igitur horum essentia , nedum uarijs , apud græcos , & latinos , atq; etiam arabes nominibus (iuxta Galeni 1 quoq; à Platone q. pⁱ. meth. cap. 3. uersus finem. desumptū præceptū: Nō ad diuidendū modò quoduis , ab ipsa quæsitæ rei essentia nobis esse inchoandū censente , sed et in omni disqrenda re eiusmodi semper principio utendum) Ad primā , generaliorēq; diuisionē interpretandā accedēs , unā cum ipso Arabum Principe

10 DICO quod omne apostema , & pustula , bothorūc , aut est calidum , aut non calidum .

COMMENTVM SECVNDVM.



20 LV RIMAS quidem apostematis diuisiones in primo libro (ad quem nos pro uniuersali horum cognitione remisit^a) inue-
nimus . Quas antea^b cunctas , breui quodam compendio , ad me-
moriam , ipsomet ex Principe , reduximus . Sat ergo tibi fue-
rit aliqua hinc folia reuoluere : atq; iterum quæ nos de apostema-
tibus ex primo libro enarrauimus , perpendere . Quibus pro-
fecto , currentibus ferè oculis , ad memoriæ thesaurum reuoca-
tis , huc euefigiò reuertere . Vbi rursus alio quidem calle incedentes (quemadmodum an-
tea promisimus^c) eadem repetere tempestiuum fore arbitrati sumus . Per diuisiones inq;
species omnes uestigando , ne frustra ad primum librum regressi fuerimus . Ad quem ideo
reuertendum primò uoluit : Quoniam de apostematibus eorumq; speciebus generali sermo-
ne determinauerat . Prima igitur diuisio ex Principe tunc penès magnitudinem præassum-
pta est . Quod scilicet uel magnus tumor effatuq; dignus est , uel paruus . Siquidem ma-
gnus , apostema : sin uerò paruus , Bothor , latinè pustula , seu eminentia ab ipso quoq;
nuncupatur . Itaq; hanc pariter distinctionem hic ab ipso statim sermonis exordio , ueluti
primam , non immeritò supponens , artificiosè admodum , appositeq; ipsius utrūq; membrū ,
apostema uidelicet ac bothor penès eorū temperamenta subdiuidit . Magnus enim tumor
30 (quod simpliciter apostema , uel Bothor etiam magnum dici posse uoluit) aut calidus , aut
non calidus est . Paruus itidem (quod simpliciter Bothor , pustulam^d ue seu eminentiam ,
aut paruum apostema nuncupandum propriè loquentibus insinuat) uel calidus uel non
calidus existit . Quoniam uerò ex triplici morborum genere compositum esse hunc morbū
antea quoq; ^d declarauimus . ideo substantiales differentie (quas ubiq; præ cæteris consi-
derandas esse , tanq; maximè proprias , ac principales , neglectis ijs , quæ ex accidenti ca-
piuntur , Galenus peritè admodum edocuit^e) non ex ipsa duntaxat tumoris magnitudine ,
uerum & intemperie , nec non continui solutione sumendæ proculdubio sunt . Quamobrè
& Prima , quæ ex iam dicta tumoris , apostematis^e ue magnitudine describitur , & Secun-
da quæ ipsius etiam ex intemperie selecta est , non temerè ut substantiales differentie , in
40 hoc generali capite , præpositæ iam sunt . Nec tertiam postergasse autumabimus : Cum
eam sub prima includi , semoto liuore , intelligere possimus . In magno enim , maior:uelut
in paruo

a. textu præce-
denti.

b. fo 22.31.32.
33. in prin.

c. cō. præcedēti
fo.33. in prin.

d. com. præcedēti
fo. 18.19.

e. pⁱ. de differen-
tiis febrium cap.
p^o. in principio.

f. 2^a. pi. doc. p^a.
cap. 5. post. prin.

Cor^m.

g. com. primo fo.
18. & 19.

Apostema se-
cundum ara-
bes cur largè
sumptum.

infra fo.

b. 2^a. pi. doc. p^a.
cap. 5.

Distinctio p^a.
i. ibidem

k. 13. meth. cir-
ca principia.

l. lib. de tumo.
præter naturā in
principio.

m. Paulo ante,
in hoc commento.

Nota.

in paruo, minor continui Segregatio magna ex parte supponitur. AEquè ac in secunda quoq; sic intelligi posse ostendemus. Ut quò calidius, aut frigidius apostema, Bothor'ue existit, eò maior unitatis dissolutio generetur. Etenim in omnibus apostematibus, tumoribus'ue continui dissolutio (ipsomet Principe s declarante) est. Nullum enim (inquit.) Apostema accidit, Nisi proculdubio continuitas solvatur: propterea quòd effunduntur materiae superfluae ad membrum apostematatum, & inter partes penetrant ipsius, quiescuntq; separando eas abinuicem, ita ut sibi ipsis loca capiant. Equibus quidem Auicennae uerbis quòd supra dicebamus & exquisitè indagantibus apertius fiet: Cur s tam ipse q; ceteri arabes tumores penè omnes apostematis abscessus'ue nomine dignati sunt. Nam in omnibus, quicunq; sint, aliquis unitarum partium abscessus fit, uel manifestus quidem (ut in 10 ueris græcorum apostematibus) uel saltem abditus, rationeq; omninò perceptus. Perinde ut in phlegmone, herpete, erysipelate, cæterisq; id genus ex materia membro duntaxat inspersa originem natis tumoribus, comprehendendi potest. Quemadmodum igitur in omnibus, uel manifesta, uel occulta continuarum, atq; contiguarum quoq; partium dissolutio, segregatioq; cum intemperiei, tum inspersi humoris ratione, fit: ita & manifestus, uel abditus earundem solutarum partium, segregatarumq; abscessus generatur. Adèò ut non temerè cuncti præternaturam ex materia geniti tumores, apostematis nomine demonstrari queant. De qua tamen re iterum deinceps cū omnium præternaturalium tumorum catalogus fiet, clariùs, ac distinctiùs loquemur. Verùm de Apostematis, ac Bothor diuisionibus in præsentī contextu ab Auicenna positīs hactenus dictum sit. PRAETER 20 has autem plures ex primo libro, ad quem reuersi iam fuimus, distinctiones (è quibus uariæ species declarari possunt) collegimus. ^b Quas quidem ad tres & triginta numero prius, perspicuitatis quidem gratiā, ipsius interim ordine reseruato, reducemus. De his uerò ad quinque differentiarum radices methodicè conuertemus. PRIMA igitur ibi quoq; præassumpta, quam hic ab initio confertim supposuit, ex magnitudine uidelicet selecta est. Quam non temerè primo semper loco collocandam fore arbitramur. Quoniam & si ex tribus morborum generibus compositus hic affectus est: Nihilominus tamen primum, ac proprium eius esse substantiæque est ut sit tumor præter naturam. Itaq; à græcis ὄγκος, quòd est tumor, appellatur: in quo partes (Galenī dogmate) à naturali habitu in quantitate recesserunt. Protinùs ergo sequitur ut excessus ille in quantitate factus in longitudine uidelicet, latitudine, ac profunditate (ipsius etiam Galenī sententiā) uel in multa quantitate, uel pauca sit. Sicq; aut magnus, aut paruus tumor apostemate dicatur. Quoniā uerò in quantitate partes excedere nequirent: ni quæpiam substantia materiæque, quæcunq; sit, ad eas aceruetur: Hæc autem uel calida, uel frigida est, seu humida, aut sicca, uel ex ijs composita: Idcirco & intemperiem consequi necessum est. Præterea cum de fluēs ea substantia locum sibi, penetrando, spatiumq; aut abditum, aut omnibus manifestū (ueluti iam iam prædiximus^m) efficiat: pariter uel occultè, uel manifestè partes abscedere, atq; abinuicem distare opus est. Quamobrem solutio quoq; continui necessariò annectitur. Adèò ut perbellè omnis generis morbos apostema complexum esse non semel præassumptū sit. Hoc nihilominus interim perpenso, quòd antea pertransuimus. Quauis s. ex tribus morborum generibus apostema compositum sit: haudquaquā tamen semper ratione omnium trium

trium ijsdem functionibus officere. At satis interdum esse intemperiei munere naturalibus, aut ipsis etiam aliquando sensitiuis: quibus continui dissolutio, præsertim dolorem inducens, obesse consuevit: tumoris autem, uel de prauati situs causâ, motiuis, præcipueq; si in artubus existat. Sicq; uarijs operationibus, pro diuersa morborum in se contentorum natura, officere apostema inuenietur. Id quod multam quoq; penes affectarum partium diuersa munera, uarietatem recipere potest. Vt in omnibus perpendere singulatim, quæ dicenda sunt, licet. QVOD si ex Galenoⁿ fortassis obijcere quispiam uelit, non ex tribus semper morbis compositum apostema. Etenim phlegmone, apostema (iuxta omnium Arabum, nedum Principis decreta) est: Verumtamen absq; tumore, qui functiones lædat, non nunq; esse potest. Quo posito, ex duobus duntaxat morbis compositum apostema fuerit. Inquit. n. Galenus, ^o de compositis aliquando morbis ex proposito sermonem habens. Ex-

10 ulcerata igitur atq; unâ inflammata membra tripliciter naturæ modum egrediuntur. ¹ Cū ob ulcus quidem unitatem suarum partiū amittant: ² ob inflammationem uerò calidiora, atq; humidiora reddantur, plus q; naturalis exigit habitus. ³ Deniq; qui in ipsis est tumor, si ad tantam magnitudinem attollitur, ut ob hoc ipsum operationem impediat: tunc iam morbus est existimandus: Quod si membrum ex hoc nullam patitur in operatione læsionem: sympto-

20 ma casus'ue tantummodò, & passio: ueluti & dolor. Equibus quidem Galeni uerbis patet, in ipsa etiam phlegmone, posse interdum tumorem fieri, qui morbus non sit. Præsertim q̃a (ut subdit) phlegmonē eo i loco appellat, nō, ut antiq. cōsueuerūt, quēdā ueluti feruorē i corporis partibus accēsum, sed rubescētem, ac renitentē, dolorificūq; tumorē. Vt erysipelata carbones &c. Quæ qdē sentētia sic posita nō ueritati modò, Auicēnāq; sed ipsi et Galeno ad uersaretur: Dū libro de tumoribus præternaturā, & propriē, speciatimq; dictā phlegmonen, & erysipelas, herpetēq; ac alios deniq; plurimos tumores præternaturā declarat. Quos tamē dici præternaturā tunc uoluit, q̃uādo functionibus officiūt. Aliter enim dici præternaturā nō posse insinuat. Quāobrem si phlegmonē, erysipelas'ue aliquā partē occuparit, utrūq; aut tumor præternaturā ubiq; à Galeno supponitur. Ergo proculdubio tū phlegmones, tū erysipelatis tumor morbus est. Atq; id ipsum omni penitus abiectio scrupulo uerum esse arbitror. Quod autem alibi ¹ Galenus distinctione usus fuerit: si actiones tumor impediat, morbum esse: sin minus offēdat, symptoma casus'ue nuncupandum, asserens: siquidem Galeni

30 mentem exquisitē perlibrarimus, minimē suo dogmati, aut ueritati repugnare cognoscemus. Etenim haud uult Galenus ibi phlegmonen, absq; tumore morbo existente, fieri aliquādo posse. Verū quia loquutus quidem prius fuerat de ulceratis: quæ unā & inflammata præter ulcus sint. Inflammatio autem genus ad febrem quoq; ac excedentem caliditatem est (prout infra loco proprio demonstrabimus) Ideo phlegmonen pati (græcè φλεγμονήν) dicere possumus, etiam si nullus tumor insit: multoq; magis si fieri tumor inceperit. Dum ergo in ipso (ut ita dixerim) fieri tumor adhuc est, quemadmodum & caliditas, aliq; omnes affectus, non morbus, at passio est, perindē ut antea quoq; latius ostendimus. tumq; actiones minimē offēdit. Quo pacto & Galenum intellexisse crediderim, donec scilicet fiens adhuc, non tamen factus tumor est. Quemadmodum uerò fi-

40 ens hic tumor (qui uidelicet nil adhuc factū, functiones impediēs, præseferre queat) morbus dici nō pōt: Ita nec factus præternaturā est, sed fiens. Quāobrem neq; phlegmone specialiter

Obiectio.

n. libr. de morb. diff. cap. 12. prope medium.

An apostema sit Morbus cōpositus ex tribus:

o. ubi supra statū

Galeni contra dictio.

p. cap. p^o. post medium. & 14. meib. cap. 14.

Solutio obiectionis, & cōtradictionis.

q. lib. de morb. differētis ca. 12.

r. cap. 2. cō. 6.

s. com. p^o. in questione de causâ cōiuncta fo. 4 s. usque ad 50.

F appellari

t. libr. de morb.
diff. cap. 12. circa
medium.

u. com. ultimo

x. ibidem.

y. ibidē, statim.

z. ibidē, statim.

a. libr. de tumor.
præter naturam.
cap. 2.

Quod solutio
cōtinui in apo
stematibus sē
per sit morb9.
Obiectiōis so-
lutio

appellari debet, sed siēs. Itaq; subdēs illa uerba Galenus¹ in hoc aut loco inflammationē seu
phlegmonē appellamus, nō ut antiqui cōsueuerūt, quēdā ueluti feruorē, &c. 3. se de uera, spe
cialiq; phlegmone intelligere specificat: In qua & uerus tumor, actionibus necessariō noxā
inferēs, ē: stratione cuius antea distinctionē tumoris proposuerat. Quae etiā de causā rubescētē
ac renitētē, dolorificūq; tumorē uelle adiūxit, ubi expresse actionis lēsionē sub renitētē nec
nō dolorifico intellexit. Tumor. n. q. tangētē renititur quādā in altū factā tēsionē, ipsa ēt in cuti
produxit. Adeō ut hēc mēbri, artus ue flexioni aut tēsioni minimē (q. s. tēsā est) cōsentiēs il
lius motū īpediat. quāobrē pars ipsa, ut cōgruēs, integrūq; foret, suo fungi offitio nō poterit.
Vt. V. g. in manu apprehēsiō, ī pede uerō incessus lēdatur. præsertimq; si musculos tumor,
q. cūq; sit, apprehēdat, lōgēq; magis, qūm tēdones, aut neruos occuparit. In qbus nō mouendi
modō actionē, sed ipsius ēt sensitiuæ uis trāsītū impediāt. Dolor aut actio lēsa (ut infrā quoq;
declarabimus^u) est: quā cōtinui diuortiū, ipsaq; intēperies hoc ēt (ut uidebimus^x) medio
peperit. Galenus uerō, de cōpositis morbis loquēs, ulceri phlegmonē cōiunxit: quoniā omnib9
pērnatos morbos ad cōpositionē capere decreuit: & si uel una per se sumpta phlegmone tria
morborū genera cōtineat. Omnia igitur (ait^y) quæ simul inflāmata, atq; ulcerata sunt, cor
pora tres qdē necessariō (intēperiē uidelicet, cōtinui solutionē, atq; ipsum ēt tumorē) nōnunq;
uerō & quatuor ægritudines (præter hęc. s. tria, dolorē quoq; functiones impediētē) patiun
tur. Omissa ergo philoxeni pertinacia, quēlibet tumorē præternaturā, nedū phlegmonē (quæ
tenus tumor præternaturā est) operationes offendere pronūtiabimus. Quasobres nō temerē
Galenus ipse subdit. ^z Oēs hmōi ægritudines (hoc est erysipelata, carbones, cācri, atq; herpe
tes, de qbus iam antea meminerat) etiā si ulcere uacēt, cōpositæ sunt. Vna qdē ratione, quoniā
am oēs à superfluo humore, siue calido, siue frigido, procreantur. A flaua quidem bile,
erysipelas: ab atra uerō, cancer: à sanguine autem, inflammatio: à pituita, œdema, la
xus ue tumor. &c. Nam si rectē hunc primum compositionis modum perceperis: tumē
rem (uelis, nolis) morbum, in erysipelate confiteri cogeris. Siquidem ideō cōpositus id
morbus est: quoniam uidelicet & intemperiem, & ab humore factum præternaturam tu
morem, absq; ulcere, comprehendit. Adeō ut appositē in sua definitione generis loco tu
morem recipiat, tumorq; tam ipse, qm ali9 huiuscemodi affectus nuncupentur. Huiuscem o
di inq; affectus, qui ab exundanti, atq; in unum collecto simulq; in tumorem attollente hu
more suæ generationis originem assumunt. Fieri. n. à sola intemperie tumorem (uel Ga
leni^a pluribus quidē rationibus, experimentisq; comprobantis testimonio) impossibile est.
Intelligimus uerō tumorem hīc ī longū latū, & profundū factā quantitatis uel sēsui occultā
excrecentiā: quæ cōtinuentem quoq; causam, subinclusos uidelicet hūores necessariō cōprehē
dat. Ad nos igitur cōuersi dicamus, omne apostema, ēt secundū arabes sumptum, necessariō
ex tribus morborum generibus cōpositum esse: Quorum quodlibet alicui functioni officiet.
Adeō ut illa etiam cōtinui disgregatio: quam abditam esse aliquandō confitemur, uel dolorē
inducēs, uel sensum quēpiā obtūdēs, imminuēsq; aut penitus destrūēs (ut ī oculi cornea, nec
stematibus sē nō auris mēbrana cōsiderari perfacile pōt) uel saltē ipsius tēperamētī, partū (penēs Galeni
per sit morb9. decretū) essentiæ cōtinuitatē impediēs, proculdubid singula exq; sitē perlibrātibus offendere
uidebitur. QVIBVS omnibus nec illud refragari certū est: quoniā s. in iecinoris etiā seu
cuiusuis alterius uisceris substātia, nedū in erure, scirrhus in principio: atq; etiā incremento
perindē

perinde occultus aliquādo sit, ut neutiq; ab ægroto, minusq; à medico (Galeni ^b testimonio)
 percipiatur: aut Saltem functionibus aperte nō obsit. Morbus enim est, idē, non dico specie,
 sed numero: Qui, postea ad uigorē accedēs propalari cōsuevit, effatu dignū corpori nocumē-
 tū inducens: ut etiā si corpus ritē gubernatū inde lædi nō sic appareat: Alicui nihilominus
 inordinato regimini occurrēs, confertim quantum lædatur, læsumq; ab affectu sit præferat.
 Quem in modū & epilepsiā, & apoplexiā, aliosq; plures morbos, circa initia quidē & pro-
 priæ generationis tempus, occultari Galenus admiserat. Cruris ergo scirrhus à Galeno
 relatus in principio, nec nō incremēto latens ferē fuerat: nullamq; tribus, aut quatuor interdū
 annis manifestā læsionē inducēs, quoniā .s. incesum minimē impedisset, haudquāq; tamen
 10 ob id morbi nomen amittit. Etenim & si cruris incesum aperte non offenderet, illius ta-
 mē partis, in qua scirrhus consisteret, sensum proculdubio lædebat: fortassisq; nō sic ad longū
 iter protendere, quemadmodū antea sine tali scirrho potuerat. Cuius affectæ partis tumor
 præter naturā morbus est: Quāq; corpus totū sanū aliquando uideatur. HIS deniq; pro
 apostematis iterū essentia, nec nō prima distinctione, hætenus prælibata iam sint. A quibus
 ad secundā digredi tēpestiuū est. Etenim quia ex triplici morborū genere cōpositū esse apo-
 stema, & Bothor nō semel ostendimus: ^d intemperie inq; uitiata cōpositione, ac unitatis dis-
 gregatione: Organicorū uerō cōpositio multiplex est: Formatio uidelicet (quæ rursus in
 figurā, uiam, & receptaculū, nec nō asperā lenem uel superficiē diuiditur) magnitudo quoq;
 situs, & numerus. Ea propter cōplures assignari differentię possunt. Prout uel omnia, uel
 20 plura ad organicā naturā pertinētia uitiāntur. Interdū nanq; numerus, nōnunq; uerō ipsa
 etiā exterior magnitudo, aut figura minimē (quod sensu dignosci queat) deprauatur: Vel
 saltē nō adeo, ut functionibus obesse ualeat. Quatenus igitur ex horū pluribus, aut pauciorib;
 bus cōpositū apostema est: ita uariæ possunt tumorū apostematū uel differentię cōsiderari.
 Quam quidē secundā distinctionē: et si expressam ab ipso Principe nō legimus: Ex eius ta-
 men uerbis, atq; sententia facillimē (ut patet) elicere possumus. Idcirco & antea ^e quoq; nos
 eam, Principis uerba repetendo, elegimus. Nec ob stare quidē nobis ipsius Principis uerba
 possunt. Cū exteriorē magnitudinē, figuramq; aliquādo, minimē, quod sensu dignosci queat,
 deprauari pronūtiarimus. Ipse autē in uniuersum protulerit, s. nullū fieri apostema quin
 cū eo proueniat læsio in figura, & in dimēsiōne. Quauis enim id perpetuū uerū esse cōcede-
 30 retur. Attamen in simul stare poterit: semper .s. magnitudinē ac figurā in apostemate uitiari,
 ac sæpē nō adeo ut operationes offendāt, deprauari. At eō magis id uerū esse cōfitebimur.
 Cū nō semper sed maxima ex parte Principis dictū uerificari cōcedamus. præter id n. q.
 magnitudo usq; adeo uitiari potest, nō deprauata quadātēnus figura, ut operationes offen-
 dat, quemadmodū antea ⁿ iam ex Galeno prædiximus: Fieri quoq; in penitioribus nōnunq;
 ipsius ossis partibus abscessum impossibile nō est. Quin experimēto, in ijs q Gallico morbo af-
 fecti sunt, cōprobauimus. Vbi ob aliquarū intrinsecarū partiū putrefactionē: simulq; cauer-
 narū, anfractuūq; aliquo penetrāte humore factā repletionē, extremæ ossis partes integræ
 adhuc, uiuentesq; ab inuicem discriminatæ abscedunt. superficialibus interim, squamosisq;
 ipsius eiusdem ossis partibus nihil, ob durtiem, & densitatem, præternaturalis affectus,
 40 extraneorumq; succorum participantibus. Quo quidem in casu exterior, euidentiq;
 ossis magnitudo, nedum figura neutiquā, quod sensu dignosci queat, deprauatur. Nihilominus

b. libr. de totius
 morbi temporibus
 cap. 4.

c. ubi supra.

Distinctio 2^a.
 d. in hoc cōm. &
 præcedenū.

e. com. p^o. fo. 18
 f. 2^a. p^o. doc. p^a
 cap. 5. post prin-
 cipia.
 Obiectionis so-
 lutio.

n. com. præcedē
 ti fo. 5. r. in declara-
 tiōe causæ coniun-
 ctæ magnitudinis
 ex Galeno libro
 de morborum dif-
 ferentiis, cap. 9.

Nota. minus tamen præternaturâ tumor dici, apud medicos, debet. Quoniâ moles illa, trinaq; ossis di-
 mensio præternaturâ (ob infartos succos, interiora ossis corrumpentes, an fractusq; interim replen-
 tes, nec nō quaspiâ partes abscedere cogētes) facta iâ est. Quas ob res uerū uniuersaliter est
 nullū apostema esse, quin proueniat læsio in dimēsiōe, hoc est in ipsa corporis mole, ac (ut di-
 cere cōsueuerūt) corporeitate interioriq; magnitudine. Id ipsum ergo est, quod supra & et infi-
 nuare uoluimus, quū satis esse diximus q̄ i penitioribus ossiū partibus tumor, moles uel præ-
 ter naturâ existat. Verū de his usq; aded pro secūda Principis distīctiōe dictū sit. Ad ter-
 tiâ igitur pertrāsire operæ pretiū est. Quoniâ s. uel in mollibus mēbris, ut cerebro: uel duris,
 ut ossibus: uel medijs, apostema procreari cōtingit. Quæ qdē penēs affectâ sedē distīctio cap-
 ta est. Nos aut plura tā de cerebro, q̄ de ossibus: atq; deinceps de ipso et corde: An. s. aposte-
 mate quouis modo sumpto uexari queāt: uberiū pracedēti cōmēto^b disputauimus. Quibus
 oibus (ut opportunū fore arbitramur) in memoriā reuocatis, Ad quartā apostematū diuisio-
 Distīctio 3^a. nē accedito. Quæ qdē ostēdit apostema, uel ab euidēti exterioriue causâ originē ducere, uel
 ab ipsa corporis abūdantia: ut de fluxui dūtātaxat, nō exteriori causæ acceptum referat. Atq;
 hāc pariter ē causis exceptâ distīctiōne fusiū anteāⁱ ex Galeni et dogmate demōstrauimus.
 Quēadmodū & eā quæ seq̄tur, ab ijs quæ sibi fortē fortunā & per accidēs (ut dicitur)
 Distīctio 4^a. ipsi, uel suæ causæ cōtingūt, electā: ipsius met ex Principis uerbis declarauimus.^k Quoniâ
 s. uel à causâ, quæ alijs prius humoribus, & qdē bonis, huius prauitatē obtundēbus admi-
 sta fuerat: Quibus tamen aliquo modo eductis sœuitas, nocumētūq; elucescat. Vel per se atq;
 impermixta ab initio cōfertim existēs: à natura nihilominus, ob sui paucitatē, regulata deinde,
 uel attracta, uel impulsâ tumorē apostemāue gignitura, quēpiâ ad locū defluxit. A quâ eue-
 stigio sextâ affectæ sedē cōgruâ elicere possumus. Quia uel ad cutem exterioraq; tā aposte-
 mata, q̄ Bothor declināt: uel (sub intellige) cōtrā, ad uiscera uidelicet, partesq; abditas uer-
 gūt. Quibus porro sex distīctionibus in prima illius capitis parte^l (in tres. n. anteā^m quoq;
 caput ipsum facilioris memoriæ gratiâ segregauimus) exagītē perpēs: septimā in secunda
 eiusdē parte, præ cæteris (ipso et Principe docēte) cōsiderandā i præsens examē reducamus.
 Distīctio 5^a. Quæ à causis quoq; desumpta ē. Aut. n. ex sanguine, aut bili, uel pituita, uel melāchlico hu-
 more, seu aquositate, seu flatuoso demū spiritu genitū apostema tumor uel est. Vel ex horū
 duobus, tribus uel pluribus quoq; permixtis cōpositum est. Ad hæc enim sex causarū ge-
 nera cūcta reducēda fore, i præcedētibusⁿ quoq; declarauimus. Quāobrē & ipsius exēplar,
 atq; author Galenus inq̄. ° Omniū tumorum qui præternaturâ sunt uarietas, ex eius quod
 influit natura, enascitur. Vbi. n. flatulenta materia copiosior accessit: flatuosi magis tumores
 fiūt: Phlegmonosi uerò, ubi sanguis: Sicut erysipelatosi, ubi flaua bilis: Et œdematosi magis,
 ubi pituita: Similiter scirrholi, ubi uel crassus, uel uehementer lentus humor est, qui parti
 est infixus. Hæc insimul eodem loco Galenus ait. Qui tamen aquosos etiam tumores ali-
 bi: Put hydrocelē, quū uidelicet aquosus humor i tunicis, quæ circa testiculū sūt, aggregatur:
 atq; ipsam ascitū, i aquæ intercutis speciem, adiunxit. Aded ut sex causarum genera
 apud ipsum quoq; Galenum sint, præter solidas substantias, atq; etiam animalcula, quæ
 ad horum aliquod reducēda fore (si lubet) saltem quò ad eorū initia prædiximus^r (ubi. n.
 humiditates perdurauerint, ad hæc conuerti Galenus^s asseruit, aut s. tenuioribus partibus
 resolutis assiccatis, aut putrefactis.) Quæ nihilominus causæ, pro diuersa inuicem facta
 cōmisiōne

g. cōm. præcedēti
fo. 28. line. 5.

Distīctio 3^a.

b. fo. 22. usq; ad
30.

Distīctio 4^a.

i. cōm. præcedēti
fo. 30. in fine et
31. in prin.

Distīctio 5^a.

k. ibidē. fo. 31.
circa prin.

Distīctio 6^a.

l. 2^a. pi. doc. p^a.
cap. 5.

m. cōm. præcedēti
fo. 31. 32.

Distīctio 7^a.

n. cōm. præcedēti
fo. 31. line. 27

usq; ad 32.

o. 13. meth. cap.

4. in prin.

p. libro. de. tu-
mo. præter natu-
rā. cap. 18.

q. ibidē cap. 20.

r. paulo ante: et
cōm. præcedēti.

fo. 31. & uide in
fra fo.

s. 2. ad glauco.
cap. 6.

40

comissione, uarios adhuc tumores gignere consueuerunt: dominantesq; nomen, ueluti pri-
 mo subdominantes cognomen semper indiderunt. Vt phlegmonen erysipelaceam, seu ery-
 sipelatosam, & œdematosam, aut scirrhosam dicamus: perinde ac erysipelas inflammatus
 phlegmonosum ue, aut scirrhosum, nec non œdematosum: Sicq; de ipso etiam œdemate, ac
 scirrho proferre ueteres consueuerint. Prout uberiùs infra rursus ostendemus: Qum
 raro simplicem fieri tumorem apostemate declarabimus. Nunc autem ut omnes tumores,
 quos sub apostematis nomine Auicenna comprehendere consueuit, ad hæc sex genera redu-
 cere tentemus: atq; unà reliquos ad hæc minimè reducibiles: ut herniarum plures species,
 aliosq; multos peruenierimus (De quibus quidè, & si largiùs capto apostematis nomine, apo-
 stemata, æquè ac tumores nuncupare proculdubio possumus: Principi nihilominus in præ-
 senti libro, de apostematibus inq; pertransante, nullatenus meminisse libuit) Galeni tra-
 ctatum, cui nomen ἐπεὶ τὸν πρὸς φύσιν ὄγκον: hoc est: De tumoribus præter natu-
 ram & inditum est, percurrere operæ pretium fore duximus. Vbi unum & sexaginta nu-
 mero tumores definiens Galenus (quos uidelicet præternaturam esse, ex ipsa functionum læ-
 sione, cognouerimus: omissis ijs qui supra naturam aliquando existentes ipsis etiam sanis cõ-
 gruunt) Nullam deniq; præternaturalium tumorum speciem, quæ ibi dicta non sit, reliquis
 se gloriatur. Quod tamen an uerum sit, quòd somnes tumorum species comprehenderit,
 expedita eorum, qui in eo quidem tractatu definiti sunt, enarratione (Deo fauente) per-
 scrutabimur. Itaq; tumores à Galeno ijs dicato iam opusculo definiti: quos (nisi error cõ-
 putando acciderit) ad unum & sexaginta numero reduximur, hi sunt.

Libri de tumo-
 ribus præter
 naturam Ex-
 positio.

u. in fine libri.

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Primus. Corpulentia. | 21. Oedema. | 42. Epiplocele. |
| 2. Phlegmone. | 22. Phagedæna. | 43. Enteroccele. |
| 3. Abscessus calidus. | 23. Ulcus chironiũ seu te- | 44. Enteropiplocele. |
| 4. Sinus. | 24. Scabies. | 45. Cirsoccele. |
| 5. Fistula. | 25. Lepra. | 46. Varices. |
| 6. Abscessus ex solidis, | 26. Elephantiasis. | 47. Bubonoccele. |
| humidis ue corporis | 27. Exostosis. | 48. Exomphalos. |
| 7. Atheroma. | 28. Satyriasmus seu pria- | 49. Ascites. |
| 8. Steatoma. | 29. Achor. | 50. Timpanites. |
| 9. Meliceris. | 30. Cerion. | 51. Anasarca. |
| 10. Anthrax. | 31. Myrmecia. | 52. Epulis. |
| 11. Cancer. | 32. Acrochordon. | 53. Parulis. |
| 12. Gangræna. | 33. Psyracion. | 54. Thymos. |
| 13. Sphacelos. | 34. Epinyctis. | 55. Vva. |
| 14. Erysipelas. | 35. Dothien. | 56. Paristhmia. |
| 15. Herpes simpliciter. | 36. Phyma. | 57. Antiades. |
| 16. Herpes esthiomenos. | 37. Bubon. | 58. Polypus. |
| 17. Herpes miliaris. | 38. Phygethlon. | 59. Encanthis. |
| 18. Scirrhus. | 39. Struma. | 60. Vnguis. |
| 19. Ecchymosis. | 40. Sarcoccele. | 61. Staphyloma. |
| 20. Aneurisma. | 41. Hydrocele. | |

Tumor præ PRIMVS igitur uniuersalis totius corporis tumor est: quem græcè πολυσαρκίαν dicere
 ter naturam possumus, & πολυσωματίαν, aut παχυσαρκίαν, uel παχυσωματίαν, latine (ut
 primus supra diximus) corpulentiam, aut obesitatem, aut carniū corporis ue multitudinem, seu
 Corpulentia. crassitiem, talem uidelicet tantamq; ut functiones impediāt. Qui uerò sic obesus, crassus ue,
 aut pinguis est, παχυσωματώδης, quasi dicat crassissimi corporis homo, cæteris
 omisiss, appositissime nuncupari potest. Nonnunq; enim ad tantam homo peruenire ma-
 gnitudinem, atq; obesitatem solet: ut uix moueri quidem, nedum exquisitè progredi ualeat.
 x. libro de mors Quemadmodum de nicomacho smyrnæo Galenus idem alibi^x refert: cuius. s. corpus ad tan-
 to. diff. cap. 9. tam molem increuit, ut loco moueri non posset: Quem tamen aiunt ab Aesculapio curatum.
 Huiusmodi uerò nonnullas frequentius mulieres interdum sic obesas, ut digredi, atq; sine
 alterius adminiculo à cubiculo uel terra surgere nequirent, agnouimus. Plurimos quoq; ui-
 9. 14. meth. cap. 15. in prin. ros nec ingredi sine molestia, nec sedem propter uentris molem (Galeno⁹ etiam confirmā-
 te) contingere: sed nec respirare liberè, aut cubantes dormire posse, aut gradus ascende-
 re. Veluti doctissimum & philosophum & theologum magistrum Vitum à Matera demum
 euasisse, omnibus qui Neapoli proximis annis studuerunt compertum est. Quem nihilomi-
 nus uniuersi corporis præternaturam aliquando factum tumorem, Auicennæ in apostlematum
 9. 20. fen. 3. tr. 2. capite. 10. catalogo connumerare (ueluti³ & testium ex pinguedine factam magnitudinem) minime
 placuit: Sed inter ea potius illum, quæ corporis pulchritudinem offendunt. Quauis &
 4. 2. de tempera intemperies, præter ingentem tumorem, frigida & humida (Galeni⁴ quoq; decretis) ad
 mentis cap. 4. & sit: Nec non quædam contiguarum partium segregatio. Perinde ac sub cute existentem
 14. meth. cap. 15. membranam (quam plurimi panniculum carnosum appellant) quantum à cuti, ob interce-
 dentem adipem, abscedat: in quibus. s. à generationis initio non fuerat, in anatomicis ad-
 ministrationibus liquidò conspeximus. Ultra quampiam, & in ipsa etiam cuti, & in
 alijs (prout imaginari perfacile potest) partibus extensionem. Adeò ut non mouèdi mo-
 do functioni uerum & pluribus alijs huiusmodi tumor officiat. Quam obrem & rectè
 b. 7. 4. tra 4. cap. 5. Arabum Princeps ait^b Pinguedo superflua est impediens corpus à motu, & deambula-
 tione, & operatione, coarctans uenas coarctatione constringente eas: Quare oppilat spi-
 ritui uias suas: quamobrem extinguitur multoties: Et similiter non peruenit ad cos spira-
 culum aeris. Quare corrumpitur propter illud complexio spiritus: & sunt in timore q̄ ex-
 pellatur sanguis eorum iterum ad locum constrictum. Quare fortassis findetur uena subitò
 c. uide. 2. apho. 44. com. scissione perniciofa. Et in huiusmodi quidem dispositione, quæ est ante eam, accidunt cō-
 strictio anhelitus, & pulsus cordis. Et isti quidem expositi sunt morti repentinæ. Et ad
 summum mors super ultimos in pinguedine festinat: & propriè illos qui impinguantur
 in prima ætate: ipsi. n. minores habent uenas & cōstrictas. Et sunt expositi apoplexiæ,
 & paralyfi, & pulsui cordis, & diarrhœæ propter humiditatem ipsorum, & malitiæ a-
 nhelitus, & syncopi, & febribus malis, & non tolerant famem, neq; sitim, causâ constri-
 ctionis meatuum spiritus, & uehementiæ frigoris complexionis, & paucitatis sanguinis,
 & multitudinis phlegmatis. Et similiter isti non sunt generantes, neq; producentes em-
 brionem. Et sperma ipsorum est paucum (quod. s. concoctum sit, ob caloris imbecillitatem:
 d. 2. art. med. tex. 55. multum uerò propter humiditatem esse potest: aquosum nihilominus, Galeni^d etiam docu-
 mento, ac tenue & infæcundum, uel foëminarum generatiuum.) Et similiter quæ de mu-
 lieribus

„ lieribus sunt pingues non concipiunt. Et quum concipiunt, abortiunt. Et earum appe-
 „ titus (naturalis uidelicet) est debilis. Hæc de obesibus quidem Princeps. Quibus deinde
 „ tum ad sanguinis missionem tum ad purgantis medicamenti exhibitionem, ineptos esse
 „ (ob uasorum angustiam) adiunxit. Quis ergo esset, qui excedentem obesitatem inter
 „ tumores præter naturam functionibus obstantes non connumeret? Quauis inter ea quæ
 „ pulchritudinem uitiant locasse Principi libuerit. Vbi quidem & plurimos quoque alios tu-
 „ mores, proculdubio præter naturam enarrat. Galenus autem cuius monumenta nunc
 „ enucleare proposuimus in præternaturalium tumorum catalogo annumerat. Itaque talis tu-
 „ moris causa materiaue nobis uestiganda (cuius ratione singulos percurrere certum est) re-
 10 „ manet. Qui uidelicet scire possimus, an sanguineus, uel pituitosus tumor sit? An ex y-
 „ mistus? uel qui uis fortasse alius existat? Ad sanguineum ergo reducendum fore opinamur,
 „ Cum si adipis, tum si carniū exundantia sit. Quauis coniuncta nunc tumoris causa
 „ uel adeps, uel caro existat. Quod igitur oleosum in sanguine fluxileque & pingue est (Ga-
 „ lenus ait f) ubi in frigidum uenerit locum, cogitur: durum tamen ne sic quidem efficitur.
 „ Quadere comode à ueteribus dictum est humidissimam esse adipem: Secundo post eam loco
 „ carnosum genus. Quoniam uero non omnes horum causas ac generationem aduertunt,
 „ Necessum fortasse erit aliquid eorum causa ex Galeno & referre. Quicquid nam in sanguine
 „ pingue, leue, & tenue est (cuiusmodi in exquisitè decocto sanguine plurimum reperiri
 „ solet: adeo ut urina quoque non nihil in superficie pinguis reportans coctionem, Galeno etiā
 20 „ docente, h præferat) id in calidioribus corporibus alimentum quoddam calido fit: in frig-
 „ idioribus seruatur. Cumque id uenæ extra se transierint, Vbi in frigidas particulas
 „ incidit, quod genus membranæ sunt, in ijs concreuit. In partibus uero natura calidiori-
 „ bus, cuiusmodi carnosæ sunt, à calore ipso absimitur, ac digeritur. Nisi si ubi frigidita-
 „ ti temperamenti etiam uita indulgentior accedens, ipsis carnosis particulis adipis aliquid
 „ allinat. Qui ratione etiam quæ hyeme delitescunt animalia non raro inueniuntur obesa.
 „ Et scæminæ uiris sunt pinguior: quia si scæmina maris est frigidior, & plurimum domi-
 „ uersatur. Ac quicumque corporum habitus & temperati natura sunt, & mediocri exerci-
 „ tatione utuntur, hos necesse est & uideamus, hoc est, quadratos, & comoderatè (Galeni
 „ quoque documento) carnosos esse. Id uero est mediocri omnino corporis habitu. Quibus
 30 „ uero humidum abundat, & calor à mediocritate summa non longè abest: hi πολυσαρκιοί;
 „ quod est latine corpulenti, siue carnosii sunt. Corpulenti carnosius rursus sunt qui na-
 „ tura sunt temperati, cæterum desides, & ociosi uiuunt. Raro igitur & adeps, præfer-
 „ timque copiosus cum uenarum gracilitate in uiris conspicitur. In scæminis sæpissime inue-
 „ nitur. Est namque tum frigidioris naturæ, tum uitæ magis desidiosæ eiusmodi nota. Si-
 „ dem adeps ex habitus frigiditate gignitur. Corpulentia carnis uel abundantia, græcè
 „ πολυσαρκία ex sanguinis copia nascitur. Mediocritas, græcè ἐνσώματα, temperata na-
 „ turæ est nota. Et πολυσαρκιοί, hoc est corpulenti carnosius omnino plus adipis habent,
 „ quàm temperati. Nec tamen pro carnis semper portione, adeps simul augetur. Sed alios ha-
 „ bere plus carnis, alios plus adipis uideas, alijs ambo pari modo sunt adaucta. Et quibus
 40 „ quidem ambo pari modo sunt aucta, ijs tantum supra temperatam naturam humoris est, quàm
 „ tum & frigoris. Quibus autem plus est adipis, in ijs frigidi plus est, quàm humidi. AEquè
 „ ut quibus

e. libro de tum.
 præter naturam.
 cap. p. & .14.
 meth. cap. 15. &
 libr. de morb. dif-
 ferentis cap. 9.

f. 2. de tempera-
 mentis cap. 3. post
 prin.

g. ibidè cap. 4.
 post principia.

h. 4. de tuenda
 ualitudine ante
 medium.

i. 2. aphor. cō.
 44. & p. de tuen-
 da ualitudine
 cap. 8. secundum
 nostram uero diui-
 sionem 4.

k. ibidem. 2. f.
 de temperamen-
 tis cap. 4. post.
 pauca.

1. ibidem uersus
finem.

no. libro de tumoribus.
præter naturam
cap. p. circa finem.

Secundus tumor.

Pblegmone.

u. cap. 2. cō. 6.
o. p. aphorism. cō.
7. ex. 2. de tōe
uic. acut. 32.
p. ut. 2. ad glauc.
co. cap. p. in fine.

q. lib. de tumoribus.
præter naturam
cap. 2.

Tertius tumor.
Abscessus ca-
lidus.

de quo in libro de
tumoribus præter
naturam cap. 3.

ut quibus caro est plenior, ijs humoris plus iusto est: non tamen etiam frigoris. Cum enim, „
calori intra debitos fines manenti boni sanguinis accedit copia, necesse est πολυσρκία, „
corpulentiaue, aut carnositas sequatur. Sicuti ergo¹ naturali calore optimam seruante tē „
periem, humidum quod intra sanitatis est terminos auctum, non adipem modò, in homine, „
sed etiam corpulentiam carnositatem uel gignit: & adipem quidem parcius adijcit, carnem „
uerò multò liberalius auget: Ita rursus si humidum & siccum mediocritatem ad unguem „
inter se seruent, calor autem in homine sit minor: necesse est huius corpus adipe, q̄ carnis „
copia magis abundet. At uerò si calor augeatur, seruetq̄ mediocritatem altera contrarie „
as, minus erit ei animali adipis, q̄ carnis: sicut è diuerso si quando pollet siccum, altera cō „
trarietate medium modum seruante, & gracilius, & durius corpus euadet. Hæc de pin „
guibus obesis uel atq̄ carnosus Galenus, Equibus primi tumoris huiusq̄: uniuerso corpori cō „
munis materia prima, & efficiens, atq̄ etiam generatio sic liquet, ut à nobis declarari qdē „
non oporteat. Quoniam uerò cuncti homines cognoscunt, non solum ipsi medici q̄ plus car „
nis, & adipis, q̄ iustum est, (Galenus^m de immediata, ultimaq̄ materia loquēs ait) eos „
tumores generat: Ad particulares igitur, non totius, sed aliquarum partium tumores de „
scendamus: à phlegmone quidem² tanq̄ ab ea quæ frequentius contingit, ³ Itemq̄: à sangui „
ne, inter omnes corporis humores nobilissimo, suæ generationis originem ducit, exordietes: „
in qua & similibus secundum dispositionem ipsorum corporum (quia, scilicet secundum intempe „
riem, atq̄ unitatis quoq̄ dissolutionem) non solum secundum q̄tutem primam, ab eo quod „
est secundum naturam excessus fit. SECUNDVS ergo à Galeno definitus tumor, 20 „
phlegmone est, græcè φλεγμαὶ, latinè autem inflammatio, ἀπὸ τὸν φλεγμαίνειν, quod „
est comburere, atq̄ inflammare, quia ueluti flammam quandam, græcè φλόγος in repræ „
sentat. Ex optimo, & mediocrem crassitudinem obtinente sanguine, si quidem exquisi „
ta phlegmone fuerit, generationem assumit. Cui quidem tumori ob id phlegmones nomen „
dedicatum est (q̄uis & plures alij tumores, qui uidelicet ex bili, atq̄ etiam atrabilario san „
guine, ijsq̄ uel simplicibus, uel aliquo modo admixtis fiūt, phlegmones inflammationes uel „
ut iterum proprio loco uberius ostendemus⁴ appellari queant: æquè ac, ipsius etiam „
Galenus⁹ testimonio, φλεγμοειδῶς) quoniam hic ex sanguine inq̄: factus tumor frequentius „
aduenire consueuit. Hanc ob rem totius generis affert appellationem.⁵ Barbari ferè oēs „
apostema calidum simpliciter hunc tumorem, pluribus in locis nuncupant. Huius ergo tu „
moris causa continens sanguis est. Ab intercluso. n. duntaxat spiritu neutiq̄: gigni: multoq̄: „
minùs sola sanguinis fusione aut feruore: quemadmodum neq̄: πολυσρκία, hoc est carnis „
multitudinem incrementum uel dici posse Galenus exquisitissimè, ac satis superq̄: demonstra „
uit: ⁶ ex nouo sanguinis defluxu genitum esse concludens. Exquisitum inq̄: Qui nihil „
minùs, ob alterius succi cum sanguine admixtionem, uel erysipelatosus, uel œdematosus, „
aut scirrhusus dici à medicis potest. Nos autem singulorum hic tumorum exquisitè, ac „
perse sumptorum causas uestigare præsertim intendimus. Ut quibus profectò notis, compo „
sitorum ratio facillimè elucescat. HANC uerò phlegmonem, quoties in halitum minis „
mè digeritur, siue superante, siue superata quidem ab ipsa fluxionis uel natura, consequi, „
ac ueluti proles ipsius inflammationis esse plurimum abscessus consueuit: ἀπόστημα, & 40 „
& ὄστειον græcos nominare, barbaros uerò specialius loquentes dubellet, seu cum aris- „
culo

culo ad dubilet antea quoque a nobis iam pluribus ostensum est. ¹ Abscessus igitur, apostemaue, si quidem ex phlegmone suae generationis exordium ceperit, ex ipso etiam sanguine genitus esse dici potest. Quemadmodum ex alijs quoque humoribus, atque ipsa etiam serosa humiditate, nec non flatuoso spiritu genitum esse nonnunquam liquet. Quamquam ex bili rarissime abscessus apostemaue (Galeno met erudiente) fit. Nos tamen primum de eo loqui abscessu cum Galeno intendimus, qui ex inflammationibus generationem sumpsit. Cuius species quaedam est $\epsilon\pi\alpha\pi\upsilon\mu\alpha$, et $\delta\iota\alpha\pi\upsilon\mu\alpha$, quod est latine suppuratio: quoniam uidelicet abscessus ad puris generationem declinabit. Auicenna deinceps (ut uidebimus) exitum ram nuncupabit. ⁵ Mox uero et de alijs abscessibus, praesertimque frigidis (pro ipsius et Galeni ordine) loquemur. Quoniam igitur in ijs qui ex phlegmone oborti sunt abscessibus, praesertim si male curati sint, pure quidem sanie acri perinde existenti ut excoriet, abducaturque et diducat ipsa a subiectis continentia, Sinus confertim oboriri, uelut eorum quoque germen, consuevit. Idcirco et huius causam ueligare operae pretium est. Namque inter apostemata, tumoresque annumerare possumus: Quum scilicet retenta in ipso sanie tumor attollitur. Vbi nec intemperies, neque continui manifestissima solutio, partiumque distantia deest. Quauis in ulcerum quoque catalogo reponi posse inficias eundem non sit. Graece $\kappa\omicron\lambda\pi\omicron\varsigma$: Ab Auicennae interpretibus Abscessio, et cauerna nuncupatur. Et quandoque dicunt quidam, (ait Princeps) abscessionem illud esse, quod penetrat sub cute, et separatur ab eo cutis. Et cauernam illud, quod concauat, inflectiturque sub carne, et dilatatur in ea. Primum ²⁰ graeci speciali nomine $\epsilon\kappa\omega\delta\eta$ hoc est lacernosum uocant sinum, attritum uidelicet uesti, laceratae uel similem adiacentem cutim possidentem, adeo ut subiectis partibus haud facile agglutinari queat. Secundum uero idem $\iota\pi\omicron\upsilon\omicron\mu\alpha$, latini cuniculosum cauernosum uel appellant: Cuniculus n. et cuniculum foramen sub terra occultum (quod uulgò nos dicimus mi- ³⁰ na) et cauernas latinis significat: quibus quidem nuper inuento bombardarum puluere in fartis, dein uero igne accenso, ad diruenda castra, quos uis aggeres, atque ipsos etiam motes, in bello milites uiuntur. Vtrunque autem, donec absque callo, duritieque persistit: ipsius sinus species est. Callosus uero dein redditus in fistulam commigrat. Itaque corruptum aliquando uitiosumque sanguinem, aut solum purum uel, aut (quod maxima ex parte contingit) alijs etiam humoribus admixtum: quandoque autem non sanguinem: at illius excrementa, quamdam uel ferositatem, aut $\iota\chi\omega\epsilon\alpha$, sanie uel (quam Auicenna uirulentiam, aut uirus nominat) in ipsius sinus interstitio collectam, uel in circumstantibus, super sedentibusque, tam cutaneis, quam carnosus partibus inspersam, alicuius tumoris continentem fore causam pronuntiabimus. Adeo ut ad sanguineum prius, dein uero ad oquosum huiusmodi tumorem reducere ualeamus. Hunc denique sinum nisi celeriter quispiam curet, callo obduci, durumque temporis progressu fieri contingit. Quem affectum postea graeci $\sigma\upsilon\epsilon\pi\epsilon\gamma\gamma\alpha$, latini fistulam uocant. Quae cum callum sibi adiunxerit, multo magis, quam sinus, et tumoris, et larvae sumpti apostematis nomina sortiri potest. Quauis ob apertissimam continui solutionem, inter ulcera potius, quam inter apostemata, uel tumores tam a Paulo, quam ab ipso Arabum Principe, et alijsque recentioribus, nedum Hippocrate, et Sinus, et ipsa etiam Fistula reposita sint. Huius ergo fistulae causam eandem, quae ipsius Sinus erat, ex quo facta quidem est, dicere absurdum non fuerit. Cum ex phlegmone (ut diximus) abscessus, indeque sinus,

q. com. praecedenti fo. 18. usque ad 22

r. 2. prognost. cō. 34. et 3. eiusdem cōm. 23. quarti de rat. uic. acut. 11. et 46. et primi ad Glauc. 15. et sepe.

s. infra cap. 21. Quartus tumor Sinus.

De tumor. praeter naturam cap. 4. et 2. ad glauc. cap. 8.

t. 4. 4. i. tr. 3. cap. p. post prin.

Cuniculus et Cuniculū qd.

Quintus tumor Fistula.

de tumor. praeter natu. cap. 4. et. 5. u. lib. 4. cap. 48. x. 4. 4. i. tr. 3. cap. p. et. 11. y. lib. de ulceribus.

sinus, ac demum fistula genita sit. Quoniam uero huiusce tumoris præcipua substantia callus est: hanc obrem & fistulæ, ut tumor quidem est, continentem causam atrabilarium quoque sanguinem, discussis quidem, ac per balnium digestis tenuioribus partibus, proferre possumus. Expeditis autem quatuor (præter obesitatem) particularibus tumoribus, phlegmone inquit, & eam consequentibus abscessu, sinuque, ac fistula: Cum duplex apostematum genus (perinde ac antea iam ex ipsius met. Galeni dogmate ostendimus) existat: Frigidus quoque abscessus apostematæue, absque ordinis ratione: uerum potius ut sibi ad memoriam subueniebant, Galenus ipse definit. Quorum rursus duplex genus existit. Vel. n. humidæ substantiam liquidam uel intus continent, ut lutum, olei amurcam, uini facem, urinam, ster-
cus, balnei sordicem, ac melleum mucosumque succum: atque grauer interdum (ut Gale-
nus ait^b) olentem substantiam, ut omnes auer sentur: Vel solida corpora (præsertim quæ inueterata fuerint) uel inter duas tunicas, uel sub certis membranis retinent: uelut ungues, pilos, lapides, ossa, poros tofaceas uel substantias, aut pororum fragmentis similes: Itaque uelut arenas, ligna, carbones, testas, grumos & tanquam sulphuris (ut Aetius addit^c) ra-
menta. Aliquando uelut mansa gallinarum officula, & demum animalcula omnibus pro-
pemodum ex putredine generationem habentibus simillima. Philoxenus autem (Actio refe-
rente)^e ait, se aliquando reperisse animalia in humore culicibus, aut paruis muscis similia. Quæ quidem omnia id genus apostemata cum eandem ferè figuram extrinsecus, formamque præseferant: ad unam tumorum differentiam reduximus: ut sextum ordine tumorem ex-
planarimus. Tuum uero est (si libuerit) tot numero tumores dicere, quot substantiarum
in se contentarum diuersæ species existent. Nos tamen clarioris insimul, breuiorisque do-
ctrinæ gratia, in unum, ex Galeni quoque placitis, reduxisse maluimus. Quibus porro, ut
potè rariùs, quin rarissimè contingentibus, breuiter, atque unà definitis: materialem cau-
sam, quæ & continens etiam, effectiuaque tumoris dici potest, omni adhibita diligentia ue-
stigantes, melancholicum succum, aut pituitosum, uel ex ijs mistum esse, quemadmodum
illius in quo urinæ simile quid reperitur, serosam superfuitatem, uel solam, uel prædictis
duobus humoribus complexam, inuenimus. Etenim circa exordia quadantenus transmu-
tati humores in liquidas illas humiditas uel substantias conuertentur. Plurimum uero cor-
rupti animalcula gignent. Perinde atque diutissimè commorantes, ac mirum in modum, te-
nuibus partibus discussis, assiccati solida tandem corpora euadent: uarias quidem formas,
tam si ab initio discindantur, quam si diutius inueterascent, pro uaria & alterationis corrup-
tionis uel deficcationis proportionem, præseferentes. Quamobrem non temerè ad illa sex
causarum genera, bis antea, reduci posse Arabum Principis uoluntate prædiximus. Verum
enim uero tria, præter ea quæ præcollecta iam sunt, abscessuum genera, tametsi ad
idem commune cum alijs genus reduci non indecenter queunt. Galeno tamen scorsum de
ijs meminisse placuit. Atque id ipsum duplici (ut uidetur) ratione, tum quia, sillis rarissimè
aduenientibus, hæc frequentissima sunt, tum secundo quia singula græcè propriam ap-
pellationem sortita sunt: Ut quædam ἀβρῶματα, Alia στενώματα, quædam demum
μελινῆδες nuncupentur. Quibus tertiam quoque rationem addere possumus: quoniam
scilicet diuersas quoque in exterioribus figuras, uariasque notas repræsentant. Atheromatis. n. tu-
mor specie, & figura (ut aetius f. ait) oblongus, sublatiusque, & ad compressionem di-
gitorum,

z. com. præcedē
ti fo. 20. lin. 26. et
sequentibus.

a. libr. de tum.
præter naturam
cap. 4.

Sextus tumor.

Abscessus ex
solidis humidisq;
corporibus.

b. 14. meth. cap.
12.

c. lib. 15. cap. 7.

d. eod. p. fo. 31. et
eod. præsent. fo.
76.

e. ut 14. meth.
cap. 12.

f. libr. 15. cap. 7.

- gitorum, ob humoris crassitudinem, tardè cedens, & amotis digitis tardè reuertens. Meliceris autem figura rotundior est, magisq; extenditur: & ad digitorum compressionem, ob tenuioris humoris essentiam, celerius cedit, & amotis digitis pari celeritate reuertitur (quà uis tardè fundi Paulus & asserat.) Cuius proculdubiò codicem deprauatum, ac mancum g. lib. 6. cap. 36 esse opinamur. Cum trium notas, quorum antea materias exposuerat, declarandas propo. Pauli locus. nens, atheromatum interim dimiserit. Verum à Paulo scriptas esse reputamus: transcribentium nihilominus, aut impressorum fortassis incuria totum id defecisse: in quo atheromatosis indicia ponebat. in quorum quidem enarratione & tardè fundi & cadcret. In meliceride aut citius & fundi & rursus reuerti ponendum est. Meliceridi. n. (uti Celsus etià cōfirmat^b) b. lib. 7. cap. 6.
- 10 liquidior humor: ideoq; pressus circūfluit. Proprietas. n. (uti Galenus aitⁱ) cessionis alia est iⁱ post medium. iⁱ 2. ad glauco. cap. 6.
- tenuibus humoribus: alia in crassis. quemadmodum & in tenacibus atq; mucosis humoribus alia. Satiùs ergo est primùm eam dictionem corrigere: ubi scilicet habet & βεῖδ' αἰώ & id est & tardè & legere & β' αἰώ & quod est & facile & Deinceps uerò quæ pro atheromatis definitione deficiunt, supplenda ex Aetij monumentis, sunt. Steatoma uerò alijs tactu durius est (ut bene Paulus^k ait) quadere cum à struma tactus mollitudine id differre Aet^k. ubi supra.
- tius^l inquit, quia. f. strumis mollior hic tumor est, ex ipsius met antea^m scriptis intelligi^l. ubi supra ca. 8. m. cap. 5. eiusdē
- ge. Qum tamen subditurⁿ & qua nota etià à Meliceride, & atheromate discernitur & quoniamⁿ. cap. 8. circa
- niam hi duo tumores ipso steatmate molliores sint, dubiò procul concipere debemus. Ta^{prin}.
- Elui ergo (ut Paulus^o ait) renintur. ex quo fit ut æqualis permanens, tactu lenis (quemadmodum Aetius^p refert) existat, neq; sicut strumæ inæqualem sæpè tumorem (ipse met do^o. lib. 6. cap. 36. p. ibidē cap. 5. 8. q. cap. 5.
- cente^q) præferentes. Basim deniq; ampliorem steatoma habet, ac solidiorem. Rarò^r. cap. 8.
- .n. (uel Aetio docente^r) contingit, ut basis angustior, & apex amplior reperiatur. Itaq; prædictis iam tribus rationibus integrum Galeno fuit seorsum de hisce tumoribus ab alijs^r. cap. 8.
- frigidis apostematibus pertractare. Haud quia inter abscessus reponendos non esse opinatus fuerit: perinde ut aliquos tenuisse refert: qui (ueluti ex Paulo^t colligi potest) abscessus^s. lib. de tum. præter naturā cap. 6.
- proprie dictos esse uolunt, qui inflammationem quidem testentur, & acrem humorem, ac rodentem contineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. At aliorum potius^t. lib. 6. cap. 36.
- us opinionem Galenus eiusq; sectatores obseruasse uisi sunt. ut. f. inter apostemata abscessus^u. ut 2. ad glauco. conē. 6. & 14. meib. cap. 12.
- sus ue reponantur. Cum duplex apostematum genus ubi de ijs loquitur, supposuerit. Pri^u. ut 2. ad glauco. conē. 6. & 14. meib. cap. 12.
- 30 mus ergo eorum, ordine tamen à Galeno descriptus tumor septimus, is est, quod Græcè^u. ut 2. ad glauco. conē. 6. & 14. meib. cap. 12.
- ἀθήρωμα dicitur, latinè autem pultatio. Quoniam (ueluti Paulus^x ex Galeno^y trans^y. Septimio tūor.
- scribens inquit) τὸ ἐν τῷ ἀθήρωματι περιεχόμενον τὴν ἀπὸ τοῦ σίτου ἀθήρᾳ παρὰ Atheroma.
- πλῆσιόν ἐστι. Hoc est, quod in atheromate, pultationeue continetur, frumentaceæ pul^x. lib. 6. cap. 36.
- ti simile est. Aetius uerò^z clarius ex farina cocta factam pulticulam ἀθήρας nomine in^y. 14. meib. cap. 12.
- tellexisse ostendit. Sic & Celsus^a quoq; tenui. f. pulticulæ similem substantiam in huius^z. lib. 15. cap. 7.
- scemodi tumore contentum ait. atq; ipse etiam (ut proprio deinceps loco uidebimus^b) Pri^{in prin.}
- ceps, & Halyabbas, exposuerunt. Quamobrem & Græcorum, & Arabum, ac Latini^a. lib. 7. cap. 6.
- norum quoq; testimonio deceptum esse Horatium Limanum patet. Qui librum Galeni de tu^b. infra. tr. 2. ca.
- moribus præter naturam in latinum conuertens, Aristæ aliquid simile in ipsis atheromatis in^{4. tex. p^o.}
- 40 ueniri exposuit: & ubi græcè Galenus ait, ἀθήρᾳ τὴν παρὰ πλῆσιόν. Eo motus quòd^c. 8. theoricæ cap. 11.
- ἀθήρας apud græcos summas, præsertimq; hordei aristas, siue ipsas etiam (prout aliqui Limani error uolunt)

- e. de quo uerbo uolunt) reijculas spicas præferunt. Quæ dere uerbum ἀθερίαν^c ortum est: quod pilis
uide eras. cil. 4.
cent. 6. pr. 13.
f. libr. 2. cap. 83. pulcem contineri: quam Dioscorides s ex Zea in tenuem pollinē redacta, & aqua demum
sic decoquendo subacta, ut sortitio liquidiori puliculæ (quod græci πολταρίον uocant)
g. lib. 7. cap. de
aibera. similis euadat. factam esse uoluit. Paulusq; & Dioscoridis uerba transcribens nō ex Zea
h. lib. 22. ca. 25. modō, sed ex frumēti etiā farina fieri posse adiunxit. Quin & ex olyra Plinius, ^b Alij;
ex amylo, uel nilio (addentibus quibusdam & mel, & ouum, Alijs uerō caseum, aut lac:
Nonnullis autem nostro etiam æuo lac, & butyrum) fieri affirmant. Ex crassiori etiā,
præcipueq; hordei, farina, huic adeo similem, ut pro eodem aliquandō capiatur, πόλτον
i. lib. 2. cap. 81. & Dioscorides, ⁱ & Galenus, ^k atq; alij deinceps factum esse ostendunt. Nos ex simi
k. 7. simplic. la, quæ candidior quidem frumenti pars, crassior tamen molendo reseruata, huiusmodi scr
med. cap. 55. & bitionem, cibum ue (ut cunq; nominare libuerit) parare consueuimus: ac uulgō simulillā
pi. de alim. facul. nuncupamus. ἀθερία igitur græcè, & ἀθερία, atq; etiam ἀθερίη Budeo^l confirmate per
cap. 13. & Aetiz
us libr. p. cap. de
hordeo. .n. uel. α. & non per .ε. huiusmodi substantia uocatur. Quamobrem^r uel græcum Gaz
l. in cōmetariis leni codicem, & consequenter aliorum, deprauatū esse exislmandum: & per .n. legendū
Expos. 3^x. potius tam ἀθερία, q̄ ἀθερίωμα. Ob quod Pauli^m quoq; uerba statim ab initio retuli. Vbi
m. libr. 6. cap. quidem per .n. legebatur ἀθερία, tamen si eius uerba penē ad literam ab ipso met Galenoⁿ
36. trāscripta fuerunt. Et ita ualentissimus noster olim præceptor Manardus legebat (quē
n. 14. meth. ca. admodum in sua de morbis exterioribus epistola^o legere potes) sicq; tam Dioscorides, p q̄
12. Paulus^q ἀθερίαν per i. scripserunt. ² Vel fortē ἀθερία & ἀθερίες ut differentes ab inui
o. 7. libri 2^a. cem proferendæ sunt. Quoniam. s. ἀθερία pulcem, ἀθερίες uero arislam significet. Quam ²
p. lib. 2. cap. 83. tamen differentiam à nullo græcorum notatam esse inuenimus: ueluti neq; ἀθερίαν de utroq;
q. lib. 7. cap. 3. intelligi posse. ³ Nisi .n. in .ε. secundum æolicos, atq; ipsos etiam doricos transmutatam ue
littera. A. lis. Vt αθερία dicere hi solent αθερίες hoc est mars. Quæ tamen sententia non satis mihi arri
det: quoniam plura Galenus ignorare, q̄ scire in his duabus linguis confessus est: ^r Quare
non adeo illorum dictionibus (nisi rarissimè) sed atticis maxime utitur. Id quod si fortassis
r. lib. de Gynæ nast. ad trasymbuz
lum cap. 3. in fi
ne secundū nostrā
diuisionem. 12. contingeret: Ne in æquiocationē incidentes, ut Horatius Limanus, decipiamur, tutius est
αθερίαν, indeq; ἀθερίωμα, q̄ ἀθερίωμα, perpetuō proferre. Quæquidem omnia usq; adeo,
non ut grammatislæ munus obeamus, at pro Limani phantasia, quid noui se iam extudisse
opinati, atq; ipsius insimul atheromatis materia cognoscenda dicta sint. Pituita enim ab
initio lenta, dein uerō intantum leniter assiccata huiuscemodi tumoris causa fuit: Donec
crassioris farinæ, aqua, uel alio liquore decoctæ substantiā referat. Quo intellecto athe
romate iam tempestiuum est alios quoq; duos tumores definire. Octauus igitur tumor est
cui peculiare pariter nomen græci à similitudine (στεάτωμα uocantes) indiderunt. La
tinè autem seuationem dicimus: quoniam uidelicet seuo similem, ex indurata itidem pituita,
substantiam continet. Pote est autem & adipem (prout aliquando uidimus) præferre.
Græcum tamen nomen, τὸ στεαρ, hoc est seuum (unde tumoris nomenclatura formata est)
significat. Quò autem differant, τὸ στεαρ, hoc est sebum, & ἡ ὑμελῆ, quod est adeps,
infra quidem fusiùs enucleabimus. Horum deniq; tertius ordine tamen in Galeni uolunt
Nonus tūor. ne nonus tumor est, quem græcè μελιχρηίδα uocat: latinè autem mellisauium dicemus: ⁴
Meliceris. quoniam s. mellis uiscida quædam substantia in tali tumore contenta per dissectionem reperis

tur. Haudquaquam tamen idem est cum trigesimo tumore, quod à faui similitudine græcè κηρίον
latine fauum nominari ostendemus. Illud. n. ultra quod capiti peculiarius est, foraminulen-
tum ulcus, tumidūque in simul existit: è quibus foraminibus, ijs qui in achore sunt maioribus,
sanies melli similis enatat, causamque (ut uidebimus) nitrosam pituitam obtinuit. Hic uerò
tumor, absque omni penitus foramine, intus sub neruea membrana, nedum cuti, in quauis
corporis parte contingens, melli, tum crassitudine, tum lentitie, atque interdum etiam colore
Cf. quidem aliquantula putredo superuenerit, similem substantiam continet: materiamque
non salisam, at uiscidam, crudamque, ac leuiter desiccata pituitam præsefert. Celsus με-
λικερίαν à μελιχερίδι se creuuisse uidetur: cum meliceriam, græcè μελικερίαν, id fora-
minulentum furunculum intellexerit, quod nos paulò ante κηρίον uocauimus, neque capiti
peculiare, sed scapulis, atque his adhuc rarò, posuerit: μελικερίδα uerò aliud, quod. s.
eiusdem esse generis cum atheromate ac steatomate iam iam ostensum est, capiti nihilominus
familiare opinatus fuerit. De quibus tamen rursus loco proprio sermocinabimur. Vbi ro-
dos, Arabicè autem apud ipsum Principem, atque etiam Halyabbatem, alselba, & selaa
nominari uidebimus. Nunc. n. Galeni magis monumenta & enarrare prius, interpretas-
rique, & deinceps quantum possibile fuerit, obseruare decreuimus. Ex pituita igitur (ut
ad propositum conuertamur) melicerida, quemadmodum atheromata, nec non steatomata
originem duxisse determinandum est. Ita & plurima in quibus res dura continetur. Quam-
non est longinquum (uti Princeps ipse dicit) quin necessarium sit ipsam. s. rem duram,
reperire esse de genere malancholicæ. Verum nos posuimus eam pblegmaticam, quoniam ra-
dix illius duri est pblegma, cui accidit ut desiccaretur grossum. Nos autem antea iam
eorum, quæ scilicet in se corpora continent materiam uestigantes, & assiccata pituitam,
& atrabilarium pariter desiccatum succum, & ex utrisque commistam substantiam, cau-
sam esse ostendimus. Verum uberiùs quidem capite proprio loquemur. Sat autem fuerit
impræsentiarum, prædictos tres tumores ex pituita, quemadmodum plures ex ijs, in qui-
bus corpora scilicet inueniuntur, genus suum duxisse determinare. Quibus uis, ad calidos tumo-
res una cum Galeno quæ enarramus: nō uestigata interim aliqua ordinis ratione, conuertamur.
DECIMVS ergo ab ipso met Galeno descriptus tumor è, quod à græcis κρημνός à latinis ue-
rò carbo seu carbunculus dicitur. Auicenna cum duplex huius species alibi posita sit altera, quæ
sine pustulis atque humiditate incipit. Prunæ: altera uerò quæ cum pustulis uescisue atque ema-
nate humiditate exoritur, Ignem Persicū, expositius loquendo, nūcupat. A feruēt, & ἔγγυς
τῆς φλεγμονῆς. i. propè inflammationē q. d. propè flammā quandā existētē, crassoque, simul melā-
cholicoue sanguine tumor hic (Galeno docētē) genitus ē. Qui uel ab initio statim talis fuit, uel
perassato iā in ipso seruire sanguine, melancholicus effectus ē. Intellico autē hic nō melancholicū
modò succū sanguini admixtū, ipsumque melancholicū reddentē: cuius ueluti fex existit, & dū
animal naturaliter se habet (Galeno authore) quondam gignitur: Verum & ipsa quoque atrā-
bilis, quæ in corpore præter naturā se habētē, exustione, ac uelut assatione quadā cōflat. Ete-
nim uterque humor si quē adeo una cum sanguine ob eorū admisionē melancholico dicto ferueat ut
febrē, et quē sēuissimā iducat, cuiusmodi præcipuē quæ atrabilis præternaturalisque, et ex
ipsis flauæ bilis adustione oborta ē, excitare cōsueuit. Imō affectus principium et origo fieri pot.
Quibus bili quoque amarā admisceri (cuius rōne feruor accēditur) uero quē simile ē, et ab ipso

Celsi opinio.

1. libro. 5. cap.
uli. sec. 12.

u. lib. 7. cap. 6.

x. tr. sequenti cap.

4. s. 6. & 7.

y. tr. sequenti ca.
4. tex. 2.

z. fo. 82.

3. tr. sequenti ca.

4. com. 2.

Decimo tuor

Anthrax.

a. libro. de tum.

præ. natu. cap. 7.

b. 2. ad glauc. p. 2.

c. infra. cap. 9.

d. de tum. præ.

nat. 7. & 14.

meib. cap. 10. &

2. ad glauc. po.

c. 14. meib. ca.

9 & lib. de atra-

bili. cap. 5. & 9.

G etiam

- f. cap. 9. cō. 10. etiā Principe (ut infrā uidebimus f.) cōfirmavit. Humor autē q̄ prae cæteris huiusmodi affe-
 ctus causa est, sanguis profectō existit (cuius ratione sanguinis missio, ad animi usq; deliqui-
 um, cōgruere declarabitur &) humori nihilominus melancholico, aut ipsi et atræ bili, quin &
 amaræ quoq; (uti iam iam diximus) portiuncula admistus. Quod si exquisitiū, Galeniq; sen-
 tentia loqui maluerimus, ita cū ipso^b pronuntiabimus. Quod si sanguis supra modum assetur, „
 pars q̄dem eius subtilior ac pinguior omnino in flauā conuertitur bilem: quæ aut crassior, in „
 atram: quod in his tumoribus q̄ carbunculi appellātur, contingit. Nam in his ex sanguine su „
 pra modum efferuescente ad atræ bilis humorem fit transmutatio. Ita aut hoc loco accipi uo „
 lo atræ bilis humorem: ut q̄ nondum exquisitē in atræ bilis naturam transferit: sed in quodam „
 sit confinio cōstitutus. Quamobrem (ut ex præscriptis Galeni uerbis elicitur) etiam si sanguis 10
 temperatus, cōsistentiaq; mediocris sit, supra modū tamen assetur: tenuior eius pars in ama-
 ram bilim cōuertitur, hac q̄; rursus exusta in atram declinat: in quā & crassior statim uers-
 git. Ex nimia igitur sanguinis combustionē, feruoreq; in atrā bilim inclinatio fit. Quadere si
 ad quempiam locum à forti natura expellatur, anthracem ibi sæpissimē progignet. Etiam si
 atra bilis adhuc exquisita non euaserit. Quauis. n. in eo, quod prae manibus exponendum
 nunc assumpsimus, uolumine, i atram bilim exactā huiusmodi tumoris causam posuisse uis-
 deatur, cum de ipsius anthracis colore loquens, aliquid splendens habere ait, ut bitumen, &
 pix: talemq; esse exactam atrā bilim adiunxit. Si tamen peregrina mente perlibrarimus: iā
 assumptis ex libro de febrium differētia uerbis minimē aduersari inueniemus. Hic. n. aliqd
 splendens habere hūc tumorē, græcē εἰς αὐτὴν καὶ τὴν βίαν ait. Haud. n. absolutē splendidū 20
 esse, uel splendorem habere inquit: uerū aliquid splendens: Qui tamen splendor illi simi-
 lis sit, qui in bitumine iudaico, ac pice conspicitur: talis autem, s̄ splendens, ut pix, & bi-
 tumen, est exacta bilis atra. Qua de re si qui anthracem progignet sanguis in bilim atram
 conuertitur, & in illius confinio existit: tantum ab eius luciditate deficiens est, q̄tū & ab
 exquisita illius natura derelictus adhuc est. Satiū ergo fuerit atrabilarium sanguinem,
 feruentem tamen, huiusmodi tumoris causam esse, q̄ atram bilim, aut melancholicum suc-
 cum proferre. Atra enim exacte bilis, post expletum feruorem, ueluti post adustionem
 cinis, remanet. Quamobrem sine feruore atram bilim cancri, non anthracis. causam exi-
 stere deinde Galenus ait: non q̄ sine calore illa sit, ueluti statim ostendemus: ^k at sine fer-
 uore: hoc est expleto iam feruore præsertim ualido, cuius quidem ui assatus, & quasi in 30
 cinerem conuersus sanguis ipse remansit. Quibus porro uis (prius q̄ ad cancri sermos-
 nem perueniamus) sub silentio prætereundum esse nolumus, malē Gangrænas in princī-
 pio huiusce capitis adiectas: q̄m dicitur & Gangræna, & carbunculi & c. & totum nanq;
 Galeni locus. quod deinceps à Galeno subditur, ad carbonēs pertinet. Haud enim feruor & crusta ad
 gangræna naturam requiruntur, sed q̄ magna inflammatio, humoris præcipuē uel copia,
 uel uenēnosa qualitate, sit, quam sequi partis affecta mortificatio solet: De qua nihilō-
 l. cap. 9. in prin. minū deinde specialis, ac proprius sermo fiet: q̄m uidelicet subdit^l & sequitur autē & c. &
 græcē & Επετα δὲ & c. & Omīssa igitur tanq; superflua, & ab aliquo scrip- tore potius
 interiecta dictione & γὰρ γὰρ & legendum est & οἱ ἀνθρώποι & hoc est & carbonēs au-
 Vndecimus tu tem & c. & Feruens itaq; atrabilarius, semiusus^{ue} sanguis anthracem generat. 40
 mor. IPSA uerō sine feruore atra bilis (peritadē atq; Galenus adiunxit^m) nō melācholicus qui
 Cancer. dem

dē propriē dictus humor ex quo (ut uidebimusⁿ) scirrū sit, sed ex q̄ sitū loquēdo atra bilis
 aliū tumorē producet, quem Græci καρκίνον, & καρκίνωμα nominant: latini autē (excepto
 Celsō) cancrū. Celsus. n. græcū nomen καρκίνωμα à cancro tanq̄ diuersum assumēs, utriq̄
 seorsum definiuit: ° Cancrū qdē ut genus ad serpētia quā dā ulcera supponēs, quæ p̄ æser-
 tim ab ijs, quæ extrinsecus incidūt, orta sunt: ulceratū uidelicet erysipelas, ulcus nigrū, &
 gangrænā: Sub qua & sphacelon siderationem uē, ac ipsum quoq̄ ab Auicēna^p dictū est hī-
 omenon (ut aliās diximus, & inferiūs iterū declarabimus^r) intellexit. Carcinoma ue-
 rō (quē nos unā cū græcis cancrū dicimus) tam cū ulcere, q̄ sine illo tumorem, prout rursū
 ostendemus, accipiēs. Quemadmodū igitur præcedētis tumoris (anthracis inq̄) causa cras-
 10 sus feruensq̄, in simul sanguis, cui uidelicet melancholicus humor, uel atra bilis admista est:
 quin ipsa etiā fortassis flaua, seu pallida, croceāue, uti Princeps ait, bilis existit: uel ipsius
 met sanguinis crassior pars in cōfinio atræ bilis, ob feruorē, reducta: Ita & huiusce tumoris,
 absq̄ ulcere qdem existentis mitior, ulcerati uerō acrior atra exquisitē bilis, feruore interim
 ualido febreq̄ per se (nisi ex accidenti superueniat) immunis, principiū & occasio est. Quā-
 20 obrem cancri (Galeno docēteⁿ) nigriores sunt colore ijs, quæ inflāmatione infestātur, & mi-
 nimū calidi. Sic. n. interpretandū omnino recensemus quod græcē dicitur, ἡ κίστα θερμὴ
 Omni. n. calore destitutos esse cancos falsissimū est. Cū eō qdem à scirrū differāt quoniam
 hic frigidus, indoliorisq̄, & penitus insensilis aliquando est. Illi uerō sæpenuerō & pun-
 gere (Celsō etiā, præter quotidianū experimentū, teste^x) & pulsationē in affecto loco exci-
 20 tare, atq̄ ebullitionem quā dā, (ut infra cū Principe declarabimus^y) inducere cōsueuerūt.
 Quāobrem & ratioe uictus refrigerate, & solani succo, alijsq̄ refrigerantibus quoq̄ sæpenu-
 merō topicis succurrēdū, ex Galeno, ac uniuersa medicorū academia demonstrabimus. Sūt
 30 ergo cancri minimū, hoc est parū calidi: Nō (ut Horatius Limanus uertit) minimē cali-
 di. Dictio nāq̄ ἡ κίστα (ipsomet Galeno didascalo^a) ταντὸν σημαίνει τὸ ὅς ἐλαχίστα,
 quod est: idē significat, quod, q̄ paruissimē. Alibiq̄: ἡ κίστα σημαίνει τὸ ἐλαχίστον. καὶ
 οὐχ ὅς ἐστιν οἰοῖται τὸ οὐδαμῶς. hoc ē: hæc dictio ἡ κίστα significat mīmū, seu paruis-
 simū, aut paucissimū (quouis. n. modo uertas nō obstat) & nō, ut qdā aiūt, nullatenus, seu
 40 nullo modo. Vtq̄; clariū pateat, ab ipso etiam alibi^c legimus, τὸ ἡ κίστα τουναντίον σημαί-
 νει τὸ μάλιστα. quod est: hæc dictio ἡ κίστα (quam nos traduximus minimū) cōtrarium
 huic uocabulo plurimū denotat. Sic interdū quoq̄; ἡ κίστα, τουτέστιν ἐλαχίστα, ex-
 ponēs, dixit. Quo etiā significatu in aphorismis^e intelligendū aliquandō declarauimus. Quan-
 uis interim & idē, quod, nullo modo, hanc dictionē alicubi significare inficias nō eamus. Quæ
 tamen significatio ueritatem hic destrueret. Itaq̄; Minimū calidi cancri sunt: hoc est parū
 calidi: & ueluti rectiūs Galeni sententiā magis fortē cōsiderās Riccus uertit: minūs (q̄. s. inflā-
 mata sint) calidi: id quod à Paulo^f clariū exprimitur, atq̄; id quod dictū est, cōfirmatur. Vt
 q̄ nō penitus hoc in tumore caliditate abnegat: uerū nō tātam, quantā carboni inesse cōspici-
 mus. Quare ait ἡ χῶρις θερμότητος τοσούτης hoc est: absq̄; tāta caliditate q̄ta. s. carboni-
 bus inest. Nec aliter Aetius^g, uel alius quispiam, aut ipsa etiam experientia docuit.
 QVAMOBREM speculatione dignum est, An inter calidos, an potius inter non calidos
 40 uel si mauis dicere frigidos tumores connumerandus cancer sit (cum hoc loco Principis diui-
 sionem interpretari intendamus) Omne. s. Apostema, & Pusula seu Bothor aut est calidū,
 uel nō calidus

n. in declaratione
 tumoris 16. et tr.
 sequenti cap. 11.
 com. 2.
 o. libro. 5. cap.
 26. sec. 26. usq̄;
 ad finem capitis.
 p. infra cap. 15.
 tex. 8.
 q. lib. 2. Iatrapo-
 logie cap. 2. et. 3.
 r. cap. 16. cō. 5.
 6. 7. 8.
 s. tr. sequenti cap.
 15. com. pri.
 t. infra cap. 9.
 tex. 2. et. x. et cap.
 10 tex. 3

u. lib. de tumori.
 præ. natu. cap. 8.

x. lib. 5. cap. 28.
 sec. 2.
 y. tr. sequenti cap.
 15. tex. 2. et cō. 2.
 z. tr. sequenti c. 16
 Limani error.
 a. p. prognost.
 cō. ult. uerjus f. nē
 b. 3. de rōe uic.
 acut. cō. 60. infi.

c. 4. eiusdē cō 95

d. 2. eiusdē cō. 19.
 e. 2. apbo. cō. 11.

f. lib. 4. cap. 26.

g. lib. 14. c. 58.

Cancer an ca-
 lidus tumor,
 uel nō calidus

aut non calidum & cuius ratione & omnes alias distinctiones uestigamus, ut ad hanc reducere demum ualeamus.) Princeps enim inter frigida apostemata, & primo quidem libro ^b (uelut infra quoque demonstrabimus ⁱ) & praesenti ^k etiam connumerauit : secutus (ut uidetur) & Razem, ^l & Serapionem, ^m atque ipsum pariter Halyabbatem. ⁿ Qui quidem omnes in frigidorum (prout uocant) apostematum catalogo connumerarunt. Cuiusmodi opinionis Galenum extitisse cuius in eius dogmatibus alumno apparet. Adeo ut huic subscripsisse praedictos barbaros authores suspicandum sit. Namque hic ex melancholico interdum succo, naturali inquam, & ueluti sanguinis faece existente: nulla de praeternaturali, adustoque mentione facta, cancrum genitum esse innuit. Quemadmodum secundo ad Glauconem ^o legere possumus. Interdum uero non aliud uelle uisus est, quam uis atrae bilis ab humore melancholico differentiam, a nobis infra ^p fusius declarandam, tetigerit. Perinde atque in methodi medendi uolumine quartodecimo ^q perpendi potest. Vbi an ex melancholico naturali que succo, an ex ipsa praeternaturali atraque bili huiusmodi tumor fiat, nil profecto determinauit. Quinimmo ad melancholicum potius humorem eius uerba tendere apparent. Id quod clarius libro de atra bili patet. ^r Vbi licet inter hos quidem succos differentiam fusius explicet: Ex melancholico tamen humore cancrum fieri, calidumque non esse protulit. Quo posito, faciem uidelicet sanguinis, melancholicum uel succum dubio procul frigidum & siccum, huiusce tumoris causam existere: inter frigidos tumores reponendum esse cancrum affirmabimus. Verum Galeni uerba non ex aliorum phantasmatibus, at ex suismet alibi praescriptis uerbis interpretanda sunt. Libro enim de tumoribus praeternaturam ^s non ex melancholico, naturali que succo: at ex atra bili, assataue, ac praeternaturali iam reddita, cancrum gigni: uelut ex illo scirrhum determinauit. Qua de causa Galenum sibi met ipsi conformem reddere cupientes, ^t non secus ex melancholico succo cancrum, quam ex laudabili, symmetraque, ac optimo sanguine exquisitam fieri phlegmonem dicturi sumus. ^u Tanquam si ex termino a quo, & prima defluenteque materia. Quoties. n. ad affectum locum sanguis quomodocumque temperatus, ac laudabilis existens effluxerit: ibique aceruatus iam fuerit: statim alterari, & calidiorē hunc fieri, quam pro natura extiterit, necessum est. Quadere & ex optimo, ac temperato sanguine phlegmonem generari: & ex calidiori quam pro natura fuerit, uerissimum est. Ex optimo inquam defluente: Ex calido uero iam fluxo, atque ad affectum sedē acruato. Sic igitur & ex melancholico nonnunquam succo fieri cancrum: Ex quo tamen adusto atra bilis effecta est: uel hoc iam fluere exordiente uerum est: Et ex ipsa atra bili: in qua, alicubi astrictus, aceruatusque donec ferueat, humor ille melancholicus conuersus iam sit. ^v Nonnunquam uero atram bilem humoris aut succi melancholici nomine ostendit. Quāobrem & melancholicum succum (tametsi cuncta garruli traductores aliquando confundunt) ueluti genus ad utrumque interdum distinxit: naturalem. scilicet quē generis nomine uocamus, & praeternaturalem, adustum uel quē peculiari nomēclatura, Graecē μελαίναν χολήν, latinē atrā bilē nūcupamus. Veluti & humorem ipsum melancholicum naturalemque, atrae bilis uoce nonnunquam ^x nominibus quod abutens manifestat. Qua Galeni contradictione sedata: uisumque atrā bilem uerē cancri causam esse: Huius profecto humoris temperamentum, an. scilicet calidum, an frigidum sit, uestigandum adhuc remanet. E cuius notitia ipsius quoque tumoris temperatura elucescet. Dignum namque speculatum id est: quoniam licet ex Gale. atque ipsis barbaris, Raze inquam, Serapione, Auicē. & Halyabbate inter frigidos tumores apostemataue computatō cancer sit. Paulus ^y tamē inter calidos tumores connumerare maluit.

Ab=

- huius. n. expleta curatione : Sic ait² Cum de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur disputatum sit: iterum de contrarijs agemus: Ab eo, quod Græcis οἱ δὲ καὶ dicitur, exorsi. & c. cuiusmodi opinionis Aetium^a quoq; nec non ipsum fortassis Celsum^b extitisse opinor: Cum inter calidos tumores ipsi etiam annumerarint. Hæc autem diuersitas nō ob aliud enis-
 10 nisse, q̄ ex uaria, penēs atræ bilis temperamentum, opinione liquet. Etenim Galenus non humorem modò melancholicum frigidum esse ac siccum reputauit: uerum & ipsam pa-
 riter atram bilim. Enimuerò non solum absq; feruore (ut de tumoribus præter naturā lo-
 quens dicebat^c) uel non calidam (ut libro ipsimet atræ bili dicato^d) sed frigidam quoq; ac
 siccam esse, quæ cancrum produxerit, atram bilem, de morborū differentijs uolumine^e de-
 terminauit. Quod in uniuersum de atrā quoq; bili in libro de potentijs naturalibus secūdo f
 (ut quartam qualitatum combinationem in ipsis humoribus inueniret) utranq; nigri succi spe-
 ciem, naturalem. s. atq; præternaturalem atræ bilis nomine intelligens, pronuntiauit. Ali-
 quantulam nihilominus illi caliditatem alibi^g attribuens. Sed quæ ipsius temperamētum ad
 20 calidum conuertere nequeat: quā ait. Frigida quidem est, quia terrestris: Sed caloris non
 expers: quemadmodum & cinis, & acetum. Paulus uerò^h calidum esse hunc humorem,
 qui uidelicet cancrum (de quo impræsentiarum sermo est.) efficit, arbitratus esse uidetur.
 Cui proculdubio & rationē suffragari comperimus. Quoniā atrā bilis, præternaturalis hu-
 mor est, & nō nisi in corporibus præternaturā affectis (Galeno et didascaloⁱ) reperitur.
 30 Succī uerò oēs, nedum atrā bilis (eodē alibi authore^k) nō eandem habent speciē, quā animās
 naturæ opera regitur qualem quā præternaturam se hēt sæpē exhibēt. Quippē quæ flaua
 est, efficitur uitellina. Ita. n. noīant, quoniā ouorum uitellis tum colore, tum crassitudine sit ad-
 similis. Est aut flaua (prout idem post aliqua subiunxit) tenuis, humida, & fluida. Quæ aut
 ad ultimum excocta est, ignea, & crassa uitellis ouorum similis euasit. Sic & nigra lōgē ma-
 lignior ea quoq; q̄ quæ naturalis est, redditur. Nomen tamen tali succo nullū est inditū: Nisi
 q̄ aliqui uel radentem eum, uel acidū appellarunt: quoniam. s. acris in morē aceti fit: & cor-
 pus animalis radit, et terrā, si supra eam sit effusus: quandoq; cū bullis ueluti fermentationē,
 ebullitionemq; excitat. Vbi. s. adscititia putredo nigro illi succo naturaliter se habēti accessit.
 40 Mihiq; uidetur ueterum medicorū pleriq; id quod ē tali succo naturaliter se hēt, quod & in-
 frā deijcitur, & sæpē supra fluitat, atrū uocare succū, & nō atrā bilē: Quod uerò ex ustio-
 ne quapiam, ac putrescentia in acidam migrauit qualitatem, id atram nuncupare bilē. Quem-
 admodum igitur (ut postea subiunxit) flaua bilis, tenuis q̄dem, humidaq; & fluida naturalis
 est: quæ uerò ignea & crassa, uitellisq; ouorū similis euasit, præternaturalis. Pari modo &
 nigrorū succorū, quod nōdum illā ueluti ebullitionē fermentatinēq; terræ efficit, est naturale.
 Quod aut in talē mutatū est uim, ac spēm: id iam præter naturā est. Ceu quod ex ustione nō
 naturalis caloris acrimoniā adsciuerit, ac ueluti cinis qdā sit redditū. Sic quodāmodo & sæx
 usta à nō usta dissidet. Illa nāq; admodū calida est, adeo ut carnē urat, liquet, ac corrumpat.
 Altera quæ nōdū est usta ad omnia medicos uti depræhēdas, ad quæ terra figulari, alijsq;
 quæ simul siccādi, ac refrigerādi facultatē habēt. Hætenus qdē Galenus. Egbus porrò uer-
 bis calidā esse atrā bilim patet: quēadmodū sæcem ustā, ob acquisitā caloris acrimoniā, esse
 40 ait. Ad eò ut carnē colliquet, & corrūpat. Non ustam uerò frigidam & siccā posuit. Quā ob
 rē ubicūq; atrā bilim describit Galenus, differētiās inter ipsam, & hūorē melācholicū adiun-

z. ibidem cap.
27. in prin.

a. libr. 14. cap.
57.
b. lib. 5. cap. 28.
sec. 2^a.

An atrā bilis
calida uel fri-
gida.

c. cap. 8. in prin.
d. cap. 4. post
medium.

e. cap. 12. uersus
finem.

f. c. 9. post prin.

g. 3. de sympt.
causis cap. 2. uersus
finem.

h. lib. 4. cap. 26

i. libr. de atrā bi-
le cap. 3. & 4.
& in fine libri et
14. methodi c. 9.

k. 2. de poi nas-
turalibus cap. 9.
circa medium.

gens: hanc feruescere, ebullitionemq; ac fermentationem quandam excitare, quin & corpus radere ait: Adeo ut nullum animal, ne ipsæ quidem muscæ, aut mures, gustauerint. Id quod me hercle non ob eius frigiditatem, aut acorem cōtingit, cum acetum conopes, pluraq; animalia non odorent modò, sed gustent: uerum ob eius acrimoniam, & salsedinem, aut amaritudinē tali aciditati subiectā: præsertim quæ ex bilis combustione fit, de quo tamē sapore, ac ratione ab eo sumpt^m, sequenti commento uberiùs declarandum. Melancholicū uerò fæculentumq; humorem, ubi ampliùs incaluerit, aut propter putredinem, aut febrē phlegmonodem, nigram efficere bilim uoluit. ¹ Nam ueluti naturalis insitiue caloris *μετρία*, mediocritas ue, aut moderantia sanguinis generandi causa est: Ita & eius *μετρία*, hoc est immoderantia reliquorum (Galeni etiam dogmate^m) succorum generationē efficit. Immoderantia inq;: Vt eius à mediocritate defectus, pituitam: Abundantia uerò, bilim: Maior autem sufficiensq; excessus, atram bilem (eodem alibi authoreⁿ) producat. **H A V D** quidem quia diuersi fortasse calores horum causæ sint: quorum unus deficiens, qui. s. pituitam: Alius uerò excedens, qui amarā bilim: Tertiusq; ab ijs distinctus, qui atram bilem: Quartus, qui melancholicum succum: Et quintus demum, qui sanguinem generit. Verum unus idemq; numero calor est, qui omnes insimul hos humores, præsertim qui naturales sunt, maxima ex parte producit. Maxima inq; ex parte: Interdum. n. ex pituita sanguinem: deincepsq; ex hoc bilim: ex qua deniq; atram generari possibile quidem est: itaq; contingit: Maxima tamen ex parte humores præsertim naturales insimul generantur: quanuis præternaturales seorsum, ac uarijs temporibus fieri sæpenumerò contingat. Qui nihilominus tam naturales, q; præternaturales succi, ob partium materiæ diuersitatem ab eodem numero calore generantur, atq; harum partium relatione, & diminutus, & superflus dici potest. Respectu uidelicet eius partis, ex qua pituitam gignit, diminutus: Respectu uerò sanguinis, uel eius portionis, ex qua sanguinem produxit, moderatus: Quemadmodum aliarum partium comparatione ex quibus. s. & amarā bilim & atrā efficit, excedens: Magisq; respectu atræ bilis, q; amaræ. **I L L I V S** autem partis relatione, ex qua quidem generare humorem propriè melancholicum solitus est, etiam (penès Auicennæ^o decreta) moderatus. Quanuis Galenus hanc distinctionem non tetigerit. Vt. s. calor melancholicum succum producens temperatus: atram uero bilim generans, immodicus superabundansq; existat. Verum omnes præter sanguinem succos ab ametro immoderatoq; calore generationem suscipere scripserit: ^P sub atra bili melancholicum quoq; succum intellexisse uisus. Vt utriusq; humoris, atræ. s. bilis, atq; melancholici succi excedentem calorem causam existere significet. Quam tamen, inter Auicennam, & Galenum, repugnantiam soluere difficile me hercle non fuerit: Hoc præassumpto: quod calor bifariam excedens esse potest: Vno quidem modo, ut tenuiores partes resoluens, crassioresq; intereā magis indurans naturalis tamen adhuc existens. Aliter uerò ut comburens, ac præternaturalis iam siue putredinalis igneus ue redditus. Quemadmodum si quispiam igni decoquēdas, assandas ue carnes uerubus affixas admoueāt: quæ lentē aliquo paulatim ac modestè reuolente decoquantur: temperato quidē calore decoctas fuisse has (siquidē opportunè ac decenter assatæ sint) proferemus. Bifariam uerò excedentem extitisse ignem aliquādo pronuntiare possumus. Interdum quia plusculum iuxta ignem commoratæ sint. Perindē atq; sæpenumerò

l. 14. meib. cap.
9. post prin.
m. 2. de pot. nat.
tural. cap. 8. circa
medium.

n. 2. de crisi cap.
12. uersus finem.

An idem calor
causa omnium
humorum.

An causa humoris
melancholici sit calor
temperatus.

o. p^a. pⁱ. doc. 4.
cap. 2. circa medium.

Gale. & Auic.
Contradictio.

p. 2. de pot. naturalibus
cap. 8. circa medium.

Calor excedens
dupliciter
Ex^m.

10

20

30

40

sæpenuerò mihi met ipsi aduenire, uel inuito, solet. Accersentibus uidelicet me interdum
 famulis ad prandium, cœnam'ue: qui tamen aliqua fortassis speculatione occupatus, seu uē
 triculi cruditate adhuc laborans, usq; adeò remorari solitus sum, ut egredeunti demum are=
 factas illas, ligniq; in modum assiccatas & prandenti, aut cœnanti offerant: meamq; mor=
 ram ne illos obiurgem famuli accusant. Nonnunq; uerò non meam ipsi moram causari pos=
 sunt: Verum ego potius illorum incuriam. Qui quidem intantum carnes igni proximas col=
 locarunt: ut non assiccarentur modò, Sed usq; adeò comburantur, donec nigrae fiant, atq;
 in cinerem ferè conuerti queant. Dupliciter igitur excedens, superflui'sue calor fuit: uel
 quia tenuiores quaspiam humiditasq; partes leuiter, ob superfluam remorationem, discussit:
 10 donec crassiores partes quasi induratae remanserint. Vel quia combustionem, & ueluti quā=
 dam in cinerem conuersionem effecerit. Ita quoq; ad propositum de insito, germanoq; no=
 stro calore dicemus. Qui uel in eundem cibum operans: Aliquas tamen partes imperfecte
 concoquens, ratione quarum diminutus est, in pituitam conuertit. Aliquas uerò adamus=
 sim, exquisiteq; ob illarum temperiem, & substantiæ æqualitatem, concoquit: atq; in
 sanguinē transmutat. Respectu quarum symmetros quidem moderatus ue dicetur. Non
 nullas itidem calor hic partes in sanguinem uertere, ob illarum terream naturam, nequit:
 uerum tamen id tantum agit, quòd tenuiores adhuc illarum portiones naturalis existens re=
 soluit: reliquum uerò quod superest crassum & terrestre est: quem humorem melancholicū
 uocare ueteres consueuerunt. Cuius comparatione calor & temperatus (ut Auicenna
 20 dicebat¹) & excedens, immoderatusq; (ueluti Galeni sententia fuit²) pronuntiari pro=
 culdubio potest. Temperatus quidem respectu remanentis partis terrestrioris, quem nūc
 humorem succum'ue melancholicum nuncupamus. Cum neq; hic diminutè concoctus sit,
 ut ulteriori coctione in temperatum sanguinem uerti sperandum sit: neq; adustus, ut ama=
 ra, uel atra bilis. Quòd si formam suam temperatam calor innatus minimè impresserit: ob
 materiæ uitium, atq; inobedientiam euenisse, uel rudibus compertum est. Qua ratione di=
 minutum quoq; calorem dixisse absurdum non est. Excedens tamen immoderatus ue idem
 calor considerari potest: quatenus tenuiorum partium non coctionem, sed resolutionem ef=
 ficat. Superfluius ergo, excedensq; est, quia resoluens, non autem comburens. Adeò ut
 medium geometricè, ac secundum latitudinem quandam esse conciliator existimarit.³ Ve=
 30 rumenim uerò secus de atrae bilis generatione proferendum. Cum immoderatus adeò super=
 abundansq; calor illius partis respectu sit, ex qua hæc genita est: ut eam combusserit, ad=
 scintillamq; calorem illi impresserit. Maior tamen ac intensior huius humoris q; ipsius ama=
 ræ bilis relatione, calor esurit. Quin (si rectius perpendere uelimus) putredinalis quidam
 extraneusq; iam factus calor huiusce generandi humoris causa existit. Quin uidelicet præ=
 ternaturaliter dispositum corpus est. Quam obrem & antea iam ex Galeno prædictū fuit⁴
 in corpore secundum naturam se habente humorem melancholicum fieri: quemadmodum in
 corpore præternaturaliter disposito, atram bilim. Quòd uerò nonnulli, pro sedanda Prin=
 cipis à Galeno repugnantia, dicunt: falsam s. Principis literam: ac pro temperato, legen=
 dum esse, intemperatum: ut sic dicat & melancholiæ autem hypostasiuæ causa est calor in=
 40 temperatus & adeò rude est, atq; omnino à Principis intentione alienum, ut puerulis etiam
 liqueat. Cum ex templo in oppositum Princeps adiungat & Sed causa efficiens adustæ est
 caliditas,

q. p^a pⁱ. doc. 4^a.
 cap. 2. circa me=
 dium.

r. 2ⁱ. de pot. na=
 tural. cap. 8. circa
 medium & 2ⁱ. de
 crisi cap. 12.

s. differentia 32.
 §. 3^o.

t. fo. 89

Contra Car=
 danum.
 libro 3. contradic.
 19.

caliditas, quæ ab æqualitate est egressa. Id quod clariùs etiam iuxta mantini traductionem patet, sic uertentis. Porro atræ bilis efficiens, eius quidem quæ faculenta, & residens est, calor moderatus causa existit: Eius uerò, quæ uisita est, excessiuus quidem calor, qui limites æqualitatis transgreditur &c. Quomodo igitur calor immoderatus hoc in textu aptè legi possit, cuius uel minimo grammatico iudicandum omittimus, ad nostrum propositum reuersi.

Contra Galenum.

Tres rationes quæ pro Galeno dari possunt reprobantur.

CALIDA Migitur atram bilim ex dominio (tamen si partes aliquas crassiores, frigidasq; & terrestres continere inficias non ibimus) determinandam esse tuta quidem fronte affirmare. Quauis. n. terrestres illæ portiones mole quidem plures calidis existant (id quod fortasse Galenus animaduertebat: quum frigidam & siccam ipsam etiam uerè atram bilim protulit) Ab affectu nihilominus, qui in huiusmodi succo, aut quouis alio præualuerit, temperamenti quoq; dominium cognoscendum est. Qua ratione rhecoma, pluraq; huiusmodi medicamenta in calidorum, non autem frigidorum catalogo annumerantur. Deducta igitur larua, semotoq; nimio Galeni respectu, atq; amore (cum ueritas præcæteris obseruanda sit) Aptius quidem ab eo prolatum fuisse opinamur: Si calidam & siccam absolute atram bilim pronuntiasset (ac præsertim quæ ex uitellina bilis exustione, ipsa etiam uitellina acrior, facta iam sit) quam terrestrem, ac frigidam simpliciter proferre (ut sæpius fecit) uel etiam caloris non expertem aliquando adiungere. Haud. n. prima, radicalisq; melancholici humoris temperatura consideranda hic est (si forte hanc perpendisse Galenum contenderis) At quam ex putredine, ac nimia superaffatione adepta iam atra bilis est. Namq; ob aliud non differt atra bilis ab humore melancholico: Nisi quia exusta, & superaffata hæc est: Ratione cuius quidem ustulationis plurimi effectus insequuntur. Quartam igitur qualitatum combinationem uestiganti, frigidam uidelicet & siccam: satis superq; fuerat in humore melancholico repperisse. Nec oportuit atram bilim, inter calidos & siccos humores reponendam, admiscere. Quod si hanc adscititiam esse caliditatem, atq; accidentalem contenderis, frigidumq; ipsius radicale, ac primum temperamentum unà cum Galeno insliteris. Nihil id esse respondebimus. Etenim quis accidentalis, tum putredo, tum affatio ipsi melancholico humori, sanguiniq; ac bili (ex quibus perse solis, aut mistis fieri solet) omni abiecto scrupulo existat. Ipsi nihilominus atræ bili, ut atrabilis est, formalis, atq; essentialis inest. Cum non ob aliud, q; ob putredinem, adustionemq; ab ijs, ex quibus genita est, differat. Quomodo ergo pituita putrens calida est, & specie ab ea, quæ secundum naturam se hæt, frigidaq; est, differt. Ita & nigra bilis ex combustionem iam, putredineq; facta, calida est, specie à naturali, melancholicoq; succo, nedum sanguine, atq; amara bili, nec non pituita proculdubio differens. Sed quid opus est uerbis? Nonne Galenus (prout antea quoq; retulimus) non eandem seruare speciem succos, qui secundum naturam, & qui præternaturam dispositi sunt, asseruit? Perinde ut ergo sanguis, quum putrescit, uel aduritur, non amplius sanguis est: Sed ex parte, amara, ex alia uerò atra bilis: Ita & exusta flaua bilis in uitellinam, alterius inq; speciei (Galenomet erudiente) conuertitur: Ipseq; etiam succus melancholicus, aut uitellina bilis, quoties in atram permutantur. Et ne in re adeò manifesta implicemur. An eiusdem speciei lignum est, & cinis? An itidem uinum, & acetum? An pituita salsa, & naturalis (ex cuius partis putredine, atq; exustione factam esse Galenus ostendit) idem specie

u. ut. 3. de symp. causis cap. 2.

x. 2. de pot. naturalibus ca. ultimo.

y. fo. 89.

z. 2. de pot. naturalibus cap. 9. circa medium.

a. ubi supra

b. 2. de differentiis febr. cap. 6.

specie existunt? Et demum quod corrumpitur, & id, in quod corruptum permutatur, quod est, qui specie differre non affirmet? Atram igitur bilim, atque humorem melancholicum specie differre audacter, intrepideque, uel Galeni fundamentis, concludemus. (quodque ex peripateticorum dogmate specificam in humoribus differentiam inuenire, Apponensi declarante, non licet) Eo praesertim Galeni dogmate ad memoriam reuocato, quod tam simplicium, quam compositorum temperamenta ipsorum formae substantiales sunt. Calidam autem atram bilim: ueluti humorem melancholicum frigidum esse determinauimus. Idcirco quae admodum caliditas, & frigiditas specie abinuicem distant. Ita & quae proprio, essentialique temperamento calida, & frigida existunt. Quibus de causis diuersos specie morbos prodigunt. Illa etenim cancrum, dolorosum quidem affectum, tam sine ulcere, quam si una cum ulcere corrodat, & mollientibus agitandum potius, irritandumque (Galenus quoque testimonio): Hic uero scirrhum, sensus quidem, non doloris modo penitus expertem, si quidem exquisitus (ut de utroque intelligimus) existat, ac firmum, & mollientibus cedentem generat. Sed cur frigidam atram bilim excogitare possumus, si non saeuissimam modo maniam a melancholia plurimum differentem efficit: uerum & omnium grauissimam phrenitidem (Paulo docente) producit. Quas obres (ut ad id, unde digressi iam sumus, conuertamur) inter calidos tumores, haud quaque uero inter frigidos connumerandum cancrum recensemus. **PRINCIPIS** & interea sententiam deridentes: ex congelante nonnunquam frigiditate posse atram bilim suae generationis initium capere, dicentis: Ex eo fortassis decepti, quoniam Galenus saepenumero nigrum fieri sanguinem ob frigefactionem declarauit. ^b Qui tamen ita subiungit: sanguis solus per se ob refrigerationem nigricans, tantum abest, ut splendorem ullum acquirat: ut etiam eum, quem ab initio habuit, amittat. Sed atra bilis uel sanguine ipso splendidior est: quemadmodum mortui maris bitumen, quod iudaicum uocant. Neque enim instar grumi ex refrigerato, sed immodice assato sanguine fit atra bilis. Vnde & lucidum splendorem obtinet, & feruet, ueluti quidam cinis &c. **NE** C minus aliam Principis phantasia negligemus, qui ex assata pituita fieri atram bilim adiunxit. De qua tamen infra, ne in superfluum, nimisque excedentem omnino tumorem id commentum reduxerimus, longiori sermone disputandum reseruauimus. **HIS** ergo omnibus adamussim, atque (ut oportet) exquisitè pensitatis, quaedam Pauli, Aetijque, quin & ipsius etiam Principis a Galeno discrepantia concordatur. Galenus enim ^m. n. χερὶς τὸν ζῆν, hoc est, sine feruore. Paulus ⁿ autem, ἐκ μελαίνης χολῆς ζέουσας, quod est: ex nigra bili feruente, cancrum generari protulerunt. Cui quidem Paulo tum Aetius, tum ipse Barbarorum Princeps ^p subscribere uisi sunt. Galenus namque χερὶς τὸν ζῆν, Id est, absque feruore praesenti: quia iam ferbuit sanguis, aut bilis, humor uel melancholicus: unde atra quidem bilis originem suae generationis assumpsit. Nam actu iam feruens haec, anthracem (prout antea quoque praescriptum est) efficit. Paulum autem, ἐκ ζέουσας, hoc est, feruente atra bili cancrum fieri dicentem: Vel in fine ipsius feruoris, quia scilicet ferbuerit, intelligendum est (quanuis enim praesentem feruorem graecum participium significet: non adeo tamen in grammaticorum subtilitatibus semper immorandum, ut sententiam aliquando uerborum neglexerimus. Cum tempus pro tempore non grammatici modo sed communis quoque, ac uulgaris loquendi modus usurpet). ² Vel debilem feruorem uoluisse opinandum est: quem

quidem

c. Concili. diff.

29. § p^o. in mediod. p^l. de usu par

tū cap. 9. & 2.

meth. cap. 6. circa

finē. libro de mul

titudine cap. 3. &

libro de usu respi

rationis uersus fi

nem. 5. de locis af

fectis cap. 7. ante

mediū. & saepe.

e. 5. simplicium

ca. 8.

f. libro 3. cap. 6.

Cōtra Auicē.

g. p^a. pⁱ. dos. 4.cap. p^o.

h. libr. de tumo.

praeter naturam

cap. 7. & 2. pro

gnost. 47. & 3.

de sympt. causis

cap. 2. uersus finē

& alibi saepe.

i. ubi supra de

sympt. causis.

k. ubi supra

cap. p^o.

Cōtra Auicē.

l. tr. sequenti cap.

15. com. p^o.

Cōtradictiōis

solutio.

m. de tum. praes

ternat. cap. 8.

n. lib. 3. cap. 26.

o. lib. 14. ca. 57.

p. tr. sequenti cap.

itex. 2. 6.

q. fo. 85. 8

Solutio. p^a.2^a.

quidem atra bilis (Galeni etiam documento) corrodens in terram effusa, nedum in anima
 lis corpore facit. Quem adhuc feruorem Galenus nequaquam abnegasset: quanquam illum interea
 penitus excluderet, qui in anthracis materia febrem, ingentis feruoris ui, necessario indu
 cente, reperitur.³ Vel demum ut à Galeni phantasia prorsus alienum Paulum, pariterque
 Aetium, & Principem condemnare opus fuerit. Quod ultimum tanquam magis impium omni
 nino, alijs duabus responsionibus electis, respuerem. Ex feruente igitur atra bili: quæ
 sferbuit iam, atque feruoris ui genita est, cessante nihilominus feruore, aut saltem non adeo
 uigente, ut febrem (perinde ac in anthrace consuevit) excitaret, cancrum fieri pronun
 tiabimus. **Tumor duodecimus.** Quo me hercle intellecto ad duodecimum à Galeno descriptum tumorem pertra
 sse tempestiuum est. Quam ueluti greci γάγγραιον, sic latini quoque, nomen ab illis ca
 pientes, Gangrænam appellant: Barbarolatini uero cancrænam, Razes^r anacram qua
 si græcè γάγγραιον .i. mortificationem, Alijque chiphroniam (perinde ut alibi etiã diximus⁵)
 nuncupant. Magnas hæc inflammationes, præsertim ex crassiore, prauoque sanguine ob
 ortas, maleque curatas, æquè ac proles insequi non infrequenter consuevit. Cui deinceps
 & alius (quem ordine tertiumdecimum collocauimus) tumor plurimum succedere solitus est.
Tumor 13^o. qui σφακελος quidem græcè, latinè autem sideratio, corrupteque à barbaris ascachillos, seu
 sphacelos.
 De quibus nomi
 nibus uide plura
 libro .2. iatr. apol.
 gie cap. 2. c. 3.
 qui σφακελος quidem græcè, latinè autem sideratio, corrupteque à barbaris ascachillos, seu
 askakilos nominatur. Potissimumque tunc is etiam aduenit: quoties negligentior, nimis ue mi
 sericors, aut ignauus medicus gangrænam curaturus institerit. Quauis autem non alius
 uerè morbus: at idem sit, qui ab initio exorsus est. Ob diuersa tamen, quæ præsefert,
 symptomata, non aliter sideratio à gangræna, quæ hæc à phlegmone distinguenda proculdu
 biò uenit, præsertimque clariorem doctrinam intendentibus. Quam obrem si tertium quoque
 mortificationis gradum à prædictis secernere unà cum Principe libuerit: quem si ipse es
 omenon uocat^t in graue profectò peccatum non cecideris. Verum de his uberius quidem
 loco proprio. Impræsentiarum namque Galeni duntaxat sermonem percurrere certum est, quò
 tumorum materias uestigaremus. A sanguine igitur maxima ex parte, uel crasso, uel
 nimium praua qualitate infecto, aut fortassis utraq; ex parte noxio, tum gangrænam, tum
 ipsam quoque siderationem fieri compertum est. **Tumor 14^o.** Mox deinde Galenus quartumdecimum
 Erysipelas. tumorem describit ἐρύσιπelas græcè uocatum, à latinis uero, præter Celsi sectatores, ignè
 sacrum. Celsus .n. græcorum nomine usus, erysipelas hunc nominat: "duplicem interim
 ulcerati herpetis speciem ignis sacri nomenclatura (prout uidebitur^x) innuens. De quo sta
 tim ac ab erysipelate expediti fuerimus, lucidioris quidem doctrinæ gratia loquemur, quæ
 unà cum erysipelate Galenus de ipsis quoque herpetibus sermonem peregerit. Erysipelas
 ergo quod Serapio,^y ipseque etiam aliquando Princeps^z arabicè almeffire nuncupant: Bar
 barolatini autem, corrupto quadantenus græco nomine, erysipillā uocant: Duplex, æquè
 atque alij etiam tumores, existit: exquisitū inquam, purū ue, ac non exquisitū, & impurum.
 Sed ne intelligas quidem exquisitum erysipelas (prout nonnulli machinantur) illud duntaxat,
 quod ulceris omnino expers est. ut ulceratum, non exquisitum atque illegitimum, ex illorum
 placito, appelles. Verum illud exquisitum (Galeni dogmate) nuncupandum uenit, quod
 ex sola bili, siue naturali, siue non naturali, suæ generationis originem sumit. Non exquis
 itum uero illegitimum ue, seu impurum quod ex bili, non sola, sed alijs humoribus admista
 fit. Quade causa non simpliciter erysipelas: uerum erysipelas inflammatum, aut ædema
 tosum,

tosū, uel scirrhusū nominari à medicorū cætu consuevit. Vtrunq; autē exquisitū .s. et nō ex
 q̄sitū ulcerari, et ulceris expers esse, potest. Quod .n. ex flaua, naturaliq; bili, multoq; ma
 gis quod ex hac aliquatenus assata, ut nonnaturalis euadat, non adeò tamē, ut ī atram sed
 uitellinam potius bilim permutetur, generationem suscepit: promptē quidem ulcere uexa
 bitur: legitimūq; nihilominus, exquisitum uē erysipelas nominari potest. Nisi, quia alte
 ri morborum generi componitur, hanc ob causam illegitimum, & non exquisitum erysipe
 las dicere uelis. Id quod herclē ridiculum foret. Sic .n. uulneri nunq; exquisita phlegmone,
 ac legitima superuenire posset: q̄uis ex optimo, symmetroq; sanguine gigneretur. Quod au
 tem ex feruenti, tenuiq; sanguine, uel in bilim feruoris ui conuerso, aut bili sanguini ad
 10 mista, seu pallida ob serosæ humiditatis commistionem reddita, factum erysipelas est: cum
 non adeò talis humor acris existat, ut statim corrodat: absq; ulcere ad sanitatem perdurare
 facillimē poterit. Nec ita ruditer, ac sicco pede pertranscundum est: ut uisis Galeni dun
 taxat uerbis ad Glauconem directis, ^a ex tenuissimo feruentiq; sanguine, aut bili huic ad
 mista exquisitum fieri erysipelas, attico uultu, pronuntiarimus: Cum ex bili non sangui
 ne, multoq; minus ex duobus, bili uidelicet sanguini commista, exquisitum erysipelas fie
 ri, & Galeno, in sexcentis ferē locis, ^b & ipsi apertissimæ rationi, atq; rei naturæ con
 forme sit. Sed ne quorundam glossula sufficiens est, & tenuissimum, feruentemq; sangui
 nem & hoc est & bilem & interpretari: Cum uiolenta expositio sit: biliq; sanguinem quoq; tam
 libro de tumoribus præter naturam, ^c q̄ secundo ad glauconem ^d admisceat, statimq; id esse
 20 exquisitum erysipelas præstulerit, illegitima deinde, nec non exquisita erysipelata decla
 rans, ut phlegmosum, œdematosum, atq; scirrhusum: & ueram purāq; bilim herpetis po
 tius causam esse dixerit. Quas ob res quia uariis Galeni sermō, pluribus in locis, in tantū
 existit: ut ambiguos, & uel ebriorum instar titubantes, uel artificiosē, tanq; nulla peni
 tūs difficultas sit, sicco (ut aiunt) pede ad hodiernum usq; diem pertranscuntes interpre
 tes offenderimus: Operæ pretium fore duximus, singula Galeni loca perlibrando, sic in
 uicem harmonice concordare, ut sibi met ipsi Galenum conformem reddamus: Insimulq; hu
 iusmodi exquisiti erysipelatis, tam ulcerati, q̄ non ulcerati materiam, continentem uē
 causam pernouerimus. Itaq; ad glauconem secundo tenuissimum feruentemq; sanguinem,
 aut bilem unā cum sanguine calidiorem utrūq; q̄ oporteat, exquisiti erysipelatis causam
 30 esse innuit: Puramq; bilim, non huius, at herpetis causam existere declarauit. Idem ue
 rò pro parte in libro de tumoribus præter naturam ostendit: exquisitam .s. puram uē bilim
 herpetis: sanguini autem admistam erysipelatis generationem efficere. Pro alia uerò par
 te quodpiam diuersum ostendit: dum feruentis, tenuisq; sanguinis nullam penitus mentionē
 agens, quasi cambium quoddam redidit: bilim .s. cui sanies aquosa commista iam sit. Quam
 obrem duplicem quoq; ibi erysipelatis causam posuit: Alteram utrobq; locorum communē,
 sanguini uidelicet admistam bilim: Alterā uerò diuersam: hoc est bilim aquosæ saniei coniū
 ctam. Cuius loco, ad glauconem scribens, simplicem quendam humorem tenuissimum .s.
 feruentemq; insimul sanguinem posuit: Exquisitam interea, puramq; bilim herpeti propri
 am dedicans. Verum tamen sexcentis ferē alijs (perinde ac antea diximus) in locis ^e pu
 40 ram bilim exquisiti erysipelatis causam: non secus atq; sanguinem, phlegmones: & pitui
 tam œdematis: ac scirrhi, melancholicum succū, omni penitus abiecto scrupulo, supposuit.

Qua de

a. libro. 2. c. p.
 Cōtra Aca
 kiam & Fu
 chsium.

b. uide Paulo
 infra lin. 39

Cōtra Taga
 ultium.

c. cap. 10.

d. cap. p.

e. ut libr. de atra
 bili cap. 5. terij
 de morb. uulg.
 parte. 3 cō. 9. 13.
 meth. dist. 2. c. p.
 8. de decretis bip.
 & platonis circa
 mediū. 14. meth.
 cap. p. 2. 3. 17. se
 cūdi de differētis
 febriū cap. 5. lib.
 de rōe curandi
 per sangui. mis. 1.
 8. secūdi de cōpo.
 med. secūdi. loca.
 cap. p. sec. 10. se
 cūdi de crisi cap.
 12. & sepius meo

f. 14. meth. cap.
3. & 2. ad glau-
conem cap. 2.

g. ut ex. 14. me
tho. cap. p^o.

b. cap. 10.

i. lib. 2. cap. p^o.

k. cō. 6.

h. 2 de differē-
tiis febr. cap. 9.
et. 2. de crisi cap.
12.

Qua de causa & sanguinis missione, i. exq̄siti erysipelatis curatioe, medēdi methodos ueligi-
gās s̄ prohibuit. Quam tamē prohibuisse indecens proculdubio foret: siquē ex tenui, feruentiq̄
sanguine, aut bili sanguineq̄ cōiunctis, & calidioribus q̄ oportet existētibz, exquisitū ery-
sipelas originem duxisset. Pro tantæ igitur & quidem arduæ difficultatis enodationē sciē-
dum, exquisitum erysipelas omne ex bili suæ generationis principium obtinere, duplex tamē
esse: ueluti & duplex quoq̄ ipsa bilis existit: naturalis inq̄, & non naturalis, seu præ-
ternaturam. Anaturali ergo bili ex pinguiori, tenuiori; chili portione genita: cuius quis-
dem color flauus est, copiosiori tamen hac, q̄ oporteat, reddita, & ut uirtutem ad sui ex-
pulsionem incitet: in quopiam deniq̄ inbecilliori loco recepta, exquisitum erysipelas potiss-
imum fieri solet. Atq̄ huius quidem color suo (exquo factum est) humori conformis est: 10
ut flauum quoq̄ ipsum euadat. Hoc uerò intellexisse Galenum opinor, ubi ubi simplici-
ter erysipelas ex bili factum esse, absq̄ aliqua additione, uel scrupulo determinat. Atq̄
idipsum in ulceratum promptē conuerti & ratione prius coniectabile est, & experimento
demum confirmatur. Etenim calida & sicca iam ab initio, uel ante q̄ flueret, existens: bilis
ad locum deinceps affectum aceruata: ibiq̄ ascripta, & calidior, & siccior euadit: quā-
damq̄ ob excandescentem calorem, exustionem recipiens, ac magis igneam naturam: ero-
dere paulatim, atq̄ ulcerare (nisi refrigerantium medicamentorum ui retundatur) inci-
piet. Id quod si sanguini, aut pituitæ, uel serosæ superfluitati cōmisceatur: nō adeo prop-
tē (cum ab illis hebetetur) efficiet, Pariterq̄ si humori melancholico adiuncta sit. Quo-
modo igitur ulceratum non exquisitum fuerit? si ex flaua, naturaliq̄, atq̄ hac quidem pu- 20
ra, genitum est? Aliud uerò exquisitum adhuc erysipelas ex bili non naturali tamen pro-
duci (Galenī documento) solet. Atq̄ idipsum triplex iterum ex eiusdem Galenī monumē-
tis elegimus. Aut n. ex pallida gignitur: quæ ob aquosæ saniei cōmissionem, flaua nō am-
plius est. Idcirco neq̄ ut ab initio fuerat naturalis. Huiusq̄ tumoris color etiam pallidus
existit. Aut ex tenuissimo, feruentiq̄ sanguine in bilim, ob talis feruoris uim, conuerso.
3. Aut demum bili, cui non nihil sanguinis, & tenuis, & feruentis admistum sit: pari; ra-
tione in bilis naturam permutatum euelegiō fuerit. Quorum profectō primum libro de tu-
moribus præternaturam posuit h̄ quim bilim, cui sanies aquosa, hoc est serosa illa superflui-
tas admista sit, erysipelatis causam esse protulit: Secundum uerò ad glauconem scribens i
expressit: Cum ex tenuissimo feruentiq̄ sanguine huiusmodi tumorem gigni declarauit. 30
Tertium autem utrobq̄ nos docuit: ex bili admistum sanguinem habente, libro de tumoribz
absolutē proferens: Vtriq̄ autem, tam bili s̄ q̄ sibi iuncto sanguine, calidioribus q̄
oporteat, glauconis uolumine adiungens. Quibus quidem Galenī uerbis (ut necessarium
fore arbitror) pensitatis: Non ex sanguine, ut sanguis est, etiam bili commisto, erysi-
pelas fieri, longeq̄ minus (de quo ibi sermo sit) exquisitum proferre, uel Galenī sententia
debemus. Cum non ex sanguine simpliciter Galenus dixerit, sed tenui. Quoniam uerò
neq̄ id satis fuerat, cum ex tenui sanguine phlegmonem adhuc fieri (prout infra k̄ uidebis
mus) contingit. Hanc obrem non ex tenui modo sanguine: uerum tenuissimo inquit ac fer-
uenti etiam superadiunxit. Ob quem quidem feruorem, cum tenuissimus cruor existat,
cōbustus in flauam conuertitur bilim: Galeno met alibi h̄ testante, quod si supra modum san-
guis affetur, pars quidem eius tenuior, ac pinguior omnino in flauam conuertitur bilem: ue- 40
luti quæ

luti quæ crassior, in atram. Tenuior (dixi) pars in flauam, græcè ξανθὴν, conuertitur bilim. Falsum nanq; græcum Galeni codicē libro de febrium differentiis ¹ opinamur: ubi pro ξανθὴν & quod est latinè flaua & habet & ὀχρεὴν & hoc est & pallidā & flaua. n. est, tametsi ad rubrum magis, q; quæ flaua naturalis est, uergat. Vt flaua hæc obscurior sit. Pallida uerò nō putredine, seu combustionē fit, sed aquosæ superfluitatis (quæ serosam uocant) admistione. Quemadmodū à Galeno pluriès repetitum est. Idcirco & ξανθὴν & idest flauam, de crisi bus libro secundo ² incorruptè ab ipso met Galeno perlegimus. Alterius ergo libri ³ dictionē, de prauatā ēē, tā ipse Galenus, q; antiqua, nedū Leonici traductio cōfirmat. Nisi malis ὀχρεὴν .i. pallidā & uel (ut alij uertere apud latinos consueuerūt) croceā, largè pro ipsa flaua intelligere. Verū ad nos cōuertamur. Ex tenuissimo ergo seruētq; sanguine erysipelas, haud secus, ac ex optimo, symetroq; exquisitā phlegmonen gigni, nec nō ex humore melancholico cancrū generari præactū est, p unā cū Galeno intelligemus. Quauis. n. circa primordia statim, qui ad locū defluit, sanguis aliquandō extiterit: tenuissimus tamen existēs, ac seruens in bilim, uel in ipsis adhuc uenulis persistens, uel ad porulos quæ imprimū transuelans (necessariō, quia præter naturā extra uenas egreditur, corrūpendus ⁴) cōuertetur. Ocyusq; multo, ac promptius in eandem bilim permutabitur, siq; tē nō tenuissimus modō, ac seruens. Verū q; tate minimus, & multæ bili calidiorq; q; oportet, seu feruenti huiusmodi sanguis admistus sit. Illicō. n. atq; in aliquam partem defluens astringatur: in bilim permutabitur. Itaq; tam Glauconis, q; de tumoribus uolumen alijs omnibus locis appositissimè cōcordabitur. Semper igitur exquisiti erysipelatis causam, bilim esse firmo corde, præsentiq; animo proferendum est: uel naturalem, ut perfectē flaua. n: uel nō naturalem, seu præter naturam, Atq; hanc ipsam rursus trifariā genitam. Vel. s. ob admistionem serosæ saniei pallidam redditam: uel nuper ex tenuissimo seruētq; in simul sanguine genitam: uel deniq; ex eodem sanguine nō amplius seculo, sed feruenti quoq; calidiorū q; oportet bili admisto, effectam. Quarum extremarum color quoq; flauus, ad rubedinem procliuor, seu si mauis dicere subrubet est. Quamobrem secundo ad Glauconem duos ultimos erysipelatum modos duntaxat definiens nō pallidum, aut flauum simpliciter eorum colorem, ut in medendi methodo ⁵ expressit: uerū pblegmones respectu ξανθοῦ τερου, quod est flauorem ipsa phlegmone (quasi dicat magis a flauum, q; phlegmone uergens) ait: ac statim, eius inditum adiungens, colorem aspectu ξανθοῦ, hoc est rubrum, facillè tangente aliquo subterfugere, rursusq; illabi deternunauit. Vt qui eas duntaxat erysipelatis species intelligebat: quæ à non naturali, atq; ob sanguinis tenuissimi adustionem genita bili originem duxerunt. SED te admirantem ex tetrico uultu extensisq; inferiori labello, & fronte, ac demū contractis supercilijs conijcio: simul ac tam uarium Galeni sermōnem intellexeris. Etenim licet quatuor iam dictæ species erysipelatis sint: quarum prima ex naturali bile: Tres uerò reliquæ ex non naturali (ut pallida ob serosæ saniei commistionē reddita, uel similiter flaua, ad rubedinē tamen declināte, subrubra, ob tenuissimi seruētq; sanguis, siue solius, siue bili et admistæ cōbustionē effecta. Nihilominus tamē ubiq; iam ex proposito de erysipelate loquitur Galenus: ibi oēs enarrare debuisset: Nec adeo perplexus atq; incertus esse, ut hic unū, alibi aliud ostēdat. Vt secūdo ad Glauconē duabus speciebus positis, eā quæ ex flaua, naturaliq; bili, & alterā q; ex pallida fit omiserit. Quæ tamē ubiq; præ cæteris declarādæ atq; anteponendæ sunt, cū biliosus affectus

1 libro. 2. cap. 9.
Galeni locus.

in ut li. de at. a bil
cap. 2. uersus finē
& .10. simplic.
cap. 14. de felle. et
8. de deiectione bip.
et plato. post me
dium.

n cap. 12.
o. 12. de diff. feb.
br. cap. 9.
p supra fo. 88.

q ut ex sexti A
phorif. 20. habet
tur.

1 libro. 14. cap. 9.

Obiectio.

H esse

r cap. primo.

s cap. primo.

t. fo. 95. in fine.

Responsio.

Galenus excusatio
satio communis.

Nihil

u 14. meth. cap.
2. et 17. d. la
uco quoq; libro 2.
cap. 2.

esse huiusmodi tumor perpetim à ueteribus omnibus exclametur. Libro autem de tumoribus preternaturam, in quo etiam scrio de hoc, unà cum alijs tumoribus, loquitur, ex pallida bili factum, atq; etiam ex bili sanguini admisto erysipelas posuit: Illud interim negligens, quod ex flaua bili, perinde ac aliud, quod ex tenuissimo feruentiq; sanguine ortum habet. In quartodecimo autem de ratione curandi, ex pallida, nec non flaua, uel ex ijs mixtum erysipelas innuit: dùm scilicet de exquisito: intelligit: duabus alijs speciebus omnino sub silentio præteritis, ea uidelicet quæ ex tenuissimo, feruentiq; sanguine, atq; alia, quæ ex bili quidem, at sanguini calidiori q; oportet composita, gignitur. de quibus porro ad Glaucōnem secundo, et quidem solis, determinauerat. In alijs autem pluribus locis non sanguinis, nec simplicis, neq; misti, sed bilis prolem esse ipsum erysipelas (uelut antea prædictum est) omni penitus abiecto scrupulo supposuit. Hæc inq; sunt quæ non te modo, sed me quoq; ac alios fortè plurimos uehementer admirari cogunt: Adeo ut nisi Galenum, quodam possumus, reuereri debeamus, ueluti loquacem græculum, et ad pauca respicientem, sed perinde ut in mentem uenerit aliquandò scribentem, unà cum pluribus Galenomastigibus condemnaremus. Verum enim uerò non huiusmodi nostra intentio fuit sed singula peregrina mente perlibrare. deincepsq; præter id quod de Galeno sæpenuerò publicè et dicere soliti sumus, maximam partem contradictionum Galeni, ac uarietatum: quæquidem sibi inuicem appositè concordēs fieri, uel non sine difficultate, nequeunt: mirabile potius Galeni ingenium, atq; solertiam præferre. Vt qui non pluribus mēsis, aut annis (ut nos facimus) consumptis, librum ædebat: uerum ex postulantibus amicis, aut discipulis in dies (propè dixerim) uaria uolumina componebat. Quamobrem quod in aliquo loco, uel dimittente, uel non ita fortassis concinnè dixerit: in alio, quum sibi ex ingenij solertia occurrerit, adiungit, atq; exquisitiùs, et quasi priora dicta corrigēdo, satius explanat. Præter id inq; quod pro cōmuni ipsius Galeni excusatione proferre cōsueuimus. Hic quoq; quod magis piū est eligētes, nō absq; rōne sic scripsisse Galenū declarabimus. Etenim id prius supponere debemus, quod Galenus idē ait, duplex erysipelas esse, alterū, scilicet ulceratū, alterū uerò ulcere destitutū. Deinde quod ulceratū ē eiusdē generis cū herpete ab eo dūtaxat hūoris tenuitate differens existere. Hæc igitur de causa ulceratū sub herpete intellexisse prōptū erat: satis ergo superq; fuerat eā erysipelatis spēm definire (ubi ubi de herpete et loquitur) quæ ab illo differt: cuiusmodi nō ulceratū ē. Id autē ex tenuissimo, feruentiq; sanguine, aut bili admisto fieri potissimum scilicet. Nā quæadmodū quæ ab initio prius q; fluere exq̄sita bilis nō erat, calida qdē et sicca: uerum sanguinis adhuc naturā participās, ad locū uerò affectū desluēs, et acruata, qn et uniuerso ē in corpore feruēs in bilim exq̄sita, calidāq; et siccā permigrat. Ita quæ ab initio cōferatim exacta bilis fuerat, desluēs postea, et in unū cōgregata, intantum excādescit, aridiorq; fit, ut cōburere, atq; rodere citius incipiat: sicq; ulceratū euadat. Quas obres libro ad Glaucōnē, ubi unā de herpetibus loq; proposuerat, id genus erysipelatis omisisse certū fuit, quod per se notū erat, ac eiusdē generis cū herpete existēs, sub ipso qdē intelligi potuerat. Aliā quoq; speciem neglexit quæ scilicet pallida ex bili generationem suscipit, ut quæ maxima ex parte ob humoris tenuitatem, uel per sudorem egreditur: uel uestigas (quas græci phlyctenas uocant) generat: aut fortè per sensui abditum halitū discuitur. Quā tamē libro de tumoribus præternaturā, et de morbis curandis, tanq; aliquādo cōtingentē, adiunxisse sibi placuit.

Quadere

Quodere si rectè Galeni uerba ad Glauconem trutinari, ab eo scriptum non leges, Omne erysipelas ex tenui feruentiq; sanguine, uel bili admista fieri. At si ex tenuissimo feruentiq; sanguine fluxio fiat, uel bili ac sanguine calidioribus q; oportet mixta sit, erysipelas factū esse: quod. s. ab herpete differt. Idem quoq; in libro de tumoribus animaduertendum. In quibus etiam locis nunq; posse (cum admista defluxio sit) herpetem uocari nobis insinuat, ex quo nec herpetem phlegmonosum, aut scirrhosum, dicere debemus: Pariterq; non œdematosum, etiam si pituita sibi commisceatur: ut in miliari declarabimus. Verum quoties admista defluxio sit: Erysipelas potius, nuncupabimus, cui tūc phlegmonosum, tūc scirrhosum, tūc deniq; œdematosum, cognomina adiungere possumus. Libro aut de morbis curandis: ubi curandi methodum, & ex ipsa morbi essentia, & suæ quoq; causæ cognitione, docere operæpretium fuerat, ad bilim, siue flauam, siue pallidam, seu ex ambabus compositam reducit. Quemadmodum quoq; ad Glauconem, quādo ad curationem descendit, idem obseruare perfacile est. In alijs ergo pluribus locis, & à bile huiusmodi tumorem generari, tanq; uerissimum simpliciter, & absq; alterius intentione, seu comparatione, prolatum esse determinandum. Paulus² autem, atq; Aetius⁴ unum duntaxat Galeni locum ponderasse uidentur: secundum uidelicet ad Glauconem. Quem tamen locū rectius à Principe q; ab illis, tā hoc libro, b; primo⁶ intellectū esse liquet. Hic. n. ex pura bili exquisitum fieri erysipelas confitetur. Illi autem uario modo Galeni uerba interpretantur. Si quidem Paulus duplex à Galeno positum erysipelas, absq; ullo cognomine, aduertens, Alterum, quod. s. ex tenui feruentiq; sanguine factum sit, i' dixit⁷ egov, Hoc est priuatum, & propriè erysipelas uocatum credidit. Alterum uerò quod ex bili, ac sanguine, calidioribus factis, conflatum est, nouo⁸ tegov, Id est cōmuniter, & non sic propriè nuncupandum erysipelas, uel Galeni sententia, reputauit. Minimè aduertens propriè dictum erysipelas ex bili, non ex sanguine, ut sanguis est, fieri. Quò posito à sanguinis missione absq; ulla distinctione curationem suam exorditur. De qua tamē infra⁴ uberiùs propriò loco repetemus. Nunc. n. tumoris tantū causas uestigare propositum est. Aetius autem magis hac in re perplexus fuisse apparet. Ut qui non eam speciem, quam Paulus, elegit: ut propriū erysipelas reputarit: quod. s. ex tenui feruentiq; sanguine conflatū est. At alterū potius, ex Galeni (ut opinatus est) sententia specie, tanq; uerā, ac propriā sumpsit. Quū uidelicet flaua bilis tenuior, & acrior facta (sic. n. fit, quoties calidior q; oportet euascri) unā cū sanguine ad aliquā corporis partē effluit. Aded ut mistum sit, quod exquisitū erysipelas esse debet. Videtur. n. nō in humoris puritate, ipsius erysipelatis exactam, exquisitam uē naturam intellexisse. at in eo quod per cutē tantūmodo, intacta carne, diffunditur. Neutiq; aduertēs id etiā phlegmoni posse nonnunq; competere (perindē atq; inferius ostendemus⁶) præsertim quoties ex symmetro ad tenuius tamen uergente, sanguine, atq; in raro secūdu hābitū corpore, inflāmatio fit. Flauā igitur, pallidam uē ab initio statim defluxus, uel anteq; etiā defluere inceperit, existentē bilim. Aut in quam tenuissimus, feruensq; sanguis, solus, seu bili quoq; calidiori q; oporteat coniunctus, in ipso fluoris tempore, conuersus sit, exquisiti erysipelatis causam esse, uel Galeni, nedū Principis monumento, concludamus. ILLUD interim sub silentio minime pertranscuntes, quod magnam posset coricæis difficultatem inducere. Nam si huiusce tumoris causa nonnunquā bilis est, cui sanies aquosa, hoc est, (ut exposuimus) serosa superfluitas, eius

Noti.

x. in declaratione
tumoris. 17. & in
fra com. 8. et cap.
8. com. p^o.

y. ut in omnibus
his quæ notauimus
supra fo. 95.
in fine i. margine.
z. lib. 4. cap. 21.
a. lib. 14. ca. 59.
b. infra c. 4. et 5.
c. 2. p. doc. p^a.
cap. 5. ante medi.
Cōtra Paulū.

d. cap. 5. cō. p^o.
Cōtra Aetū.

e. com. 6. & hic
fo. 102. notabili.
p^o.

Obiectio.

Hij acrimoniam

acrimoniam, sua frigidityte, atq; humiditate obtundens, admista fuerit: eamq; perinde ac etiam declarauimus f pallidam (Galenus quoq; testimonio) reddiderit. Hæc autem (Galenus) nonmet, & quamplurimis in locis demonstrante) tenuior q; flaua, ex qua herpetem fieri certum est, dubio procul existat: tenuiorem erysipelatis humorem aliquando fore sequetur q; herpetis. Id quod quidem admissum Galeno aduersaretur, eiusdem generis esse dicentib; erysipelas cum herpete: Verumtamen humoris tenuitate differre. Quoniam, s. tenuior herpetis, q; erysipelatis causa est. Quamobrem & illa ad cuticulam usq; pertransit. Est n. (ut ait) admodum tenuis humor, qui herpetem excitat: adeo profecto, ut non solum omnes interiores partes, quæ utiq; carnosæ substantia sunt, transeat: sed etiam cutim ipsam ad summam usq; cuticulam (ἐπιδερμίδα Græci uocant) quam solam, propterea q; ea remoratur, tum erodit, tum exedit: quando si hanc quoq; sudoris uice transiret, haudquaq; ulcus excitaret.

Respon. p.

l. infra com. 3.

k. 14. metho. cap. 17.

l. cap. 10.

m. cap. p.

Cui quidem haud negligendæ in Galeni monumentis repugnantia, licet promptum, atq; in manibus ferè omnium euestigio sit, proferre Galeni sententiam: Herpetis uidelicet materiâ tenuitate illam, quæ erysipelatis causa sit, superare dicentis, Maxima ex parte: ac præsertim in simpliciter dicto, generisq; nomine uocato herpete (de quo ibi, ut uidebimus, loquebatur) uerificari proculdubio posse. Quum uidelicet pura ex bili uterq; affectus originem duxerit. Qua de causa eiusdem esse tunc generis protulit. Secus autem fore, si alteri nonnunq; uel tenuiori, humiditati erysipelatis causa coniungatur. Aut in ipso fortassis herpete esthiomeno sermonem direxerimus. Nihilominus tamen bisariam adhuc Galeni uerba sedare, sibiq; inuicem congruentia reddere ualemus. Primò. n. eò refugiendum est. Quod de ulceratis potissimam erysipelatis, ab exquisita, purâue, ac naturali flaua bili obornis (quæ magis, q; quæ ulceris expertia sunt, genere cum herpete conuenire statim antea prædixerat) intelligens Galenus, humoris tenuitate ab illo superari adiunxit. Cuius uerba perlibrare facillimum est: Quum ait: Atq; huius quoq; magis etiam cum eo quod exulceratum est: Differt autem humoris tenuitate: Dictio. n. ab erysipelate: repetita in Græco Galeni codice non est, sed ab interprete adiuncta fuit. De ulceratis ergo loqui, nedum à syncera bili genitis erysipelatis præcipua ipsius intentio fuit. De quibus tamen libro de tumoribus præternaturalibus, non secus ac in secundo ad Glauconem, uerba fecisse non libuit. Verum sub herpete potius, cum eiusdem generis existant, intellexisse placuit. Quam ob rem de ijs dicitur: quæ ulceris expertia sunt, atq; in tumorem magis partem attollunt ibi sermocinans, bilim non exquisitè flauam, puramue (cuius nis ad erodendum, ulcerandumq; promptior esset) uerum aut humido sanguine, aut non humida modò, sed frigida quoq; serosa substantia obtusam bilim erysipelatis causam declarauit. Quæ non erodendo (ni plurimum comorata fuerit) at potius in tumorem tollendo, pro suæ substantiæ copia, ualebit. Ulceratum uerò erysipelas à calidiori, sicciori; insimul bili (cui mordendi facultas insit) principium suæ generatiōis obtinuit. Qua de causa uniuersam cutim, et carnis interdum nonnihil exedere consueuit. Herpes uerò frequentissimè cuticulam, raro autem ipsam subiectam ueramq; cutim (ut esthiomenus ab Hippocrate uocatus) intacta interim, penitusq; illesa carne, corrodens exulcerat. Secundò. me hercle, si exquisitiùs uestigaris, non indecenter dicere possumus, quod tametsi pallida bilis, ob serosæ substantiæ admistionem, tenuior effecta est, quam flaua (ex qua sero commista genita hæc est) prius fuerit.

Illius

Illius tamen respectu, quæ herpetem generarit, crassior adhuc remansit. Pro cuius intellectu supponendum est flauam bilim, perinde ac & alios humores, quin & singula quæ ad humanum corpus attinent, in puncto nequaquam consistere: at latitudinem aliquando etiam amplam obtinuisse. Adeo ut non semper flaua bilis eadem quantitate, mensura ue, aut tenuis aut crassa proferenda sit: Verum ponentibus nobis duos extremos terminos: ut duo. scilicet ut sex: intermedia erunt ut tria, ut quatuor, & ut quinq;. Ex ea igitur, quæ ad ultimum tenuitatis gradum flaua bilis peruenierit (ni per halitum sensui occultum digeratur) Herpes simpliciter nomineque generis dictus fiet. V. G. ex ea quæ ut sex tenuis extiterat. Ex alia uero tenui quidem adhuc, minus tamen quam prima: ut potest quæ tenuis sit ut quinq;, prope illam, quæ ad summum tenuitatis peruenit. Ad quem fortasse gradum & prædicta iam subtilissima bilis, ob aliquantulum pituitæ miscelam retracta est, Herpes miliaris producetur. At ex alia, quæ non adeo quidem tenuis est, uerum (prout antea retulimus) ut quatuor, Herpes esthiomenos generabitur. Quod si adhuc magis ab extremè tenui recesserit: ut quæ ad tertium usque gradum, multoque magis quæ ad secundum accesserit, adeo ut crassissima inter biles dicenda sit: non cutim modò, instar Herpetis esthiomeni, sed ipsius etiam tenuis membranæ singulis internarum partium circumdata (panniculum carnosum barbari appellat) substantiam subiectæque carnis extremam summamue superficiem erodendo interdum attinget: Erysipelas, atque id ipsum ulceratum quoque, fiet. Hæc igitur crassissima bilis, si quidem feri nonnihil ei admisceatur, subtilior, quemadmodum si dixerimus ut tria, uel ut quatuor euadet. Ex qua non ulceratum uel non sic citò, promptèque derosum erysipelas efficietur. Quamobrem nulli dubium esse debuerit tenuiorem, ob serosæ superfluitatis commissionem, quam antea fuerat, euasisse. Cum hoc tamen omnino stabit, hanc ea quæ herpetem causa sit, grossiorem: uel minus (si dixisse malueris) tenuem existere. Ob feri tamen eius acrimoniam obtundentis coniunctionem, non sic erodere, neque ad ulcus propere (nisi diutius, & absque præsidio comoretur) perdurare. Namque si ad extremam (illius instar quæ herpetem fecit) tenuitatem serosa hæc pallidaue bilis peruenierit: (id quod uel ob multæ feri admisionem contingit, uel quia non crassiori, sed tenuissima fortassis bili adiuncta compositaque serositas est) uescas potius gracæ φλυκταινας generabit. Aut forte per insensibilem halitum, aut per sudorem egredietur. Talis namque maxime est (Galenus ait) etiam quæ quotidie cum sudore exit. Quod si & hanc herpetis quoque causam fieri posse contemneris. Etiam si à Galeno præscriptum non sit: Nihilominus tamen id protulisse absurdum non est. Etenim pro uaria ipsius affecti corporis dispositione, præsertimque in carniū raritate cuticulæque interim ab exteriori fortassis occasione facta densitate, ac tenella nihilominus superficie, ab hac etiam uel minimum commorante, ueluti & à salso nitrosoue humore ulcus, erosionemque fieri impossibile non est. Quin sæpenumero contigisse conspeximus. Licet non sic ab initio statim ulceratus esse affectus hic soleat. Quemadmodum quoque de miliari (ob pituitæ admisionem) Galenus enarrat. Quadere si ex pallida etiam bili herpetem fieri posse concesserimus: eiusdem pariter generis cum erysipelate futurum esse dicemus: quod scilicet ex eadem pallida bili obortum sit. Differre tamen adhuc humoris tenuitate. Verum enim uero usque adeo, pro exactiori tum erysipelatis, tum herpetis causarum cognitione, præscripta iam, ad nauseam fortasse, hoc loco sint. Plura enim deinceps

Hij proprio

n. 14. meib. cap.
p. uersus finem.o. 14. meib. cap.
17. uersus medium.

Not^m. p^m.

proprio singulorum capite occurrent. Duobus igitur duntaxat prænotatis ad alterius tumoris sermonem commigrabimus. Quorum primum id est quod præ oculis perpetim habere operæ pretium est: cæteris inq; , quo ad corporis dispositionem, ac uirium robur, paribus uera hæc inueniri: & quantum ad humoris attinet naturam. Quicquid quò tenuior est, eò magis, & promptius ad exteriora transuolabit. Cum quo tamen in simul stare, congrue req; potest, ob intrinsecæ alicuius partis imbecillitatem, & erysipelas, & herpetem in uisceribus fieri. Prout in iocinore, ac pulmone, ipsoq; etiam cerebro compertum est. Quem admodum contra. Robustissimæ uires atrabilarium succum, ipsam uel atram bilim, ac uiscidam pituitam ad exteriora, cancrum, uel scirrhum, uel scabiem, lepram uel: quin & ipsas etiam uerrucas, aut quemuis deniq; nō exteriorem modò, sed cutaneū quoq; affectū gignituros crassissimos humores emittunt. Sicq; necessarium non esse liquet. Quia, s. magis intus retinetur, idcirco grossior succus causa fuit: Nec etiam contra: Crassior succus causa est, igitur in interioribus retineri debet: Similiter de tenui perpèdendum. His de causis maxima ex parte, & quantum ad ipsius humoris naturam attinet (quæ potissima diuersitatum causa est)

2^m.

Galenī sententiā uerificandam esse compertum est. Alterum uerò, quod pernotasse demum oportuit, est: in quo non paucos ambigere concipio. Quoniam, s. exquisitum fieri etiā erysipelas ex bili sanguini admixta, uel serosæ interdum superfluitati, pro Galenī etiam sententiā, nedum ueritate, præscriptum prius est. Præter id quod erysipelas inflammatum, uel inflammotio etiam erysipelacea, seu inflammatio & erysipelas dicitur. Quò igitur differūt

Du^o.

exquisitum, & inflammatum, seu aquosum erysipelas, siquidem illud quoq; bili admixtum aliquandò sanguinem, aut serum habet? Præterea si non simplex humor affectus causa est, cur exquisitum hunc genitum esse præscripsimus? Hanc obrem bili sanguinem commisceri

R^o.

Humores 2^r.
comisceri possunt. p^o.

posse bifariam intelligendum est. Altero quidem modo in minima quantitate, ut non naturalis bilis euadat. Quemadmodum serosæ quoq; superfluitatis portiuncula eidem adueniēs non mixtum ex aquoso & bilioso tumorem efficit: sed biliosum. Quæ tamen bilis ob illius admixtionem pallida euasit. Ita & minima sanguinis portiuncula bili permixta illam quadantenus à sua tenuitate, ac flauo colore in subrubrum deriuat. Quadere præternaturalem potius fieri bilim, q̃ duos inesse humores proferemus. Vsq; adeo namq; dominans bilis est, ut

sanguinem aut serositatem ad seipsam conuertat. In qua tamen actione repatiens ipsa ab exquisita quidem integrāq; propria natura declinat: ut non ampliùs naturalis reputetur. Quem in modum si centum amphoris uini amphoram aquæ quispiam admisceat: uinum adhuc purum dicere possumus. Ita & multæ bili minimam uel sanguinis, uel seri quantitatem sic mixtā fuisse nonnunq; continget: ut hi qui adiuncti sunt, humores propria symptomata minimè præseferant. Præsertimq; si tenuissimus, feruensq; sanguis ille fuerit, qui uel solus eue-

2^o.

stigio in bilim conuertere solet: Quantò igitur magis cum bili adiunctus est in eius ut dominantis naturam conuertere credendum est? Altero autem modo uel bilis sanguini, uel hic bili coniungi, admisceriq; potest, ut sua quisq; symptoma demonstrare palam queat: uel dominantia, uel alijs dominantibus subiecta, uel æqualia. Quorum nihilominus prima coniunctio, compositioq; quanuis purum, exquisitum uel humorem, atq; tumorem, penès physicè singula indagentes, minimè efficiat: Apud medicos tamen cuncta sensu uestigantes, exquisitum humorem, saltem præternaturalem redditum: atq; hinc exquisitum tumorem dicere incongruum non est.

non est. Verū enim uero de his infra^p (DEO Optimo Maximo permittente) Quicquid reliquum est, uberiùs determinandum reseruauimus. Impræsentiarum nanq; sat superq; fuerit erysipelatis continentem causam, bilim siue naturalem ut flauam, siue nonnaturale, ut pallidam, atq; subrubram pronuntiare. PERINDE atq; alterius quoq; tumoris, quem ordine quintumdecimum unā cum Galeno¹ connumerabimus, Herpetis inq; nomine generis absolute nuncupati Græci ἐρετα dicunt, causam bilim esse flauam, puramq; à Galeno² perlegimus. QVAM quidem & alterius quoq; ἐσθιομενίου ab Hippocrate latine exedentis, corrodentisq; nominati materiam pariter ab eodem edoeli sumus. q; illius q; dem tenuiorem (quadere cuticulam ueluti deurit tantum) Huius uero crassiozem, ac magis adustam (ex quo uniuersam quoq; cutim ad subiectam usq; carnem exedit) bilim esse protulit. TERTIAE autem speciei, Miliaris uidelicet, Græca κεχέαις, à multis post Hippocratem uocatae causam esse bilim aliquantulae pituitae admistam (Galenus etiam opinione) certum est. Quauis. n. aliorum esse opinionem libro de curandi ratione innuerit: At tamen tanq; rationi congruam adeo comprobauit, ut libro de tumoribus præternaturam non ex aliena amplius sententia locutus fuerit: uerum ex propria, sic dicens. φλέγματι μὲν οὐ μοι δοκεῖ μεμικχθαι τὸ τῷ οὐτὸν ἐκύμα. quod est, phlegmati quidem igitur mihi uidetur mistum esse talem defluxum. Quam obrem ad Glauconem quoq; scribens, haud temere miliarem herpetem ex bili minus calida, & acri, q; priores fieri protulit. Adeo igitur admistam bili pituitam intellige: ut ipsius bilis acrimonia quadantenus obtundatur: non tamen ut œdematosus affectus dici mereatur. Perinde ac antea iam declarauimus. Tres autem esse ipsius herpetis species & à nobis alibi præstatum est, & infra rursus, ubi ad propositum magis Auicennae sermo expositulauerit, uberiùs, ex ipsius met Galeni uerbis, demonstrabimus. Licet libro de tumoribus præter naturam duas tantum innuisse plurimis appareat, Essthiomenon uidelicet, atq; miliarem: eam interea (quam nomine proprii generis, absoluteq; herpete, libro ad Glauconem secundo nominari uoluit) penitus omittens. At satis quidem hoc in loco fuerit huiusmodi tumorum causas materiales uestigasse. Quod (ueluti statim ab initio notauimus) quod apostema, quis ue tumor calidus, & quis non calidus frigidus ue existat aperte cognouerimus. AD duodeuigesimum ergo tumorem permigresmus. Qui à Græcis ἐνιέρος, & ἐκλυγός, seu ἐκλυγώμα, latine autem duritia seu durities, aut aptius tumor durus: à barbaris uero, corrupto fortassis uocabulo ἐνιέρος, sephiros nuncupatur. Qui quidem & si unam eandemq; speciem tangenti medico præsefert: duplici tamen à causa, materiaue originem duxisse potest: crassa inq; glutinosaq; prius, dein uero sensim assiccatam pituita, uel sanguinis faeces quem antea melancholicum succum proprie loquendo nuncupari tetigimus, aut ex ambobus præscriptis humoribus admistā. Proinde tumores scirrhusi (alibi Galenus ait) omnino aut pituitosae sūt substatiæ, aut atrabiliaræ, aut ex utraq; misti. Qui tamen (ut uidebimus) colore ab inuicem discerni quadantenus poterunt. Verum quia tumorum hoc loco materias, causas ue inquirimus: ut qui calidus, quiue non calidus sit, pernouerimus. Idcirco & quæ penes iam dictas causas intercidunt difficultates, ambiguitatesq; trutinare, ac domum pro uiribus enodare operæ pretium fore arbitratum sumus. Qua de causa & hic sub silentio prætereundum esse minimè sustulimus, Galenum sibi met ipsi, atq; etiam (quod maius est) apertissime ueritati, libro de simplicium medicamentorum

p. Com. sequenti
& cap. 4. cō. p^o.

Tumor 15^o.

Herpes simpl.

q. libro de tum.

præter natu. c. 10.

r. 2. ad Glauco.

p^o. & 14. meib.

cap. 17. & ubi su

pra de tum. præ.

Tumor 16^o.

Herpes Essthi

omenos.

Tumor 17^o.

Herpes Mili

liaris.

5. 14. meib. cap.

17.

1. cap. 10.

u. cap. p^o. libr. 2.

x. libro. 2. Iatras

pol. cap. 3.

y. com. 8.

z. cap. 20.

a. cap. p^o.

18^o. tumor.

Scirrhus.

b. de tumo. præ

ter naturā cap. 10.

c. fo. 28.

d. 15. simplicium

cap. 8. uersus finē

e. tr. sequenti. cap.

11. tr. 2. & 3.

f. lib. 5. cap. 5. mentorum uiribus, præsertimq; mollientibus aliquando loquentem, f. turpissima (ut ita dis-
 uersus finem. xerim) repugnantia aduersatum esse. Nam libro de tumoribus præternaturam & dupli-
 g. cap. 10. uersus finem. cem scirrhum posuit: Quorum alter ex assiccata pituita: Alter uero ex melancholico atrabi-
 h. 13. meib. cap. larioe, ac naturali succo factus sit. Quemadmodum in Lienis scirrho, b atq; interdum
 15. 16. 17. quoq; loci inoris perspicue considerari potest. Quum uel frige facta nimium phlegmone, tes-
 nuioribus ue partibus, discutientium medicamentorum ui, superflue discussis, limosus terres-
 str. q; humor in illis remanserit. Vel glutinosus homo crassiq; alimentis (tam si earum par-
 tium phlegmone, q; si obstructione laboret) immodice utatur. Opportunissima nanq; ad
 scirrhum sunt (Galenus idem ait i) hæc duo uiscera, Iecur, & Lienis. Si quis parum ha-
 bita de his ratione glutinoso cibo utatur. Quippe Iocinoris substantia (ut post aliqua sub-
 i. ibidem. cap. 15. uersus finem. iunxit k) scirrhis maxime opportuna est: ut pote quæ naturaliter lutosum quippiam conti-
 k. ibide. cap. 16. net. Veluti medicus quidam nostri temporis per iocum dixit. Lienis uero rarior substan-
 circa prin. tia, q; Iocinoris est: cæterum crebrius scirrhis uitijs affligitur propter nutrimenti, quo uti-
 tur, speciem. Monstratum nanq; est l quod crasso nutritur sanguine: qui ueluti limus purio-
 l. 4. de usu par- ris est, facillimeq; nigra bilis efficitur. Ideoq; etiam ipsum melancholicum siue atrum ap-
 nam cap. 15. pellamus excrementum. Atq; hæc duo uiscera scirrhis tumoribus tentari uel experientia
 ipsa clare indicat &c. Quamobrem non ex pituita modo crassa, lentaq; scirrhus, in ipsis
 etiam uisceribus fit. Verum etiam & ex melancholico, terrestriq; succo. Perinde ut an-
 te à iam ex libro de tumoribus præternaturam m intelleximus. Tametsi de prauatus Galeni
 m. cap. 10. uersus finem. codex non paucis ambiguitatem reliquerat. Quia. n. dicit & Alterum scirrhorum genus fax
 sanguinis efficit. Est autem ipsa quoq; duplex: Altera quidem species quam Hippocrates
 nigram uocat: Altera uero & ipsa quidem nigra est, propriam uero appellationem hêt: no-
 minatur. n. atra bilis & uidetur Galenus ex his uerbis, apud græcarum literarum expertes,
 inter atram, & nigram bilem, differentiam quandam intelligere. Quam in aphorismis
 n. 4. aphorif. cõ. etiam, iuxta Leoniceum translationem, inuuisse apparet: cum sic ait & sermo in hoc aphorif
 23. in prin. m est potentia talis: siue atra bilis (de qua antecedens docuit aphorismus n) siue nigra, quæ
 o. s. aphorif. 24. sanguini assimilantur &c. & Quod si græcum quoq; exemplar in libro de tumoribus contem-
 plarimus: alia ratione scrupum adauget: quoniam. s. semper μέλαινα dicit hoc est, nigra.
 Quid ergo sibi uult: & quam Hippocrates nigram uocat: altera uero et ipsa quidem nigra est,
 quæ proprie atra bilis dicitur: & Si. n. utraq; bilis est, & quidem nigra: quin utranq; nigra
 ipsemet Hippocrates nominat. Ergo utraq; atra bilis, seu nigrabilis dicenda est. Nisi in-
 ter atram & nigram apud latinos differentiam nouus quispiam ridiculusq; grammatisa fe-
 cerit: quæ adhuc in græcis dictionibus minime reperitur. Pro huiusce igitur nodi solutione,
 Galeni locus. sciendum est, eo in loco de prauatam esse literam ubi dicit & ὁ πρὸς Ἱπποκράτους ὀνομαζέται
 μέλαινα. & Dicitio. nanq; & μέλαινα. & i. i. nigram & μέλαινα. i. nigra in neutro genere, ac
 numero plurali, legenda est: ut sic legamus & ὁ πρὸς Ἱπποκράτους ὀνομαζέται μέλαινα. & hoc
 est & quam speciem Hippocrates nominat nigra & s. deiecta, seu nigras, intelligendo deie-
 ctiones. Id ipsum uero ab Hippocrate in aphorismis, Galenomet enarrantem didicimus: Quum
 p. 4. aphorif. 21. ait. Ρ. ὁ πρὸς Ἱπποκράτους μέλαινα &c. i. deiectiones nigre &c. Galenusq; in commento,
 περὶ τῶν διαχωρημάτων αὐτῶν τὸν ὁ λόγος ἐστίν, ὅτι πρὸς ὀνομαζέται, ὑπὸ τῶν
 λαῶν ἰατρῶν μέλαινα, μέλαινα. δ' ἀκριβὲς οὐκ ἐστὶ χολή. Quod est de deiectionibus
 nunc

„ nunc ipse est sermo quæ à priscis quidem nigra uocantur (dicit autem nigra latinè , ut cum
 „ deiectionibus cõueniat : Græcè autem μέλαινα i. nigra : quia intelligitur ὑποχρώματα)
 „ bilis uero nigra exquisitè nō sunt . Itemq; rursus ¹ ait : αἷμα ἄνω μὲν ὁπὸ τοῦ ἄνω κακόν . q. ibidē apho. 25
 „ κατω δὲ ἀγαθόν τὰ μέλαινα ὑποχρώματα : hoc est : sanguis quidem suprà, qualiscūq;
 „ fuerit , malus : infrà uerò , nigra deiecta , bonum . Vbi Galenus in commento etiam inquit:
 „ κατω δὲ δι' αἰμορροΐδων, ἀγαθόν, ὅταν ἐκκενῶι τὰ μέλαινα . quod est : Infrà uerò per
 „ hemorrhoidas bonum : quando nigra euacuatur &c. His igitur , alijsq; omnibus quæ in
 „ proximis aphorismis , tam ab Hippocrate , q̃ Galeno præscripta sunt , perpensis , nigra
 „ simpliciter : aut nigra deiecta , siue nigras deiectiones ab Hippocrate uocari liquet , eum,
 10 „ quem nos hodie unà cum Galeno melancholicum , siue humorem , siue succum nuncupamus:
 „ quicq; naturalis ipsius sanguinis limus existit . Quemadmodum μέλαινα χολή, hoc est atra
 „ bilis , alia quæ . s. exusta est ac præternaturalis , ab ipso etiam Hippocrate , nedum à Gale-
 „ no propriè nuncupata est . Idipsum igitur & in alio aphorismo ² Galenus , iuxta etiā Leo-
 „ nicensi traductionem , uolebat : dicens : Siue atra bilis , siue nigra quæ sanguini assilantur
 „ apparuerint , postmodum moriuntur : cuius . n. nel minimo grammaticulo nigra numeri plu-
 „ ralis , neutriq; insimul generis esse liquet . Vt opus quidem non sit ita literam corrigere , ut
 „ nonnulli nuper fecerunt : sic legentes : siue niger quispiā humor atro sanguini similis &c. :
 „ sunt autem Galeni uerba (omisissis ijs quæ propositum uariare non possunt) hæc . εἰτε
 „ χολή μέλαινα , εἰτε τὰ μέλαινα τὰ τῷ αἵματι εὐκρίνα &c. hoc est (si tutius omnē
 20 „ amphibologiam deuitasse cupimus) siue bilis nigra : siue deiectiones nigra sanguini similes,
 „ &c. uerum de his obiter , ut caudicis de tumoribus præternaturam ³ falsitatem ostendamus:
 „ atq; unā Galeni sententiam satis superq; perspectam habuerimus : dum humoris dicti melan-
 „ cholici , naturalisq; fæcis germen scirrhum atræ uerò bilis cancrum esse demonstrauit . In-
 „ simulq; (ut magis ad nostrum propositum conuertamur) duplicem scirrhi causam ostendit :
 „ Alteram . s. humorem : quem iamiam melancholicum , naturalemq; sanguinis fæcem nuncupa-
 „ ri prædiximus : Alteram uerò crassam glutinosamq; pituitam . Cui quidem loco medendi
 „ methodus appositè congruit : sic dicens . ⁴ Scirrhi tumores fiunt , ubi uel crassus , uel ue-
 „ hementior lentus humor est , qui parti est infixus . Sanè crassus humor quodammodo iam me-
 „ lancholicus magis , minus ue est . Lentus autem ex glutinosis prouenit cibis . Sed & ex
 30 „ ipsis aliquando neruosis partibus : utiq; quum multum excrementi genuerint . Cum præ-
 „ sertim (ut antea Galenus idem præscripserat ⁵) earum substantia ex refrigerata , concre-
 „ taq; humidior materia sit condita : In quibus quidem Galeni uerbis , scirrhorum causas ex-
 „ primentibus id præ cæteris notandum est : crassi nomine melancholicum : lenti uerò pituito-
 „ sum intellexisse . Qui deinceps assiccatus , partiq; affixus , & pertinaciter adhærens scirr-
 „ rhi causa est . Aquea nanq; pituita fluxilisq; , aut tenuis , & lentoris minimè particeps ,
 „ exhalabit potius , uel in sudorem conuertetur , q̃ scirrhum genitura figi queat . Idem uerò
 „ rursus & ex proposito magis de scirrho loquentem intellexisse opinandum est : Quum ait . ⁶
 „ : Siquidem humor unde . eiusmodi uitium nascitur , aut glutinosus est , aut crassus , aut utri-
 „ usq; rationis particeps . : Pariter . n. crassi nomine melancholicum , lenti uerò pituitosum (ut
 40 „ antea libro . s. tertio decimo ⁷ scriptum est : ac de tumoribus quoq; præter naturam uolumine
 „ quin & quinto , perinde atq; uidebimus , de simplicium medicamentorum facultatibus ⁸ con-
 „ fitetur)

q. ibidē apho. 25

r. apho. 22. 23. 24.

s. cō. 23. in prin.

i. cap. 10.

u. 13. meth. c. 4.

x. 6. meth. cap. 2 uersus medium.

y. 14. meth. cap. 4. post mediū.

x. cap. 4.

a. cap. 10.

b. cap. 8. uersus finem.

fitetur) subaudire oportet. Quamobrem sic prænarrata uerba interpretabimur: Aut lentus glutinosus uel ut pituita: Aut crassus: ut melancholicus: Aut utriusque rationis particeps: ut si fortassis admixtus ex utroque sit: uel pituita insimul crassa, nec non uiscida, glutinosaque existat. Amplius (ut sibi met ipsum undique congruentem, harmoniceque consonantem Galenum reddiderimus) secundi ad Glauconem ante methodum medendi (ipso met Galeno teste) scripti locum intelligendum omnino fore arbitramur. Vbi sic etiam inquit: ^d Fit autem ex humore lento, & crasso uix solubiliter induratis partibus infixo. Intelligo (ni mirum quandoque, imperfectumque Galenū concesserimus) lentum quidem pituitosum: crassum uero melancholicum, alijs præscriptis locis concordem reddendo. Quauis enim lenta pituita, quæ scirrhi causa est, crassa etiam sit (Adeò ut libro de tumoribus præter naturam^e utrumque de ipsa dixerit: crassam uidelicet, & glutinosam: à tenui, ex qua œdema factum est, distinguens) lenta nihilominus magis, quæ crassa, lentorisque magis, quæ crassitie ratione: quum firmiter inhaeret, paulatimque desiccatur huiusmodi tumoris causa sit. Idcirco quandoque & lenta glutinosa uel & crassa est: lenti nihilominus, aut glutinosi nomine ipsam connotare maluit: crassi nomine interim melancholicum terrestremque succum intelligens. Quo etiā modo & alia ipsius uerba subaudire oportet, quum ait: ^f Oritur autem induratum affectio ex fluxione uiscosa, & crassa paruis particulae poris, siue meatibus impacta. Pariterque de utraque specie intelligendum est: quum utriusque generatione interdum quidē ab initio fieri dixit & nonnunquam uero ex lapsu conuersioneque aut inflammationis, aut erysipelatis, aut œdematis: cum immodestius frigidata sint. Nam qui ex congelata phlegmone uel erysipelate fit: expressis quidē tenuioribus partibus, uel inuicem cunctis, melancholici terrestriisque humoris proles scirrhus ille euadet. Qui autem ex frigefactio similiter œdemate originē duxerit: pituitæ germen fuerit: quandoque non est longinquum (dicet Princeps^h) Quin sit de genere melancholice (quatenus uidelicet frigidus tunc, siccusque pituitosus humor effectus est) uerum nos posuimus phlegmaticum, quoniam radix illius duri est phlegma. Cui accedit ut desiccaretur grossum. At sequenti cōmento uberius quidē, & satis superque de humeribus, atque eorum generatione sermo fiet. His ergo singulis Galeni locis exquisitis, ac perse prius consideratis: Deinceps uero inuicem appositè comparatis, duas esse exquisiti scirrhi materiales causas, lentam, scilicet siccataque pituitam, atque humorem melancholicum didicimus. Quibus & tertiam addere possumus: Quæ uidelicet ex ambabus composita sit. Quibus denique omnibus id mirum in modum congruit, quod de mollientibus medicamentis loquens, ait: his uerbis. Porro nascuntur scirrhi ex humore crasso & frigido: quales sunt in animalium corporibus duntaxat duo, bilis uidelicet atra, & superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhusi omnino aut pituitosæ sunt substantiæ, aut atrabilarie, aut ex utraque mixti. Quo in loco si rectè aduertis crassum utrumque, ac frigidum, (ut re uera sunt) appellat: Paulò tamen infra (uti uidebimus) crassi nomine melancholicum, perinde ac alijs etiā præscriptis in locis notatum est, præse ferre uidetur. Verum enim uero quæ nos magnoperè conturbare potest Galeni repugnantia est: Cum sibi & ueritati (quæadmodum antea^k tetigimus) aduersetur subdicens: Sed de agnitione eorum non est nunc tempestiuum differere: uerum de medicamentis emollientibus illud, ut nunc dicam, opportunum est. Nempe quod propriè uocatur emollientia, quæ medentur scirrhusi tumoribus ex pituita resiccata, crassoque humore prognatis.

c. in fine. 2. ad Glauconem.
d. 2. ad Glauconem.
cap. 4. circa prin.

e. cap. 10.

f. 5. simplic. 6. in prin.

g. de lib. de tumoribus præter naturam cap. 10. in fine. & 2. ad Glauconem. ca. 4. circa prin. & colligitur. 14. meth. cap. 4. & 5. simplic. cap. 6. et 8. & sæpe.
h. infra. tr. sequenti cap. 4. text. 2.

i. quinti simplic. um cap. 8. uersus finem.

k. fo. 104. in prin. Galeni contra dictio.

„ gnatis. Consueuerunt autem ij potissimum in musculorum capitibus, & qui ex eis prodeunt
 „ tendonibus consistere. At quæ ab atrabilario succo duruerunt, cancrosa sunt omnia, & ab
 „ emollientibus medicinis exacerbantur: &c. Ex ijs igitur, accuratè perlibratis alteram
 scirrhi speciem ex atra bili genitam esse, nō melancholico succo: quin ex hoc cancroso om-
 nia fieri à Galeno scriptum esse liquet. Cui tamen sententiæ, cum per se nota ueritas, tum
 ipsius met Galeni libro de tumoribus¹ præscripta id determinatio aduersissima est. Ex me-
 lancholico. n. humore scirrhum: ex atra uerò bili cancerum, cancerosos ue tumores generari
 clarissimum est. Itaq; tam apertæ contradictioni obsistere uolentes (ni Galenum adeò uel
 somno, uel uino sepultum talia scribentem attico uultu condemnare malueris) ob antiquitatē
 10 de prauatos esse codices omnino suspicandum esse, respondebimus: Cambiumq; (ut ita di-
 xerimus) uocabulorum, ex ipsius met monumentis, factum ab aliquo incauto scriptore opi-
 namur. Ita ut ubi duos scirrhi humores ab eo enarratos legentes, atram bilim inuenimus:
 melancholicum succum humorem ue, atræ bilis loco, ponendum fore, præsentī quidē animo,
 „ determinemus: Vt sic græcè legatur^m τοιοῦτοι δ' εἰσὶν ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασι δύο
 „ μόνοι, χυλὸς μελαγχολικὸς, καὶ τὸ ὑπερξηρανθὲν φλεγµα. hoc est: Tales autem sunt
 „ in animalium corporibus duo tantum: succus melancholicus, & superexiccatum plegma.
 Cōtrā uerò ubi deinceps quæ ab atrabilario melancholico ue succo duruerūt, cancroso om-
 nia esse, & ab emollientibus exasperari offendimus: melancholici succi loco, atrā nigram ue
 „ bilim, collocandam fore pro comperto habemus. Vt sic etiam græcè legaturⁿ ὅσα μὲν γὰρ
 20 ὑπὸ μελαίνης σκιάζονται χολῆς, καρκινώδης τε πάντα εἰσὶν, καὶ παροξύνονται
 „ ὑπὸ τῶν μαλακτικῶν φαρμάκων. quod est: Quæcunq; enim ab atra bili dura fiunt, et
 „ cancroso omnia sunt, & ab emollientibus medicamentis exacerbantur. Quod autem de ijs,
 qui atra ex bili proueniunt, cancerosis tumoribus intellexerit: exacerbari quidē eos à mol-
 lientibus, ut potè calidis, ac siccis dicens: non de altera scirrhi specie: præter ea, quæ dicta
 „ iam sunt, ex his etiam, quæ subiungit apertissimum fiet. quum sic ait: Sed his quo pacto
 „ prospicere oporteat, in commentarijs methodi curandi docebimus: Libro autem methodi curā
 di nullam in curanda utraq; scirrhi specie differentiam posuit: at emollientibus utraq; cu-
 rat: Cancri interim aliam diuersamq; curationem admolienti. Cuius etiam sanandi rationē
 absq; hac scirrhi distinctione cuncti post Galenum, & Græci, & Arabes, atq; ipsi etiam La-
 30 tini scētati sunt. Quando igitur (ut singula patefiant, sibiq; congruentia omni ex parte
 reddantur) ait^p & quod propriè molliencia medentur scirrhosis tumoribus ex pituita resicca-
 ta, crassoq; humore prognatis & intelligendum per id quod subdit & crassoq; humore & melan-
 cholicum opinamur. Si enim phlegmati uerba illa & crassoq; humore & referre aptareq; uo-
 lisset: ita potius dixisset & ex phlegmate crasso & seu & ex phlegmate, crasso quidem humo-
 re & Vtriq; igitur scirrhu tam. s. ex phlegmate, q̄ melancholico humore (quem crassi epitheto
 non hic modo, sed alijs quoq; prænotatis locis ostendisse notauimus^q) emolliencia medicamē-
 ta congruunt. Quæ autem ab atra bili duruerunt, cancroso sunt omnia: & ab emollienti-
 „ bus exarcebantur. Quam ob rem & rursus adiunxit & Quæ uerò à lento, crassoq; humore
 „ congelato indurata sunt, calida poscunt siccaq; medicamenta &. Non temerè autem, si ex
 40 congelatione duruerunt, superaddidit. Si. n. alia ratione indurata sint: alia quoq; ac diuersa
 sa medendi ratione oppugnantibus succurrendum. Nam sicuti plures sunt durandi ratio-
 nes, &

l. cap. 10.

Solutio.

m. s. de simplic.
med. faculi cap. 3
uersus finem.n. ibidem post
faua.o. 14. meth. cap.
4. & 5.p. ubi supra de
simplic. med.

q. supra fo. 106.

7. cap. 3. com. 2.
12. & 15. & 17.
sequenti cap. 12.
com. 3.

Quædam res
sponsio impu-
gnatur.

s. fo. 33. circa. finem.

t. cap. 8. uersus finem.

u. cap. 10. uersus finem.

x. tra. sequenti
cap. 11. & 12.
Tumor 19.

Ecchymosis.

y. de tum. præter
na. cap. 11.

z. ut Vidius, 3.
de officina medici.

a. ut Augustinus
Riccius traducit

lib. de tū. prætern.

b. ut Felicianus
traducit. 2. de fra-

cturis cō. 16 et de
medici uulnerarij

munere lib. 3. cō. 3

c. libro p^o. 1. atra-
pologia cap. p^o.

d. libro de medici
officina. 3. cō. 31.

nes, & causæ: ita & diuersæ ac singulis propriæ sunt curandi uia (prout uberius infra
ipsiusmet ex Galeni monumentis ostendemus.) Melancholicus autem humor etiam natu-
ralissimus si ab excedente quidem calore desiccante, non à frigido congelante scirrhi occasio
fiat: in Cancerosum proculdubio tumorem pertransire facillimè poterit. propriè autem dicta
durities ea est, quæ congelatis humoribus fit. Quemadmodum immodicè frigefactis phleg-
monis, atq; erysipelatis nedum œdematis non infrequenter contigisse conspeximus. Quibus
& propriè dicta etiam mollientia, calida inq; & sicca, tametsi non magnoperè talia, repu-
gnant. Hæc uerò pro manifesta Galeni contradictione dicta sint. Quæ mutatis quidem
(prout fecimus) melancholici humoris, atq; atræ bilis nominibus, appositè sedata est. Haud n.
respondisse ualeb: quoniā. s. largè nominibus utrobq; usus, aut fortasse abusus sit. ut atræ 10
bilis nomine melancholicum succum: atq; huius rursus nomine atram bilim intellexerit.
Etenim quauis id à Galeno permissum obseruatumq; sit (prout antea quoq; tetigimus) hæc
uidelicet nomina confundi sæpenuerò posse: Idipsum tamen ab eo seruari tunc offendimus
(& quidem non indecenter) quò de altero seorsum loqui intentio est. ut. V. G. si nonnunq;
ita duntaxat scripserit: Altera scirrhi species ab atra bili: altera uerò ab exiccata pituita
fit. & tunc. n. atram bilim communiter, pro humore. s. melancholico subintelligere oportet.
Aequè ac si nonnunq; legimus: ab humore melancholico cancrum fieri: aut melancholicum
succum ex bilis adustione interdum generari: Melancholicum proculdubio succum uel hu-
morem, improprie tunc, pro atra bili capere necessum est. Sin autem sic dixerit: ex atra
bili scirrhus, ex melancholico autem succo uel humore cancerosus tumor fit: (ut libro sim- 20
plicium medicamentorum quinto dixisse uidetur.) Aut econtrà: ex melancholico succo
scirrhum, ex atra uero bili cancrum fieri: scripsisset. (quemadmodum libro de tumoribus
præternaturam uoluisse compertum est) Ridiculum profectò est nos in eam glossam per-
uenire: ut ita differentiam posuisse credamus, utrobq; nominibus abutentem. At magis
hercle ridiculus esset qui hunc sermonem scripserit. Cum propriè nominibus utendum per-
petuò sit: quoties inter ea differentiam quampiam demonstrare intendimus. Verùm hætenus
hæc de scirrhi materia dicta hic sint. Reliqua nihilominus multa proprio deinceps loco per-
scrutabimur. AD undeigesimum igitur tumorem pertranseamus: Qui scirrhus (Ga-
leni & etiā dogmate) propinquus est, ἐκχυμωσις græcè, & ἐκχυμωμα dicitur: latine aut
effusio, quasi dicat extra uenas fusio, respondet: à quibusdam suffusio quasi sub cute fu- 30
sio. Ab alijs circumfusio: à nonnullis deniq; sugillatio, & exuccatio traducitur. quanuis
plurimi unam tantum ecchymoseos speciem sugillationis, & sugillatorū nomine intelligāt:
quæ. s. in facie fit, ac proprio nomine apud græcos ὑπὸ πτερόν, & ὑπὸ φθάλλον, hoc est
(ut sic dixerimus) subocularis: cum in facie sub oculis existente, ac potissimum in inferioris
palpebræ circuitu, propè oculos, fieri nonnunq; uel ex ictu, uel alia quapiam causa consue-
uerit. Significat autem utraq; dictio ἐκχυμωσις, & ἐκχυμωμα nil aliud, q̃ χυμὼν
ἐκχυσις, hoc est: humorum effusionem: quæ plurimum unā cum contusione ruptioneq; in-
cidit: quanq; & alijs ex causis aduenire solita est: prout alibi etiam ex Galeno præsten-
dimus. Quam obrem Galenus idem inquit. Cum caro contusa in locum sub cute sanguinem
περὸς χεῖρ, hoc est transfundit, siue transmittit, talis passio ecchymosis nuncupatur. Fitq; id si 40
ne ulla cutis diuisione: Venas tamen exiguas insimul cum carne rumpi discindi ue in ec-
chymomatum

chymomatum generatione perspicuū est. Iterūq; alibi Hippocratis quoq; uerba enarrans: e 2. de fracturis
 qum dicebat ἡ φλέβια ἐκχυμοῦνται ἰδεστὶ uenæ sanguinē effundūt ἢ siue (ut qdam uertūt) com 16.
 ἢ exuccantur ἢ. Galenus idem ait ἐκχυμῶνσθαι uenas inquit Hippocrates, significare
 uolens effundere succum extra, quē continent, nempe sanguinē. Id quod fit cum tunica ipsa
 uenarū cōtusa est: quæ n. cōtunduntur corpora unionē naturalē amittunt, multis, ac paruis par
 tibus ipsorū discerpis, ē quibus etiam sanguis circūfunditur. Appellāt igitur ecchymosin Hip
 pocrates, & alij multi medici (perindē ac aliās f. ab eodē Galeno didicimus) affectionē circa
 cutē: cum tenuibus in ipsa uenis cōtufis, sanguis per fissuras effunditur, nō uno loco acerua
 tim, græcē ἀθρόως, ac statim ita excretus in grumos coiens: sed postq; per dissulationē
 (græcē διασπῆσθαι uocat) effusio facta est. Equibus qdem oībus perspicuū fit, per .κ. le
 gendum ἐκχυμῶσις, & ἐκχυμῶμα: non per .γ. ἐγχυμῶσις, uel ἐγχυμῶμα: ue
 luti nōnulli à deprauata, ob librariorū defectum, littera quinti litri de compōe medicamentoz
 rum secundū loca & de cepti scribere cōsueuerunt. Diuerfos n. affectus tametsi nō omni ratio
 ne contrarios, ἐκχυμῶσις, & ἐγχυμῶσις ostendunt. Cum ἐκχυμῶσις (quemadmo
 dum præscriptū iam est) extra uenas factam sanguinis effusionem significet: ἐγχυμῶσις
 uerò intus factam in uenulis ipsis atq; arteriolis innati caloris spiritūue ac sanguinis fusio
 nē, non Hippocratis modò, sed Galeni etiam enarrātis testimonio, præferat: qua uidelicet ob
 irā animiq; excandescētiā, uel aliā quālibet occasionē uenulæ, atq; arteriolæ i extremis cor
 poris partibus existētes pleniores reddūtur, corpusq; coloratius euadit. Quēadmodū aliquādo
 20 Hippocrates scripsit ἡ ἐπιτῆδευσιν ὁ ἐνθυμῶν ἐμποιεῖν, καὶ χρωματὸς ἀναλῆψις: ἐν
 κα, καὶ ἐγχυμῶσις hoc ē: diligētia studiū ue adhibendū est, ut animi excandescētia indu
 catur: et coloris reparandi causā, et sanguinis effundēdi. Haud extra uenas (cū præternatu
 ralis ille affectus à medico curādus qdē, nō inducēdus sit) uerū i uasa ipsa: quæ in exteris q
 dē partibus, et cuti posita sunt. Id quod naturæ qdē ui, nō cōtusionis, aut ruptionis fieri solet.
 Quadere diuerfos affectus antea iam diximus. Quoniā uerò à centro ut dici cōsueuit, ipsoq; à
 corde ad corporis peripheriam sanguinis calidiq; innati effusio fit: Hac de causa non omni
 ratione contrarios affectus prænotauimus. Cum in eo conuenire uideantur, quod ab intera
 neis ad exteriora quædam effusio fiat. In eo nihilominus differunt, quod alter extra uenas
 effusionem connotet: Alter uerò in ipsis uenis: quauis à maioribus ad minimas fusionem
 30 præferat. Quamobrem ἐκχυμῶσιν primū, ἐγχυμῶσιν uerò secundum nuncupabimus.
 Atq; idipsum à Galeno etiam promptius addiscere possumus, quum Hippocratis uerba enar
 rans, 2 animi excandescētiā hac ratione insitum calorem excitare posse ait. Qua propter
 eam in perfrigeratis, & decoloratis, atq; gracilibus (ex quibusdam licet interuallis, tempo
 ribusq; opportunis: ne ob continuitatem uires, dissoluto nimium calore, offendamus) assumere
 Galenus ipse præcepit. Quo in loco rursus, ob typographorum quoq; imperitiā, ἐκχυ
 μῶσις, per .κ. legitur: ubi pe. γ. ἐγχυμῶσις scribendum fuerat. Verū de his
 hætenus: atq; obiter dictum hic sit. Ad ἐγχυμῶσιν ergo reuertamur: quæ sanz
 guinis, ob contusionem præcipuē, ruptionemq; sub cuti effusio est. Quamobrem contin
 git aliquandò (Galenus ait^a) ubi ita coierit sanguis, temporis progressu liuescere, & de
 40 nigrari, paruis nimirum grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis. Idēq;
 alibi confirmat: dicens. ^b At effluentem sanguinem loca circum uenam excipiunt
 I atq;

f supra de cōpo.
 med. secundū loc.
 cap. pri. in princi.
 & uide. 6. de mor
 bis uulg. parte. 2.
 com. 2.

g ubi supra.
 Gale. locus.

y 2. de morb. uul
 gar. sec. 4. in fine.

z lib. 3. de spiran
 di difficult. cap. 10
 in medio.

Galeni locus.

a 5. de compōe
 med. secundū loc.
 cap. p. cir. prin.
 b 2. lib. de fras
 cturis com. 6. cir
 ca prin.

atq; ubi exceperunt talem qualis à principio erat, minime conseruant: Nam mora quadam ibi nigrescit: perinde ac si foras effusus inueterasset &c. Qua de re duas species, penes to-
lorum diuersitatem, posuit Galenus. Quarum alteram senibus quidem, quoties illorum ue-
nae contuse, aut alia quapiam ex causa reseratae sunt, familiarem, ac maxime contingen-
tem, peculiari nomenclatura, μελασμάτα, hoc est, nigrores appellat. Nigra. n. ob atri
humoris melancholicisq; sanguinis effusioneui, affecta pars euadit. Alteram uero (quae .f.
medium colorem inter rubrum atq; nigrum obtinuit: proprieq; πελιδνὰ, idest liuida, seu
liuores uocari potest) generis nomine prius ostendisse uidetur: cum sic dixerit ἑγγύς ἐστι
ὁ κίρρῳ τὰ τε ἐκχυμώματα καλούμενα, καὶ τὰ μελασμάτα. quod est: propinqua ue-
ro scirrhus sunt tum quae ecchymomata uocantur: tum quae nigrores. Qui. f. nigrores (ut sub-
dit) senibus praesertim, contusis eorum uenis, contingunt. ἐστὶ δὲ καὶ τούτων, ἕν τι μὲν,
ὡς ἐρεται, μέλαινα, hoc est. Sunt autem & horum (intelligo ἐκχυμώματων effusio-
num ue) quaedam uti dictum est nigra (quae .f. μελασμάτα nuncupari paulo ante iam di-
xerat) & in senibus potissimum leui ex occasione fiunt: ἕν τι δὲ καὶ ἐρυθρὸν καὶ μέλα-
ρος, ἐν τῷ μεταξὺ, τὰ καλούμενα πελιδνὰ. quod est: quaedam aut & rubri & nigri
in medio sunt: quae .f. liuida uocantur. Haec uero sunt generis nomine statim ab initio praeta-
cta: & contra nigrores assumpta. Vbi graecum Galeni caudicem quater in eadem linea de
praetatum esse liquet: sic dicentem ἑνὶ οὐδὲ καὶ ἐρυθροὶ καὶ μέλανες ἐν τῷ μεταξὺ. 3 le-
gendum nanq; ut nos antea iam scripsimus, est. Quem admodum uero μελασμάτα, lati-
ne nigrores potissimum senibus aduenire, uel ex leui causa, consueuerunt: Ita et πελιδνὰ,
latine liuores pueris, mulieribusq; & colore candentibus accidere plurimum, ex leuissima
quauis occasione, soliti sunt. Pueris quidem, ac mulieribus, ob laxam & raram illorū sub-
stantiam: adeo ut statim sanguis persulset, laxaq; in ipsa carne, et cuti conspergatur: Can-
didioribus autem, quia ex minima cruoris effusione color ipse tingitur, atq; inscitur. Verū
enim uero unū est quod sicco (ut aiūt) pede pertranseundū nō est. Quoniā Galenus scirrhus pro-
pinquū hūc affectū praescripserit. Paulus aut de ipso loquēs, ait: ὡς περ ὁ γκός ἐν αφῆς εἰ
κὼν ἐτετα. hoc est: tanq; tumor tactu facilis et cedēs comitatur. Si. n. tactui cedēs est, ac per
hoc mollis (Ea nāq; mollis definitio est, philosophorū Coryphaeo sic definiēte: μαλακὸν ἐστὶ
τὸ ὅταν κοίης ἐαυτὸ, καὶ μὴ μεθιστάμενον: quod est. Molle ē quod i se ipsum cedit, ac mi-
nimē obsistit. ipsoq; met Paulo sic de aneurismate dicēte: τὸ ἀνεύγυμα ὁ γκός ἐν αφῆς ἐστὶ,
καὶ τοῖς δακτύλοις ὑπέκων: idest, aneurisma dilatatiōe tumor ē tactu facilis blādus ue,
ac digitis cedens. quod uerbum εἰ κὼν, 3 seu ὕπεκων 3 à Galeni uerbo clarius fit: cū ait ἢ
ἢ ὑποχωρεῖ 3 quod est: locū exhibet prementibus, aut tangētibz digitis.) Si tactui inq; ce-
dēs est, blādusq; ac facilis. Quo nā pacto scirrhus, tumori qdē tactui renitēti duroq; propinquus
esse pōt? Rursusq; ecōtrā, si qdē scirrhus propinquus affectus ē: quomodo tactui cedēs existit?
Alteruter igitur horū, uel Galenus .f. uel Paulus falsum dicit. Nisi esset quod insimul hāc am-
bo stare congruenter possunt. Mollem .f. tumorem esse, ac blandum, tactuiq; cedentē. scir-
rho nibilominus propinquum: duplici quidem ratione: Tū quia indolens magna ex parte
te (Pauli & etiam testimonio) ecchymosis est. Qua de causa scirrhus prorsus insensili ne-
dum indolorio proxima est. Tū secundo, quia cū sanguinis extra uenam sub cuti effusio
facta sit, q locus cōgelatiōi, ob caloris paucitatē, promptissimus est. praesertimq; si refrigerati-
bus

bus importunè medicus occurrat : Facillimè tenuioribus partibus expressis generari scirrhus poterit . Id quod ipsis etiam œdematis immodestè frigefactis contingere nonnunq̃ solitum est . Aut si fortasse ualidioribus desiccantibus , calfacientibusq̃ medicus insisterit : tenuioribus quoq̃ partibus ipsius sanguinis per halitum digestis , quæ remanserunt crassiores portiones , in lapideam ferè naturam , uel terream conuersæ , ex ecchymosi scirrhum constituent . Propinqua igitur scirrhus ecchymosis est : quoniam promptè (ni sedulò , atq̃ omni adhibita diligentia curetur) in scirrhum degenerare consueuit . Hæc uerò de apparenti contradictione usq̃ ad eò dicta iam sint . Verum enim uerò ecchymoseos species pro affectuum partium diuersitate assumptæ à Paulo^b tres expressæ sunt . Prima est , τὰ καλούμενα ὑπὸ πτώσιν : hoc est : quæ uocantur subocularia . Nonnulli peculiari , atq̃ huic affectui dicto nomine , sugillata latinè appellant : quanuis alij , perindè ac anteaⁱ notauimus , nomen id generalius capientes , non eos modò liuores nigredines ue , quæ in facie , atq̃ sub ipsis oculis fieri ex ictu solent , sugillata nuncupent : Verum in quauis parte corporis eueniant : Singulariq̃ etiam numero apud Galenum , ὑπό πτωσιν , quod est : subocularis inuenitur . Scribitur uerò græcè ὑπό πτωσιν & per . ω . in secunda syllaba , & . ι . in tertia . ut ijs qui græcos saltem characteres legere norint , primo statim obitu ipsius ab altero affectu differentia liqueat : Cuius quidem non ab oculis , quos græci ὡπας uocant , sed à pure , quod πῦον eadè gēs appellat , deductum nomen est , uocaturq̃ ; similiter ὑπό πύον , per . ο . in secunda syllaba , & . υ . in tertia . quasi dicat suppuratio . Est . n . puris sub cornea oculi tunica congregatio . Quadere ὑπό πύον^k inter oculi affectus : ὑπό πτωσιν^l uerò inter faciei dispositiones à Paulo seorsum , propriq̃ capitibus , describuntur . At omissio quidem oculi affectu , ad primam ecchymosis spēm reuertamur . ὑπό πτωσιν (uti prædictum iam est) græci uocant , Latini nonnulli sugillata . Auicennæ interpres proprio nomine descripsisse non apparet . Sed , nigredinem sub oculo , nonnunq̃ græco nomini alludens uocasse reperitur .^m Quanuis non hanc modò , sed omnem siue liuorem , siue nigritudinem in quauis corporis parte factam , sanguinem mortuum nuncupetⁿ interdum uerò^o uestigia sanguinis : aut uestigia nigra :^p Siq̃ à contundente , percutiente ue quapiam occasione contigerit , quasi specialius eundem sanguinem mortuum ex causa determinās , uestigia percussione appellat^q Quem tamen affectū aliquando^r alfasch seu alfasenomenclatura (prout aliās^s etiam prædixisse recolo) Princeps ipse nobis connotasse uisus est . Latini quidem huiuscemodi percussionum uestigia Vibices , quasi uis quadam (uti festus ait) facta nominant . Secunda uerò ecchymosis species à Paulo^t expressa est , quæ græcè ὑπό σφάγμα , & Galenus , & ceteri alij nūcupant . Latini uerò simplex huic nomen minimè inuenerūt : sed pluribus circumscripserunt . Quæ de re Celsum^u oculorū sanguine suffusionem uocat , cum extrinsecus offendūtur . Alij liuores ex ictu in oculis uertunt . Plurimi autem græcorū nomine utentes , hyposphagma perpetuò nuncupāt , quasi latinè diceret subruptionē , uel sanguinis è uase eruptionē , ἀπὸ τοῦ σφάττειν , quod est iugulare , atque incidere , seu rūpere : & si quibusdā ὑπό σφάγμα potius proferre libet , ἀπὸ τοῦ σφάλλειν , quod est percutere , atq̃ etiam aberrare . Cum sanguis extra uenas præternaturam lapsus aberrat . Est enim hyposphagma , seu hyposphagma (paulo^x de finiens) uenarum adnatæ membranæ ruptura , ex ictu potissimum eueniens . Quibus uenis (ut Aetius^y addit) ruptis confusis ue , sanguis sub tunica subit , ac statim quidem cruentus

Ecchymosis
spēs à Paulo
posita.

^b Ibidem
ⁱ fo. 108.

^k lib. 3. cap. 22.
^l ibidem cap. 25.

^m . 2. can. tra 2.
cap. 158. de cala-
mento. post prin.
ⁿ ut 4. 4. tr. 2.
cap. 3. & cap. 6.
et 7. 4. tr. 2. ca.
6. et 2. can. tr. 2.
cap. 161. de cala-
mento aromatico.
^o 2. can. cap. de
aceto.

^p ut 7. 4. tr. 2.
cap. 4. et 2. can.
tr. 2. cap. 158. de
calamentis.

^q ut 7. 4. tr. 2.
cap. 4.
^r 4. p. cap. 28.
^s lib. p. Iatrapo-
logia.
^t lib. 4. cap. 30.
^u lib. 6. cap. 6.
sec. ult.

^x lib. 3. cap. 22.
^y lib. 7. cap. 20.
in prin.

z .3. fen. 3. tr. 2.
cap. 24.

a po. de' sympt.
causis cap. 2. uer-
sus finem.

b .4. de compo.
med. secundum lo-
ca. cap. 6. in prin.

c ibidem.

d ibidem.

r lib. de lingua-
rum Hippocratis
expositione.
e 4. libr. cap. 30.
tertij ultimo, et se-
xii 86.

f infra. f.

g lib. de tum. præ-
terna. ca. 11. i fin.

Tumor uigesi-
mus.

Aneurisma.

h lib. de tu. præ-
terna. cap. 12.

i lib. Iatrapolo-
gia cap. 4.

oculi color euadit, postea uero liuidus. Sæpenuerò autem in extima ipsius albæ tunice parte ueluti sanguinis puncta conspeximus. Qua de causa Princeps^z etiam ait de Tarfa-
ni loquens, (Sic. n. suo idiomate hunc affectum appellat, uel cum articulo Altarfani) est
punctum sanguinis recentis rubei, aut antiqui mortui liuidi, aut nigri currentis à quibusdā
uenis ruptis in oculo, propter percussione^c &c. Hinc succedit ut qui huiusmodi affe-
ctu laborant rubra putent omnia (Galeni^a quoq; testimonio) quæcunq; aspexerint. E quo
rursus euenit, ut non ὑποσφάγµατα modò, uerum & αἱµάλωπας, unā cum Archige-
ne, Galenus^b appellet: quod est, cruentum sanguineum uel aspectum: haud illa duntaxat
ratione, quia sanguineus oculus cum conspicientibus appareat: sed quoniam (ut præscrip-
tum ex Galeno est) sanguinea sibi uideantur quæcunq; affectus oculus inspexerit. Non
igitur duos affectus archigenes duobus nominibus intellexit: quæuis copulati^c dixerit & πρὸς
αἱµάλωπας, καὶ ὑποσφάγµατα & hoc est, ut quidam interpretantur & Ad cruentatos
oculos, & sugillatos & at unum eundemq; affectum præferre uoluit. Galenus^d αἱµατο-
δαῖς ὑποχρῶεις, id est, sanguineas suffusiones appellat. Omittimus autem hic Hippocratis
ὑποσφάγµα tanq; nostro proposito minimè conducens: totius. f. atramenti sepiæ tanq; sub
sidentē faciem, Galeni^e expositio, ne significans. Tertia Demum ecchymosis spēs à Paulo^f
relata est, quæ sub contusis unguibus fit. Quæ uidelicet sub illis à ruptis contusione uenulis
resiliens sanguis congregatur: rubrum ab initio, dein uero liuidum, ac deniq; nigrum ipsum
unguem efficiens: quemadmodum & ille iisdem coloribus successiue inficitur. ὑπόχρον
græcè, latinè autem subunguium: non incommodè (tametsi nouis ac nunc effectis nomen-
claturis) uocare nos possumus. Id ipsum prætereā notantes quòd non in his modò partibus,
facie inq; oculis, & unguibus affectus hic aduenire potest: Verum & in qualibet corpo-
ris particula. Adeò ut tot numerari spēs penès affectam sedē queant: quot sedes membraue
corporis existunt. Paulus. n. & si tres duntaxat expresserit: Haudquaquā tamen determi-
nato numero dixit & tres sunt ecchymosis spēs. & At hæc tria Ecchymosis esse species uoluit.
Ut non ecchymosis species uestigantem: sed ad quem affectum illa tria reducantur: quoniam
f. ad ecchymosin, ut illius species, declarantem cognouerimus. Nos autem rursus infra
& alios affectus ad ecchymosin reducibiles contemplabimur. f Nunc igitur ad huiusmodi
di affectus causam, cuius ratione singula hoc loco perpenduntur, commigremus. Quæ non
alia quidem est, q̃ sanguis è uenis effusus, nunc profecto (ut ait^g) per tunicas contusas:
nunc uero in finibus reſeratas. Sanguis inq; causa est, non quarta substantia, quæ ab
utraq; bili, nec non pituita secūdu propriā naturā secreta est. at uniuersus quidem sanguis
ex quatuor humoribus, quin & ipsa interdum serosa superfluitate congregatus: quæuis uari-
us, in quibusdam. f. biliosus magis: in alijs uero pituitosus, aut atrabilarius, pro diuersa
corporum dispositione, ac temperamento, existat. ORE autem in arteria factò, uige-
simus tumor prosequi nonnunq; consuevit: quod græci α'ν'ε'ρ'ι'σ'µ'α, h latinè autem à quibus-
dā dilatio: corruptisq; barbarolatinorū uocabulis, Hyporisma, et Emborisma seu Emborismū^h
et Aporisma nuncupatur. De quo cum alibiⁱ quidē uberrimè locuti fuerimus. Breuius hic,
& per transfennam nonnihil atangemus. Qui uidelicet eiusmodi tumoris materiā
pernouerimus: quæ non alia, quam spirituosus sanguis, substantia quidem tenuissi-
mus, colore flauus, temperamentoq; calidior eo, qui uenarum, sanguine existit.

Qui

Qui nonnunq; (tametsi rarissime : ac tum præcipue , cum ab arteriæ fœtu sanguis , in quem
 piam fortasse cuniculum incidens , remotus , prorsusq; destitutus sit) in grumos , quos græci
 ci θρόν. Bous nominant , conuersus , ibiq; astrictus , quinetiam ab imperitioribus medicis
 perperam , atq; importunè frigesfactus , gangrænam prius , deincepsq; hac negligentius cu
 rata siderationem , sphacelon uel parere consuevit. QVO quidem aneurismate affectus
 alius multò latiore tumorem representans , coloreq; tamen albidior oedema spali no
 menclatura , post Hippocratem , à medicis (Galeno referente ^k) nominatū est. Quauis in
 eo quod prementibus utrunq; digitis cedat , inuicem congruant. Delitescit . n. omnis in ane
 urismate tumor , recurrente in arterias substantia , quæ eum efficit . In œdemate uerò pre
 10 mentibus materia digitis cedit , foueæq; instar pars ipsa excauatur . Ex alba nihilominus id
 tenuiq; pituita , nec non uaporoso spiritu membri substantiæ permisto , nedum insperso , gigni
 tur : Illud aut ex spirituofo sanguine (ueluti iamiam prædiximus) effectum est. Duplex
 igitur œdematis materia (Galeno^l præ cæteris declarate) ē : licet una eadēq; tumoris forma tā
 genibus quoq; digitis , nedum cernentibus oculis præsentetur . Vel . n. tenuis pituita : uel
 uaporosus spiritus eiusmodi tumoris occasio est . Id ipsum nihilominus uerum est , quod ex pi
 tuita factum œdema , morbus quidem existit : perinde ac ex uaporoso constitutū spiritu , symp
 toma . Id quod cum plurimi negligenter , atq; ineptè à Galeno perceperint , operæ pretium
 fore arbitrati sumus hoc etiam loco Galeni mentem enucleare . Duplex . n. pro illius sententi
 20 a œdema est (quod græci quidem οἰδημα , barbarolatini autem corrupto uocabulo undimi
 am , aliq; corruptius Zimiam , Arabum uerò nonnulli trebel nuncupant) Alterum quidem
 ut morbus , ueluti præscriptum iam est , atq; id ipsum ex pituita , non . assiccata (ut in scir
 rho) uerum tenui , nec non aquosa , & lubrica , præsertimq; in carne , atq; ipsa etiam cuti
 roris instar in lanis & spongijs infusi , originem ducit . Quamobrem à pituita quidem eua
 cuatione curationem inchoandam esse necessum est , ac deinceps ad topica perueniendum .
 Alterum uerò ut symptoma , alium affectum , qui morbus sit , insequens : ut . V . G . aquam
 intercutem , & quam propriè græci , & præsertim Athenienses nominant , φθόρυ , Hip
 pocrates uerò nonnunq; (Galeno enarrante ^m) φθόρυ appellat , pulmonis uidelicet ulcera
 insanabilia consequentem totius corporis cum febre parua extenuationem : Itemq; uehemen
 ter malos corporis habitus (καχεξία græci uocant) qui & in ipsis etiam utero generenti
 30 bus , ob suppressos menses , aduenire solent . Hos inq; affectus insequi , maximeq; in cru
 ribus ac pedibus œdema tanq; symptoma consuevit . Qua de re nullam (uti Galenus ⁿ ait)
 seorsum propriā curationem , nisi uehementius increseat , requirens . Quippè remoto quem in
 sequitur affectu , confertim euanescere talis quoq; pedum , alterius uel cuiuslibet partis tumor
 solitus est . Itaq; huius secundi œdematis , aliorum (ut diximus) morborum symptomatis
 causa non pituita , quemadmodum prioris est : Verum flatuosus , uaporosus uel spiritus est ,
 qualis in cadaueribus (Galenomet erudiente ^o) uenit . Cuius rursum flatuosi spūs non ma
 40 gis pituita , q; atrabilarius humor , uitiosus uel sanguis aut serosa superfluitas esse materia
 potest . Morbos . n . aliquando sequitur , in quibus pituitæ defectus potius existit : prindè ut
 phthisis præsertim diuturna , & prope mortē existens est : quæ corpus usq; adeo quidem cō
 tabescit , ut nil aliud præter ossa , & cutim præferat , exactumq; σκελετον conspicien
 tibus representet . Ex caloris tamen imbecillitate plurimi possunt uaporosi spiritus eleuari ,

Tumor 21^o
 œdema.

k . 5. Aphorif.
 65.4. de rōe uic.
 acut. com. 21. post
 principia. primi
 prognost. cō. 29.
 & 30.

l . 14. meth. cap.
 4. & 2. ad glau.
 co. 3.

Oedema 22^o

m

2^o

m . ut 7. aphorif.
 16. Ideo leoni . 2.
 ad Glaco . tradus
 cit phthisicis , ubi
 græcè dicebatur
 φθόρυ .

n . 14. meth. cap.
 4. & 2. ad Glau
 co. 3.

o . 2. ad Glau. 3.

p 14. meth. cap.

4. in prin.

q 2. ad Glauco.

cap. 3.

r libro. 4. ca. 27

s libro. 15. ca. p^o.

t libro. 3. cap. 48

post principia.

Linacri dor-
mitatio.

u 14. meth. c. 4.

Galenus locus

x lib. de Symp.

diff. cap. p^o. post

prin. & 2. meth.

3. de consti. art.

med. 15. libro. de

morb. diff. cap. 8.

post medium pⁱ.

de locis aff. cap. 2.

circa mediū p^o. li

bro de officina me

dici com. p^o. postprin. et p^o. epidē.cōst. p^o. cō. 22. &cōsidera pⁱ. apho

rij. 4. 24. & ter

tij 28. & sepe.

y lib. 4. cap. 27.

z lib. 15. cap. p^o.

a 14. meth. cap.

4. et 2. ad Gla. 3.

b lib. 4. cap. 27.

c lib. 15. cap. p^o.

Cōtra Taga

ultium.

Libro pri. cap. 10.

in prin. & antea

in generalibus di-

uisionibus in diui-

sione oedematis.

maximēq; in extremis cruribus pedibus ue: In quibus tanq; à caloris fonte remotissimis imbecillimus calor est. propterea nō temerē Galenus^p ait: Egdē scio aliter quoq; oedemata prouenire, sicut in pedibus in aqua intercitis affectibus & c. & Aliter, intellige, q; ex pituita, Quoniam. s. ex uaporofo flatuoso ue spiritu: quemadmodum alibi^q etiam ex ipso didicimus. Cuius uerba, & illis denotatam sententiam Paulus, & atq; ipse etiam Aetius^s exscribentes confirmarunt. Qui nihilominus pedum tumor in duabus aqua intercitis speciebus: tympania uidelicet, atq; ascite, uaporosis ex spiritibus, absq; pituita defluxu, fieri consuevit. In alia uerō spē, quæ à græcis (paulo^t etiam docēte) λευκοφλεματίας, uel ὑπὸ σαρκί δι' οὐδ' ὑδρὸς. uel ἀνασάρκεια nuncupatur, nonnunq; etiam (ut idem ait) in tota corporis mole frigidior, pituitosiorq; sanguis cōtinetur: qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis, ueluti in aquam resoluta emanat. Ad dō ut corpus albido, & pituita colore, emortui in star appareat. In hac igitur aqua intercitis specie mistus uidetur affectus fieri, partim s. ex defluente pituita, partim uerō ex flatuoso uaporofo ue spiritu. Quamobrē & alia quidem ratione morbus, alia uerō symptoma non immeritō dici queat. Verum enim uerō ex ijs quæ præostensa iam sunt Linacrum^u dormitasse liquet, oedema id quod symptoma duntaxat est & multitudinis eius quæ hominem premit & uertentem: græciq; interim codicis lapsū minimē considerantem. Vbi. n. & πλῆθος & idest, multitudinis, seu plenitudinis habet, legendum uel cæcis apparet & ὁδὸς & hoc est, morbi (Capi. n. posse ὁδὸς latine passionem pro morbo, licet improprie, communiterq; non semel Galenus & ipse testis est: quæ quidem, & aliorum quoq; græcorum morem insequens, ὁδὸς pro permanente affectu morbo ue sæpenumerō usurpat.) Quam tamen contextus de prauationem, cum ex Pauli, & atq; Aetij, & qui Galeni uerba, ueluti prænotauimus, exscribunt, græcis codicibus inspectis cognoscere perfacile potuerat. tum etiam ex ipsa re certius id fieri promptum erat. Siquidem, & tabem, & cachexias malos ue habitus, aut aquas intercutes insequi, præscriptum à Galeno est: in quibus πλῆθος, multitudo ue, nulla dubio procul existit. tum tertio ex antiquiori uersione palatum fuerat, sic dicente in quibus demum non dispositionem, sed eam consequens symptoma dicendum & Duplex igitur (ut ad id, unde digressi sumus, reuertamur) oedematis species est. Altera quidem ex defluente ad locum tenuiori pituita generationem suscipiens: Quæ morbus est. Altera uerō ex uaporofo potius, flatulentoq; spiritu originem ducens, non morbus, at aliorum morborum insequens symptoma: nullamq; propterea sibi propriam curationem efflagitans. Priorē ergo speciem & Galenus^a et eius sectatores, Paulus^b atq; Aetius^c intellexerunt, quum sic aduersanter subiunxerunt. & At si ex pituitoso humore in particulam influente oedema constat, abundē aliquando satisfacit spongia. & c. & Quibus omnibus exquisitē, ut operæ pretium est, pensatis: à Galeni simul intentione, & ueritate deuio esse liquet eos, qui quidem oedema id, quod symptoma cum Galeno supposuimus, adhuc subdiuidunt, Vel ex pituitoso humore, Vel ex uaporofo spiritu generari dicentes: quasiq; differre abinuicem, ex pituitosi humoris defluxu, aut ex pituitoso humore fieri, supponentes. Id quod nonnihil sibi ueritatis adiungere fortassis ualeret: si æquē in cruribus pedibusq; generari pituita posset, ac uaporofo spiritus eleuari ab illorum imbecillo calore contingit. Verum secus profectō, q; ipsi opinantur, se habet: Cum ex uenis elargiri pituita: haud in ipsis cruribus pedibus ue generari posse perspicuū sit. VERVM

quia

quia secundam œdematis speciem tetigimus : quæ plurimum affectuum symptoma est : Hanc autem ad genus althebegi, seu thebegi Princeps ipse (uti uidebimus ^d) reducet . Thelegi uerò ab ipso in uentosum apostematum catalogo præscribitur ^e : Hanc obrem futile non fuerit ipsum quoque uentosum tumorem hic obiter definire , præsertim quia Galenus libro quem interpretamur , de tumoribus . s. præternaturam , & si multos antea tumores tanquàm à medicis necessariò pernosceudos , tum quò ad eorum generationem , tum etiam quò ad substantiam , enarrauerat : inter quos & ipsas quoque πνεύματωσες (inflationes nonnulli ex nostris f conuertunt) pari ratione considerandas proposuerat ^g . Alijs tamen deinceps definitis , nil amplius de huiusmodi πνεύματωσες , inflationis uel generatione , aut substantia meminit . Qua de causa neque inter tumores à Galeno in illo libro definitos antea nos , in nostro tumorum catalogo , reposuimus ^h . Tuum uerò est illis etiam hunc adiungere , ac duos & sexaginta numero determinare . Nosce tamen operæ pretium , maiorisquè momenti est , Græcos tria distincta nomina , diuersis rebus ostendèdis , imposuisse : Videlicet ὀίδημα πνεύματωσιν & ἐμφύημα : Quauis traducuntur plurimi usque ; adeò nonnunquàm , dormitarint , aut uarij abinuicem extiterint , ut nobis inflationem pro quolibet illorum conuerterint . Qua quidem æquiocatione græcarum literarum mopes magnoperè perplexos uidimus . Vt modo unum , modò aliud intelligerent . Nuncquàm bisariam , nunc uerò trifariam capi inflationem , uel Galeni (ut existimant) sententia protulerint . At enim uerò secus esse , ac illi machinantur , ex græcorum nominum definitionibus liquere perfacile poterit . ὀίδημα namque , quod nos œdema latinis characteribus scribere solemus , quauis apud Hippocratem ὀίδησος quoque aliquando ^k proferentem , ueterrimosque tumore omnem indifferenter , (Galeni testimonio ⁱ) præsetulerit : Ipsius tamen Galeni æuo & reliquis deinde iunioribus mollem , indoloriumquàm , ac laxum tumorem ostendit : siue mortuus existat , ab aquosa tenuiquàm pituita originem ducens : siue symptoma sit , à uaporesco spiritu (ueluti præostensum iam est) genitum . Id Leoniceus ^l inflationem sæpenuerò conuertit . πνεύματωσιν uerò , & ἐμπνεύματωσιν (quam similiter multi ^m inflationem traducunt) commune genus existit ad eum tumore , qui ex flatuoso spiritu in spatiolis porulisque ; ratione contemplabilibus insperso genitus est . quamquàm paulò ante alteram œdematis speciem , ex Galeni monumentis ostendimus : & ad alium quoque tumorem , in quo flatuosus spiritus in spatio sensui exposito colligitur : Isque ille est , quod speciali quidè nomine ἐμφύημα nuncupabimus . Inquit , n. Galenus ⁿ ἡ δὲ πνεύματωσιν γίνεται δὴ τῶς : ἡ τῶι κατὰ τίνος αἰσθητῆος κοιλότητος ἀερίοιζομένου πνεύματος φυσώδου , ἡ λόγῳ θεωρητῆος . quod est (ut uerbum uerbo reddamus) spirituiificatio autem dupliciter fit : nempe collecto spiritu uentoso in quibusdam cavitatibus , uel sensui expositis , uel ratione cõtemplabilibus . Quam porrò distinctionem Glauconi etiam scribens confirmauit ^o . Intelligo autè cavitates ratione contemplabiles , quia sensum effugiant , ipsos simularum partium porulos , atque interposita similibus spatiola : quæ in mollibus quidem , sensui proculdubio occulta (Galeni etiam testimonio ^p) sunt . Quamobrem , & euestigio præscriptis adiunxit : 1 Fuerunt sanè qui aliquando tumores præternaturam in musculis secuerunt , tanquàm pus in imo reperiuri : Sed nihil aliud præterquàm spiritum , qui totam per carnem minutatim disseminatus esset inuenerunt . Dicens igitur totam per carnem minutatim disseminatum esse spiritum , id quod iterum post pauca repetit : in carnis porulis dispersum esse uoluit . Id ipsum uerò nil aliud , quàm secundam

d infra tra. 2. ca.

2 lex. 3.

e ibidè cap. po.

lex. 4. & 2^a pi.doc p^a cap. 5. cir

ca finè.

f ut Limanus, et

Riccus.

g de tum. præter

natu. cap. 6.

h supra fo. 77.

ὀίδημα.

i 5. aphorif. com.

6 s. i. prin. & 4.

eiusdem com. 34.

ante med. u. ei pri.

prognost. 29. 30.

& 4. de rōe uic.

acut. cō. 21. post.

prin.

k 3. de fracturis

t. & com. 8.

l 4. aphorif. 34.

& 5. cō. 6. in

prin. licet recentio

res Leoniceu lite

ram correxerint.

πνεύματωσιν

m ut Limanus, et

Riccus lib. de tus

mo. præ. nat. ca.

6. et Vasseus. 4.

de rōe uic. acut.

com. 21. post prin.

n 4. de rōe uic.

acut. com. 21. post

prin.

o 2. ad Glauco.

cap. 5. circa medi.

p lib. de inæqua

li inieperie cap. 2.

et 9. de usu. par

tū p^a. & 2. de tē

peramētis. 5.

q 4. de rōe uic.

acut. 21. ante m.

ἐμφυσμα

r 14. meth. cap.
7. circa princ.s 2. ad Glauco.
cap. 5. circa medi.t 2. p. doc. pa.
cap. 5. in fine. &
ira. sequenti cap.
19. tex. p.
u tr. sequenti cap.
19. tex. p.z infra. tr. sequenti
cap. 19. tex. 3.

secundam œdematis speciem nobis indigitare prima fronte uidetur. Nihilò secius tamen & tertiam quandam tumoris differentiam, quæ sub emphysemate quoq; contineatur subtilius ue stigantibus significabit. Fieri. n. posse ἐμφυσματα (latine aptius inflationes, quemadmodum πνευματώσις, spirituiificationem conuertere latinis possumus) ex flatuoso spiritu, non uno tantum in loco, amploq; interstitio aceruatim collecto: uerum & ex eo per minutulas partes in musculis, aut alia quoq; parte disperso, Galenus idem alibi nobis insinuat. Etenim cum huiuscemodi tumorum ab œdematis morbi differentias ostenderet: prædixeritq; eò differre, quod pressa digitis emphysemata inflationes ue in foueam minimè concuantur: ac secundo quia sonitum uelut tympanum reddunt: Denique tertio subdit, quod in cavitare sensibili πωλλάκις, hoc est sæpè, siue crebrò continentur, atq; hæc nonnunq; maxima. Dicendo igitur tertiam differentiam esse, quoniam hæc sensibili sepe numero in cavitare continentur: innuit nonnunq; in cavitare sensum latente posse ipsum emphysema inflationem ue generari. Ut tertia quidem differentia in hoc persistat: Quoniam œdema semper ob materiam, in cavitatibus sensui occultis, rationeq; potius contemplabilibus dispersam gignitur: Emphysema uerò sæpè in spatijs sensibilibus aceruato spiritu efficitur. Quamobrem & alteram πνευματώδες, spirituiificationis ue speciem rursus distinguere, penès has ratione contemplabiles cavitates oportet. Vel. n. in porulis membrum ipsum tales flatuosos uaporesq; spiritus recipit: Tunc q; altera, quam diximus, œdematis species fit. Vel nuper effectis ob contusionem aliam ue causam minimis interuallis aceruatim suscipit: Tuncq; altera emphysematis spes gignetur. Perinde atq; altera ab hac est: quæ. s. in sensui pernotis, publicisq; uacuitatibus, ut in uentriculo, intestinis, atq; medio inter hæc & peritonæum uacuo, recepta uentositate, producit. Hæc nanq; uel cæcis manifestæ cavitates sunt. In rupta uerò ob contusionem, siue aliam quacunq; causam carne, aut in quo muscoli se inuicem contingunt. Quin si rectius perpendere uoluerimus (licet seorsum Galenus enarret) sub mēbranulis etiā tum musculos, tum ossa, tum deniq; singula priuatim uiscera circundantibus, sensui occulta spacia existunt: quæ tamen deinceps latiora fiunt: ut cuius pateant, ubi uidelicet prædicto flatuoso spiritu distenta, nec non dilatata iam sint. Itaq; ab inuicem secunda œdematis, atq; altera emphysematis inflationis ue species differunt (Et si utraq; flatuoso ex spiritu, in minimis ac sensum effugientibus spatiolis inperso genita est) Nam illa ex huiuscemodi spiritu fit in minutissimas particulas diuiso: ut roris instar in ipsis porulis inpersus nec nō disseminatus, ac (uti princeps ait) mēbri substantiæ admixtus remaneat, nec multum interea partem ipsam tanq; tenuis, debilisq; existens uapor, ac per hoc leuis à Principe uocatus distendat: ex quo fouea prementibus digitis fieri potest. Hæc uerò quanq; in minimis etiam spatiolis recepto prius uento gignitur: Vsq; adeò nihilominus in simul materia congregatur, ut magnoperè membrum ipsum distendat, sensuiq; manifestam quandam cavitatem, dilaceratis deniq; partibus, efficiat. Sic q; in foueam excuari nequit: Verum instar tympani percussa pars affecta resonat. De hac igitur appositè Princeps ait: Et fortasse non ingreditur spatia, immo separat mēbra coniuncta, & ingreditur ea, & generatur in eis quod est necessarium disrumpere ea: & uentositas remanet. His ergo sedulo perpensis, πνευματώσις græcè, latine autem spūificationē de tribus posse flatuosis tumoribus, ueluti sub se contentis speciebus, prædicari perspicuum fit. Quorum primus, alterum œdema est:

Duo

Duo uerò reliqui græcè *εμφυσήματα*, latinè autem inflationes peculiari nomenclatura uocantur. Auicenna² primum, ad genus Thebegi reduxit: & quatenus ex flatuoso spiritu fit, sub uentofo apostemate collocauit: generatim Videlicet capiendū uentofo apostema. ut idem sit, quod græcis *πνευματώσις*. Alibi² uerò cum ex phlegmatis uapore nōnunq̃ fieri posse idem considerarit, substantiæq; membri sic infusum, & inspersum esse talem uaporem intellexerit, ut in foueam premente digito cauetur, ad œdema reduxisse tandem decreuit de genere tamen althebegi esse adiungens. quauis proprij (ut uidetur) sermonis oblitus deinde non amplius thebegi sed illi simile pronunciarit. Est autem Thebegi seu cum articulo Althebegi apud Arabes (teste Andrea. Bellunensi^b eorum idiomatis peritissimo) idem quod tumefactio quedam similis cachexiæ. unde Cachexia est tumefactio faciei, & extremitatum, causa debilitatis hepatis. Sed Thebegi est nomen commune ad cachexiam ueram s. quæ prouenit uitio hepatis, & ad tumefactionem membrorum similem cachexiæ, prouenientem ab alia causa: Sicut tumefactio oculorum, & faciei ex fomno prolixo, & alia consimilia. Quæ autem ex uento in unum aggregato, siue manifesta quamprimum ab initio cauitas extiterit, siue deinceps ab extendente separanteq; materia facta sit, ab Auicennæ interpretibus inflatio dicta est. Verum de his usq; adeo dictum sit: quod tum œdematis tum emphysematis materia pernoscat. Illius. n. uel defluens pituita, quæ tenuis quidem consistencia sit, uel spiritus uaporosus membri substantiæ admixtus (ut infra^c rursum ex ipso etiā Principe declarabimus) materia generationis est. Huius uerò in uniuersum spūs flatuosus. Vocatur autem (Galenus^d no docente^d) non solum flatuosus, sed etiam flatus uentus ue huiusmodi spiritus crassus, ac uaporosus existens, non secundum substantiam æthereus, neq; tenuis. Velut. n. aer qualis in austrinis constitutionibus, haud qualis in aquilonaribus conspicitur. Fit autem huiusce spiritus uenti ue generatio (ut eius quoq; substantiam atq; temperamentum unā cum Galeno^e pernoscamus.) ex crudis glutinosissq; & crassis, ac temperamento frigidis in animalis corpore inuentis succis. Qui tamen lente, atq; imbecilliter calefiant. Lentè inq; & imbecilliter. Superfluous. n. ac nimium excedens calor usq; adeo quidem attenuat, ut in halitum deniq; sensum effugientem discutiatur: uel fortassis crudum ipsum humorem concoquit. Nimium uerò debilis, aut sincera existens frigiditas prorsus halitus non facit. Atq; uno uerbo (appositissimè Galenus^f ait) tanq; extrinsecus tum frigidissimi status sunt sereni, solentq; maxime flāte borea fieri: tum calidissimi, qui æstatis tempore incidunt, ambientem aera purum reddūt. Qui uerò inter hos sunt nebulam gignunt. Idem in animalibus neq; in caloris summa imbecillitate, nec cum idem nimium est uehemens: Sed in ijs qui inter hos sunt statibus flatuosum excrementum gignitur. Verum de his hactenus hoc loco dictum sit: donec non œdematis modo, sed emphysematis quoq; materia causaq; pernota iam sit. Ad alios igitur tumores progredi tempestiuum est. ITAQUE secundum & uigesimum tumore, ulcerosum alioquin existentem, contemplemur. *φαγέδαινα* græcè uocatur, ἀπὸ τοῦ φαγεῖν, hoc est: ab edendo. quasi dicatur latinè exedens, seu corrodens. Vlcus. n. semper est (Galenus^g ait) idq; *ἐσθίουμενον*, id est exedens: siue *ἀναβιβαστικόν*, hoc est depascens, corrodens ue: siue quomodocunq; appellasse libet. Quot in re ab herpete non semper ulcere existente differt. Verum non ratione quā ulcus est nos hic phagedænam declarare proposuimus: At quā talis ulceris oræ uitiosissimo succo, præsertimq; (ut uidebimus) atra bile necessario infartæ sint, ut præter

infra tr. sequenti cap. p.º. tex. 4.
& 2. pi. doc. p.º.
cap. 5. infine.
2. tr. sequenti cap. 2. tex. 3.

Thebegi.

Althebegi.

a Ibidem cap. 19
tex. p.º. et cap. 20.
tex. etiam p.º.

b In expositione
arabi corum nomi
num litera. T.

c In hoc commē
to in expositione
distinctionis 32. et
et tr. sequenti cap.
p.º. co. 2.
d 2. ad Glauco.
5. uersus mediū.

e 12. met. ult. 14.
7º. et 21. ad Glau.
5. & 3. de sympt.
causis cap. 2.

f 3. de sympt. cau
sis cap. 2. post me
dium.

Tumor 22º.

Phagedæna.

g 2. met. cap. 2.

b Vbi supra. f.
2. meib. cap. 2.

Phagedæna

4^o significata

i 61. de morbis
uulgaribus eomē.

3. co. 37.

k post medium
libri.

l libro 3. chronion
cap. 3. in prin.

m 8. de compo.
med. secundum
loc. cap. 5. & p^o.
de sympt. causis
cap. 7.

n lib. 2. cap. 52.

o libro. 9. cap.

21. 22.

p 13. fen. 3. tra.

2. cap. 12.

q lib. 26. cap. xi.

anr medium.

r ut lib. 20. cap.

5. circaprin. cap.

13. post pri. & li

bro 31 cap. 9. uer

fus finem & lib.

35. cap. 15. circa

finem.

s lib. 28. cap. 18.

circa medium.

t lib. 10. cap. 13.

uersus finem.

Phagedæna

nomen quomo

do æquiucum

& quomodo

uniucum.

ut præternaturam tumor circumstantes ulceris partes occupet. Alioquin neque corrosio fieret: Nisi prauis (uti dictum est) succis affecta pars completa, refertaque iam sit. Nomine igitur (ut appositè Galenus^b ait) à symptomate, hoc est ab ipsa exedendi, erodendiue actione desumpto, phagedæna huiusmodi tumor, & phagedænicum ulcus nuncupatur. Quauis^{1m} & alios pari quidem ratione affectus nomen id præferre soleat. Quos ne in æquiucationem aliquandò insciij ceciderimus, pernotasse operæpretium fore arbitrati sumus. Nonul-
li. n. (Galenusⁱ quoque testimonio) phagedænas multorum ciborum esus esse uoluerunt: Quos^{2m} & ipsos à uitiatibus humoribus, immodicos edendi appetitus excitantibus, prouenire, ab ipso etiam Galeno conceditur. Adeò ut non esum modò, sed insimul esuritionem quoque uehementem insinuet. Id quod tùm inter græcos ab authore^k libri definitionum medicarum, absque ulla
conditione, confirmatur: sic definiente. Phagedæna est constitutio, in qua multum appetentes cibum, sumentesque immodicum, non ipsum retinent, sed ubi eiecerint rursus appetunt.
tùm inter latinos à Cælio Aureliano^l declaratum: quum ait. Est etiam phagædena ex stomachi passionibus: qua affecto sequetur cibi uehemens appetentia: quam græci ὀρεξις appellant, & coaceruati accipiendi cupiditas, & immastricata transuoratio. Tunc grauedo, atque tensio, & propterea uomitus, quem sibi coacti, atque oppressi prouocant ægrotantes: corporis macies, pallor: aliquandò etiam uultus inflatio, oris pædor, &c. Quorum nuper dictæ definitiones non alium esse affectum, phagedænam ostendunt; quæ is qui à Galeno,^m suisque sectatoribus, Pauloⁿ, Aetio^o, atque etiam Principe^p caninus appetitus, seu fames dicitur. Sic. n. huiusmodi affectus à Galeno definitur: quod. s. eum habentes, & plurima edunt, & maxime grauati paulò post reuomant. Qua de re à canibus nomen affectus desumpsit. non modò quia ueluti canes uehementer esuriunt, comeduntque: uerum magis quoniam
niam canum istar (ut Aetius^o ait) euomunt, rursusque ad cibum reuertuntur. Itaque duplicem phagedænam iam iam prænotatum modum aduertens Plinius,^q aliquandò ait: phagedænis, quod nomen sine modo exedentium est, & aliàs ulcerum, tithymali medentur &c. Alibi;
non semel distinctionis gratià & ulcerum & adiunxit & phagedænas, aut phagedænis ulcerum
dicens. Quemadmodum quoque interdum^r ait & Ea uerò quæ phagedænas uocant, in ulcerum genere, corij bubuli cinis cum melle &c. & Quod phagedæna nomen (ut maior eius æquiucatic pateat) alium quoque à præscriptis duobus diuersum affectum ueteribus (Columella^s teste) significauit: Apium uidelicet quandam ueluti luem. Sæpè. n. (inquit) uitio, quod
græci φαγέδαινα uocant) intereunt. Siquidem cum sit hæc apium consuetudo, ut prius tantum cerarum confingant. quantum putant explere se posse. Nonnunquam euenit, ut consummatis operibus cereis, ut examen conquirendi mellis causa longius euagatum subitis imbribus, aut turbinibus in syluis opprimatur, & maiorem partem plebis amittat. Quod ubi factum est: reliqua paucitas complendis fauis non sufficit. Cumque uacue cerarum partes computrescant, & uitijs paulatim serpentibus, corrupto melle, ipsæ quoque apes intereunt. Quin & quartum quoque affectum ueteres phagedæna nomine interdum ostendebant: iumentorum. s. quem uulgò uermem quoque nuncupare solemus, eorum crura sic exedendo corrumpentem. Quauis autem una eademque in omnibus nomenclaturæ communis ratio uideatur: erodendi. s. exedendiue. Quia tamen diuersas erosionum formas, ac maneries obtinent. ut illud
s. tale nuncupetur quoniā hominis carnes erodat. Aliud^t uerò, quoniā ipsemet homo uehementem

menter

10 menter esuriat, comedatq; . Aliud³ deinceps quia serpens putredo & mel & fauum cor-
 20 rumpat: ac ipsas apes interimat. Aliudq;⁴ demum quod iumentorum præcipue crura quis-
 30 busdam præsentatis foraminibus exedat. Idcirco æquiuiocum potius nomen phagedænam, q̃
 40 uniuiocum determinauimus. Verum de his obiter pro nominis duntaxat significatione perno-
 scenda, intantum dicta hic sint. Ad id ergo cuius causa hæc enarrauimus, reuertamur: ul-
 50 cerosos Videlicet, phagedænicos uel hominis tumores. De quibus Galenus⁵ quidem loquens,
 60 ait: Quæcunq; autem ex ipsis (.s. ulceribus) depascuntur, atq; circumiacentia corpora at-
 70 tingunt, quod sanum est ea continens erodentia, omnia hæc à græcis φαγεδαίμων, nun-
 80 cupantur: Quæ uero ex utrisq; composita sunt: ulcere. s. & tumore circum ambiēte φαγέ-
 90 δαιμων uocant (de qua nos impræsentiarum loqui intendimus.) Depascitur quinetiam &
 100 herpes circumuicinas partes, uerum solius cutis ulceratio existit. phagedæna uero una cum
 110 cute quæ subiecta sunt attingit. Fiunt autem ex atra bili (prout idem⁶ ostēdit) atq; humo-
 120 rum cacochymia corruptione uel (eodē alibi⁷ authore) Eoq; maior erosio fit: quod uitiosior
 130 corruptiorq; materia fuerit. præsertimq; si uenenositatis nonnihil participaret. Quæ nihilo-
 140 minus materia (Galenus⁸ etiā dogmate) inter eam quæ cancrorū, & eam quæ herpetum: atq;
 150 erysipelatum quoq; causæ sunt, media crassitie consistentia uel existit: Suppurationiq; (ut
 160 idē⁹ ait) rebellis. Quod uero nonnulli aiunt, de qua nunc loquimur, phagedænam uolūis, hoc
 170 est pascentis putredinis speciem esse, nequaquam admittimus. Cum nome serpentem put-
 180 redinem depascentem uel significet etiā si ulcus ipsum minimē serpat, cuius species gangræ-
 190 na potius q̃ phagedæna fuerit. Phagedæna. n. ab acribus erodentibusq; uel sine putredine
 200 humoribus generationem obtinuisse consuevit. Quamobrem non temere Arabum Princeps
 210 ait: Et putrefactio est alia à corrosione (uel ut alia habet litera) Et putrida est alia à cor-
 220 rosua. Et fortasse corrodens, est corrodens illud: quod continuatur ex: proprie propter acuita-
 230 tem absq; putrefactione. Et neq; est febris omnino. Vlcus itaq; putridum σαπιδών dicitur:
 240 quoties Videlicet, putridum sit minimē tamen serpat, uicinasq; partes depascat: quin & si
 250 ne ulcere σαπιδών putredo uel ipsa per se ipsam in multis corporis partibus (uti Galenus
 260 ait) cōstituitur. Sin uero absq; putredine serpat, erodēdo. s. carnem circumstātem: phagedæ-
 270 na dicitur: ab Auicēna, ulcus corrodens se, nuncupatum est. Sin deniq; utrunq; sit putre-
 280 do. s. atq; ēt erosio. ut putredo ipsa circumuicinas partes una cum ulcere depascatur. uel ēt
 290 absq; ulceris extensione sola putredo serpat, cuiusmodi in ipsius nonnunq; gāgrænæ primor-
 300 dijs fieri contingit. Tunc uolū dicitur. De qua Galenus¹⁰ aliquandō loquens, inquit. Ap-
 310 pellant nescio quomodo eum affectum omnes nunc medici uolū à uerbo νεκροειδής, quod pa-
 320 scere significat: propterea quod pergere pascendo id uitium ab ægris particulis ad eas quæ
 330 integræ sint soleat: atq; harum semper aliquid ægris adijcere. Quare non à substantia indi-
 340 catæ rei (haud. n. ulcus uel putredinem dictio uolū significat) sed ab accessorio (quod est ab
 350 ipso pascere) appellationem indiderunt. Tria igitur tanq; diuersa Galenus¹¹ interdum sup-
 360 ponit. Paulusq; apertissime indigitat: Sic eodē capitis titulo proponens & νεκρὸν uolū,
 370 καὶ σαπιδών, καὶ φαγεδαίμων quod est & de nomis depascente uel putredine, & putri-
 380 dis, & phagedæna, seu corrodente. & Quod si tria nomina confundere nonnunq; libuerit:
 390 nullum profectō absurdum succedet: modò rerum differētijs obseruari. At enim uero (quod
 400 maioris momenti est) nō parua hic ambiguitas insurgit. Siquidem Galenus¹² alicubi¹³ pha-
 gedænam

u libro de tum.
 præter naturam.
 cap. 14.

x. ibidem coniu-
 gendo cū cap. 13.
 & 14. methodi
 cap. 17.

y 3. de tempera.
 cap. 3.
 z 14. meth. cap.
 17.

a 3. apbo. cō. 22.

Contra Mas-
 nardum, &
 Tagaultium,
 et Agricolum.

b 4. 4. tr. 3. cap
 pri. ante med. uim.
 σαπιδών.

c 6. apbo. cō. 45.
 d ubi supr. cap. 8.

uolū.
 e 5. meth. cap. 4.
 infine.

f 4. de cōp. med.
 secundum genera
 sec. 10.

g lib. 4. cap. 44.

h ut. 14. meth.
 cap. 17. et ita col-
 ligi pot. licet nō ne-
 cessario. lib. de tu-
 mo. præ. na. ca. 14.

Dubitatio.

i ut. 2. meth. cap.
2. et. 5. aph. cō. 22.
6. eiusdem cō. 4. s
et. 3. de tempera.
cap. 3.

k De phagedæ-
na lib. 4. cap. 44.

l De chironijs et
telephijs. ibidem
cap. 46.

m lib. 5. cap. 28.
sec. 3.

n libro. 6. cap.
18. sec. 4.

o libro. 5. cap. 28.
sec. 5.

Solutio.

p 6. aph. cō. 4. s.
post prin.

q ut. 14. meth.
cap. 17.

r ubi supra. 6.
aphor. 4. s.

s ut. 2. meth. cap.
2. et. 5. aph. 22.

6. eiusdem 4. s. et
3. de temperamētis
cap. 3.

t 6. aph. 4. s.

u libro de tumor.
præ natu. cap. 14.
in fine.

Phagedæna
Trisaria (p.
capi potest.

2.
3.

x supra fol. 117.
in fine. et 118. in
prin.

gedænam à chironio, telephioq; ulceribus: tanq; commune genus à subiectis speciebus dis-
tingui: Alicubiⁱ uerò non tanq; genus à speciebus, uerum non secus, ac tertià ab illis ma-
ligni contumacis ue (græcè κακονδουσ) ulceris speciem secerni ostendit. Quam porrò in
Galenī scriptis uarietatem plurimi nequaquàm olfacientes absolūtē, ac perpetim phagedænae
species esse tum Chironia tum Telephia ulcera (uel Galenī sententia) supponunt. Cum
tamen non ex Galenī duntaxat monumentis elegisse promptum fuerit: uerum, & ex ipso et
Paulo. qui quidem seorsum, ac proprijs cuiusq; capitibus de Phagedæna, k & Chironijs
l Telephijs ue ulceribus determinauit. Idemq; à Celso etiam elicitur. qui de phagedæna
prius^m sub theriomate (ut uidetur) atq; herpete esbhiomeno intelligens, quin proprio nonnūq;
nomine (quum de colis affectibus loquiturⁿ) cancri speciem, more suo locutus, esse supponēs,
determinauit: De Chironijs nihilominus ulceribus, tanq; à phagedæna, quin à toto cancri
genere, atq; etiam theriomate, & esbhiomeno, dubio procul omni distinctis, proprio seorsum
loco scripsit^o. nihil serpere affectum hunc (pro maiori difficultate) adiungens. Ad cuius
nodi solutionem nosce quidem, ex Galenī sententia, p oportet q; ulcera, quæ semper maiora,
& detericra fiunt, omnia phagedænas antiqui nominabant: quo modo capta phagedæna,
communiter inq; Chironia, & Telephia phagedænae species dici possunt: ueluti nonnūq;
q Galenus enuntiauit. Quidam uerò posteriores (subdit Galenus^r) ea distinguere cogita-
runt, propriam singulis dantes appellationem: & quædam eorum Chironia nominantes,
quædam Telephia, quædam Phagedænas, & alias adhuc curiosas magis afferentes appella-
tiones. Hoc igitur secundo modo, propriè Videlicet sumpta phagedænae nomenclatura, nō
species, Chironia, & Telephia Galenus^s posuit, uerum per se distinctas à phagedænis dif-
ferentias. Quod si horum nominum uarietas, aut æquiucatio quampiam fortassis caliginem
induxerit: sufficiet nobis (Galenī^t etiam præcepto) ex ijs, quæ aliquid loci occupant cir-
cumstantis, nonnulla quidem herpetas nominare: quando summas tantum partes cutis oc-
cupauerint: Alia uerò communi nomenclatura phagedænas: quæ carnem subiectam corrū-
punt. Quinimò sat aliquandò fuerit ijs præsertim quorum labilis memoria sit) communiore
nomine cuncta κακονδου hoc est maligna (Galenī^u quoq; uenia) nuncupare. Atq; hæc
pro Galenī, suis in scriptis, concordia dicta nunc sint. Nam Celso, ac Pauli sententia, ex
ijs quæ in Chironij, Telephijs ue, ulceris sermone post hæc dicentur notissima fiet. Itaq; ut
phagedænae extremam manum imponamus, Trisariam capi phagedænam ex iam iam præ-
scriptis elicitur. Primò communissimè, ut non exedentia modò ulcera, uerum & ipsius uē-
triculi affectum, atq; apium labem, & deniq; iumentorum uulgo dictum uermem sub sua
communissima significatione concludit. Secundò & quidem arctius prout exedens corro-
dens ue duntaxat ulcus indigitat. Quo tamen modo ad Chironia Telephiaq; ulcera genus
existit. Tertiò (& omnium arctissime) ut erodentis adhuc ulceris quædam determinata
species est: à Chironio nihilominus Telephioq; differens. Quæ. s. carnē ipsam præter cu-
tīm exedis: non adedò tamen maligna, ut Chironium, Telephium ue, aut Cancer est. Hoc
autem tertio modo nos antea sumpsimus: quum in tumorum catalogo uigesimum secundum
ordine statuimus. Sicq; etiam nunc ipsum, ut ab alijs tumoribus distinctum, declarasse in-
tendimus. Cuius materia (ueluti prædictū est^x) atra bilis, uitisus ue, aut corruptus sanguis;
qualis in cacochymia reperitur, est. Sed ne absurdum quidem fuerit salsam nitrosam ue piz-
tuitam,

tuitā, præcipuè atræ bili, aut melācholico succo admistā, acriorēq; iā, ob aliquē feruorē, reddi-
tā phagedænæ causam aliquādō existere. ¶ QV A qdē exactiūs perpēsa, cōdecens est ad
Chironiū Telephium'ue ulcus pertrāsire. Quæ tametsi Galenus ut duo uidetur^y distincta ul-
cera supposuisse. Nihilominus tamē ut unū tumidū ulcus antea nos cōnumerauimus, Itaq; hoc
ē loco determinabimus: tertiu et uigesimū hūc tumorē supponētes. Id quod ut clariūs qdē elu-
cescat: quadatēnus circa nomina Chironiū, et Telephiū digrediētibz, enucleandū nobis est.
Etenim sciscitantibus, exq̄siteq; uestigantibus unde Chironiū ulcus dicatur: uariæ sunt dicendi
formæ, Zenodotus. n. (uel Erasmo^z referēte) q̄a Chiron centaurus, in bello aduersus centau-
ros, ictus ab Hercule, uulnus immedicabile accepit in pede: unde & perijt: in paræmiam
10 cōmigrasse autumat. Vt χαρδονιον ἔλκος .i. Chironium ulcus seu uulnus de immedicabili
quouis malo, seu uulnere, aut etiam spontaneo ulcere dicatur. Plinius^a uerò, atq; etiam
Ouidius^b non sponte ab Hercule uulneratum Chironem testantur: At cum hic Herculis
amici potius, exceptiq; hospitio arma pertractaret. Sagitta fortē fortunā incidit in pedem
(ut Ouidius ait) sinistrum. Inde q; hic mortuum, Plinius uerò centaurea curatum, referūt.
Inquit. n. Naso. Dumq; senex tractat squalentia tela uenenis, Excidit, & læuo fixa sagit-
ta pede est. Ingemuit Chiron, traxitq; à corpore ferrum: Et gemit Alcides, Hemoniusq;
puer. &c. Quod si mortem ob sagittæ uenenum obijse crediderimus: AEquè ac paulò prius
dictum ex Zenodoto est immedicabili de uulnere χαρδονιον ἔλκος intelligetur. Sin uerò
non mortuum, sed centaurea semetipsum curasse Chironem, unā cū Plinio, atq; alijs quoq;
20 non paucis existimauimus, Rōe cuius quidem curationis, quia semetipsum ab atrocis uene-
ni ui tam diligenter liberauerit, immortalem poetæ, quin ad perpetuam sui nominis memori-
am inter astra locatum effinxerunt: Centaureamq; ipsam posteriores multi. Chironem, ob
sanatum Chironem, appellarunt: Chironiū inde uulnus, ulcus'ue dicendū affirmabimus:
Quoniā. s. usq; ad eò cōtūmax malignūq; est, ut salutiferam Chironis manū, atq; artē, pro sui
curatione, desideraret. ut qui si uenenosum uulnus curauerit, promptius quæ uenenosa non
sunt, etiā si malefica quouis modo sint, sanare poterit. Siuē aut Chirō mortē eo uulnere obie-
rit: Siue semetipsum Cētaurea, uel alio quouis alexipharmaco liberarit: cū plures alij, ante
ipsum ēt Chironē, tali uulnere uel mortui, uel liberati fuerint: à qbus nomen deduci nō minū
poterat. Magis qdē inde ulceris nomē deductū esse mihi arridet. Quoniā. s. primus nō herba-
rū modò aut medicamētōrū (prout ex Plinio^c didicimus) uerū et chirurgiæ, antiquioris qdē (per
indē ac ex Homero tamē Celsus, d q; Galenus^e testatur) medicinæ partis inuētor hic fuerit.
Cuius rōe Chironē à manibus, manuūq; opere dictū esse aiūt. f Qui et AESculapiū educa-
uit, g ac Achillē erudiuit. h Cūq; (uelut Isidorus ait) nō hominū dūtaxat, uerū et iumētōrū
quoq; medicinā, et præsertim (uti dictū iā est) chirurgiā inuenerit: hōinis et equi filius à poe-
tis fictus est. Quas ob res q̄a primus ille tale ulcus (uel Galeniⁱ testimonio) sanauit. Idcirco
& ab eo tanq; primo, qn et peritissimo curatore nomē assumpsit. Quāuis aut Chironiū ulcus
id dici nō temerē queat, quodcūq; .f. Chironis experiētissimi, ac solertissimi chirurgi curatricē
salutiferāq; manū ob sui malitiā, cōtūmāciāq; & curationi rebellionē, exoptaret. Ne tamē in
distincta nominis significatio sit: hāc ulceris spēm à chirone primitus sanatā ueteres definie-
rūt: Quæ nō lethale qdem, sed curationi cōtūmax, ac soli (si curaturus reuiuisceret) Chironi
40 palmam exhibens ulcus præfert. Chironium ergo ulcus (ut à Celsō^k definitionem

Tumor 23^o
chironiū Te-
lephium'ue ul-
cus.

y ut. 14. meth.
cap. 17. s. apho.
22. sexti. 45. &
licet non expresse
idē tamē uidetur
2 meth. cap. 2. et
de tum. præterna-
turā cap. 14.

Chironiū ul-
cus unde dici-
tur.

z chil. 2. cent. 8.
prouerb. 21.

a lib. 25. cap. 6.

b in fastis libro
5. post mediū.

c lib. 7. naturalis
historiæ cap. 56.

ante mediū et col-
ligitur libro 30.
cap. 10. circa me.

d i proœmio pi.
circa prin.

e libro de salubr.
ad trasibulum
cap. 32. 33.

f Boccatus lib.
de Genealogia de-
orum. 8. cap. 8.

g uide eundem
lib. 5. cap. 19.

h ut idem lib. 7.
cap. 16. & lib.

12. cap. 52.
i 2. meth. cap. 2.

Chironium ul-
cus quod.

k libro. 5. cap. 28

K nacti sec.

nacti sumus) appellatur , quod & magnum est , & habet oras duas callosas , tumentes .
 Exit sanies non multa , sed tenuis : Odor malus , neq; in ulcere , neq; in eius tumore est . Nul-
 la inflammatio , Dolor modicus est : Nihil serpit : ideoq; nullum periculum affert : sed non
 facile sanescit . Interdum tenuis cicatrix inducitur , deinde iterum rumpitur , ulcusq; renoua-
 tur , & maximè in pedibus , & cruribus . Hæc de Chironio Celsus . Qui quidem cum nulli
 bi penitus de Telephio meminerit , idem esse id Chironio reputasse credendus est . Id quod à
 Paulo¹ manifestius habetur . Qui tametsi malefica malignaue prius in titulo , quæ Chiro-
 nia , & Telephia dicuntur ancipiti sermone proposuerat , dicens . περί κακῶν ἐλκῶν
 ἢ χαρῶν , καὶ τηλεφία καλεῖται : quod est de malignis ulceribus , quæ Chironia , &
 Telephia uocantur . Ancipiti inq; sermone : cum an idem , an diuersa sint , à chironijs Tele-
 phia , per hæc uerba determinare minimè queamus . Deinceps tamen se ipsum proculdubio
 sic determinat , ut idem esse apud ipsum sole clarius sit : Cum subdat , τὰ παλαιὰ καὶ συ-
 σκατούλωτα τῶν ἐλκῶν , οἱ μὲν χαρῶν προσηγόρευσαν , οἱ αὖ δὲ τοῦ χείρονος ἄν-
 τοῦ δέοντα πρὸς ἴασιν : οἱ δὲ τηλεφία , διὰ τὸ τὸν τηλεφον ἐν ἔλκε τοιοῦτον χρο-
 νίσαι . hoc est) ad uerbum fidelius interpretantibus) Inueterata & quæ uix cicatricem
 recipiunt ulcera , nonnulli chironia nuncuparunt , tanq; Chirone ipso ad sanitatem indigētia .
 Alij uerò Telephia , propterea quod Telephus in tali ulcere diutius perseuerarit . E quibus
 quidem Celsi prius deinceps uerò Pauli etiam uerbis patet non in erosione , aut depastu Chi-
 ronij rationem consistere (ueluti Galenus opinabatur , qui rationē phagedenæ in his posuit ,
 ac chironium deinceps ,ⁿ Telephiumq; phagedenæ species existere adiunxit) uerum in eo
 quod malignum , & curationi contumax est , ut inueterascere , atq; consensescere soleat , tum
 Celsus , tum etiam Paulus edocuerunt : Quibus & Arabum Princeps^o assentire uisus est , à
 corrosiuis id distinguens , quod corrupto uocabulo alkirunie , corruptissimoq; algeromati , &
 alieronati apud ipsum legitur . Horum igitur sententiam , præcipueq; Celsi , quam à Gale-
 no uetustioribus græcis exscriptam credimus , ueriores esse omni semoto scrupulo tenemus .
 Nisi exedens ideo dici posse contenderis , nō quia ad proximas & sanas partes ulcus ipsum
 1 serpat . Sed quia & sanguinem ad affectam partem pro nutrimento , carnisq; generatione
 2 defluentem corrumpat , quasiq; suo uitio exedat . Itemq; cicatricem , quam aliquandō effi-
 cere uidetur , rursus depascatur , ac profundam sæpenuerō cavitatem , eminentibus præci-
 puè callosis utrinq; oris retineat : qua de causa exesum quodammodo ulcus dicere possumus .
 Verum enim uerò ad Telephium reuersi idem esse Chironio reputamus , alia tamen ratione
 sic dictum : Quoniam .s. Telephus Nisiorum (ut aiunt) rex eo affectus sit : siue à Chiro-
 ne deinceps curatus euaserit : siue Chironis manum desiderans , eo tandem consenuerit .
 Quod si non ulcus , at uulnus Telepho (prout nonnulli uolunt) ab Achille illatum , & ab
 eodem quoq; sanitati restitutum intellexerimus : ut Ouidius P etiam ijs carminibus innuit .
 Vulnus Achillæo quæ quondam fecerat hosti , uulneris auxiliū Pelias hasta tulit . Vnde naz-
 tum quoq; adagium Eustathius scribit , ἰὼς ὁ τρώας καὶ ἄσσειται : quod qui uulnus intus
 lit , Ille idē persanabit . Quāobrē Telephiū dicitur , quoniā .s. Telephus passus sit , & quod sa-
 lutarē Achillis manū requireret . Sic .n. nonnulli exponūt . Nosce tamē operæ pretiū ē . eadē quoq;
 uia idem Chironum dici posse : Tum q̄a Achilles à Chirone educatus fuit . A quo rationa-
 bile est aliqua præsidiorum genera didicisse , quibus Telepho quoq; salutem præberet .
 siue

lib. 4. cap. 46.

Contra Gale-
num.

m 2. meth. cap. 2.

n 14. meth. c. 17.

o 4. 4. tr. 3. cap.
po. post mediū &
uide rursus cap.
10. circa princi.Telephiū ul-
cus unde dici-
tur.d lib. p. de reme-
dio amoris post
principium.q uide Cælium
Rhodiginum lib.
19. lec. antiquarū
cap. 10. uersus si-
nem.

40

siue rubigine ærugine, siue Achillæo ab inuentore nuncupata herba : siue utroq; usus
 medicamento, prout nonnulli (Plinio quoq; referēte) uolūt: Telephum Achilles sanauerit.
 Adeo ut pariter chironium dici queat : Quoniā nō nisi Chironis arte sanari ualeat. Tūm secū
 dō quia Chiro (uelut antea diximus) Aesculapiū educauit. Aquo etiā plurima in chirurgi-
 ca facultate Aesculapiū didicisse uerisimile est. Quāobrē Chironiū quoq; illud dici meretur,
 etiam si ab Aesculapio curatum esset: ut quia Chironis arte saluatum esset. Quoniā uerō nos
 hic non de uulnere, at de tumore, malignoq; ulcere loquimur. Idcirco Achillis tam uulne-
 rantis, q̄ curantis opere neglecto, Telephum ulcus spontaneū intelligemus, ab humorum pra-
 uitate genitum, quo Telephus diuturno tempore afflictus est, eundemq; chironij definitione à
 10 Celso nobis declarata concipimus. Galenus autem quauis pro duobus abinuicem distinctis
 ulceribus Chironiū & Telephum sumpsisse uideatur. Quia tamen nullibi uel alterum ex qui-
 sitē definiuit: Quin potius aliquandō huiusmodi nomina, tanq; superuacua reputans, sa-
 tis superq; fore dixit, uel ~~non~~ hoc est maligna, uel (ut alibi uoluit) phagedænas cō-
 muni nomēclatura nuncupare: Ex aliorū liquet opinione locutum, ac ignorasse potius ex-
 quisitam prædicti ulceris definitionem: Quæ de re sat sibi fore ait, quod maligna, cōtumaciaq;
 & ut credidit exedentia ulcera sint scire: quo etiam pacto ex Asclepiade communē quandā
 20 Chironij definitionem tetigisse nonnunq; uoluit, ^u dicens: Nominant. n. sic, uidelicet chiro-
 21 nia, ulcera non mediocriter maligna contumaciāue, sed maximē talia: Nos igitur (ut re-
 ceptū demū canamus) quod uerosimilius, atq; etiam Celso, nec nō paulo cōformius est, se-
 20 cuti, unam ulceris speciē, non duas reputauimus. Quæ de causâ tertū & uigesimū tumore
 numerantes chironium, Telephum uē diximus. Magisq; ad id accessimus. Quoniam prin-
 ceptū quoq; chironium ulcus (sub corrupto licet uti diximus uocabulo alkironie) aliquan-
 do nominās, Telephum tamen ut sub illo intellectum prorsus reticuit. Huiusmodi ergo
 ulcera (ne longius progrediamur) tumorosa sunt: quæ passim quotidie coram ecclesiis, præ-
 sertimq; in sollemnibus festiuitatibus conspiciunt, in pauperculorum mendicorum quandoq;
 brachijs, sæpius autem cruribus, ac maximē in tibijs, & pedibus. Quæ adeo quidem
 in illis occalluerunt, ut uix doleant. Et uniuersum ferē per orbem uagantur, elemosynam
 illius ulceris occasione non orantes modò, sed efflagitantes. Adeo ut ad finem usq; uitæ
 perdurans tale ulcus, non minùs lucri claudis, ac Ars quælibet sanis reportet. Quæ de
 30 causâ neq; uellent ab eo liberari, tam libenter cum illo, ceu perpetuo eorum socordiæ, ac
 segnitiei, simul ac gulositatis alitore uiuunt, Cuius quidem ulcerosi tumoris causâ, mate-
 riæue melancholicus proculdubio succus est, atræ nonnunq; bilis, ob frequentem corruptio-
 nem, non nihil admistum retinens. At de Chironio Telephioue ulcere satis superq;, ut
 proposito conducit, dictum nunc sit. Ad quartum ergo & uigesimum tumorem deuenia-
 mus. Scabiē inq;, græcè uerò ~~ωρίων~~ appellatam. Quam profectò longis, uarijsq; am-
 bagibus circumscribere superuacaneum est: cum sole clarior omnibus, passimq;, affectus
 sit: Nihilominus tamen quia lepræ affinis, congenerq; est, ab eadem. s. causâ, tenuitate
 duntaxat aliquantula, minori uē crassitie (prout uidebimus) differente, originē ducēs: Hac
 de causâ utranq; insimul (perinde, ac sæpenuerò Galenū, ^y ac postea Paulum ^z obseruaf-
 40 se offendimus) determinare certū est. Quò præsertim Lepræ nomē, in quo nō leuis æquo-
 catio cōcidit, q̄nā græcis, q̄ ue barbaris præferat, perspicuū euadat. Sicq; uigesimū q̄ntū
 K ij antea

r lib. 25. cap. 5.
 & lib. 34. ca. 15.

Cōtra Fuch-
 sum.

s de tumo. præ-
 terna. cap. 14.
 t 6. apborif. cō.
 45.

u .4. de compōe
 med. secundū ge-
 nera cap. 4.

x 4. 4. i. tra. 3.
 cap. p. post medi-
 um: & cap. 10.
 circa prin.

Chironia, Te-
 lephioue ulce-
 ra quæ.

Tumor. 24.
 Scabiēs.

y ut de tum. præ-
 terna. cap. 14. 2.
 de sympt. causis
 cap. 6. lib. de cibis
 boni et mali succi
 in fine. 14. meth.
 cap. 17. & sæpe.
 z lib. 4. cap. 2.

Tumor .25.^o
Lepra.

antea propositum tumorem enuclearimus. Quanta.n.Barbarolatinorum dogmatis confusio sit: è qua non semel pernities emanet, uel in huiusmodi duntaxat affectus definitione, confertim cui uis etiam candidato elucescet: Cum nesciant eorum plurimi lepram à lepra: & elephantum ab elephanto discernere. Græcorum inq; medicorum, Hippocratis, Galeniq; monumenta sectantium, λέπρων, Et Plinij, multorumq; pariter latinorum lepram, à lepra cunctorum serè medicorum (quos uidimus) Arabum: Et ab alia quoq; Haliabbatis lepra. Quam tertiam à duabus prædictis, non Haliabbatis modò, sed græcorum quoq; ac latinorum nonnullis diuersam esse declarabimus. Itemq; tam Græcorum, q; latinorum elephantum, ab elephanto Razis, & Auicennæ distinguere nesciunt. Pro quorum profectò nominum cognitione, aduertendum sedulo est, λέπρων Hippocrati, & Galeno, cæterisq; græcis (quos uidere nobis licuit) illorum dogmata sectantibus medicis: Nec non plurimis (perindè ac prædictum iam est) Romanis, aliud nomen minimè uestigantibus, at eadem lepræ nomenclatura, quam græci usurparunt, contentis: affectum quempiam usq; adeò à Razis, Serapionis, Auicennæ, Abenzoaris, atq; omnium penè barbarolatinorū lepra, grauissimo inq; pernitiosissimoq; nedum fœdissimo affectu differentem, huiusq; respectu leuissimum præferre: Vt eiusdem generis cum ῥέγων (quam nos, Plinio ^a quoq; teste, scabiem latinè dicimus) λέπρων esse protulerint. Solius.n.cutis affectus ambæ (Galeno b docente) sunt. Quamobrem de ambabus insimul, lepra uidelicet, ac psora loquens Paulus ait. ^c Vterq; affectus superficie aspritudo est, cum pruritu, & consumptione colliquatione ue corporis, originem ex melancholico humore trahens. Dicit autem paulus μετὰ ἁποτίξεως σώματος ἢ id est cum consumptione colliquatione (est .n. ἀνότῃς, qua semper aliquid à corpore abscedit, eliquaturq;) Quoniam, ueluti Galenus inquit, d ex mutatione consistunt solidarum partium: haud postmodum oborta, sicuti meliceris, atheromata, & c. Eo tamen differunt (quemadmodum Paulus ^e adiunxit) quia lepra profundius, circularibusq; erosionibus corporis cutè depascit, & pisciū instar, squamulas ex se remittit. Psora uerò scabies ue summa infestat potius, uarieq; figurata, furfuracea ex se corpusecula remittit. Quam porrò sententiā Aetius ^f quoq; ex Archigenis decreto, cōprobat. Et si latius multò passim uulgares scabiei nomē (ueluti rectissime nosser olim præceptor Manardus ^g aduertit) usurpāt: ut nō propriè dictā modò græcorū ῥέγων: sed plures alios, modò uarias insimul corporis partes, tam cū uera scabie, q; sine illa molestēt, affectus, prædicta scabiei nomenclatura significare cōsueuerūt. Vt Furūculos, Phlegmonas, Erysipelata, Rhagadas, profunda & crustacea ulcera, Psodracia, Exanthemata, Herpetas, & id genus multa. Dixi tā si unā cū uera scabie eandē partē affligēt, q; si absq; illa molestēt. Modò tamē propria scabies nō penitus absit: uerū alias intereā partes erodat. Quoniā igitur lepra, et scabies eiusdē generis affectus ī cuti, et ab eadē cā facti sūt. Idcirco nō temerè (prout dictū est) Paulus uno eodemq; insimul capite de utrisq; determinauit. ^h Princeps autē distincta seorsum capita de scabie, ⁱ et græcorū lepra ^k cōposuit. Quā qdē leprā ipse modò Albaras nigrā, modò Impetiginē excorticatiuā appellat. Verū de scabie latius adhuc Princeps ipse, q; græci, locutus ē: ut ī excorticatā (quā lepræ uiciniorē reputamus) et nō excorticatā: ī humidā, et siccā: ac de mū ī fœdā, et nō fœdā distinxerit: Nec solū ab atrabilario succo, sed à salsa ēt pituita, uel bilioso, aut quouis modo corrupto uitiosoue sanguine originē suā ducere scabiē uoluit. Fœdamq; uel exitus

a libro 20. c. po.
b lib. de tum. præternat. cap. 14.
c lib. 4. cap. 2.

d 14. meth. cap. 17. circa prin.

e ubi supra.

Lepra, et scabies quò differunt.

f lib. 13. cap. ult.
g lib. 7. epist. 2.

Lepra, et scabies eiusdē generis affectus.

h libro 4. cap. 2.
i de scabie 74.
4. tra. 3. cap. 6.
k De lepra ibidē tr. 2. cap. 9. 12. & tr. 3. cap. 3.

uel exituras secum trahere, uel ad impetigines (intellige, ut postea declarabimus, excor-
ticatuas, quæ nil aliud, q̄ læ præ græcorum sunt) uel alfabafati (hoc est, ut uidemus,
achorem, ac cerion fauum ue) conueri nonnunq̄ posse determinat. Quæ quidem omnia,
(ut causas quoq̄ scabiei pernouerimus, quas tum in hac ipsa tum in alijs præternaturam tu-
moribus inquirimus) ex ipso met Arabum Principe discamus, talia scribente. ¹ Materia ex 1 7. 4. tr. 3. ca. 6.
² qua generatur scabies, ¹ Aut est materia sanguinea, cui admiscetur cholera, quæ forsitan cō
³ uersa est in melancholiam, uel conuersa est pars eius in melancholiam: ² Aut materia sangui Duplex sca-
⁴ nea cui admiscetur pblegma falsum baurachium. Et prima quidem est scabies sicca, ad gros biei species.
⁵ situdinem decliuis. Et altera est scabies humida, & humiditas eius est humiditas ad suba-
⁶ litatem decliuis. Et illa (ut paulò post subdit) quæ est magis sparsa, & corpulentiore, &
⁷ acutioris capitis ex omnibus Bothor, est acutioris humoris. (intellige magis sparsam, in al-
⁸ tum, & corpulentiorem, hoc est in tumorem magis eleuatam) Et quæ est latior, & uehe-
⁹ mentioris profundationis, eius humor est minoris acuitatis (Quam proculdubio sententiam
¹⁰ ab Hippocrate, ^m atq̄ eius interprete Galeno de sumptam liquet: Quin lata exanthemata nō
¹¹ admodum puriginosa esse conscribunt) Et scabies quidem fœda (in calce inquit Princeps)
¹² attrahit exituras, & permutatur ad impetigines, & Alfabafati. Quò autem scabies à pru-
¹³ ritu differat, rectè (ut uidetur) princeps ipse explanat, dicens. ⁿ Et scabies quidem differt
¹⁴ à pruritu in hoc, q̄ cum pruritu non sunt Bothor, sicut sunt in scabie: quoniam ipsa est à ma-
¹⁵ teria grossiore, & minus declinante ad falsedinem, & in ea generatur. Legimus autem
¹⁶ & grossiore & tametsi Auicennæ codex & subtiliore & scriptum habeat: Quam quidem literā
¹⁷ dubio procul omni deprauatam esse reputamus ut hinc Gentilis, & aliorum interpretum con-
¹⁸ tentiones deleantur. Atq̄ id ipsum ex eiusdem paulò ante scriptis uerbis primum ostendemus:
¹⁹ deinceps uerò ex Galeno, cæterisq̄ etiam Arabibus confirmabimus. Inquit igitur Princeps.
²⁰ Et causæ quidem generantes materiam scabiei sunt causæ generantes materiam pruritus:
²¹ Verum ipsæ (quæ sc. generant scabiem) sunt fortiores, & appropinquant causis genera-
²² tibus pediculos, & alfabafati, & furfures, & impetiginem: Et approximant eis in cura-
²³ none &c. Si causæ igitur scabiem generantes appropinquant causis pediculos, aliosq̄ præ-
²⁴ narratos affectus generantibus, cui dubium crassiores ijs, quæ pruritus duntaxat exci-
²⁵ tant, existere? Cum præscripti affectus ex atrabilario potius succo generentur? Qua de re
²⁶ idem ait. Et ad ultimum materia pruritus aggregatur inter duas cutes. Quòd si de ea alia
²⁷ quid est in corpore (intelligo cutis) tunc est scabies sicca. Quæ uerba crassiore proculdubio
²⁸ materiam scabiei connotant, in qua profundius aliquid offenditur. In pruritu. n. (pro-
²⁹ ut antea dixerat) non accidit ex profundo aliquid. Quam sententiam à Serapione, ^o atq̄
³⁰ Haliabbate & colligere facillimè possumus. At cur à barbaris suffragium mendicare eniti-
³¹ mur? Si Galenum singula exactissimè declarantem obtinuimus. Qui quidem de expul-
³² tricis facultatis motu, unà cum rei molestantis sensu loquens, ^q ait: in quibusdam affecti-
³³ bus non motus esse, at tantum sensus. Cuiusmodi. sc. sensus in ulcerosa lassitudine aduertun-
³⁴ tur. Atq̄ hoc etiam magis in pruritu (qui xvi. 10. 105. o 5. breuiarij ca. 6. & 7.
³⁵ symptomate pruritusorum excrementorum est tantum sensus. Neq̄. n. aliter ea nominare
³⁶ datur: Nisi quis nitrosa ea, & salsa, uel amara nominare uelit: talis nanq̄ natura eorū est.
³⁷ Licet autem id intelligas, tum per ea quæ extrinsecus habentur: ueluti urticam, & scillam,
p 8. theoricæ ca. 17.
q. 2. de symp. causis. cap. 6. post prin.
xvi. 10. 105.

& muriam, & mare, aliāq; id genus: Nihilōq; min⁹ per ea quæ in ipso sunt corpore. Quippè illos, & sordidos, & qui cruditate laborant, & qui nutrimenta mali succi comedunt, hos pruritus exercet, Multoq; magis scabiosos, & leprosos. Propterea q̄ in his affectibus & copiosior, & crassior est uiosus succus. Quo utiq; & diutius & magis scabunt, q̄ ulli alij, qui citra talem pruriunt. Nec tamen iuuantur: Nec si seipsos immodicè scabendo exorient. Propterea nimirum quod eiusmodi succus infixus in ijs manet: Ac (ut ita dixerim) cuti impactus hæret. Non. n. adeo exiguus, & tenuis est, sicut in illotis, aut sorde affectis: sed plurimus, & crassus, interim uerò & glutinosus. Omnia igitur eiusmodi symptomata à uioso succo proueniunt. Dissident inter se causæ tum qualitate, tum magnitudine, itemq; quiete, & motu. Quippè tenuis, sal⁹, immotusq; succus in ijs est, qui pruriunt. Paruus, tenuis, mordens, & immotus in ulcerosis affectibus. Multus, sal⁹, crassus, & immotus in lepra, & scabie. Paruus, tenuis, & mordax, cum exiguo motu, in horroribus. Quod si uehementius mouetur, uel copiosior, mordacior ue est, concutientem rigorem infert, non horrorem. &c. Equibus quidem Galeni uerbis luce clarius fit scabiei materiam ea, quæ solum pruritus induxerit, crassiorem esse. Itemq; uelut ulcerosa lassitudo ad horrorem, horrorq; ad rigorem, ut eius quædam præuia dispo comparatur: eodem pacto, pruritus ad scabiem, hæc uerò ad lepram refertur. Adeo ut quemadmodum horror, paruus quidam rigor: & Rigor, magnus quoq; horror; Galeni decrens, dici potest. Ita quidem indecens absurdum ue minimè fuerit, pruritus esse leuem, atq; imbecilem scabiem: Rursusq; hanc esse maximum firmumq; pruritus. Ratione cuius intantum scabunt patientes, ut ulcera, pustulasq; & dolores, ac deniq; inflammationes in ipsis patientibus partibus excitent. Quinimò nil impedimento fore arbitror, si scabiem, dixerimus leuiorem esse lepram: Aut hanc fortissimam scabiem nuncuparimus. Cum in eo, quod magis minus ue est, huiusmodi affectus abinuicem differant. Haud. n. obflare interim poterit: quia. s. prurigo humoris tenuitate à scabie differat. Cum tenuioribus pruriendo, ac scabendo per balistum digestis: crassiores sæpenuerò partes retentæ, ac magis assatæ scabiem: & demum magis, ac magis assicatæ, nec non combustæ, subtilioribus semper portionibus discussis, lepram quoq; producere queant. Ex præscriptis etiam Galeni uerbis pruritus à scabie, & lepra secretum esse: quum uidelicet absoluto nomine pruritus, græcè uerò κνισμός proferimus: At scabiem, & lepram fortiori, ac multo pruritus necessario coniunctas esse liquet. Nec minus tam pruriginis, q̄ scabiei materia innotescit: quæ non solum atra bilis, at salsa etiam nitrosæue pituita, uel sanguis quoq; uitiat⁹, aut multæ amaræ bili nedum atræ commist⁹ aliquandò est. Quæ rursus materia quoties in maiorem adustionem, & crassitiem reducta fuerit, lepram gignere nonnunq; consueuit. Serapio lepram, & psoam eodem capite amplectens, illam impetiginem exoriabilem, & albas nigram, hanc uerò pruritus ipse, uel potius interpres (quam tamen literam postea corrigemus) nuncupauit: aliudq; deinceps caput de pruritu, aliud autem ab ijs seorsum de scabie adiunxit: quemadmodum de uera quoq; impetigine, græcorū. s. lichene seorsum antea determinauerat. Quod autem pruritus nomine, psoam: albas uerò nigræ, ac impetiginis exoriabilis dictione, lepram uoluerit: ex eo statim liquet, quoniam à paulo uerba de lepra, & psoa transcripsit: Dicens. Istæ duæ ægritudines simul sunt asperitas in superficie corporis extrinseca, Cum

Materia.

Pruriginis.

Ulcerosæ lassitudinis.

Lepræ, et scabiei.

(cor. m. p. m.)

Horroris. (2. m.)

Rigoris.

Obiectio.

Responsio.

3.

4.

r. s. breuiarij cap. 4.

n. fo. 128.

s. ibidem cap. 6.

t. ibidem cap. 7.

u. ibidem cap. 2.

pruritus

,, pruritu, in quibus excoriatur cutis: & accidunt ex humore melancholico. Verum
 ,, tamen impetigines excoriabiles (quas iam in capitis titulo prædixerat esse albaras ni-
 ,, gras) ambulant, & reuoluuntur in concauitate corporis secundum reuolutiones, & ca-
 ,, dunt ex eis cortices rotundi. Pruritus autem est pustula in eo, quod apparet de corpore: et
 ,, figurantur cum coloribus, & expelluntur ostraca furfurea. Quæ quidem non alia, quæ Pau-
 li uerba esse, tametsi uitiosa (ut barbarorum mos est) nemo sanæ mentis est, qui negare po-
 terit. Quod. n. Paulus ait: profundius lepram depascere: Serapio in concauitate corporis
 habet. Quod item ille, circularibus erosionibus lepram depascere inquit: hic, & reuolu-
 tur, ait, secundum reuolutiones. Aliæque (ut patet) barbaro modo relata sunt. Attamen ead-
 10 dem Pauli sententiæ præferunt. A quo deinceps Serapione Princeps^x etiam assumpsit:
 qui modò Albaras nigram, modò impetiginem excorticatam ipsam lepram uocat. QUA de
 causa Leoniceum hic à principis phantasia deuium extitisse perspicuum est. Qui albaram
 nigram Auicennæ Pauli, & græcorum psoram esse credidit: Itemque impetiginem excor-
 ticatiam ab albara nigra, penes eundem Auicennam, distingui reputauit: Concedens in-
 terim impetiginem excorticatiam eandem esse cum ea, quæ à Galeno, pauloque lepra dicta est.
 Ex eo uerò Leoniceus motus est: quoniam de impetigine excorticata (siue. n. excorticatam,
 siue excorticatiam dixeris, idem est) loquens Princeps, hæc uerba scripsit: & Et de im-
 ,, petigine est excorticata, propter uebementiam siccitatis, & multitudinem profunditatis.
 ,, Et est sicut albaras nigra, & sicuti cortices. Quibus quidem uerbis, aliud esse albaras
 20 nigram, ab impetigine excorticata, insinuat. Quod. n. est sicuti alterum, non idem uidetur
 esse. Dubitatione tamen dignum esse Leoniceus ait, cur Auicenna hoc in loco impetiginem
 excorticatam dixerit esse sicut albaras nigram: qui tamen in alio capite superiore^z Albaras
 ,, nigram ita definierat. Albaras nigra est impetigo excorticatua, & est scabiositas accidens,
 ,, aspera, uebemens, & facit squamas sicuti piscium, cum pruritu, & est propter humorem
 ,, melancholicum inbibentem de eo, quod est iuxta ea, inhibitione fortiore, quæ in colore impræ-
 ,, mat tantum: Et est de antecedentibus lepram, & est cum malitia. Hæc quidem Auicenna:
 qui sibi quodammodo contradixisse uidetur, cum albaras nigram esse impetiginem excortia-
 catiam dixerit: deinceps uero impetiginem excorticatiam esse sicut albaras nigram pro-
 nunciarit. Pro cuius contradictionis solutione præmissa, quam antea^a retulimus, inter le-
 30 præ, & psoram, ex paulo, distinctione, subdit. Lepra igitur apud Paulum, est impetigo
 ,, excorticatua apud Auicennam & id quod uerum esse confirmabimus. Sicuti impetigo non
 ,, excorticata, apud eundem Auicennam, est Lichen apud græcos & atque id ipsum uerum quoque
 aliquatenus esse demonstrabimus. Minimè tamen admittentes quod deinde subdit, dicens
 ,, & Albaras autem nigra, est Paulo Aeginetæ psora. Quamquidem albaras nigram Auicen-
 ,, na ab impetigine excorticatua separauit. Quam quidem opinionem Leoniceus ex duobus
 confirmat, tum quia Princeps, loco quasi differentie, adiunxit & Et est Scabiositas ac-
 cidens, &c. Quod uerbum (sc. Scabiositas) adiunctum inditio esse ait tantum importare
 Auicennæ albaras nigram, quantum græcis authoribus psora. Tum secundo quia Razis
 nonnunquam Baras pro scabie usum esse inuenimus. ut ex quodam illius dicto à Galeni monu-
 40 mentis transcripto comprobatur. Verum enin uerò nec uerbum scabiositas & quod traducendum,
 non Principis est, mouere ad eius phantasiam potest, neque Razis autoritas Principem in-
 terpretari

x 7.4. tr. 2. cap.
 9.12. & tract. 3.
 cap. 3.

Contra Leo-
 nicenum.
 Libro de morbo
 gallico.

y 7.4. tr. 3. ca. 3.

z tr. 2. cap. 9. pro
 p. medium.
 Auicennæ con-
 tradictio.

a fo. 124.
 Leoniceus so-
 lutio.

Impugnatio.

interpretari potest: cum de alia re Razēs loquatur. Vltrā quōd bifariā capere Baras, & scabiem: communiter inq; & propriē, absurdum non est. At de Raze aliās sermo habetur. Nunc autem Principis intentionem, ex definitione potius albaras nigræ ab ipso data, atq; etiam à quo exscripsit authore, Serapione inq; uenari facillimē poterimus. præsertim cum legerimus, apud Auicennam, Albaram nigram emittere squamis piscium similia: esse uehementer asperam, adeoq; malignam, ut præuia sit ad lepram suam (idest græcorum elephantiasin) affectio. Et q non sanatur, si sit antiqua: in hoc. n. à morphea nigra differre uoluit, ^b quoniam excoriatio, squamositas, & testositas in hac sunt: quæ in morphea nigra minimē inueniuntur. Quæ nemo quidem nescit (ueluti perdoctē ante nos Marnardus ^c aduertit) scabiei, uel (quod idem est) psoræ non cōuenire: quam in superficie magis consistere, tum Paulus, ^d tum ex Archigine Aetius. ^e Nec squamis piscium, sed furi similia emittere scripserunt. Atqui Principis mentem, quicunq; Serapionem prius contemplatus fuerit, ignorare non poterit: modò unum in titulo traducens errorem antea correxerit: Cum ait, f & De impetiginibus, in quibus excoriatur, & scinditur cutis: & sunt Albaras nigra, & pruritus. In quibus quidem uerbis uidetur Serapio pruritum, impetiginis excorticatæ speciem tenere. quod non sic congruum, neq; ipsius etiam menti, uidetur: cū de pruritu, atq; etiam impetigine seorsum & determinarit. Quadere ex ipsius etiam, atq; Auicennæ, unā cum Pauli, quem transcripserunt, decretis, hoc modo titulus legendus est. & De impetiginibus in quibus excoriatur, & scinditur cutis: & sunt albaræ nigræ: & de scabie. Adeo ut pruritus loco, nō in titulo tantum, sed intus etiam pro his scripto capite, unā cum Paulo, scabies, uel psora legatur. id quod, cum per se notum, uel medicinæ candidatis sit: comprobare particulatim non aggrediar. Ad Auicennæ duntaxat contradictionem, quæ Leonicensio difficultatem induxit, conuerti operæpretium esse ratus. Dictionis ergo & sicut & hic similitudinis nota non est, sed expositionis, ipsius diuisionis. Perinde atq; solemus etiam aliquādō dicere: Animal aliud est rōnale, sicut est homo: Aliud irrationale, ut Asinus: etc. Quamobrem non aliud, aduerbium & sicut & q; & ut & exempli quidem signum, & non similitudinis ostendit. Perspicuum uerò est non posse, nec deberi Barbarorum dictionibus omnimoda, concinnaq; series adaptari: præsertim cum illorum idiomatis expertes simus. At satis superq; fuerit, quum ex ijs, à quibus exscripserunt, authoribus intentionem nacti fuerimus. Verum, ut primum nostri instituti propositum tandem absoluiamus. Quæ à græcis λέπρα dicitur, ab Arabum Principe, atq; etiam Serapione Albaras nigra, & impetigo excorticatiua nuncupatur: genere interim ab albara alba (uti dein reps ex ipsis met Serapione, ac Principe demonstrabimus ^b) differens. NEC solum barbari Serapio. s. atq; Auicenna impetiginis nomine, tametsi adiuncto epitheto, excorticatiuæ, græcorum medicorum lepram indicarunt. Verum & Celsus quoq; pluribus iam annis ante illos, impetiginem latine appellauit. Qui quidem prius scabiem, his uerbis definiuit: i Scabies est, durior cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur: quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies. Fitq; ex continuata exulceratio pruriens. Serpitq; in quibusdam citò. Atq; in alijs quidem ex toto desinit: In alijs uerò certo tempore anni reuertitur. Quò asperior est, quoq; prurit magis, eò difficilius tollitur. Itaq; eam, quæ talis est αἰγιον, idest feram, græci appellant. A cuius deinde curatione expeditus Celsus, impetiginem describit ^k quam scabiei quoq;

b 7.4. tr. 2. cap.

9. circa finem.

c lib. 7. epi. 2.

d lib. 4. cap. 2.

e lib. 13. cap. ult.

f i titu. capitis. 4

Serapionis loci.

g de pruritu cap.

6. de impetigine

cap. 2. ibidem.

Solutio cōtradictionis Auicennæ.

h infra fa

i libro. 5. cap. 28.

sec. 15.

Scabies secundum Celsum.

k ibidē sec. 16.

quoque remedio curandam edocuit. Vt hinc primum elici promptissime queat non aliud impetiginis nomenclatura à Celsò intendi, quàm Hippocratis lepram. Quamquidem eisdem remedijs, quibus & scabies curatur, sanandam esse non Paulus modò, qui uno eodemque capite de lepra, & scabie determinauit: ¹ Verùm & ipse etiam Aetius ^m confirmat. qui medicamentum (quod ad Protarchum authorem Celsus ⁿ retulit, quoque ualentius esse non aliud, ad impetigines, atque ad scabiem pertinere ait) ex Archigene ad psoras in callum obduratas, & ad leprosos affectus prosperè accomodatum scripsit. Idem namque medicamentum est. Nisi quod loliaceam quoque farinam Aetius adiunxit: ac pro humida resina terebinthinam determinat. Secundo Celsi impetiginem nil aliud, quàm græcorum lepram præferre, inde eligi potest: Quoniam lichenas intellexisse non licet. Cum nullus author græcus, neque etiam latinus tot genera in lichenone unquam agnouisse inuentus est. quæ tamen quatuor in impetigine Celsus enarrat. Duo interim in papulis supponens. quas deinde græcorum lichenas Celsò demonstrasse comprobauimus. ^o Quatuor autem illa genera, siue gradus in lepra (ut uidebimus ^p) adaptare difficile non est. Atque id ipsum tertio rursus inditio confirmatur: quia nullum de lepra caput in Celsi monumentis reperitur. Qua de re si non sub impetigine comprehenderit: nullibi talem affectum intellexisset. Quem nihilominus Celsò incognitum: fuisse ne per somnium quidem arbitrandum est. Cum uetustissimus author Hippocrates ^q quem in pluribus ipse æmulari conatus est, non semel lepram nominarit: Multique adhuc Romani medici lepram uocantes, ut Plinius, ^r Marcellus, ^s Aemilius Macer, ^t Apuleius Madaurensis, ^u Scribonius Largus, ^x omnibus notam fuisse lepram significant. Quarto idem persuaderi potest: quoniam scabie peior à Celsò, uel ^m omnium leuissima impetigo ponitur. Etenim prima species (ait) quæ minimè mala est, siue similitudine scabiem repræsentat: Distat tamen ab ea, quia magis exulcerata est, & Varis ^m similes pustulas habet: uidenturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore squamulæ resoluuntur: certioribusque temporibus reuertitur. Reliquæ autem species hac prima deteriores sunt: adeo ut quarta curationem omnino non admittat. Quam obrem impetiginis nomine apud Celsum intelligi græcorum lichen minimè potest, quam Plinius ^y latine impetiginem conuertit. Is. n. λειχήν (Galeno ^z atque etiam Paulo ^a testibus) facile in psoram scabiem uel lepram tanquam in peiores morbos pertransit. quo quidem tempore, ubi ^m in psoram, aut lepram pertransierit: non modò ualide siccantibus medicamentis indiget: quibus solis lichen existens, contentus erat: Verùm supra resiccantia pharmaca: repurgantia etiam, ^m & exteriorsia exposulat. Atque ex ijs quæ prædicta iam sunt, quinta ratio elicitur, Celsi uidelicet impetiginem non aliud, quàm græcorum lepram nobis ostendere: Cum papulam dixerit, nisi sublata sit, in impetiginem suam conuerti. Eius uerò papulam nil aliud nobis, quàm græcorum lichenem præferre, ab hac impetigine lepræ uel expediti demonstrabibus. ^b Ad sextam nunc coniecturam permigrantes: quoniam, si squamas emittere cuncta impetiginis genera Celsus ostendit: quas lepræ potius, quàm alteri morbo proprias esse, unà cum erosione, aspredineque insimul ex eius definitione liquet: unde (ut uidebimus) λεπίς quasi λεπίς per syncopen. i. squamosa nuncupatur. λεπίς. n. græcè squamam significat. Ideo non simpliciter impetiginem Princeps, ^c ac Serapio: ^d Sed impetiginem excorticatiam, seu excorticatam nuncupabant. Squamas autem licheni græcorum nullus, quem uiderimus, attribuit: At summæ cutis aspredinem esse cum aliquo pruritu aiunt: leuioremque cutis infectionem esse, quàm psora,

impetigo apud Celsum quod significet lepram octo iditijs probatur.

l lib. 4. cap. 2.
m libro. 13. cap. 126. uersus finem
n ubi supra. f. sec. 15. et 16.

o folio.
p infra in 8. rone

q ut. 3. apho. 20.
& lib. de affecti.
post medium &
2. de morbis mulieribus uer. finem
r ut lib. 20. cap. 9
13. 17. 21. 22. &
lib. 21. et sæpe. in sequentibus.
s libro de medi. cap. 19.

t cap. de ostrutio de sinapio, de caule, de belleboro nigro & cap. de lilio.

u lib. de uirtutibus herbarum.

x cap. 250.

y lib. 20. cap. pri.

z lib. 5. de compositione med. secundum loca. cap. 3.

post principia & circa medium.

a lib. 4. cap. 3.

in principio.

b infra f.

c 7. 4. tr. 2. cap.

9. & tr. 3. cap. 3.

d 5. breuiarij cap. 4.

q̄ p̄sora, uel lepra sint. Dumq̄ talis manet lichenis impetiginis uel nomen, apud Celsum uero Papulæ, quemadmodum apud nonnullos Volaticæ nomenclaturam retinet. Sin autem peior sit, nomen sicuti & formam commutat. Si nanq̄ per extimam adhuc tantummodò superficiem extenditur, & furfuracea corpuscula emittit: ἰσχυρὰ à græcis, à nobis scabies uocatur. At si manifestas squamas facit, satisq̄ profunda est, cutim uniuersā non cuticulam modo erodens, à græcis pariter atq̄ latinis medicis lepra dicitur. Haud uerò nobis obstat, quoniam Author Introductorij, quisquis tandem ille fuerit, squamas ex cute abscedere inquit: sub quibus rubicundior locus, fereq̄; exulceratus apparet. Præter id. n. quod tanq̄ spurium illegitimum uel Galeni librum respuere possemus: si quæ squamulæ in lichene, præsertimq̄ agrestes remittuntur: non instar squamarum piscium, quæ in lepra sunt: & ueræ squamulæ dicuntur, ab interiori potius cuti, q̄ à cuticula secretæ: Sed furfuraceæ sunt, à cuticula genitæ: quæ quidē furfures potius, q̄ squamulæ dicendæ forent. Quam ob rem Plinius f. agrestem lichenem (quam ut uidebimus mentagram usurpato uocabulo nuncuparunt) non squamis, at fædo cutis furfure, totos utiq̄; uultus, dein uerò & colla, pectusq̄; ac manus occupare testatus est. At secus Cælium Aurelium de lichenis iumentorum aliquando loquentem intelligere oportet: quum ait. ^g Sunt autem squamulæ anteriorum crurum, sub armorū partibus, in ipsis animalibus natæ: has græci lichenas uocant, siue chelidonas: Nos uerò impetigiues, siue hirundines. Haud enim Cælius morbum in equorum cruribus accidentem declarare, aut curare intendit: uerum quandam substantiam callosam potius q̄; osseam naturaliter equorum cruribus adnascentem intelligit: quam æqui uoco etiam nomine lichenem, siue impetiginem nuncupabant: & ex Serapionis græci, empiricorumq̄; sectæ institutoris ^h præcepto, ex castoreo, & equorum impetiginibus lichenis uel medicamentum specialiter epilepsiæ congruum refert. Quem rursus equi lichenem cum oleo infusum per aurem, dentes percussu uexatos confirmari Plinius docuit. ⁱ Est autem hoc (ut subdit) non Hippomanes: quod alioquin noxium omitto. Sed in equorum genibus, ac super ungulas. Inquit uerò lichenem non esse hippomanes, quod nō in genibus, aut unguibus nascitur: at in fronte. ut de eo iam antea ^k quoq̄; scripserat: Carunculam esse dicens, in fronte pulli equini, ab ortu naturæ adnatam, caricæ magnitudine, colore nigro. Quam statim ædito partu mater è fronte dentibus auellit. Quod si prius quis abstulerit: pullum mater ad ubera non admittit. quam obrem equis innascei amoris ueneficium hippomanes prædixerat. Virgiliusq̄; idem innuit dicens: ^l Quæritur & nascentis equi de fronte reuulsus, et matri præceptus amor. & c. Hac caruncula mulieres medicamenta uertere homines feruntur in furorem: Idcirco ut noxium hippomanes, perinde ac prædictum iam est, Plinius ^m omittit: lichenemq̄; potius oleo infusum in aurem eius, cuius dentes patiuntur, inijcit. Quod autē subdit Plinius, dicens: Præterea in corde equorum inuenitur os, dentibus caninis maxime simile. & c. & nō amplius de lichene intelligendum est: at de quodam officulo in illorum corde inuento sermonem habere liquet. Qua de causâ non admirari Lodouicum Cælium Rhodiginum nequeo: qui hæc fortassis Plinij uerba coniungens, ait ⁿ & lichenas officula uocant, canini dentis imagine, genibus equorum, & propè ungulas adnascentia: & At de his obiter usq̄; adeo dictum sit: ad nostrum propositum conuertamur: Celsi uidelicet impetiginem Hippocratis, Galeniq̄; ac reliquorum græcorum fere omnium medicorum lepram significare dicentes. Eo tandem inditio moti:

Obiectionis solutio.

e cap. 13. uersus finem.

f lib. 26. cap. pri. post principia.

g lib. pri. chronion cap. 4. uersus finem.

Lichen equorum quid.

b Celsus i. proœ. pri. ponit Serapionem primum fuisse empiricæ sectæ Introductorij uero author primum ponit Philinum secundum uero Serapionem.

i lib. 28. cap. 11. circa finem.

k libro 8. cap. 42. uersus finem.

Hippomanes quid.

l 4. æneidos uersus finem.

m lib. 28. cap. 11. uersus finem.

Contra Cælium Rhodiginum.

n lib. 21. lectionū antiquarum cap. 24. propè medium.

tio moti : quoniam squamas habere cunctas impetiginis species Celsus posuit. Quæ uiden-
 tur magis lepræ, q̃ licheni græcorum adaptari. Haud quaq̃ uerò barbarorum lepram sub
 impetigine Celsi comprehendere licet. Cum elephantiasis nomenclatura (quemadmodum
 7^m post hæc ostendemus) alibi^o talem morbum declarauerit. Sed & alio quoq̃ signo Leonis
 8^m cenus^o Celsi impetiginem græcorum esse lepram eligit : quoniam omnia maximè genera
 (Celsus ait) oriuntur in pedibus & manibus, atq̃ ungues quoq̃ infestant. Quod postre-
 mum dictum uel ipsum probare queat quod intendimus. Cum nō solum græci authores, Sed
 9^m Plinius quoq̃ author Romanus ungues leprosos sæpissimè nominet. Demūq̃ (ne in im-
 mensum probatio hæc excedat) alio, & quidem efficaci, signo, quod demonstrare intendi-
 10^m mus confirmatur. Quoniam quatuor genera ponit Celsus, qui gradus quidam uidentur :
 11^m pro maiori uidelicet, aut minori materie malignitate, atq̃ adustione diuersi. Primus. n.
 12^m gradus similitudine scabiem repræsentat, ac rubet : magis tamē, q̃ scabies exulceratus est :
 Quæ de re & illa peior est : ultra q̃ squamulas emittit. quo modo lepra à scabie differt.
 Quoniam uerò lepra cū uehementius augetur, ac sæuior euadit in elephantiasim conuer-
 13^m tū confueuit : Id autem euestigiō, ac sine latitudine nō fit : Idcirco sensim, ac ueluti per gra-
 14^m dus quosdam sæpissimè pertransit. Quamobrem & secundum genus succedit rubicundius,
 15^m asperiusq̃, ac demū (ut ex ijs, quæ Celsus illi attribuit, liquet) priori lōgè peius. Ter-
 16^m tium deinde genus in deterius adhuc labitur. adeò ut nigrum ob maiorem adustionē euase-
 17^m rit. Quoniam autem exurens calor quæ humida sunt denigrat : Sicciora uerò in cinerem cō-
 18^m uertit, ac dealbat. Idē ad subalbidum quartum deniq̃ genus permutatur. ad quem colorē
 19^m ultimō lepra conuerit solet. Adeò ut (quemadmodum postea uidebimus) ab albedine lepræ
 20^m nomenclatura, penēs aliquos etiam græcos, imposita sit. Verū prius q̃ id ostendamus
 21^m operæpretium esse duximus singula impetiginis genera apud Celsum perpendere. Quō
 22^m facilius quæ dicta, necnon dicenda sunt, iudicare ualeamus. Impetiginis ergo species (in-
 23^m quit^o) sunt quatuor. Minimè mala est quæ similitudine scabiem repræsentat. Nam &
 24^m rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ab ea, q̃a magis exul-
 25^m cerata est, & uaris similes pustulas habet : uidenturq̃ esse in ea quasi bullulæ quædam, ex
 26^m quibus interposito tempore squamulæ resoluuntur : certioribusq̃ hæc temporibus reuertitur.
 27^m Alterum genus peius est, simile papulæ ferè, sed asperius, rubicundiusq̃, figuras uarias
 28^m habens. Squamulæ ex summa cute discedunt : Rosio maior est : celerius, & latius pro-
 29^m cedit : Certioribusq̃ etiam nonnunq̃ priori temporibus, & fit, & desinit. Rubrica co-
 30^m gnominatur. Tertia etiamnū deterior est. Nam & crassior est, & durior & magis
 31^m tumet : in summa cute funditur, & uehementius rodit. Ipsa quoq̃ squamosa, sed nigra
 32^m procedit : & latè & tardè eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit. Neq̃ ex
 33^m toto tollitur : Nigræ cognomen est. Quartum genus est quod curationem omninō nō recipit,
 34^m distans colore : Nam subalbidum est, recenti cicatrici simile : Squamulasq̃ habet pallidas,
 35^m quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes : quibus demptis nōnunq̃ profluit sanguis.
 36^m Alioquin uerò humor eius albidus est, cutis dura, atq̃ fissæ est, proceditq̃ latius. Hæc
 37^m uerò omnia maximè genera oriuntur in pedibus & manibus : atq̃ ungues quoq̃ infestant.
 38^m Hactenū quidem Celsus de quatuor impetiginis speciebus. Quarū ultima subalbida est,
 39^m squamulas interdū pallidas ; interdū uerò subalbidas remittens. Atq̃ id ipsum ei profè-
 40^m

o libro. 3. cap. 25
 p libro de morbo
 gallico.

Impetiginis, le-
 præ uel gradus
 quatuor.

q libro. 5. cap. 11
 timo sec. 16.

Impetiginis
 eadem species
 quatuor.

Lepra quomo-
 do ad album
 transit.

Ad respondet,

v cap. 13. circa
finem.

Introductorij
locus.

s scholio. 8. uer-
sus finem.

*luna et
Cus*

6 libro. 26. le-
tio
num antiquarum
cap. 9. circa finem.
u libro. 5. lec. an-
tiquarum cap. 8. uer-
sus finem.

Nicandri lo-
cus.

x 6. aphorismo-
rum com. pri. uer-
sus finem.
y uersus finem lib.

Et respondet, quod de lepra Introductorij Author retulit, dicens: λέπρα πᾶθος μὲν καὶ
αὐτὴ δέρματος, ἐπὶ τὸ λευκότερον, καὶ τραχύτερον, τρεπομένου. quod est: Lepra
passio quidē & ipsa cutis est, ad candidius, asperiusq; conuersa. Cutis n. est quæ ad can-
didius asperiusq; conuertitur: non passio. quadere nō ē τρεπόμενον; ut in græco textu ha-
betur, sed ē τρεπομένου & legimus, ad cutim referentes, non ad passionem. Nisi ē τρε-
πομένου & in actiua significatione, tanq; medium cōmunēq; acceperis: passionem quæ cus-
tim conuertat intelligens. Innomimatus uerò Author Scholiorum in Theriaca Nicandri, sus-
per uerbo ἐπεὶ λέπρην λέγουσιν αὐτὴν αἰτ: τὸ δὲ ἐπεὶ λέπρην λέγουσιν αὐτὴν, ἀντὶ τοῦ ἡ τρα-
χύνονται, ἢ λευκαίνονται. ἀφ' οὗ καὶ ἡ ἐν τοῖς σώμασι, παρὰ φύσιν λευκότης καλεῖ-
ται λέπρα. hoc est: quod autem dicit & reuolutione leprificantur & uel capitur dictio illa
& λέπρην λέγουσιν (quam nos, sententiam potius, q̄ sermonis latinatē obseruantes & leprific-
cantur & traduximus) pro eo quod est τραχύνονται, id est asperantur. uel idem est, quod
λευκαίνονται, id est dealbantur. à qua uidelicet uerbi significatione, quoniam, s. λέπρην-
ω, id est leprificor, idem est, quod λευκαίνω, hoc est, dealbor, contingit: Vt ea quæ præ-
ter naturam in corporibus albedo fit, lepra nuncupetur, uel (quod mihi magis arridet) non
uerbum & λέπρην & prius & dealbor & significat: ut inde & λέπρα & quæ, s. præter naturam
albedo est, dicatur. At potius ab eo q̄ is affectus in quo cutis præter naturam alba effecta
est, λέπρα nuncupatur, contingit, ut & λέπρην & pro & dealbor & capi possit. Sicq; uer-
ba illa intelligere & ἀφ' οὗ καὶ ἡ ἐν τοῖς σώμασι, & hoc est: leprificantur dicit Nicander
pro eo quod est & asperantur & uel & dealbātur & ab eo quod et quæ in corporibus præter natu-
albedo est lepra nuncupatur. Cuius innominati licet Authoris sententiam Iodouicus Ca-
lius¹ admittit. Qua de causa & antea² Persarum consuetudinem ex Herodoto retulerat,
dicens; legimus in Syncerioribus Herodoti codicibus. Apud Persas si ciuium quis lepra ca-
perit affici, aut leuca, ad urbem eum minimè commeare, nec alijs promisceri. Obtingere
autem ista: quod is in solem quippiam deliquerit. Si uerò in hæc causationes incidat per-
grinus, illum cæteri hinc inde extrudunt. Quin & hoc argumento albas columbas nemo
abigit (quāq; Cælius literæ deprauationem non aduertit: ubi apud Nicadrū legitur & λέ-
πρην λέγουσιν & pro & λέπρην λέγουσιν & uel si mauis & λέπρην λέγουσιν & Hinc fortasse motus ē Author
illius libri, qui Hippocrati ascribitur: Cui titulus est περὶ πᾶθῶν (siue polibi, ut Gale-
nus³ existimasse uidetur, & in græco libri titulo, πολύβου. i. prolybi dicitur, siue al-
terius cuiusuis, aut ipsius etiam Hippocratis sit) ut pituitam lepræ causam esse pronuntia-
rit, dicēs & λέπρα, καὶ κνημὸς, καὶ ἰώρη, καὶ λεχῆνες, καὶ ἀλφός, ὅτι φλέγμα-
τος γίνονται. hoc est lepra, pruritus, scabies lichenes impetigines uel, aut secundum Cel-
sum papulæ, ac uiriliginis species, alphas dicta, ex pituita gignuntur. Id quod, nisi de sal-
sa pituita intellexerimus, falsum prorsus est. Quos quidem prænarratos affectus turpitudinē
magis, q̄ morbos esse idem Author adiunxit: haud negans (opinor) morbos esse, at magis
turpitudinem, q̄ morbos non iniuria determinans. de qua tamen re alijs. Nunc uerò lepræ
nomen, penēs græcorum placita, uestigamus. Etenim, perinde ac prædictum iam est, al-
bedinem præter naturam in corporibus factam nonnulli lepram uocari dixerunt. Quæ quia
dem albedo si cum aspredine, cutisq; (quam solam apprehenderit) erosione, prurituq; ac
desquamatione fiat: lepra tunc speciali nomine dicetur. Sin uerò absq; prurigine, ac squa-
mis, &

- mis, & omnimoda erosione: quin læuissima (ut Aetius inquit)^z existente cuti, non eam modo, sed subiectam quoq; carnem præter naturalis hæc albedo occupauerit: leuce nuncupatur. Quæ ^{z lib. 13. cap. ult.} tum affinitatis, tum albedinis (quæ lepram uocari, apud quosdam etiam Græcos, antea^a demon- ^{timo circa prin.} ^{Leuce} ^{a fo. 132.} strauimus) ratione, lepram quoq; nominasse nonnullis placuit. Cuiusmodi fortassis sententiæ fuit Innominatus Author, Nicandri Theriacâ enarrâs. Cum præternaturam factam albedinem, leprâ nominari scripserit: quam alij propriè leucen uocant (ut uidetur) intelligens. Quas ob res mirum non est: si non Hali Abbas modò leprâ, pro leuce assumpserit: Sed **DIVVS** etiâ **AVGVSTINVS** lepram coloris esse uitium super Euangelio crediderit. Ab aliquo enim uetustiore etiam Græco id didicisse potuerunt. Nos autem hic non omnium, sed medicorum
- 10 Græcorum, ut Hippocratis, Galeniq; , & eorum qui hos sectati sunt, lepram uestigamus. **Lepra Iudeo** Eamq; pforæ scabiæ ue congenerè esse determinauimus. Iudeorum interea lepram, quæ Mo- ^{rum.} saica lex^b à **DEO** Optimo Maximo reuelata ab integris hominibus separandâ præcepit: ^{b quæ legē uide} ^{Leuit. cap. 13. 14.} Ne ue quispiam sanus leprosum tangeret: quoniam extemplo uel contactu, uel sola conuer- satione inficeretur: non coloris modò uitium, sed plagas quoq; ac scabiem & morbi (ut patet) contagionem ostendere legimus. Quæq; plura in Leuitico dicuntur quæ figurata potius et supra nostri ingenij uires existunt. Quam ergo Redemptor noster **CHRISTVS** miraculo- sè sanauit, non Græcorum lepram esse reputamus, sed elephantiasim, & quam Arabes ferè omnes (præter Hali Abbatè) lepram nuncuparunt. Parum nanq; differre Arabum, atq; ^{c ut Matthæi ca.} ^{8. & Marci. 1. &} Hebræorum idioma, cuius pernotum est. Qua de re tam si Græcè nunc, q; Latine, aut quo- ^{Lucæ. 5. & 16.}
- 20 uis idiomate scribantur Euangelia, Hebræorum semper lepram (cum apud ipsos facta mira- cula sint) quæ & eadem Arabum est, intelligendam esse opinamur. Constantini uerò leprâ infrâ, cum de elephantiasis sermo fiet, enucleare conabimur. Ex his ergo quæ dicta, nec non dicenda sunt, facillimè cognosci potest, quàm parum nominibus fidendum sit: nisi res bene fue- rit exploratâ. Quando & lepræ nomen leuem, apud Græcos propemodum omnes, morbum à scabiæ pforâ ue non multum differentem: Apud Hebræos autem, Arabesq; ferè cunctos gra- uissimum, ac perniciosissimum, maximeq; contagiosum: Apud Hali Abbatem uerò, atq; aliquos alios, & quidem pauculos, difficilè curabilem, non perniciosum tamen affectum, quin coloris potius uitium significat. **QVEMADMODVM** & Impetiginis nomē apud Latinos uariam significationem præsefert. Siquidem apud Celsum, prout antea demonstra- uimus, f. prænarratam Græcorum lepram repræsentat. Apud Plinium uerò, pluresq; ^{Impetigo apud} ^{alios Latinos.} ^{f. fo. 129. 130. 131} alios etiam ex ueteribus Romanis, uulgò dictam uolaticam: à Græcis uerò lichenem indi- ^{Lichen Plinij} ^{& Græcorū.} gitat. Id quod hoc etiam in loco, ubi de impetiginibus propter lepras meminimus, consequen- tia ducti necessitate declarandum, ob incidentes præcipuè quasdam difficultates, proposui- mus. A Plinij uerbis de lichenis alicubi scriptis, exordium sumentes: quum sic ait. ^{d Senz} ^{d lib. 26. cap. 1.} „ sit. & facies hominum nouos, omniq; æuo priore incognitos, non Italiæ modò, uerum etiam „ uniuersæ propè Europæ morbos. Tunc quoq; nec tota Italia, nec per Illyricum, Gal- „ lias ue, aut Hispanias magnoperè uagatos, aut alibi, q; Romæ, circaq;. Sine dolo- „ re quidem ullo, aut sine pernicio uitæ: Sed tanta fœditate, ut quæcunq; mors præ- „ ferenda esset. Grauiissimum ex his lichenas appellauere, Græco nomine: Latine (quoniâ „ à mento ferè oriebatur) ioculari primū lasciuiâ (ut est procax natura multorum, in alienis mise- „ rijs) mox, & usurpato uocabulo, Mentagrâ, occupantem in multis totos utiq; uultus, oculis tan-

- tantum immunibus: descendente uero & in colla, pectusq; ac manus, fædo cutis fursure. „
 In quibus Plinij uerbis, prius q; ultra progrediamur, nouum fuisse hunc morbum didicimus:
 ac, (ueluti post hæc, ex ipsius iterum uerbis, referemus), ante Tiberij Claudij Cæsaris
 principatu n penitus incognitum. Qua de causa cū inuadere primū occeperit innominatus erat.
 Id quod qui tunc temporis uiuebant aduertentes, nouumq; morbum alijs significare quopiam
 rato nomine cupientes, duo nomina confertim imposuerunt: quorum alterum à Græcis (ob alte
 rius affectus, tali nomine iam antea penes illos nuncupati, similitudinē, ac serpendi, impetendiq;
 symptoma) quasi mutuum acceperunt: pro Græco nomine Latinū ei affectui, impetiginem sci
 licet reddentes. Alterum uero a sede affecta nomen imposuerunt. Primū ergo totum Græcum
 nomen est λαιχῖν. quod Græci passim impetigini (eiusdem Plinij testimonio *) dedicauerant. 10
 Lichen & im Eadem nanq; ratione dictū esse, λαιχῖν Græcè opinor (ἀπὸ τοῦ λαιχῶ, quod est lambo:
 petigo unde quoniā s. lambendo proserpat. uelut etiam in petris lichen herba solet) & Latine impetigo im
 dicatur petix, & petigo. quoniā uidelicet (uti festus ait) propinqua petat: Quintusq; Serenus: uitiū
 r cap. 11. est, quod ducit ab impete nomen. Qua ratione Serpiginē quoq; alij, nonnulli uero Herpiginē ap
 pellant. Dixi primū nomen totum Græcum extitisse. Nā secundū nomen uitiosæ cōpositionis
 est, ex dimidio Græcum: ueluti ex altera parte Latinū: contra Grammaticorum præcepta. Ex
 mēto. n. Latina dictione, et ἀγέειν uerbo Græco, quod significat capere: seu nomine ἀγέα.
 quod capturam præsefert. q. a. s. mentum caperet: seu menti captura sit. Ad similitudinem Græ
 corum nominū, ποδᾶγας, & χερσᾶγας: quæ pedum aut manuum capturae sunt: quæ tamē
 rectius, utraq; ex parte Græca, cōposita sunt. Quam quidem cōpositionis nouitatem, ac uitium 20
 aduertens Plinius: ioculari primū lasciuiā, mox usurpato uocabulo Mentagram nuncupas
 uisse Romanos ait. Nomenclaturæ impositionem à se minimè comprobari, per hæc uerba in
 sinuas. At omiſsa nominum speculatione, rem potius ipsam aggrediamur. Oculis enim dun
 taxat immunibus totos nonnunq; uultus occupantem lichenem Plinius refert. Galenus s. uero
 f. 5. de cōp. med. & oculos etiam aliquandō contingere testatur. Id quod impossibile quidem non est, q; q; raris
 secundū loca cap. 3. simè contingit. Cum & ipsos oculos Bothryon, Caeloma, Argemon, Epicauma, Cancer, Vn
 guis, ac plura præter hæc: de quibus quidem posterius erit sermo, uel ulceroſorum affectuum
 genera molestare soleant. Fortassisq; largius oculos Galenus intellexit. ut palpebras etiam ocu
 los cooperientes oculorum nomine significarit. Verū enim uero an ueterrimis, ac prioris sæ
 culi uiris notus hic affectus fuerit, contemplandum ex ipso etiam Plinio & succedit. Non fue 30
 g lib. 26. cap. 1. rat enim (ipse inquit) hæc lues apud maiores, patresq; nostros. Et primū Tiberij Claudij „
 Mentagra an Cæsaris principatu medio irrepſit in Italia, quodam Perusino Equite Romano quæstorio scri „
 ueterrimis in ba. Cum in Asia apparuiſſet: inde contagionem eius apportante. Nec ſenſere id malū ſæmis „
 cognita. næ, aut ſeruitia. plebesq; humilis, aut media: Sed procēres ueloci tranſitu, oſculi maximè, ſæ „
 diore (multorum, qui perpeti medicinam tolerauerant) cicatrice, q; morbo. Cauſticis nanq; cu „
 rabatur. Nec niſi uſq; in oſſa corpus exuſtum eſſet, non rebellante tædio. Quo mirabilius qd „
 poteſt reperiri? (poſt pauca ſubiungit) aliqua gigni repentē uitia terrarum in parte certa, cer „
 tisq; membris hominum, uel ætatibus, aut etiam fortunis. Tanq; malo eligente, hæc in pueris „
 Leoniceus cō graſſari, illa in adultis: Hæc procēres ſentire, illa pauperes. Hactenus quidem Plinius. Ad „
 tra Pliniū uerſus quem tamen Leoniceus, ac nonnulli deinceps alij inſurrexerunt. Inquit. n. poſt relatā 40
 b libro. de morbo Plinij ſententiam Leoniceus. h Ego uero de alijs Europæ partibus non planè habeo ſtatuz „
 Gallico in prin. tum

tum quid sentiam. Illud pro certo affirmare ausim: multis, anteq̃ Claudius imperaret, annis li-
 chenas fuisse Græcis familiares. Quando Hippocrates author Græcus uetustissimus cum mul-
 tis alijs in locis, tum præsertim in tertia particula aphorismorum^k in morborum uernalium
 mentione, lichenum commemorat. Vt mihi magis fiat uerisimile uexasse id malum etiam Ita-
 liam: Quauis fortè longo temporum interuallo ante Claudium, sed nondum Romano Im-
 perio ad exteras nationes propagato, atq; idcò minùs à Græcis medicis Roma frequentata,
 defuisse eidem morbo nomenclatores. Idcirco donec sine nomine perstitit, fuisse interim ob-
 scuriorem. Sicuti postea Claudio imperante, iam Græcis artibus, ac præcipuè Medicina ui-
 gente in ciuitate, lichenas, atq; mentagram uocitantes, fecere illustriorem. Simile quoddam
 nostro hoc æuo accidit. Iam enim insolitæ naturæ morbus Italiam, & multas alias regiones
 inuasit. Pusculæ sunt à partibus obscenis incipientes: mox totum corpus, atq; ipsam præci-
 puè faciem occupantes, præter frigiditatem, magnum insuper cruciatum plerunq; afferentes.
 Huic tamen morbo nondum nostri temporis medici uerum nomen imposuere: sed uulgato no-
 mine, malum gallicum uocant. Quasi eius contagio à Gallis in Italiam importato: aut eo-
 dem tempore & morbo ipso, & Gallorum armis Italia infestata, etc. Hæc quidem contra
 Plinium Leoniceus. Qui tamen aliud nil asserit, q̃ Hippocratem, aliosq; Claudio Cæsare
 uetustiores lichenem agnouisse: uerisimileq; sibi uideri (& si nulla ratione, uel autoritate
 comprobatur) id malum etiam Italiam uexasse. Eius autem uerba absq; ullo etiam authore,
 uel ratione dilatans Fuchsius^l addit, q̃ paucis ante Tiberij Claudij principatum annis, in
 Italia cognitus fuerit. Verum enimuero quod maiorem ijs reprehendendi Plinium, ansam
 præbere potest, id ipsum est. Quoniam Galenus de hoc morbo etiam sub nomine Romanis
 usurpato meminit: scilicet Mentagra (quanuis deprauatus Græcus codex {μελιταγρας} Galeni locus.
 pro {μενταγρας} habeat) nil tamen an nouus hic morbus sub Claudij Cæsaris principatu
 cœperit, Galenus tetigit. Vltrà q̃ pleriq; authores, ex quibus pharmaca huic morbo confe-
 rentia citat, ante Claudium uixisse leguntur: & Impetiginis nomen longè ante ea tempo-
 ra Latinis notum fuit. quod de nullo alio morbo accipi debere uidetur, quàm de lichenibus à
 Græcis appellatis. Quos ipse etiam Plinius^m aliquoties impetiginem Latine conuertit. m ut lib. 20. ca. 1.
 Atq; hac quidem ultima, ex Galeno præsertim desumpta coniectura, omninò ueram non
 esse Plinij sententiam Cornariusⁿ etiam comprobatur. Nos autem cum nullam uideamus effi-
 cacem rationem, aut prisorum autoritatem Plinio aduersari, Magis illi credendum Hi-
 storias colligenti, q̃ nostræ existimationi reputamus. Quapropter primum Plinij uerba
 considerare oportet. Haud enim toti simpliciter Europæ incognitum esse hunc morbum
 priori sæculo inquit: Verum & propè & adiunxit. uniuersæ enim propè Europæ dicit, Ma-
 ximam Europæ partem, non omninò totam, hoc loquendi modo significans. Ex quo nec
 ei aduersari dicendum, si quispiam in Europæ aliqua parte huiusmodi affectum præno-
 uerit. Secundo perpendendum est, quoniam & si Hippocrates de lichenibus alicubi me-
 minerit: Nullibi tamen aded contagiosum hunc affectum ostendit, ut uel osculo, uel solo con-
 tactu plures homines inquinet: quemadmodum de Mentagra Plinius,^o atq; etiam Mar-
 cellus^p testantur. Quin talem habere discretionem Plinius ait, ut nec fœminas, nec ser-
 uos, neq; humiliorem, aut mediam plebeculam, sed procures duntaxat inuasit. Quæ
 omnia propriam quandã noui morbi nunq; antea definiti naturam præseferunt. Quamobrem, Lichen duplex.

omni penitus reiecto scrupulo, duplicem esse lichenem opinamur. Alterum quidem de quo Hippocrates, ueterrimiq; illi Græci, uel ante ipsum Claudium Cæsarem, locuti sunt: quæq; non Plinius modò, sed omnes ferè ueteres Romani, excepto Celsò, impetiginem Latine appellarunt. Alterum uerò prioribus, ante Claudium, temporibus incognitum: quem Romani, ob nominis penuriam, prius Græcorum nomine, alteri affectui, cui simillimus hic esset, imposito, deinceps uerò usurpato uocabulo Mētagram nūcuparunt. Alij autem λεχνία ἀγρίαν. id est lichenem syluestrem agrestem^q ue aut ferū (Vt ex Archigene Galenus¹ refert) nominarunt. Hac de causa Plinius² scribens impetiginem, & scabiem: quam pforam, & lichenas uocant. & referendo scilicet scabiei Latine dictioni pforam, Impetigini uerò lichenas: uidetur aperte secundum uetustiores Græcos sic nominatos lichenas intelligere. quare simpliciter ait & uocant & scilicet Græci. Quos tamen quia Romani, respondente Græcis nomine, impetiginē dixere, Idcirco ubi ubi Plinius de huiusmodi affectu intellexisse uoluit, impetiginis nomine significauit: derelicto Græco uocabulo alteri lichenum generi: ne uitiosam amplius nomenclaturæ compositionem Mētagræ scilicet unā cum uulgaribus, usurpet. Adeò ut mirum non esse debeat, siquidem in uno eodemq; capite lichenum & impetiginis remedia seorsum distinctis (ut dictum est) nomenclaturis descripserit. Atq; ubi de nouo agrestiq; lichenem meminit, nil de impetigine protulerit. Hunc igitur nouum lichenem, usurpato à Romanis uocabulo, Mētagram nominare nos possumus. Alterum uerò & quidem ueterrimum, omnibusq; gentibus communem, uel impetiginem, uel ex Celsò papulam uocabimus. Qui tamen (ut uidebimus³) utranq; præfati lichenis speciem latina dictione insinuare uolens: duplicem quoq; popularū maneriē posuit: quarum alterā ἀγρίαν, hoc est agrestem, seu feram ex Græcis appellauit. Quòd si non duos, at unū esse lichenem: aut si duos, agrestem nihilominus priori quoq; ante Claudium Sæculo uel Italiæ pernotum, obstatè contenderis: Nihilosecūs tamen & huiusmodi affectus contagionem, & contagionis modum, quo uidelicet procures tantum osculo inuaderet, nouum esse inficias ire nequiueris. Quam porò epidemiam Galenus apertissimè innuit, dicens⁴ & Cum in Vrbe Mētagra appellatus morbus inualesceret. Quo tempore plurima lucratum esse Pamphilum excoiatorio medicamento retulit. Quoniam scilicet plures insimul homines tali morbo inquinati uexabantur. Nam Soranus medicus (referente Marcello⁵) quondam ducentis hominibus hoc morbo laborantibus curandis, in Aquitania se locauit: Adueneruntq; ex Aegypto, gentes nitrice talium uitiorum, medici (Plinius⁶ ait) hanc solam operam afferentes, magna sua præda. Siquidem certum est Manilium Cornutum ex prætorij Legatum Aquitanie prouintiae, sestertia. CC. elocasse, in eo morbo, ad curandum sese. Acciditq; sæpius ut noua contra genera morborum medici gregatim sentirentur. At priusq; ad alia progrediamur, Marcellum (cuius antea meminimus) iterum consideremus: Quem manifestè lichenem, siue Mētagrā ab impetigine distinctā intellexisse liquet. Quoniā seorsum hos affectus curat. In primis. n. plura ad lichenem siue Mētagram remedia proposuit: dein uerò impetiginem tantū recentem, q; inueteratam, atq; etiam scabidam curat. Rursusq; seorsum hæc subdit. Si locum, quem impetigo adludit, auro circumscribas, postea eum omnino non adpetet. Loco quem mētagra obsederit, simū murinū tritum ex aceto oportet imponi. etc. E quibus uerbis, oī reiecto liuore, Plinij (quā supra declarauimus)⁷ sententia liquet: lichenē mētagram⁸ ue Romano-

rum ab impetigine, quam Græci lichenē quoque dixerunt, distinctos affectus esse. Id quod pro Plinij defensione assumpsimus. Haud. n. existimandum est Marcellū Celsi instar impetiginē, pro Græcorū lepra cepisse: Cū & lepræ curationē per se eodē capite posuerit. Latissima igitur (ut his finē imposuerimus) lichenis, post Claudii nominis usurpatio facta est: ut mitem aliquando, leuissimāque impetiginem præseferat. quæ uel sola hominis salua deleri facilis limē queat. Nonnunquam uerò, pessimum affectum (quam & Mentagram uocarūt) non nisi exurentibus, acerrimisque medicamentis extirpabilem ostendit. **V T R V N Q V E** Papulas Celsi. genus, papulæ nomenclatura Celsus significasse uoluit. Quemadmodum perdoctē ante nos Leoniceus (ut neminem sua laude defraudemus) sex euidentibus coniecturis **Græcorū lichenē eē. 7. iditij** ostendit. Quarum prima est, quoniam à Cassio Felice scribitur lichenas nasci rotundo **probat.** **p^m.** schemate, id est figura in superficie cutis, cum ingenti pruritu, & asperitate: atque ubi id malum serpere cæperit, Serpiginem dici. Ita & Celsus ait utrunque papularum genus per minimas pustulas cutim exasperare, rodere, & eandem serpere. Atque uti id uitium rotundum **2^m.** incipit, ita in orbem procedere. Secundo quod intendimus confirmatur: quoniam ubi Galenus, & Paulusque ex lichenibus facile in lepram fieri transitum scribunt: Celsus ait, Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: Nisi sublata est, in impetiginem uertitur. Tertium **3^m.** inditium est, quia sicuti Galenus, & Introductorijque Author, & Aetius duas lichenum species faciunt. Quarum altera mitis: altera uerò agrestis, ferāque sit (Græce ἀγρίαν uocant) Ita quoque Celsus papularum duas esse species statuit. Quarum alterā ἀγρίαν, id est feram, ex græcis nuncupauit: Alteram interea mitiorem esse intelligens. Quod autem tria hæc prædicta inditia considerari à quouis liberè queant, atque unā papularum Celsi definitio **20** innotescat. Eius uerba subscribere superuacaneum non est. Cum inquit: **1^a** papularum duo genera sunt. Altera est, in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet. leuiterque roditur, medium habet paucillo leuius: tardè serpit. Idque uitium maximè rotundum incipit: eademque ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam ἀγρίαν, id est feram græci appellat. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, ulceraturque, ac uehementius & roditur, & rubet. Interdum etiam pilos remittit. Hæc Celsus, qui tamē de feræ contagio nil tetigisse uoluit. fortassis cum eadē curatio sit, siue contagio ad alios homines transferatur, siue nulla alia genita, in eodem homine persisterit. Sat ergo ei fuerat morbi definitionem assignare. Quartum uerò deinceps signum eligi potest ex eo quod in curatione **30** statim Celsus ait, quoniam. scilicet leuis papula, etiā si ieiuna salua quotidie defricatur, sanescit. Idē uerò non Paulus modo lichenibus puerorum, atque Arabum Princeps impetigini commendarunt. Verum & Serenus cum ait: si uerò uitium est, quod ducit ab impete nomen: hoc matutina poteris cohibere salua: atque ipse Plinius secundus, aut quisquis ille fuerit Plinij nomine, inscriptus dicens & salua ieiuni perfricantur. Qui quidem curationis modus argumento esse potest Græcorum lichenas Celsique papulas esse morbum, quem uulgò plures uolaticam nominant (quanuis prædictus Plinio ascriptus liber & pustellas quasdam, ab impetigine distinctas, uolaticas nuncuparit) aduersus quam, nostro quoque tempore, mulierculæ circa puerorum mala sananda præcipuè sollicitæ, nullam magis præsentaneam nouere medicamam, quam ieiunā saluam. Sed & eodem Celsi auctore (ut quinta coniectura subnectatur) maxime ior papula murali herba commodissime tollitur: quā euidenter extergendi experimētum & **40** **5^m.**

1 6. simplicium in uasis uitreis præbere Galenus 1 asserit. Qua de causa & uulgus, ob eum quem in uasis
 cap. 130. uitreis abstergendis exhibet usum, uitriolum appellat, ut minus mirandum sit hanc ipsam
 herbam lichenas, sua ui absterforia, sanare. Quibus omnibus & sextam Leoniceus conie 6^m.
 7 post mediū libri. Eturam collegit, quoniam Definitionum Medicarum Author 1 licheni pruritus, asperita-
 temq; , lepræ autem squamulas attribuit, in quam lepram lichenas conuerti nonnunq; posse
 præscriptum ex Galeno, atq; eius æmulo Paulo, est, Ita et Celsus papulis asperitatem, pruri-
 tumq; . Impetiginis uerò cunctis quatuor speciebus squamulas dedicauit, in quam impetiginē
 aliquando papulas etiam conuerti prænarratum est. Verum ne diutius in re adeò manifez 7^m.
 sta tempus frustra conteramus, adhuc septimo poterimus inditio quod ab initio proposui-
 mus, confirmare: cum nullibi scilicet Celsus de Græcorum lichenibus meminerit. Quamobz 10
 rem nisi sub papulis intelligantur, omnino à Celso prætermisos esse lichenas proferendum
 est. Haud. n. sub impetigine comprehendi opinandum, cum hanc Græcorum esse leprā satis
 Plinij papulæ à superq; demonstratum antea sit. VERVM, ut altera rursus æquiuocatio propale-
 papulis Celsi tur, aduertendum sedulo est, Celsi papulas à Plinij, pluriumq; illum æmulantium, papulis
 differunt. differre. Celsi enim papulas esse Græcorum lichenas, communemq; aliorum Latinorum im-
 s uide lib. 20. cap. petiginem, prædictū iam est. Plinius uerò papulas, cum nullibi, quod uidisse recolam, desinie-
 p^o. et 9. et lib. 22. cap. rit: difficile profecto est quidnam præferre uoluerit iudicare. Compertum nihilominus
 22. 23. et lib. 23. i. est nec impetiginē, aut lichenas, neq; lepram Plinio significasse. Cum de his non semel nos-
 proce. et cap. 2. 7. et minibus proprijs meminerit. Quamobrē aliud ab his uoluisse opinandum est. Ac ut colligi
 lib. 26. cap. 1. 4. et ex eius uerbis potest: Exanthematum speciē, quæ scilicet calidior sit, atq; sublimius in acuz 20
 lib. 28. cap. 4. 12. et men eleuatur, intellexisse apparet. Duplicem nāq; exanthemata, ueluti & phymata tuber-
 lib. 31. cap. 9. et lib. cula ue, differentiam (Galeno 4 referente) obtinent. Quædam enim sublimia sunt, in acumen
 32. cap. 7. et lib. 35 tendentia, & alium petentia. Et hæc quidem à calidiore humore, sanguine inq; , uel bili, aut
 cap. 15. et sæpe. ex ys commesto generantur. Quædam uerò lata sunt, ad maiorem locum extensa: humiliora
 1 6. aphor. com. 9. et 6. de morbis uul. tamē, atq; in altum non elata. Et hæc rursus frigidiori ex succo, ut salsa pituita generationē
 parte. 2. comen. 29. recipiunt. Ex alijs nāq; speciebus pituitæ potius œdema, quemadmodū ex melancholico suc-
 u lib. 20. cap. 13. co puro, nī sanguini admisceatur: scirrhus, aut aliquis nodosus tumor, ut gāglion, athero-
 uersus finē & cap. ma, steatoma, & huiusmodi, q̄ exanthema fit. Quæcunq; igitur à pituitoso humore orta
 22. lib. 22. cap. 25. sunt, pituitæ eruptiones, quæ autem à sanguine, uel altera bili: papulas 2 aut papularum eru-
 lib. 23. cap. 2. 9. lib. ptiones 3 nuncupari à Plinio credimus: Quæ quidem papulæ adhuc inter se differunt: quas 30
 28. cap. 17. libro. 31. dam nāq; rubeas Plinius supponit. Boas interdum 2 nuncupans: inde. s. nomen sortitas, quoz 1.
 cap. 10. lib. 32. cap. 6. niam bubulo fimo illito maxime (ut idem 4 ait) tolluntur, uel fortassis (quemadmodū alij scri- 2.
 x ut lib. 22. uersus ptionēs 3 pserunt) quoniam corpora papularum multitudine rubent, ad similitudinem eorū qui Boa
 finē et lib. 23. cap. 7. sēpente iēti turgescunt: fortassisq; tertia ratione sic dictas, quia Boæ serpentis instar om- 3.
 post principia et. 8. nes regiones, in quibus habitat uasstantis: ita morbus hic cum erumpere inceperit plurimos
 circa finem lib. 24. præsertim pueros interimit. Ad has enim papularum eruptiones uariolæ uulgò dictæ, ac
 ca. 8. lib. 35. cap. 15. morbilli (de quibus postea sermo fiet) reduci appositissimè queunt. Et sunt hæc, rubeæ: s.
 post mediū lib. 31. papularum eruptiones, quæ à sanguine, uel bili, aut mistis his adueniunt: quas deniq; feruēs-
 cap. 9. circa prin. tes papulas Scribonius Largus 5 atq; Marcellus, 4 appellarunt. Quædam uerò nigre ab eoz
 y ut lib. 20. cap. 8. dem Plinio 6 supponitur. quas ab atra bile uel sanguine melancholico feruentiq; in simul ges 40
 post prin. nitas esse credendū est. Atq; huius esse generis eam, quam noxiam uocat, tertiāq; die homi-
 z ut lib. 24. cap. 8. nem
 et lib. 26. cap. 17.
 a lib. 28. cap. 18.
 b de quoserpente ui
 de Plin. lib. 8. ca. 14
 c ca. 24. 3. et ca. 106
 numerat cū calidis.
 d cap. 4. uersus fi
 nē. et cap. 20.
 e lib. 28. cap. 17.

nem occidere liber sibi ascriptus asserit f. His igitur singulis unà cum Plinij locis exquisi-
 site perpenſis, non idem eſſe pituitæ eruptiones, & papularum, ſiue papulas liquet. Cum al-
 bas illas eſſe rationabile ſit à pituita præſertim falſa obortas. Has autem rubeas, à ſanguine,
 bili'ue, aut miſta materia, uel nigras ab atrabili, ſanguine'ue melancholico genitas. Idipſum
 uerò notandum fore duximus, ubicunq; ſimpliciter, absoluteq; eruptiones profert, & tam pi-
 tuitæ, q̃ papularum puſtularum'ue eruptiones intelligi poſſe. Addidimus autem & expo-
 ſitiue i puſtularum quoniã i puſtulas papulas'ue non Plinius b modo, ſed Marcellus quoq; b
 nonnunq; protuliſſe leguntur. Pliniusq; puſtularum quoq; eruptiones aliquandò k curat. Eſt i
 autem puſtula (prout inferius oſtendemus) genus ad papulas, impetiginēq; ac ſcabiem, plu-
 10 resq; alios tumores, ſi Celſi l authoritatē admiſerimus. Decipiuntur ergo q̃ eruptiones ſim-
 pliciter Græcè è παυαο τός εις, papularū eruptiones interpretantur. Cūq; Galenus m dicat
 i ουκός εις è παυαο τός εις traducunt i ficofas papularum eruptiones i differunt enim fi-
 coſæ eruptiones, à papularum eruptionibus. Nec ſolū ficofæ, aut papularū, ſed pituitæ, plu-
 2m ac puſtularum, quin & tuberculorum eruptiones exiſtūt. Multoq; adhuc magis aberrant
 qui Græcorum exanthemata, quin (quod peius eſt) morbillos, & uariolas, pituitæ eruptio-
 nes latinè appellant, Plinij uocabulo uſos eſſe opinati. Cum nō omnia, ſed pituitofa dūtaxat
 3m exanthemata, pituitæ eruptiones dici, uel Plinio docente mereantur. Quod ſi Græcorum
 è ξανθία τα quiſpiam latinè i eruptiones i abſolute conuerterit: minimè (ut opinor) repre-
 hendendus ueniret. quāq; effloſcentiā quandam potiùs Græca dictio præſeſert: Verūm
 20 de his poſtea. NVNC igitur ad id, unde, plusq; opinabamur, digreſſi ſumus, reuerti iā
 tēpeſtiuum eſt. & ὅρα ergo apud latinos ſcabiem repræſentat. λέπρα autem de qua libro
 (quem præ manibus hic obiter, ac ueluti per tranſennam enarrandū aſſumpſimus) de tumo-
 ribus. ſ. præternaturam loquitur: ea eſt quæ à Celſo impetigo, ab Auicenna autē impetigo
 excorticatiua dicitur. Non ea tamen, quæ à Græcis λεχιν, à Latinis uerò pluribus impeti-
 go, ſeu uolatica uocatur: nec ea, quam Romani mentagram nuncuparunt. Quam & præ-
 dictum lichenem Celſus papulas à Plinij interim papulis differētes, appellauit. Verūm quæ
 arabicè Albaras, & quidē nigra nominata eſt. Nigram dico: Albaras enim alba diuerſum
 genere morbum nobis indigitat. Aded ut non, ueluti genus in ſpecies diſtinguitur, ſic Alba-
 ras in albam & nigram ſecernatur: At ueluti uox tantū in ſua ſignificata. Ipſomet Prin-
 30 cipe n declarante nigram genus diuerſum ab alba exiſtere, albamq; uerā albaras ab initio
 ſtatim capitis nominando: Nigram uerò tali modo (quemadmodum peritiōribus liquet) de-
 ſcribente: ut ambigi nequeat, quin eum affectum intellexerit, quem plurimi tam Græcorum,
 q̃ Latinorum, lepram, Celſus uerò impetiginem, uocant. Diſpoſitionem inq; morbum'ue di-
 ſponentem ad Auicennæ plurimūq; Arabum, atq; etiam Hebræorum lepram, Græcorumq;
 elephantem. Quemadmodum enim impetigo lichen'ue, qā nō ex ſolis craſſis humoribus fit: Impetiginis ma-
 uerūm ex miſto quopiam humore (Galenus, o quem Paulus, p atq; Aetius i ſectati ſunt, dog-
 mate) ſeroſis nimirū ſanioſis'ue (Græcè i χροός δ' ων) ac tenuibus, et acribus ſuccis, cū craſ-
 ſis permiſtis: Idcirco non in ſcabiem modo, ſed in lepram quoq; ſiquidē inueteraſcet, diſeuſ-
 ſis illis ſanioſis, tenuioribusq; per halitum ſuccis: aut increſcēte corporis combuſtione, facilli-
 40 mē permutari poteſt. Ita & lepra hæc albaras'ue, ſi diutiùs perſeueret, in elephantiaſim
 quādoq; ac præſertim in exuſtis, melancholicisq; corporibus, cōuerſi coſueuit. Eoq; magis
 quò

f lib. 3. de re medi-
ca. cap. 31.g ut lib. 24. cap. 4
& lib. 26. cap. 11.b ut lib. 31. cap. 9.
i cap. 19. uerſus ſi-
nem.

Puſtula.

Cor^m. p^m.

k lib. 23. cap. 9.

l lib. 5. cap. 28. ſec.
14. 15. 19. 17.

Cōtra Cornar.

m 5. de cōpo. medi.
ſecūdū loc. cap. 3.

ε ξανθία τα

n 7. 4. tr. 2. cap. 9.

Albaras nigra.

Impetiginis ma-
teria.o 5. de cōpo. medi.
ſecūdū loca. cap. 3.

p lib. 4. cap. 3.

q lib. 3. cap. 16.

7. fen. 4. tr. 2. ca.
9. 11. & 12.
5. quinto Breuiarij
cap. 3. & 4.
Albaras alba
Leuce.

1. lib. 5. cap. ult. in
fine.

Vitiligo unde
dicitur.

u. in proe. primi li
bri. in fine.

x. ubi supra.

y. ut lib. 20. cap. 13.
uersus finem lib. 27.
cap. 12. & lib. 35.
cap. 15. post prin.
z. ut lib. 20. cap. 15
& lib. 31. cap. 10.
post mediu.
a. ut lib. 22. cap. 25
uersus finem.

Contra multos
Græcorū inter
pretes.

b. lib. 5. cap. ult. in
fine.

quò calidior ambientis aeris regionis ue temperatura sit: deprauataq; uictus ratione leprosus homo utatur. At id quod paulò ante proposuimus exequamur. Albarā. s. Serapionis, atq; Auicennæ in nigram, & albam distingui. Cumq; Albaram nigram esse Hippocratis, Galeni, & Græcorum ferè omnium medicorum lepram, ad satietatem usq; prædictum iam sit. Albaras quidem alba (prout ex tum Serapionis, tum Auicennæ definitionibus colligi apertissime potest) nō aliud est, q̃ quæ ab Hippocrate, suisq; affectis, λέυκον dicitur: ab innominato autem scholiorum, in Theriaca Nicandri, Authore, atq; etiam à DIVO AVGVSTINO, & Hali Abbate lepra nuncupatur. A Latinis uerò, uel Græcorum medicorum nomine seruato, leuce: perindè ac Celsus appellabat. uel generis nomenclatura Latinis propria uilitiligo nominatur: quem in modum Plinius uocat. Qui tamen distinctionis gratiā, modò albam uilitiginem, modò nigram dicit. Id quod si exquisitiùs intelligere cupimus, ac multorum circa huiusce nominis (uilitiginis m̃q;) usum, errores detegere, Notandū profectò est: Vitiliginem sic uidelicet dictam uel à uitio & lite: quoniam uitium est, in quo lis quædam ac rebellio fit nutrimenti aduersus alteratricem facultatem: adeò ut illud assimilare facultas nequeat. Qua ratione uilitigatures quoq; ipsos detractores calumniatores ue Cato eleganter (uti Plinius refert) ex uitijs & litigatoribus nomine composito uocauit. uel (ut alij uolunt) à uitulo, propter eius membranæ, amnii. s. quo nascitur inuolutus, cādorem. uel quauis alia ratione sic nominatam, genus quodam esse tres sub se species apud Celsum recludens. leucam. s. ac alphon utrunq; candidum inq; & atrum: Nec Celsus modò uilitiginis nomē, ut genericū prædictas iam tres species sub se differenter comprehendens usurpauit. Verum & Plinius quoq; qui tamen si uilitigines nonūq; absq; ulla distinctionis nota, simpliciter curauit. Nihilominus tamen genus esse uilitiginem ad albam & nigram præsefert: Cum aliquandò uilitigines albas: Nonnunq; uerò uilitigines nigras curare præsidijs doceat. Promptum uerò atq; in manu fuerit, albam uilitiginem adhuc subdistinguere. quoniam. s. uel profundius ad subiectam usq; carnem uitium occupauit: tuncq; (uti uidebimus) Leuce dicitur, uel superficialius cutim duntaxat infecit, tuncq; candidus alphas non à Græcis modò, sed ab ipso etiam Celso nuncupabitur. Quamobrem uehementer non admirari nequeo, Cur sæpè interpretes: ubi uel Hippocrates, uel Galenus Græcè habet λέυκον traducunt generis nomine uilitiligo. Alij autem non semel: ubi Græcè legitur ἄλφος nobis uertunt similiter uilitiligo. Ex quo nec speciem ab authore intellectam nos generico nomine cōcipere possumus. Cur. n. si Græcè ἄνθρωπος legitur, Latine sonans homo generis nomine utentes animal uerte re debemus: Vitiligo igitur (ut ad id unde digressi sumus, reuertamur) genus quoddam tribus affectibus cōmune Latinis importat. Cui quidem generico Latinorum nomini respondens nullū apud Græcos inuenimus. quemadmodum neq; speciebus, leuca. s. ac alphi respondens ullum nomen Latini effinxerunt. Qua de causa hi generis nomenclatura suis interim additis differentijs, candidi uidelicet, & atri: Illi uerò specierum nominibus generis interim uoce subintellecta suas intentiones exprimere consueuerunt. Nos autem quò singulorum causas (prout hic maximè intendimus) pernoscamus: Genus quidem Latine uilitiginem, species uerò Græcè λέυκον, & ἄλφον, & μέλανα (Celsi instar uocantes: sigillatim cunctas enucleare conabimur. A prima specie, cuius ratione & alias perpendimus, exordium sumentes. λέυκον ergo Latinis characteribus leuce, siue leuca nomen est à similitudine (Galenus fen

ni⁹ sententia) sumptum. λέυκη enim Populus arbor est, cuius folia in candidum uergunt: quin
 & arboris cortex albus est: Cui quidem cutis leucam patiens assimilari quodammodo uide-
 tur. Nonnunq; uerò Galenus non à similitudine: Sed à uisibili potius Symptomate nomen id
 inditum affectui fuisse insinuat. Id quod magis quidem nobis arridet: Cum λέυκη non aliud
 Græcis q; nobis Alba significet. Adeò ut eadem pari; ratione tam Populus, q; præsens
 morbus λέυκη dictus uterq; sit. Inquit ergo (ut exquisitiùs iudicare queas) Galenus de alte-
 ratricis nutritoriæ ue facultatis uitio, indeq; succedentibus Symptomatibus loquens. d. Vitio-
 se quidem nutritoriæ uirtutis actio fit ob alimenti materiæ ue uitium: ut in Elephātiāsi, & leu-
 cis, cæterisq; id genus. Accidit enim dum agglutinatur carnibus, nutrimentum, ubi pituitosior
 sanguis est carnē quoq; effici magis pituitosam. Neq; n. idē est carni esse, et pituitosæ carni eē:
 sicuti nec carni eē, & melācholicæ carni esse. Ergo cū caro longo tēpore pituitoso simul, ac
 glutinoso sanguine nutritur, caro qdē adhuc manet: mutatur tamē eius forma, & in alterā spe-
 ciem uertitur. fitq; media quædam inter sanguineam exanguemq; carnem. Vbi autem talis
 est reddita, accidit ei ut de cætero allatum sibi nutrimentum non magis uel tentet in rubram
 carnis speciem mutare, q; polipodes, & locustæ. Ita fit ut tum alba, tum pituitosa tota q; citissi-
 mē euadat. Cum nec ipsa possit nutrimentum ad ruborem uertere, & simul pituitosum illud
 affluat. Ergo qualem ab initio locusta carnē habet, ferēq; omnes ostreæ: talem ex transmuta-
 tione habēt qui leucis fœdantur. Ita enim carnis uitium nominant αὐτὸ τῆς χροίας τῆς οὐ-
 μασιανθιμῆς. hoc est: à colore nomen imponentes: sicut nigræ & callosæ carni ab ele-
 phante nomē ferunt. Hæc Galenus. In quibus ultimis uerbis nō à similitudine impositum esse
 leucæ nomen ait: quemadmodum secundo quidē methodi uoluit. f. Verum (ut patet) à colore.
 qua de re à Synhomate potius uisibili, q; à similitudine impositū esse ex ijs uerbis liquet. A si-
 militudine tamen elephantis, reliquo affectui nomenclaturam inditam esse apparet. qui quidē
 ex melancholico nutrimento ad carnem longo tempore confluyente, nō secus ac ex pituitoso leu-
 ca, fit. τὸν δὲ ἀλφὼν ἢ γένεσις. idest: Alphorum autem generatio cum prædictis uitijis (uti
 Galenus ibidem adiunxit) similis est generis. Non tamē sub ijs tota caro uitiat: Sed in sum-
 ma cutis superficie, οἷον λεπίδες τινὲς ἐπὶ πρὸς πύλας. quod est ueluti squamulæ quæpiam
 superfiguntur, stabiliuntur ue. Albi quidem ex pituitoso, Nigri uerò ex melancholico succo
 exorti. In quibus porrò Galeni uerbis animaduertendum sedulò est, ne decipiamur: existimā-
 tes in Alphis esse squamas, ueluti in lepra fore prædiximus. & Haud enim dicit hic Galenus
 q; in summa cutis superficie sint squamæ: at & ueluti squamæ ait. q. d. ille colorum infectiones,
 quos alphos nuncupari præscriptum est, αὐτὸ τῆς ἀλφαίνας: quod est & immutare: quoniam sci-
 licet cutis color permutatur: non tamen ubiq; cutis conformiter immutatur, at per aliqua inter-
 ualla: non secus ac maculæ quædam inspersæ sunt, & ueluti squamulæ quæpiam cuti affixæ:
 non tamen squamæ uerè sunt. In hoc enim à lepra (quam Albaras Nigrā uocabat) morpheā
 nigram differre princeps ait. ^b Quoniam in albaras nigra sunt excoꝛiatio, & squamositas,
 & testositas (ut eius uerbis utar) quæ non sunt in morpheā nigra (Intelligere autē non Aui-
 cennam¹ modò, at Srapionē^k quoq; Razem,^l Hali Abbatē,^m atq; omnes deniq; Arabes, Bar-
 baros¹ ue utriusq; morpheæ, albæ scilicet ac nigræ nomine, Græcorum alphos, tum cādidos, tū
 atros perspicuum cuius consideranti est. Quoniam uidelicet noua quædam figuratio corporis
 apparet: μορφή enim, & μορφωμα, seu μορφωσις forma est, seu figura, atq; figuratio.
 Metamorphosis

c. 2. meth. cap. 2.

d. 3. de sympt. cau-
sis cap. 2. ante me-
dium.e. ibidem post ali-
qua exēpla iterpo-
sita de alijs aīali-
bus.

f. cap. 2.

Alphi:

An alphi squa-
mas habeant.g. suprà fo. 124.
129. 130.h. 7^a. 41. tr. 2^o. ca.
9. uersus finem.

i. ibidē et cap. 10.

k. 5. breuiarij c. 5.

l. 5. ad almasorē

cap. 32. 33. & lib.

diuisionū cap. 118.

& 5. ad almaso.

cap. 32 & 33.

m. 8. theoricæ ca.

16. & 4. practicæ

cap. 4.

Metamorphosis enim quædam fieri ex albo homine in nigrum, & ex nigro in album apparet. Non tamen is affectus est, quam uulgares nostri morpheam uocant. Illa enim longè ab hac (ut uidebimus) distat: Græcisq; ἀλωπεκία, & οφθαλμία nuncupatur. De qua tamè postea. Nunc uerò ad alphos reuertamur, quos Barbari morpheæ nomine describunt: quin & ipse Arabum Princeps candidum album non solum Morpheam albam uocat: uerum & aliquando Alguada suo idiomate, siue ut alij legunt Algrada appellat. Alphi ergo quemadmodum ex Galeno^o (cuius uerba Aetius^p exscripsit) prænarratum¹ est: ueluti quædam squamulae superiori cutis superficiei annectuntur. quomobrem & Celsus^r quoq; dicebat, quasdam quasi guttas dispersas uideri. Qui tamen Celsus (ut omnium sermones, quoad possumus, percipere queamus) cum tres prænarratas uiriliginis species aduerterit: proprijsq; singulas nominibus designare cuperet, nullum à Latinis speciale nomen obtinens: Græcorum nomenclaturis hoc modo determinauit: ut scilicet primā speciem leucen, & leucam uocarit: candidum uerò album, simpliciter album dixerit: Nigrumq; interea, Melana nuncuparit. In quibus porro tribus uiriliginis speciebus, tametsi ueræ squamæ non sunt, at maculae tanq; squamulae supersistunt: Ab asperitate nihilominus aliqua minimè absolutio fit. Verum de his plura locis proprijs discutientur. Impræsentiarum ergo sat superq; est efficientem humorem considerare. Qui quidem in albo alphi, ac leuca pituitosus humor: in nigro autem alphi melancholicus esse præscriptus iam ex Galeno^o est. Verum tamen in hoc differunt Alphi (quos Aui.⁴ Morpheas uocabat) à leuca, dicta ab eodem Albara: Quoniam (ut ipse met inquit) materia est in utraq; morpheæ minor, & subtilior: & uirtus expulsiua fortior. quare expellit ad superficiem. Et materia in Baras est grossior, (quin, ut Paulus ait, uiscosa et glutinosa pituita) & uirtus expulsiua debilior, fixa in interiori parte: & corrumpit complexionem eius etc. Quas ob res in Baras, siue cum articulo Albaras, leuca uel albi pili sunt, & lanugini (Celsi^r referente) similes. Quamq; & ipsi quoq; alphi cum inueterascent, penitus (Paulo docente)⁷ penetrant: ut etiā albos pilos producant, siquidem candidi alphi sunt. Nigri enim nigros quoq; pilos generant. cum pro humoris qui subest ratione id fiat. Ex quo non semel canos etiam senes aliquam uel barbæ uel superciliorum portionem (ubi uidelicet inueteratus melas, ater uel albus extiterit) nigram habuisse uidimus: perinde ac iuuenibus etiam ex toto nigris, quampiam nihilominus partem leuca quidem, aut inueterato iam alphi affectam, candescere conspeximus. VERVM enim uerò à rerum consequentijs necessariò tracti, hucusq; sermonem protelauimus. ut quauis de pfora scabiæ uel lepra nonnihil enucleandum proposuerimus: de pruritu nihilominus, ac lichenis utrisq;: Græcorum scilicet, quam plurimi latinorum impetiginem traducunt, & alio Romanorum lichene, fero uel quem distinctionis gratia, uel ferum lichenem, uel mentagram usurpato nomine uocabimus: qua occasione de equorum obiter lichenis nonnihil tetigimus, atq; insimul de hippomane. Deincepsq; cum de lichenis facta mentio sit, quas impetigines plurimi Latine appellant: operæpretium fuit Celsi quoq; impetigines ostendere: quibus unà Græcorum lepram penes Celsum inuenimus. Quoniam uerò lichenas apud eundem Celsum non legimus: impetiginis enim nomen alteri affectui dedicatum fuerat. Idcirco & opportunū fuit Celsi papulas perpendere, quibus & Græcorum lichenes, & aliorum Romanorum impetigines cognouimus. Aliud interim aduertentes, Plinij. s. papulas à Celsi papulis differre. Demum quia de Græcorum lepra loquebamur. Hali Abbas autem. Diuus Augustinus & quidam alij le-

præ

præ nomenclatura nõ eum affectum intelligunt, quẽ nũc intendimus. At alium qui à Græcis leuce dicitur: Leuce autem uutiliginis species est: Hac de causa de uutiliginis speciebus aliquid tan gere necessum fuit: præsertim quia nonnulli sunt, qui non apte generis nomen speciebus accom modant. In quibus omnibus, pro Græcorum simul, ac Latinorum, & Barbarorum intelligen tia, Barbara nomina ut Baras, & albaras, albã & nigram, excorticatam impetiginẽ, itidenq; morpheam utranq; declarasse opportunum fuit. Præter hæc autem plurima de lepræ nomine discussimus: Cũ non in hoc solum æquiucatio consistat. quia. s. nonnulli leucã uutiliginis speciẽ lepræ nomine intelligant. Verũ & alium longe maioris momenti affectum Razes, & Aben xoar, ^a Serapio, ^b Auicenna, ^c horumq; sequaces leprã nominarunt Græcorum. s. elephantia sim, quæ turpissimum quidẽ non minũs, q; sæuissimũ affectũ ostendit: cum cancer uniuersalis sit.

HICQUE tumor est, quem ordine uigesimum sextum antea numerauimus: quãq; aliquandò Leontiasim quoq; nuncupant, nec non satyriasmon, siue satyriasim. Quæ quidem nomenclaturæ à similitudine, quin & hac multiplici impositæ sunt. Multiplici inq; Satyriasim enim ali quaddo, ^d interdum uerò ^e Satyriasimus à Galeno uocatur: Quoniam uultu similes Satyris hoc

pº malo affecti fiunt. Resimatur enim nasus (perindẽ ut aliàs f inquit) et labra crassa fiunt, atq; aures extenuatæ, quasiq; acuminatæ uidentur. Quorum profectò, ueluti & aliorum omnium symptomatum rationes loco proprio & demonstrabimus. Nunc uerò quod intendimus profe

2º quamur. Aliam igitur, & quidem ab hac diuersam similitudinis rationem ex Archigene Aetius refert. ^b Quoniam uidelicet malæ faciei iisdem cum rubore attolluntur: & musculis ma

2º xillaribus ueluti conuulsionem patientibus, mentum ipsum dilatatur. Quemadmodum etiam ri dentibus euenire solet: similitudine quadam ad picturas Satyrorũ. Quos α τὸ πρὸς τὸν ὄψιν uocitatos nonnulli (Caelio referente) opinantur. quod est gaudere, ac ridere. Nam ο αἰς ο uer bum, à quo ο αἰς ο uerbum formatur, idẽ est quod gaudeo rideo, labia diduco cātando & ludendo. etc. His igitur de causis aspectu molesti terribiles uel nonnunq; à Galeno^k dicuntur. Cũ com pressus recuruusq; nasus fiat, labia crassa, aures extenuatæ, atq; etiam oris muscoli conuellan

3º tur, ut inuiti ridentes appareant. Quin (ut tertia quoq; à prædictis diuersa similitudinis ad Sa tyros ratio pateat) alacritas etiam uehemens ad coitum ipsis adest (uel Aetio^l ex Archigenis libro, teste.) Quemadmodum & de satyris fertur. quamobrem & castrari homines docuit. ^m siquidem uel ab huiusmodi passione immunem, ac tutissimum uiuere: uel si præcaptus sit, ne

3º in peius malum prolabatur, exoptarit. De qua tamẽ uenerea Satyrorum procacitate uberiũs infra ⁿ sermocinabimur. Triplici ergo cum Satyris conformitate perpensa, uel si mauis dupli ci: Quoad uultum. s. ac libidinem, uenereum uel stimulu, Satyriasim, & Satyriasimus hic mor bus appellatus est. Verũ enim uerò quauis incipientem affectum sic nominandum Galenus^o innuerit: Id ipsum nihilominus apud eos, qui rerum corticem, non medullam contemplantur Ga

leni uerba præseferunt. Secus autem est ac hi machinantur. Cũ non ab initio statim Satyris præscripto iam uel à Galeno uultu similes huiusmodi morbo correpti euadant: Verũ longo deinceps temporis interuallo. quũ. s. aspectu horribiles redduntur. Adeo ut oppositu potius ei quod prima fronte concipitur, peregrina mente speculantibus offeratur. Quoniam nõ in prin cipio, sed prope finem Satyris similes appareant. Atq; id ipsum (si mihi confidere nolueris)

4º ab ipso met Galeno intelligas. Quũ ait ^p τὸ χρὸν δὲ πλεον ἢ μέλαινα γίνεται τὰ αἵματός, ἢνὶ καὶ δυσώδεις εἰσὶ καὶ ἀπεχθεῖς ἰδέν. ἐν τοῖς δὲ αὐτῶν καὶ ἑλκὲς συμπίπτει

z 25. cōtin. ca. 11.
litera. T. s. ad al=
māf. 35. et li. diui.
cap. 120.

a 2º. they sir. tr.
7. cap. 12.

b 5. breuiarij ca.
14.

c 3º. 4º. tr. 3. per
totum.

Tumor 26.

Elephāti asis.

Satyriasim no
men unde.

d lib. de mor. cau.
cap. 6. post prin.

e li. de tum. præ.
nat. 15.

f de morb. cau.
cap. 7. ante med.

g infra tr. 3. ca. 2
h lib. 13. cap. 120.

i lib. 19. lec. anti
quarum cap. 25.

Satyr unde di
citur.

k lib. de tumor.
præ. nat. cap. 15.

l lib. 13. cap. 120.
in principio.

m in principio.

Nota.

Cōtra Tagaul
tium

m Ibidẽ cap. 122.

n In declaratio
ne tumoris. 28º. in
tertio Satyriasim si

gnificatu.

o lib. de tum. præ.
nat. cap. 15.

p Ibidem.

Τα τοῦτο

τὸν τοῦ πένθος ἀρχόμενον ὀνομάζουσι σατυριασμόν, ἐπεὶ τῶν σατῆρος ὁμοίῳ γίνε-
 νται τὸ πρόσωπον. quod est. Tempore autem procedente atra bilis copia sanguinem exu-
 perat (ex melancholico enim sanguine primam huiusce affectus generationem fieri iam iam
 prædixerat: ubi sanguinē atro quidem succo dominari supposuerat.) Quo tempore sunt gra-
 uiter olentes, atq; ad uisum molesti. horum uerò nonnullis & ulcera contingunt. Hanc affe-
 ctionem incipientem Satyriasmum appellant: eò quòd Satyris uultu aspectu'ue similes reddun-
 tur. Supposita igitur passionis diuturnitate: donec, ob adauctam atram bilim, & malè graui-
 ter'ue olentes, & aspectu horribiles molestiq; fiant: (quia, labra facta sint crassa, silusq; na-
 sus, & aures acuminatae, prout alibi scripsisse prænotauimus) Quin & nonnullis ulcera
 cōnascantur, Subdit, Τοῦ τοῦ πένθος ἀρχόμενον ὀνομάζουσι, σατυριασμόν. etc. quod est: 10
 hanc passionem affectionem'ue, quum incipit, q. d. cum hæc passio ultimò dicta. (s. malus odor, &
 aspectus molestia, & ulcera: Quæ tamen Symptomata, ueluti præassumptum iam est, tem-
 pore procedente adueniunt) incipit: Quia tunc satyrorum effigiem præsefert, nonnulli saty-
 riasmum appellarunt. Fortassisq; Archigenem nobis insinuat. Id quod nihilominus perbellè
 Arabum Principem¹ intellexisse liquet. Vt qui non exordientem affectum: Sed postq; plus
 rima Symptomata præmissa sunt: ac demum ingrossantur labia (ut eius uerbis utar) & deni-
 gratur: & apparet super corpus additio glandulosa. Tunc subdit: Et fit similis animali quod
 Græcè nominatur satyros. etc. Atq; id ipsum Galeno etiam alibi² conforme est. Quum nō in-
 cipientem affectum, sed quādo labra crassa fiunt, resimaturq; nasus, & aures extenuatae ui-
 dentur (quemadmodum prædiximus) satyrorum effigiem præseferre ait. Qua de causa & 20
 satyriasin (prout antea³ nominauerat) à quibusdam nuncupatum fuisse insinuat. Quam etiam
 ob rem & Archigines (Actio⁴ referente) non cum incipit passio: satyriasin uocat. Verum ob
 faciei cum satyris similitudinem: Quam non ab initio confertim, sed temporis interuallo per-
 mutari iam liquet. Quocirca & nos absoluit unā cum Actio, & Archigene, in quouis tempo-
 re affectus sit, ab ea uultus, uel procacitatis similitudine: quæ nonnunq; succedere cōsueuerūt:
 aut ambæ insimul, aut altera: simpliciter, absoluteq; satyriasin & satyriasmon nuncupabi-
 mus. Quòd si refractariè adhuc uelis Galeni⁵ uerba de incipiente penitus affectione intellis-
 gere. ut. s. quum incipit duntaxat Satyriasmos appelletur. Ex aliorum sententia, nō autem ex
 propria, locutum esse respondebimus. Id quod Phæbo clarius est. Qua de re non satyriasin
 siue satyriasum, at elephantis initiū, seu elephantem inchoantem alibi⁶ nōn semel ab eo pro 30
 latum offendimus. AT alia contemplari nomina tempestiuum est. Nonnulli enim eun-
 dem quoq; morbum Leontiasin uocant: multiplici etiam similitudinis ratione. Quāuis enim
 ex Archigene Aetius⁷ unam duntaxat tetigerit: Quoniam scilicet frons ægrorum cum quo-
 dam tumore laxior redditur: ad similitudinem pellis flexilis superciliorum leonis. Princeps⁸ ta-
 men leoninam ægritudinem appellans, alias tres similitudinis rationes explicauit. Quartū pri-
 ma est, quoniam non nominatur ita, nisi quia plurimum accidit leonibus. Secunda, quoniam ter-
 ribilem facit faciem patientis eam, & ponit eam in forma leonum. Tertia quoniam rapaciter
 uiolenter'ue tenet quod capit, rapacitate leonis. Sed harum quidem Principis rationum primam
 satis suspectam atq; ambiguum teneo: Cum nullus ueterum, quos uidere licuit, authorum hui-
 iusmodi affectu uexari leones prædixerit. Quamobrem deprauatum Auicennæ cōtextum 40
 reputamus: quum ait & dicitur q non nominatur ita, nisi quoniam plurimum accidit leonibus.

Et dicitur

Et dicitur quoniam terribile facit faciem. etc. Dictionem namque nisi superfluere, ac per hoc expungendam opinamur: Coniunctionem quoque; Et aduersatiue potius legendam Sed ut sic legamus. Et dicitur quod non nominatur ita, quoniam plurimum accidit Leonibus: Sed dicitur quoniam terribilem facit faciem. etc. Adeo ut non tres, quia primam reprobabat: Verum duas similitudinis rationes assignarit. Quarum adhuc primam, quæ ordine secunda prius fuerat (quoniam scilicet terribilem facit faciem patientis eam, & ponit eam in forma leonum) si eandem cum ea quæ ab Archigene, Aetioque ponitur, intellexisse malueris: tuum quidem est. Exquisitiùs tamen uestiganti quippiam diuersum inesse manifestabitur. Cum in altera similitudine (quæ scilicet ab Archigene posita est) frons duntaxat consideretur: In altera uero (quam à Principe expressam inuenimus) totius etiam uultus terrorem inducentis ad leonis faciem comparatio facta sit. Quæ de re diuersam hæc ab illa similitudine quam Archigenes prænarrauerat, arbitramur. Nihilominus tamen aliam à prædictis, atque illius quam deleuimus loco, adiungere possumus. Quoniam scilicet tali morbo pressorum anima, leonum instar, foetet: quorum quidem leonum & anima spiritus ue, ac uiscera omnia pergrauiter olent. Fædum namque odorem in cibo relinquunt ex suo halitu, Aristoteles prius, ac Plinius deinde testati sunt. Proscissis etiam leonibus (ut aiunt) interiora grauius olent. Quæ de causa & flatum quoque acerrimum emittunt, & urinam grauius olentem. Nō secus autem & eorum, qui præscriptum morbum patiuntur anima, sudorque, ac totum denique corpus, nedum excrementa mirum in modum foetent. Quadruplici ergo similitudinis ad leonem ratione Leontiasis huiusmodi affectus nuncupari consuevit. Quarum profecto prima est, quoniam frons ægrorum laxior cum tumore quopiam redditur instar flexilis pellis suæ. 2^a. perciliorum leonis (uelut ex Archigene, atque Aetio prædictum est.) Secunda uero fuerit, quoniam huiusmodi morbo affectorum anima spiritus ue, non secus ac leonum anhelitus, quemadmodum & excrementa foetent. Tertia quoniam terribili turpissimaque facie homines à tali affectu redduntur, ut leonum instar terrorem ex improviso conspicientibus inducant. 4^a. Quarta demum, quia tenacissimus ac maximè uiolentus morbus est, quin & fortissimus, ut uel omnino insuperabilis, uel cum maxima difficultate, ad leonum imitationem existat.

QV ANVIS autem leontiasis, & satyriasis nomina sint nihilominus tamen quod non Græcis modò, at Romanis quoque omnibus commune semper nomen fuit, ἐλεφας est 30 ἐλεφαντίασις, & ἐλεφαντία. Sic etiam apud Latinos prolatum, Elephas, Elephantiasis, uel Elephantia. Idem namque nomen intelligo tametsi uariè declinatur. Hactenus igitur nomenclatura Celsus, Plinius uterque, Aurelianus, Quintus Serenus, Marcellus, Theodorus Priscianus, Aemilius Macer. Alijque plurimi hunc affectum demonstrarunt. Quæ quidem apud HaliAbbatem quoque inter Arabes obseruata est. Quamquam apud multos Arabes Elephantia diuersum ab hoc affectum: Pedum scilicet quendam tumorem à uaricibus obortum significat. Perinde ac apud Razem, Auicennam, atque ipsum quoque Abenxoarem perpendere licet. de quo quidem affectu iterum deinceps ubi oportebit fermocinabimur. ut Arabum Elephantem à Græcorum elephantem distinguere queamus. Atque idipsum ultimum nomen: siue Elephantem, siue Elephantiam dixeris, aut Elephantiam, multiplici etiam similitudinis ratione ab Elephantem sumptum est. Primo enim sic dicitur: quoniam nigra tuberosaque caro in huiusmodi

M

morbo

b 8^o. de histo. animalium. 5^o. uersus finem.
c libro 8. cap. 16. post principia.

d lib. 3. cap. 25.
e lib. 26. cap. 10.
& alibi sæpe. Aliter quoque Plinius illi ascriptus lib. 2 de re medica cap. 57^o.
f lib. 4. chronion cap. 10.

g cap. 10.
h de medic. ca. 19
i lib. 10. ad Timotheum cap. 32.
k cap. de nepeta.
l 8. theoricæ cap. 15. & 4^o. præticæ cap. 3.
m 12. cōtra. cap. 2
litera 1. & 9. Almansor cap. 93. & lib. diuis. cap. 107
n 22^o. fen. 3^o. tr. 16. 17. 18.
o 20. Theisir. tr. 7. cap. 26.

Elephas unde dicitur.
p 3. de symptom. cau. ca. 2. de med.

morbo fit, instar carnis elephantum: prout ex Galeno¹ didicisse promptum est. Quum de nutritoria facultatis uitio loquens, tam in leuce, quam in Elephantiasi exemplum ostendit. Vbi scilicet pituitosum in leuca, melancholicum uero in elephantiasi nutrimentum adeo carni agglutinatur: ut carnem quoque ipsam, in priori pituitosam, albamque locustarum carni similem: in elephantiasi uero nigram, duramque, siue (ut ipse ait) tuberosam, elephantum carnis instar, generari contingat. Dixi ex Galeno tuberosam. Græcè enim sic ait. Τῆς δὲ γὰρ μελαίνης σαρκὸς ἅμα καὶ ὀχθρόδους: ἀπὸ τοῦ ὥου τοῦ ἐλεφαντὸς ἐπὶ ἰσοαν τοῦ νομα. quod est: Nigræ autem carnis, insimul & tuberosæ ab animali elephante nomen effinxerunt. Quo quidem in loco uehementer non admirari nequeo, unde Copus habuit, ut & ὀχθρόδους traduxerit & pallida qua de re nigram simul & pallidam carnem intellexerit, dicens & ubi caro nigra, ac pallida fuerit, elephas nominatur & opinans forte legendum esse & ὀχρόδους id est & pallidæ & Linacer tamen callosam uertens, ueritatem uisdetur potius, quam uerborum uim obseruasse. Cum ὀχθος apud Græcos tumulum, collem asperumque, & inuium locum significet: Indeque apud eiusdem nationis medicos extuberationes, uerrucas, atque tumores ὀχθοί (unde ὀχθρόδους formatur) præferant. Quamobrem aptius fortasse fuerit non callosam legere, sed collosam (si Latine sic liceat) quoniam scilicet ueluti pluribus collibus monticulisue inæqualis caro fit, & aspera. Hæc igitur de causa & nos & tuberosam & Latine interpretati sumus. Cum non in omnibus conformiter partibus illud melancholicum uitiosumque nutrimentum agglutinetur. Ex quo & uarijs maculis uniuersum corpus infici solet: nec similiter illa nigredine intingi. Cuius

q lib. 13. cap. 120. tis enim ipsa (ut ex Archigene Aetius¹ inquit) nedum caro difformis, inæqualis, & in prin. aspera euadit: quin & dura, ut stupida sensusque hebetis quibusdam in partibus reddatur. r 3. de usu partium quemadmodum & ipsorum quoque elephantum cutem esse Galenusmetestatus est. ca. 12. Quas s lib. 3. cap. 25. in obres & Celsus⁵ (quem Plinius uterque ac Marcellus^u propemodum transcripserunt) principio. ait: Summa pars corporis crebras maculas, crebrosque tumores habet. Rubor harum pau- t li. 26. cap. p^o. et latim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæquabiliter crassa, tenuis, dura, mol- li. 2^o. de re med. si lisque quasi squamis quibusdam exasperatur. etc. Prima igitur similitudinis cum elephante bi ascripto ca. 57. ratio est (ut ad id, unde digressi sumus, reuertamur.) Quoniam caro nigra, & in plu u de med. cap. 19. ribus locis dura, nec non monticulosa extuberansque instar carnis elephantum est. ante medium. Cuius ius etiam carnis uitio cutim (ueluti prædiximus) unâ infici necesse est. Quocirca nil de carne tanquam abdita, nisi ulceretur, proferens Aetius, propter cutis primo intuitu conspectæ asperitatem, quæ in quibusdam accidere consuevit, deductum esse elephantias- 30 sis nomen ex Archigene determinauit. x Authorque medicarum definitionum ait y Elephas est affectus qui cutē crassam, atque inæquabilem reddit: liuor adest tum cuti tum oculorum al- 40 bis, exeduntur partes manuum, ac pedum summæ: ex quibus sanies liuida, ac foetida emanat. Fortassis uero non tumore modo carnis, cutisque Galenus in præscripta similitudine, dictio- ne illa & ὀχθρόδους & considerauit: sed lapideā duramque substantiam. Cum (ut patet) colles, montesque omnes lapidei sint. Qua ratione Linacrum callosam uertiisse uerosimile est. Prima igitur similitudinis occasio hæc sit. Ante quam nihilominus rationem duas alias tum Archi- genes, tum ab ipso exscribens Aetius^z enarrauerant. Quarum adhuc prima iam ab elephan- tis magnitudine sumebatur. Sicut enim inter quadrupeda maximum animal elephas est:

Ita

Cōtra Copū

q lib. 13. cap. 120. in prin.
r 3. de usu partium ca. 12.
s lib. 3. cap. 25. in principio.
t li. 26. cap. p^o. et li. 2^o. de re med. si bi ascripto ca. 57.
u de med. cap. 19. ante medium.

x lib. 13. cap. 120 in principio.
y post mediū lib.

z ubi supra.

Ita inter morbos hic maximus, & ferè inuictissimus existit. Atq; idipsum non modò ad corporis magnitudinem: Verum ad eius quoq; animantis fortitudinem unà refertur. Quamobrem & Quintus Serenus^a ait. Est elephas morbus tristi quoq; nomine dirus, Non solum turpans infandis ora papillis, Sed cita præcipitans funesto fata ueneno. Aemilius uerò Macer^b eius magnitudinem ostendit, dicens. Est lepræ species, elephantiasisq; uocatur, Quæ cunctis morbis maior sic esse uidetur, ut maior cunctis elephant animantibus extat. Quanquàm in eo proculdubio deficeret Macer, quoniam lepræ species^{3º} elephantem supposuerit. Secunda uerò ab eodem Archigene prænarrata similitudinis ratio est, Quoniam diuturnus, elephantum uitæ ritu, hic morbus est. Adeò ut ad mortem usq; comitari hominem soleat. Viuere autem elephantēs (philosopho^c teste) mares quidem alij annos ducentos: quin & alij trecentos, alij centum & uiginti aiunt. fœminas etiam ferè totidem: Sed florere ætate circa sexagesimum narrant. Hominum ergo ætates illorum uita superat. E quibus omnibus in animum reuocatis, triplici quidem similitudinis ratione morbum hunc elephantem nuncupari iam liquet. Præter quas & quarta demum addi potest. Quoniam^{4º} scilicet graues homines, & uix flexibiles reddat, in modum elephantis animalis. Corpus enim ipsorum (uel Aetio teste^d) magnum esse uidetur: & cuiusdam intolerabilis grauitatis sensus eis adest. Quod si ob nutritoriæ deinceps, aut attractricis uirtutis imbecillitatem, corpus emacrescit: os tamen, suræ, ac pedes (uti Celsus^e ait) intumescunt. Atq; ubi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusq; sub tumore conduntur. Quam quidem postrema ratione Razes^f quoq;, ac Arabum Princeps, & Abenxoar,^h Alijque dein qui hos persecuti sunt omnes, siue Arabes, siue Barbarolatini fuerint, grandem illum, ac diuturnum pedum tumorem elephantiasis nomine intelligunt. Cû adeò graue totum crus, nedum pes ipse ob atri humoris abundantiam reddatur: ut uix mouere ipsum homines queant. Quamobrem & Abenxoar ait.^b Accidit cruribus grossitudo præter naturam, quæ dicitur elephantia. Et hoc idè quia assimilatur cruribus elephantis in grossitudine. Et causa huius est exuberantia humorum grossorum, quæ sunt ultimi in grossitudine, qui descendunt ibi propter ponderositatem ipsorum. Verum de hac Rasis, Auicennæ, atq; Abenxoaris elephantia rursus infra, quum de uaricibus sermo fiet, nonnihil attingemus.ⁱ Impræsentiarum uerò sat est pro comperto supponere Arabum elephantiam à Græcorum pariter, atq; Romanorum elephantiasi mirum in modum differre. Quam in re cû Leonicens^k uberrimè ac satis superq; laborarit. Vltrà quòd notissima perscemet ipsam cuius etiam candidato, ac leuiter utrorumq; capita consideranti differentia est: Satiùs hercle mihi uisum est ad ea quæ magis necessaria fuerint, sermonem nostrum conuètere. Omissa interim ueluti rudibus quoq; notissima differentia, quæ inter lepram Græcorum, atq; Arabum existit: Et quod Arabum Iudeorumq; lepra (quam nostri uulgò SANCTI LAZARI morbum appellant) non aliud, quàm Græcorum, Latinorumq; elephantiasis est. Vltrà quòd ab eodem Leonicens^l & Manardo,^m atq; ambrosiorum exscriptore Fuchsioⁿ ad nauseam usq; pluribus inditijs comprobatum est. Nosq; rursum proprio loco plurima (uelimus, nolimus,) enucleaturi sumus.^o Cur autè Sancti Lazari morbus dicatur aliud non habemus, quàm summi Redemptoris nostri uerba: quum ait. P^p Homo quidam erat diues, qui induebatur purpura & bisso & epulabatur quotidie splendide. Et erat quidam mēdicus nomine Lazarus, qui iacebat ad ianuam eius ulceribus plenus, cupiens

M ij saturari

^a cap. 10.

^b de uiribus herbarum cap. 15. de Nepeta.

Cātra Macrū

^c 9^o. de histo. aīa. liū cap. 46. & 8^o. eiusdē cap. 9.

^d lib. 13. cap. 120. uersus finem.

^e lib. 3. cap. 25.

^f 12. corin. cap. 2. litera. I. & 9. Al.

^g 22^a. fen. 3^a. tr. p^o. cap. 16. 17. 18.

^h 2^o. theysir. tr. 7. cap. 26.

ⁱ In declaratione tumori 4^o. fo.

^k libro de Morbo Gallico circa principia.

^l ubi suprā.

^m li. 7. epist. 2^a.

ⁿ lib. 2. paradoxorum cap. 16.

^o infra tr. 3. cap. p^o. com. p^o.

^p Lucæ cap. 16.

q lib. 3. cap. 25.

r li. 26. cap. p^o.

Elephas ubi

frequens.

s de medic. ca. 19

ante medium.

t lib. 2. de medic.

cap. 57.

u 2^o. ad Clauco.

cap. 10. uer. finē.

x ubi supra.

Constantini Le

pra seu Ele

phas.

y ubi supra.

Obiectionis so

lutio

saturari de micis, quæ cadebant de mensa diuitis, & nemo illi dabat. Sed & canes uenie-
bant: & lingebant ulcera eius. etc. An uerò elephantiasim, siue (ut Iudeorū more loquar)
lepram Lazarus ille patiebatur, an ulcerosus alia quauis ex occasione fuerit: ignotum quis-
dem nobis est. Sat igitur nobis erit elephanticos ulceribus interdum usq; adeò scatere. ut mi-
serculo illi Lazaro comparandus sit. Quamobrem & hoc quoq; nomen, quemadmodum &
prædicta iam, à similitudine impositum est. Elephantiasis ergo, aut quouis nomine appelles,
morbus est, qui quidem ignotus penè in Italia Celsi temporibus (ipsomet referente¹) fuit:
præsertimq; ante Pompei Magni ætatem, uti Plinius refert^r. Nos uerò plures in Sicilia, &
maximè Panhormi, atq; etiam Neapoli conspeximus. Frequentissimus tamen in quibus-
dam regionibus is morbus est (subdebat Celsus) Aegypti enim peculiaris, declarante Plinio,
quem & Marcellus,^s & Plinius alter^t transcripserunt. Præcipuè autem ex Aegypti re-
gionibus in Alexandria (Galeno docente) elephantico morbo plurimi corripuntur, propter
uictus modum, & regionis feruorem. At in Germania, & Misia rarissima hæc passio ui-
detur: Et apud Scythas lactis potatores nunq; ferè apparuit. In Alexandria uerò plurimum
generatur ex uictus ratione. Comedunt enim farinam elixatam, & lentem, & cochleas,
& plura salita: & nonnulli ex ipsis carnes asininas, & alia quædam quæ crassum & atræ
bilis humorem generant. (ut hinc ad materiæ, quam præ cæteris hoc loco uestigamus, cogni-
tionem descenderimus.) Nam cum circumflans aer calidus sit, motus humorum agitur uer-
sus cutem. Cumq; in reges incidisset hoc malum: Aegypti populis funebre (Plinio^x utroq;
ac Marcello^x testibus) erat. Quippè in balneis solia temperabantur humano sanguine ad me-
dicinam eam. E quo demum CONSTANTINI Imperatoris lepram, hanc Græcorum
elephantiasim extitisse intelligo. Quauis enim celeriter hunc morbum restinctum esse in Ita-
lia Plinius dixerit: Reuiuiscere nihilominus potuit. quam ob rem & nostris quoq; temporibus
in Italia plurimi tali morbo uexantur. Constantinum uerò id genus morbo correptum extitis-
se, & non Græcorum Lepra, ex eo conijcimus: quoniam maledicto illo, atq; ab omnium auris
bus exterminando præsidij genere, à diabolis potius extuso, q̃ ab homine uel quantumuis ty-
ranno: Balneo scilicet ex humano sanguine, præsertimq; innocentium puerorum parato, sa-
nitatem sibi comparere (à falsis Idolis exhortatus, prius q̃ a D E O inspiraretur) inten-
debat. Quod remedium (uti Plinius,^y ac Marcellus^y aiunt) Aegyptiorum regibus elephan-
tiasim patientibus familiare erat. Haud quaq; tamen obstat, quoniam Romanorum Impe-
rator erat, Romæq; uitam tunc temporis degens lepram pati scribitur. Quauis enim Ro-
mani tunc lepram appellassent, ubi elephantiasim nominasse debuerāt. Quia tamen deflectere
iam à sua perfectione Romanorum idioma inceperat, Barbarisq; innumeris dictionibus
permisceri, ut in deterius semper ad nostra usq; tempora processerit: Idcirco mirum non
est: si non amplius Latini, sed Barbarolatini facti Romani lepram potius, Barbaro-
rum more, quam elephantiasim appellarint. Secundo quia non qui Latinum candorem pro-
sequuntur Constantini historiam scripserunt: ut Latinorum dictione à Græcis deducta usi
sint. Nec etiam politici medici: uti Celsus, aut Plinius, aut huiusce farinæ quispiam, sed qui
sacras literas incolebant, & in illis nutriebantur. Quamobrem & lepræ nomenclatura
(prout in Euangelio quoq; scribitur) Constantini elephantiasim demonstrarunt. For-
tassisq; aliquis Hebræus, aut Arabs medicus Imperatori familiaris morbum sic primus
nuncupauit.

nuncupauit. Fœlix tamen, siue lepra, siue elephantiasis dicatur. Vt quæ dignitatis, potenz
 tizq; & honoris sanctissimæ nostræ Ecclesiæ Romanæ ac summi eius Põtificis principii et
 causa fuit. Quamq; hæc minima & ferè nulla sint, eorũ relatione, quæ deberemus: Atq; hoc
 præsertim fœlicissimo sæculo: quo sanctissimus, non minus q̃ sapientissimus præsul. **IULIUS** Tertius
TERTIVS omni procul exterminato liuore, quin omnium Christianorum Principum tranz optimus Ponti
 quilla pace, ut a **DEO** Optimo Maximo potius, q̃ humano consilio electus eam gubernat. fex.
 Quamq; nonnullos esse minimè nos præterit, qui tali morbo (quouis modo sumatur) laboras
 se Constantinum inficias eunt. Nisi methaphoricè, quia. **DIVVS SYLVESTER** Impera
 torem à lepra, hoc est, grauiissimo quopiam peccato, contagio sòq; ut fortassis Idololatria laue
 rit, ac liberarit, intelligatur. At hæc obiter, & ulterius q̃ opinabamur dicta iam sint. Quæ au
 tem gregarij plures medici, quorum primi Isaac, & Constantinus Africanus^a dein uerò q̃
 hos ueluti cæcos duces cæciores etiam ipsi consequuntur, ut Conciliator,^b Gentilis,^c Simon Ia
 nuensis,^d Nicolaus florentinus,^e Guido Cauliacus, f Theodoricus, & Dinus,^h Rogerius,ⁱ
¹ Arnaldus à Villa Noua, ^k Philonium uocatum, l innumeriq; alij ex Barbarolatinorũ grez
 ge medici dicunt: (Quatuor uidelicet lepræ Arabũ species esse: pro quatuor humorũ diuersi
 tate distinctas, qn & quatuor nominibus effictis, ac (ut ita dixerim) chimærizatis, nuncupatas:
 ut primam, quæ scilicet ex sanguinis combustione fit, Alopeciam, seu Alopiciam, aut uulpinã
 uocent: Secundam uerò quæ ex flaua, seu rubra, aut pallida fortassis bili gignitur, Leoninam.
 Tertiã autem, quæ ex atra bili ortum habet, humore uel melancholico, Elephantiam. Ac de
 niq; quartã quæ ex pituita phlegmate uel suæ generationis originem ducit. Tyriam appella
 rint:) deliria perdeliria esse reputamus. Quauis enim quatuor humores huiusce affectus cau
 sas esse probabile sit: Haudquaquã tamen aliqua species determinatum distinctumq; nomen
 sibi unq; apud ueteres, aut Græcos, aut politos Romanos, aut etiam maioris momenti Arabes
 uendicauit. Cũ quælibet (à quouis humore generetur) elephantiasis, elephas & elephan
 tia, uel leontiasis, & leonina: uel demũ Satyriasis, & satyriasmos dicta sit: frequentissimeq;
 usurpato nomine apud Græcos, & Latinos elephas, elephantiasis & elephantia: Apud plu
 res uerò Arabes lepra. Sed qua ratione aliorum & longè diuersorum affectuum nomina tā
 uiolenter rapere, atq; huius morbi speciebus ineptè applicare, imponereq; debemus? ut Alope
 ciam, & Tyriam, quam Græci ophiāsin uocant, cutis capitis capillorum uel affectus in lepræ
 species transferamus? Qui duo morbi (siue mauius dicere unus, cũ figura tantũ differant,
 uti Gal.^m eũq; trāsribetes Oribasius,ⁿ Paulus,^o Aetiusq; aiūt. p) ex utraq; bili, amara inq;
 ac nigra, nec non & ex pituita fieri solent: iuxta Galeni, ¹ Pauli, ^r Alexandri, ^s & Aetij
 monumenta: Quin & ex sanguine (uti Princeps^u addidit) corrupto. De quibus tamen ube
 rius loco proprio deinceps sermonem habebimus. Neglecto igitur tali nominum abusu: Elephã
 tiasis causas (quarũ ratione impræsentiarum singula percurrimus) enarrare tempestiuũ est.
 Calenus enim ad atram uidetur^x bilim duntaxat hũc affectum referre. Qua de re unam esse
 cãm (qua uis ex materia prius genita hæc sit) præsentia quidẽ animo dicere possumus: aut salte
 duas, insimul tamen permistas. Cũ sanguini adiunctam hanc atrã bilim, exquisitiũs aliquãdò
 perpedens, Galenus determinarit. Paulus^z uerò, cui qdẽ & Serapio^a & Hali Abbas^b asti
 pulatur, duos humores cõsiderat: è qbus atra hæc bilis primã suæ generatiõis originẽ duxerit.
 Adeò ut duas quoq; elephantiasis spēs enũtiarit: sic scribēs. Cũ atra bilis, ex qua huic affectui
 in medio.

origo est, duplici modo generetur (uel enim ex melancholico sanguine, faculentioreq; & ue-
luti eius limo: uel bile flaua, utrisq; nimium uisus nascitur) Subrubicundā quidē elephantiasim,
mitiorem quodāmodo: ut autem uerius dixerimus, minū malignā primā ipsius differētia pro-
creat. Reliquam uerō & maligniorē, in qua totum corpus fœdatur ulceribus, et extrema de-
cidunt, altera flauæ bilis supra naturæ modum adustæ soboles producit. Hæc Paulus: cui (ue-
luti prædiximus) astipulatus est, præter Hali Abbatem, Serapion: quò ad hoc. s. quoniam duo-
bus ex humoribus atra bilis elephantiasim produciens generari queat: Quāq; à Paulo inep-
tē deuiat Serapion: peiorem uidelicet, uehementiusq; adurentem eam, quæ ex nigri humoris
exustione fit, determinans. De qua nihilominus differentia, proprio loco, unā cū nostro Ara-
bum Principe, loquemur. Ambas uerò has elephantiasis causas hoc mō consideratas Galenus
profec̃to minimē abnegasset. Quin et ex ipsius. et monumētis elegisse promptissimū est. quū ui-
delicet ob lienis imbecillitatem corpus uniuersum à melancholico succo expurgare nequeūtis,
aut ob hæmorrhoidarum, seu mensium muliebrium importunam detētionē hunc affectū proue-
nire nonnunq; uoluit, Quā ob causam, & melancholicus hic humor unā cum sanguine per-
uenas uniuerso in corpore uagans, atq; aliquam deinde recipiens supercalefactionem, moxq;
assationē, huiusmodi affectus causa euadit. Vel ob excedentem iocinoris calorē, qui flauā prius
bilim, dein uerò atram gignere, ob illius ulteriorē assationem, aliquando demonstrauit. perin-
de ac sequenti uberius commento enucleabimus. Arabum autem Princeps, s. supposito iam
atram bilim elephantiasis, lepræ ue (ut ipse ait) causam esse: quinq; huiusce atræ bilis mate-
rias, originisq; causas esse de lepra sermocinans innuisse uidetur: s. ultra quod de humorum
generatione nonnunq; loquens, & manifestissime omnes expressit. In primis enim atram bilim
(quā ipse melancholiam uocat) ex sanguinis combustione genitam innuit: quū ait {causa ef-
ficiens antiquior est malitia complexionis hepatis, decliuis ualdē ad caliditatem, & siccitatem:
quare adurit sanguinem in melancholiam: aut complexio corporis totius: aut sunt ambæ, ita q;
faciunt sanguinem acquirere per causas suas frigus.} Mox uerò eam, quæ ex humore melan-
cholico fit, insinuat: dicens. {Et causæ eius iuuatiuæ sunt oppilatio pororum: quare præfoca-
tur calor innatus, & in frigidatur sanguis, & ingrossatur. Et propriè quando splen est oppi-
latus, debilis. Quare non attrahit, neq; potest mundificare sanguinem ex humore melancholiz-
co. Aut est uirtus expulsiua in uisceribus debilis: ab expulsiōe illius in uenas ani, & matris
cis: & sunt pori stricti.} Id quod magis adhuc infra corroborat, dicens. {Et facta à fœce
sanguinis est saluior, & quietior, & non ulcerat.} Præter has autem & aliam, quæ à bilis
amaræ combustionē gignitur, ostendit. quū subdit. {Et facta ex melancholia cholera est ma-
gis fœda, & pluris nocumenti, & difficiliorum accidentium, & uehementius adurens. etc.}
Eam uerò quæ ex pituitæ combustionē fit, antea quodāmodo innuisse uidetur: quū ait {Et
causa eius materialis sunt cibi melancholici, & cibi phlegmatici iterum, quando adiungitur eis
satietas nauſeatiua, & operatur in eis caliditas: quare resoluit subtile, & ponit spissum me-
lancholiam, etc.} Quam tamen libro primo, de humorū generatione loquens, manifestius ostē-
dit. Nos autem hanc ē pituitæ uidelicet exustione factā atram bilim abnegamus: quemad-
modum antea tetigimus, ac rursus tractatu sequenti declarabimus. Nihilominus tamē aliā
non dico atram bilim, at elephantiasis speciem unā cum Aetio adiungemus: quæ scilicet ex
salsa nitrosa ue pituita suæ generationis initium sumpserit. Omissa interim quæ ex acida fieri
possent

posse ab Aetio creditur: cum frigidus omnino succus hunc affectum efficere, (ni putredine ad eum Contra Aetium
 tus in falsum conuertatur,) nequeat. Ex quo tamen falso humore impetigo nonnunquam fieri po-
 test, haec uero deinceps in scabiem, scabiesque in lepram, ac denique lepra in elephantiasim permi-
 grasce (praesertim quoties male curetur) apparuit. Hanc igitur, quae nitrosa ex pituita origi-
 nem duxerit, intellexisse Plinium opinamur: Quum albam elephantiasim aliquando protus
 lit. Ad obstructionem nihilominus nonnihil acidam conferre pituitam, aliosque crudos, & crassos
 humores, inficias non ibimus. Praeter has autem quatuor elephantiasis iam dictas primas cau-
 5^a. sas, quintam quoque tum Galeni, tum Principis Arabum dogmatibus respondentem atrae bilis ori-
 ginem adiungere possumus: eam uidelicet, quae non ex alio humore genita sit: uerum in simul
 10 ex chili crassa, & calida, nec non exustioni prompta portione, a calidissimo iocinore, una cum
 alijs humoribus genita fuerit. Vt quae ex falsis carnibus, multisque ac uarijs tum aromaticis, tum
 calidissimis speciebus, uel aestiuo tempore conditis cibis generari consueuit. Quamobrem &
 ipse Medicorum phœbus Galenus ait, in Alexandria propter uictus modum, & regionis fer-
 uorem, plurimum abundare huiusmodi morbum. Comedunt namque (ut inquit) farinam elixam
 tam, & lentem, & cochleas, & plura salita, & nonnulli ex ipsis carnes asminas. etc. Cu-
 ius uerba Princeps, de lepra (nomine Arabibus usurpato) loquens, transcripsit. Clariusque
 de humorum generatione sermonem habens, ait: spuma igitur est ipsa flaua bilis, faex uero
 atra: & utraque eae sunt naturales. perusti uero pars tenuior est ipsa bilis, uitiosa: Illiusque cras-
 sum est atra bilis uitiosa nonnaturalis: crudum quoque est ipsa pituita. Quod uero ex hac summa
 20 percolatum & cōcoctum est, sanguis quidem est. etc. Vbi quidem simul interdum generari pos-
 se atram bilim cum alijs humoribus liquet. Verum de humorum generatione uberius commento
 sequenti disputabimus. Ex combustis igitur sanguine, humore melancholico, atque etiam amara
 bili atram fieri posse compertum habemus. Id quod mox reiectis multorum phantasijs ostend-
 demus. Veluti & ex calidis, ac siccis, substantiisque crassis aliquando cibus circa initia statim ab
 exurente calore praeter modum adustis eandem generari saepenumero contingit. Ex hac au-
 tem atram bilim (quouis modo genita sit) quum uidelicet sanguini (Galeno docente) admista
 uniuerso corpori, nutrimenti loco, absque putredine febris inductiua, distribuitur: elephantiasis
 primam suae generationis originem suscipit. Quod si ex falsa interdum pituita (ueluti & an-
 tea tetigimus) genitum esse nonnunquam huiusmodi affectum admisserimus: Sanguini quoque ta-
 30 le pituitam admisceri, nec sine atrae bilis, aut melancholici quoque humoris permissione fieri unquam
 posse opinamur. Quamobrem ad calidorum tumorum catalogum reducere hunc morbum debemus.
 tametsi pauca in quibusdam caliditas est: praesertim in ijs quorum sanguis harenosus
 iam totus, ob nimiam adustionem, siccitatemque effectus est. Vt frigidus ab ipso Arabum Prin-
 cipe, & congelatusque a congelante melancholia proferatur: uel a gelido continente grumofus,
 impactusque iam redditus. (Aetio docente) fuerit. Id quod intelligendum hercle non est, quia
 frigidus, omni calore destitutus cruor sit. uerum quia multum a naturali suo temperamento
 calore ue lapsus. Nonnullas tamen interea putredinalis, adscititiaeque caloris portiones retinens:
 Quarum uir, ni discutiatur, ulcerare ubi ubi ascriptus nimium sit, uehementerque corrodere con-
 sueuit. ubi enim discutitur scirrhus potius, ac frigidos, quam cancerosos, in extremis praecipue par-
 40 tibus, affectus generabit. Adeo ut diuersi generis tumores in elephantico gigni absurdum non sit
 Verum de his longè plura loco proprio disputabuntur. Nunc enim sat superque fuerit affectus
 nomina,

r lib. 25. cap. 5.
 uersus finem.

s 2^o. ad glauco.
 cap. 10. & uide. 2
 de pot. natural. ca.
 8. & 9. et fusi-
 com. sequenti.
 t 3^a. 4^a. tr. 3. ca. p^o
 tex. 7.

u p^a. pⁱ. doc. 4. ca.
 2. ante medium.

x li. de tum. praet.
 nat. 15. & lib. de
 atra bili cap. 4.

y 3^a. 4^a. tr. 3. cap.
 p^o tex. 3. 5. & 8.
 z lib. 13. cap. 120
 post medium.

a cap. 15.

b in declaratione
tumoris. 28^l.

Tumor. 27.

Exostosis.

c li. de tum. præ.

nat. cap. 15:

d 14. meth. cap.

17. uersus finem.

Tumor 28.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

Satyriasis.

nomina, & causas materiales prænouisse: ut ordine sextum & uigesimum tumorem expediuerimus. Quem Galenus, libro quem præ manibus obiter enarrandum assumpsimus, de tumoribus uidelicet præter naturam, ^a Elephantiasim uocat. Cumq; fœdus, aspectuq; horridus fieri homo inceperit, Satyriasmon. Quamq; nonnulli secundum id nomen non toti affectui, sed cuiusdam in temporibus factæ ossium eminentiæ dedicarunt: Similitudine ut mox uidebimus ^b à Satyris cornua circa tempora portatibus desumpta. Hæc at ossium temporalium siue genarum eminentia in elephantiasi aduenire sæpissimè consuevit: Quauis & præter elephantiasim possit contingere. Quæ uero in alijs partibus fieri solent, ossium eminentias (ut ad septimum & uigesimum ordine propositum tumorem transeamus) ^c exostosis nuncupari Galenus ait: ^d quas si Latine dixerimus, exostationes. Sub quibus (ut uidebimus) & eam, quæ in temporibus fieri consuevit, extuberationem intelligimus. Est autem quantitate auctus morbus, Galeno met alibi ^e auctore. Cuius causa materialis dubio procul omni terrestris ac melancholicus succus proferendus est. Qui & ossis quoq; naturale nutrimentum est. Verum enim uero aduertendum hic duximus, non in alijs modo partibus ossium factas supereminencias exostoses, exostationes uel nuncupari posse. At in ipsis etiam temporibus, aut genis: siquidem contigerint, generali nomine exostoses uocari nil prohibere liquet. Idcirco sub exostosi nos intelligere has prædicimus: Tamen si speciali quadam nomenclatura Satyriasmos à quibusdam (ueluti prædictum est) nuncupatur. Quod quidem nomen, quia æquiuiocum est, & uarios etiam genere affectus præferre solet: Hanc ob causam satis opportunum, atq; operæpretium simul me factus Satyriasmos, rum orbitror, si & hanc æquiocationem explanando, octauum & uigesimum unum tumorem seu priapismus enuclearimus. SATYRIASIS ergo nomen, & Satyriasmos octo, penes diuersa medicorum placita, significare offendimus. Quorum plurimis, aut fortassis omnibus à similitudine impositum id nomen est. In primis enim libro de præternaturalibus tumoribus, quem nunc exponere præ cæteris intendimus, pro iam dicta elephantiasi ^f capitur similitudinis rationibus prænaratis. Quas quidem repetere superpondium ferebat. Sat ergo fuerit nonnulla hinc scilicet reuolueret. Secundò rursus pro eminentijs extuberationibusq; ossium, quæ circa tempora fiunt, Satyriasis nomen (Galeno etiam referente ^g) usurpatur. Apparèt enim in partibus temporum quædam, ob ossium eminentias, turbercula. Nec deest ijs quoq; similitudinis Satyrorum ratio. Circa tempora enim utrinq; cornua satyris nasci referunt. Quamobrem & qui timida tempora, uel prope illa etiam existentes genas utrinq; extuberantes habuerint, Satyris quodammodo similes fieri dicuntur. Sunt autem Satyri (Plinio docente ^h) animalia quadrupeda subsolanis Indorum montibus (Corradulorum dicitur regio) perniciosissimum animal: tanq; quadrupedes tam rectè currentes, humana effigie, ut propter uelocitatem nisi senes, aut ægri non capiantur. Nil uero (prout alibi dicit ⁱ) præter figuram habent moris humani. tamen si mitissimam aliquid eorum naturam esse protulit: quemadmodum efferacior cynocephalis existit. Veteres huiusmodi monstra pro Syluestribus dijs coluerunt. Vidit autem DIVVS ANTONIVS in eremis Aegypti: (referente DIVO HIERONYMO ^k) homunculum, ad uncis naribus, fronte cornibus asperata: Cuius extrema pars corporis in caprarum pedes desinebat. Ad hoc spectaculum Antonius scutum fidei, & lorica spei bonus præliator arripuit: Nihilominus memoratum animal palmarum fructus eidem ad uaticum quasi pacis obsequia offerebat. Quo cognito gradum pressit Antonius, & quis nam esset interrogas, hoc ab eo responsum accepit.

Mortalis

- „ Mortalis ego sum, & unus ex accolis eremi: quos uano delusa errore Gentilitas Faunos, &
 „ Satyros, et Incubos colit: Legatione fungor gregis mei. Precamur ut pro nobis cōmunem Do
 „ minū deprecetur, quem pro salute mundi olim uenisse cognouimus. Nam in uniuersam terram
 „ exiuit sc̄nus eius. Hæc pro secundo satyriasmī, siue satyriasis significato. Satis dicta iā sint.
 3^m. Tertium uerò est: quoniam præternaturalem, ac non desistentem pudendorū tentionē huiusce
 modi nomina præseferunt, quam alij Priapismō quoq; uocant. Pro qua quidem tertia nomi
 nis significatione, Cū non contemnendæ difficultates ob authorum diuersitatem insurge
 re consueuerint, aliquantisper hic immorandum. Præmissa nihilominus Celsi excusatione me
 scribentem, nec minù te legentem à uiligatoribus, ineptissimisq; susurronibus defendente: Excusatio.
 10 Quoniam de obscenis partibus non hoc tantum loco, sed sæpiusculè deinceps, ubi occurrerit,
 „ sermonem interseremus. Quarum quidem partium (uti Celsus¹ ait) apud Græcos uocabula et
 „ tolerabilius se habent, & accepta iam usu sunt: Cū omni ferè medicorum uolumine, atq; ser
 „ mone iactentur: Apud nos fœdiora uerba ne consuetudine quidem aliqua uerecundiùs loquen
 „ tium commendata sunt. Vt difficilis hæc explanatio sit, simul & pudorem, et artis præcepta
 „ seruauit. Neq; tamen ea res à scribendo detertere me debuit, Primum ut omnia quæ salu
 „ taria accepi, comprehenderem. Deim quia in uulgus eorum curatio etiam præcipuè cognosce
 „ da est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit. Hæc Celsus. Quibus omnibus & uera nominū
 „ significatio (uelimus, nolimus) antecellit. Magis uerò nobis ignoscendum ueniret: si Stoi
 „ corum sententiam à nonnullis, hodierno etiam tempore, comprobata seclabimur. Nullam sci
 20 licet in uerbis turpitudinem fore (uel Cicerone^m teste) determinantium, modò rem, ut à na
 tura facta est, uerbis significemus. Satyriasmos igitur, siue Satyriasis (idem nanq; significa
 tur, utrouis nomine utaris) apud quosdam pro eodem cum Priapismo sumitur: Apud nonnul
 lo autem pro diuersis affectibus duo nomina, Satyriasis inq; & priapismus, capiuntur. Atq;
 rursum utriq; ab inuicem differunt. Qui scilicet pro eodem capiunt, inter se met ipsos discor
 dantes: Aequè ac & alij differre Satyriasum à priapismo reputantes à se inuicem distant.
 Prout sigillatim omnes enucleabimus. In primis ergo Galenus non alium affectum Satyrias
 mi nomine intellexisse uidetur (quā scilicet ad pudenda refertur) q̄ priapismus: hoc est (ut
 libro de tumoribusⁿ inquit) & præternaturalem, ac non desistentem pudendi tentionem. Sic
 enim legendum in eo loco est & παρὰ φύσιν & id est præternaturalem, seu præter naturam &
 30 & non, ut malè in impressis codicibus habetur & κατὰ φύσιν & quod est & secundum naturā, Limani dormi
 siue naturalem. Id quod interpres Horatius Limanus non aduertit. Vbiq; igitur de Co
 lis affectibus loquitur Galenus, priapismus duntaxat nominans, Satyriasum intellexisse il
 lo etiam nomine uidetur.^o Atq; id ipsum nō inconultè me hercle factū à Galeno existimamus,
 Etenim ne Satyriasmi uoce alium affectum, scilicet ipsam elephantiasim, aut quoduis aliud for
 tas significatum æquiucè caperemus. Quod si de morbis curandis libro secundo & utriusq;
 in simul nominis meminit: Quoniam scilicet à similitudine imposita sunt: Nil uel obstare, uel
 fauere nobis potest. Nanq; an pro eodem intellexerit, an pro diuersis: ut Satyriasmon pro
 elephantiasi, aut quolibet alio, priapismus uerò pro pudendi erectione: minimè constat. Cū
 à similitudine, quouis modo intellexeris, nomen assumptum esse uerum inueniatur. Nullibi au
 40 tem, quod memoriæ suppetat, alium pudendorum affectum à priapismo diuersum nobis Saty
 riasmī dictione ostendit. Quamobrem ueluti præscriptum iam est, idem Galeno Satyriasmos
 aliquando

lib. 6. cap. 18. in prin.

Stoicorū sentētia de nominibus.

m lib. p^o. de officiis. cap. de temperantia, et lib. 9. epist. famil. epistola. 22. a prin. uerò epist. 172.

n cap. 15.

Galenī locus.

Limani dormitatio.

o. vi. 6. de locis effec. cap. 6. post. prin. et circa finē, et 3. de sympt. cau sis ca. 4. i fine. et 14. metho. cap. 7. post. mediū. et ca. 8. & lib. de morb. diff. cap. 9. circa medium. & 9. de cōpo. med. secūdu loc. cap. 7. uersus finem. p cap. 2. circa medium.

Priapismus aliquando (quum uidelicet penis affectum præsefert) & priapismus insinuat. Est autē (ut
 quid. ab eodē assignata definitio magis liqueat) priapismus Cum coles in longitudine, & latitudo
 6. de locis affe dine seu circulo totus augetur, nullo quidem (ut ait¹) stimulante ad libidinem aut desiderio,
 cap. 6. post prin. aut acquisito calore: ueluti quibusdam accidere cosuevit, qui supini decumbunt. Quin (perin-
 3. de sympt. cau. de ac alibi quoque inquit²) intumescit omnino, inflaturque, & arrigitur³ inuito. At breuiori
 cap. 4. aer. fin. quoque cōpendio (subiunxit.) dicere potes permanentem colis aut auctione, aut tumorem. Auge
 14. meth. ca. 7. post mediū. tur enim naturalis magnitudo (prout aliās inquit⁴) non secus ac in ulceribus nonnunquam caro res-
 6. de loc. eff. 6. dundat: Ac etiam lingua, testes aut ubera, siue quoduis aliud membrum, præternaturaliter
 libro de morb. diff. cap. 9. increfcere consueuerunt. Deducta uerò denominatio est à Priapo (Galenus idem ait⁵) Nā
 6. de loc. aff. 6. Priapismus un quasi ei suapte natura huiusmodi coles esset, ita eum finxerunt, atque pictura descripserunt
 de dicitur. homines. Quem quidem priapum Aetius⁶ Galeni⁷ sermonem referens, satyrum extitisse
 12. cap. 32. se adiunxit. Quod quidem, si sic esset, quemadmodum Aetius ait, utriusque insimul nominis
 2. ubi supra de lo. origo foret: satyriasis inquit, quia satyr ille fuerat, quem erecta uirga stantem pinxerunt: &
 cis aff. priapismi, quoniam & illi quoque priapi nomen erat. Sin uerò (quod potius reputo) diuersos
 Priapus quis. esse à priapo satyros conceperimus: Cum hi bruta animalia sint, priapus autem homo à poe-
 Satyri qui. tis effingatur. Quin & hic Hortorum Deus Bacchi & ueneris filius. Illi uerò Nemorum
 de quibus uide potius Dyonysius, ac Fauni ex Senta Fauna geniti ab iisdem poetis depingantur.⁸ Quamobrem nō
 Doccatū li. de Ge nealogia Deorum 8 satyri, sed hominis uultum præseferre Princeps⁹ innuit, dicens & hoc nomen permutatur
 cap. 10. 11. 13. 14. obiterque de priapo ad hanc aegritudinem ex forma hominis figurati habentis uirgam erectam, qua ludunt quidā.
 ibid. cap. 3. etc. Si inquit diuersos à priapo satyros intellexerimus: adhuc tamen in idem ferè conueniet. ut
 Satyr unde di priapismus à priapi similitudine, qui erecto perpetim cole depictus est: Satyriasmus uerò à
 Elus est. uide ei satyris, procacissimis quidem animalibus, ueneris uel, ac per hoc erectum sapissimè colem hab-
 supra fo. 143. b. 20. 3. trat po. bentibus nomen susceperint. A quo etiam uirili membro nonnulli satyros huiusmodi animan-
 cap. 37. in fine. tes dici asseruerunt. Veteres enim Græci & αὐτὸν ueretrum nuncupabant: uel (ut alij malūt)
 e lib. 3. cap. 136. & αὐτὸν. Ex quo & αὐτὸν πᾶσι τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν. quod est: Satyrus à ueretro quidē
 d lib. de uirtutib. pudendo dicitur. Quibus de causis & herba, quæ uenerem stimulat, Satyrion ab eisde nū-
 bus herbarū ca. 15. cupata est: à quibusdam uerò (uel Dioscoride auctore¹⁰) satyricos, & satyri testiculus: Ab
 e lib. 26. cap. 10. alijs autem non Græcis modò, sed (Apuleio Madaurense teste¹¹) Italis priapiscos appellaz-
 f. 6. de loc. aff. 6. tur. Romani Molorticulum ueneris dicebant. Quin (uti Plinius¹² etiam fatetur.) in totū quiz-
 g. de tu. præ. 15. dem Græci, quum concitationem ueneris uolunt significare, Satyrion appellant: Quemad-
 h lib. de morb. cau. 7. modum in contu pigriliam ob assiduos præsertim labores aduenientem, Proscadamum uocarūt.
 i Vi lib. de iun. De deducta igitur priapismi denominatio (ut ad Galeni f. sermonem reuertamur) à priapo, quē
 præ. nat. cap. 15. sic erecto pene depinxerūt. Satyriasmī aut nomen Galenus minimè declarat. Cum illud elez-
 & de linguarum phantia si potius dedicarit. Idcirco illius affectus ad satyros relationem aliquando¹³ denuntias
 htp. expōne i dic. uit. Quod si nonnunquam satyriasm, ex aliorum placitis, penis affectum uocarit: nullam tamen
 Satyriasmus. inter satyriasm & priapismum differentiam posuisse, quin pro eodem penitus affectu itelles-
 h sup. hic et f. 153. phantia si potius dedicarit. Idcirco illius affectus ad satyros relationem aliquando¹³ denuntias
 l. 21. 6. de lo. affe. uit. Quod si nonnunquam satyriasm, ex aliorum placitis, penis affectum uocarit: nullam tamen
 ca. 6. circa prin. inter satyriasm & priapismum differentiam posuisse, quin pro eodem penitus affectu itelles-
 finit et 3. de sym. phantia si potius dedicarit. Idcirco illius affectus ad satyros relationem aliquando¹³ denuntias
 ptom. causis ca. 4. uit. Quod si nonnunquam satyriasm, ex aliorum placitis, penis affectum uocarit: nullam tamen
 14. meth. ca. 7. exisse insinuat. Qua de re sub priapismi nomine (ueluti prædictum est¹⁴) penis tentionē (saz-
 8. li. de morb. diff. tyriasm prorsus reticens) alibi¹⁵ descripsit, ipsumque curat. Cuius causam esse uoluit flatuos-
 ca. 9. et. 6. de co- sum, inflantemque spiritum. Adeo ut quicumque in ijs, quæ in medendi methodo scripta sunt, exer-
 po. med. fecit loc. 7. citatus fuerit: protinus (ait¹⁶) ex emphysematum inflationum¹⁷ ue genere esse intelligat. De
 m. 14. meth. cap. quibus quidem emphysematibus antea iam loco proprio locuti sumus.¹⁸ Qui nanque memoria
 7. post mediū. n. supra fol. 115. tenuerit
 116. 117.

„ tenuerit tūc omnia quæ in dissectione eius membri apparent, tūc quæ de functione eius, et usu
 „ in naturalibus libris sunt prodita. Is nullo negotio intelliget, q̄ cauernosus neruus, qui pro-
 „ priam colis substantiā constituit, halituofo spiritu impletus affectum hunc excitat porro hali-
 „ tuosum spiritū in animalis corpore ex succis, qui lentē excalescant, sensim nasci didicimus. prout
 „ uberiū, quū de emphysemate loquebamur, Ex ipsius met Galeni sententia declarauimus. P
 „ Quamobrem & compendiosius alibi q̄ scripsit, dicens: Est autem flatus uētosus uidelicet, qui
 „ membrum ipsum tūc facit ex humoribus uiscosis, ac crassis generatus per moderatam calis-
 „ ditatem. Quicūq; autem libro de curandis morbis cauernosam ipsius membri substantiā rez-
 „ pleri in huiusmodi affectu determinarit: De colis tamen affectibus alibi magis ex proposito
 10 loquens, & exquisitiū affectas partes uestigans: tam colis substantiæ cauernosæ, q̄ arterias
 „ rum: quæ in ipso pudendo existunt affectum esse ait. Priapismus enim (ut inquit) planē co-
 „ lis est symptoma. At fieri potest ut nullo præcipuo, proprioq; ipsum affectu infestante, ad ar-
 „ terias referatur: ut pote quæ solæ interdū huiusmodi habeant præternaturalem dispositionē:
 „ quali uidelicet affici consueuerunt, Cū naturaliter totus coles intenditur. Atqui à spiritu
 „ ipsum in tumorem attolli manifestē patet ijs qui celeritatem eius, & cū intumescit, & cū
 „ iterūm residet, perpendunt. Quippē nullus humor tam subitam in alterutram partem mutatio-
 „ nem efficere posset. His sic se habentibus cū in corporum dissectione, magnæ uideantur ar-
 „ teriæ in pudendum exiguum scilicet particulam irrucere: sitq; coles essentia talis qualē in nul-
 „ la alia parte uidere est. utpote cuius corpus neruosum sit, ac omniuaq; fistulosum: excepta ea
 30 parte, quam glandem uocāt, quid aliud excogitauerit quis, q̄ q̄ a uaporofo spiritu ab arterijs
 „ affluente per extēfiones in tumorem attollatur? Ideoq; glandem æqualem semper habere ma-
 „ gnitudinem, quod fistulosus in ipsam neruus non ingreditur. Ergo quid causæ est, cum libidin-
 „ nis impetu quis stimuletur, aut ubi ob supinum decubitus calfacti sunt lumbi ut coles exten-
 „ datur? Nempe hac inuenta facile priapismi quoq; dispositionem inuenire nos posse speramus.
 „ Quod uerò princeps causa sit plenitudo uel arteriarum, uel nerui fistulosi, aut etiam utriusq;
 „ cum ex priore conditione mutantur, palam constat. At uerò utrius magis, aut si etiam amborū,
 „ deinceps consideremus. Hæc Galenus. Qui deinceps multis enarratis exemplis, è quibus om-
 „ nium qui à uoluntate & consilio pendent actionum instrumēta per se docta esse cognoscimus:
 „ Ad propositum reuersus est: sic dicens. Non igitur dubites pudendorum facultatem per se
 20 doctam esse: ut fistulosum hoc, neruosumq; corpus, ubi ad coitum insurgit animal, à natura
 „ li facultate, quæ ipsum potest attollere protinus distendatur. Cuius rei simile & in corde &
 „ arteria planē uidere est: Nisi q̄ horum motus perpetuus est, eò q̄ semper necessaria sit no-
 „ bis eorum actio: fistulosus uerò neruus non semper mouetur, sed quū usus requirit. Quū
 „ ergo sic fuerit extensus, sequitur ex arterijs spiritus: quemadmodum pulmo thoracem ob eā,
 „ quam habet ad motum ipsius sequelam. Verū posses fortasse replentis fistulosum neruum spi-
 „ ritus uim, quū ad coitum irrumpit animal, ad arterias quoq; referre: q̄q̄ multo satius est ut
 „ huiusmodi actionem ad neruum, non ad arterias referamus: Cū præsertim actiones ex pro-
 „ pria partium essentia non ex earum positu prouenire rationi consonū sit. Nam cor si in alia
 „ quapiam parte poneretur, nihilominus actionem suam obtineret. Nec aliter quoq; de iecinore,
 40 liene, ac reliquis omnibus sentiendū est. Quare uniuersi corporis arteriæ eandē habere actio-
 „ nem probabile est. quippē eodem tempore omnes totius animalis arteriæ inter se similiter pro-
 „ ducuntur.

o 15 de usu pars
 titū ca. p. 2. & 3.
 p sup fo. 117 lin.
 20. cū sequētib.
 q lib. 7. de copo.
 med. secū. loc. ca.
 7. prope finē.
 r lib. 14. ca. 7. in
 uerbis paulo ante
 recitatis.

s 6. de loc. aff. ca.
 6. post principia.

t Ibid. post me-
 diū capitis.

ducuntur. Itaq; haudquaquam par esse uidetur, ut arteriæ pudendis innatæ aliquā aliam habeant facultatem, præter eam quam antea in toto corpore habebāt. Sed ampliora sunt ipsis, q̃ cæteris arterijs ora: & quidem optimo iure, ad celeritatem sequelæ ad id quod euacuatur sic præparata. Semper enim natura quod unicuiq; actioni utile est, undiquaq; explere uidetur. Cæterum nullam aliam insuper præcipuam habent actionis facultatem, quum ad pudendum peruenerint. Licet calfactis lumbis, par sit, ut & arteriæ calidiores reddatur, & magis etiā pateant ipsarum ora. Quamobrem non exiguam tunc spiritus essentiam in fistulosum neruū effundunt: qui paulatim impletus colem extendit. Ita ut tota ipsius essentia in fistuloso neruo consistere uideatur. His itaq; cognitis ad priapismi dispositionē ueniamus. Quippè ex ijs quæ supra proposita sunt constat, uel ob arteriarum ora immodicè patentia, uel uaporosum spiritum in fistuloso neruo ortum hunc fieri affectum. Sed utrum potius pro causa sit habendū, inquirere oportet. Ego quidem ab utrisq; ipsum fieri posse existimo: Crebrius tamen arteriarum ora patentia sequi. quippè facilius est hæc distendi, q̃ flatusum spiritum in neruo fistuloso generari. (siue tamen ex arterijs in fistulosum neruum flatusus ille spiritus effundatur: siue in ipso met neruo genitus sit, Neruosi semper corporis, non arteriarum affectū esse priapismum, ex ijs quæ paulo ante dicta sunt, intelligito.) Ac memini (subdit Galenus) me huiusmodi quidem nerui dispositionem semel uidisse (ubi scilicet in ipso fistuloso corpore genitus flatusus spiritus sit.) Arteriarum uerò sæpenuerò (Quod scilicet ex arterijs effusus sit) cuius rei coniecturam feci, tum ex ijs, quæ præcesserunt, symptomatibus, tum ex modo curationis. In illo enim cui assidue colis palpitatio præcesserat, causa erat spiritus flatusus (in ipsa uidelicet colis fistulosa cauitate genitus. Nam colis, non arteriarum palpitatiōe Græce τὰ λυγρὰ præcessisse ait.) ad quem cum omnem curationem conuertissem, hominem sanauī. Quibus uerò supra modum arteriarum ora patebant, in ijs nullum huiusmodi symptoma præcedere solebat. E quibus quidem omnibus, præsertimq; ultimò relatis Galeni uerbis patet disscensum eius recitatorem fuisse Fuchsum. qui præassumpta ex Galeno priapismi definitione subdit: {quod si pudendi accedat palpitatio: tunc satyriasis dicitur} priapismi enim alter modus (tamen si rarius contingens) à Galeno positus est. Quauis ad Pauli satyriasm (ut poslea uidebimus) in quo palpitatio consistit, affectus accedat. Verum enimuero quoniam fistulosum neruum esse colis substantiam à Galeno præscriptum non hoc tantum loco, sed alibi quoq; non semel est. Vesalius autem Galeno detraxit tauri potius aut arietis penem (ut Vesalius con- inquit) q̃ humanum describenti, ac per hoc humanum sibi penitus incognitum, ac nunq̃ uisum demonstranti. Quoniam Galenus unicum neruosum corpus, atq; hunc concauum, sanguinisq; expertem quin & omni humore uacuum, Boum pene (ut aduersarij uerbis utar) delusus male describit. Duplex enim haud unicum simplex ue illud corpus esse Vesalius declarauit, nec uacuum, sanguineq; indigum, sed fungosa, & ueluti carnea materia, & plurimo nigricante sanguine instar farciminum utrinq; impletum. Hac de causa digrediendum quadantenus hoc loco, tamen si per transfennam, pro aliquantula Galeni (si possibile fuerit) excusatione atq; insimul maiori ueritatis elucidatione, uisum est. Præmissa interim exquisitissima colis historia: prout ipse met Vesalius Anatomicorum proculdubio princeps eam scribit. Ex dextro itaq; pubis osse, ubi id crassius & quasi teres ad inferiorem commissuræ pubis ossa committentis se dem uisitur: teres quoddam corpus ualidissime principium ducit, ligamenti nas-

Nota

Contra Fuchsum.

li. 3. de med. et morbis ca. 49 in princ.

et ut 15. de usu partiu ca. 9. et 20

Vesalius contra Galenum.

9 lib. 5. de humana corporis fabrica cap. 14.

Penis Anatomice.

turam

„ turam prorsus referēs: quod ab osse nōnihil sursūm recedens, interno latere aliud cōtingit cor-
 „ pus, similiter à sinistro pubis osse pronatū. Hæc corpora in eū modū inuicē cōmittuntur, ac si
 „ utrarūq; manū indices internis partibus mutuō iungeres, unitosq; fingeres. Vt. n. interna indi Pulchra cōpa
 „ cū sedes plana, nō at gibba & teres, exterioris sedis mō est: ita et hæc corpora, quā inuicē con- ratio.
 „ nascūtur, plana sunt, externis aut lateribus, & superiori sede teretia inuicē, iunctorū digitorū
 „ instar: Qui simul cōmissi latius, q; profundius corpus ad penis modū efficiunt. Deinde ut infe-
 „ rior indicū, ita cōmissorū sedes modicē dehiscit, planaq; uisitur: Sic & penis corporū inferior
 „ sedes dehiscit, ac urinarū uesicæ meatū sub se ita porrectū exigit, ac si calami quo scribitur,
 „ inferiori indicū sedi exporrigeres, & indices tibi penis corporum loco, calami autē urinarū
 „ meatus uice essent. Mox. n. a corporū exortu ipsis urinarū meatus, seu uesicæ ceruix subten-
 „ ditur, ac cū illis ad glādis usq; initū in eū modū porrigitur, ut corporū substātia nusq; ingre-
 „ diatur. Vt in glādis sede, ubi meatū i corporū substātiā duci paulō post audies. Corpora hæc Penis substā-
 „ in hūc modū enata simulq; cōmissa seorsum singula oblongū referūt corpus, ex neruea cōtextū tia.
 „ substātia: instar coriaceæ fistulæ, cuius interior substātia rubra prorsus, & nigricās, & fun-
 „ gosa, & atro sanguine oppleta cernitur: ad eū ferē modū, ac si ex innumeris arteriarū uena-
 „ rūq; surculis q; tenuissimis, simulq; proximē implicatis retia quædā cōformarentur, orbicula-
 „ tim à neruea illa substātia tāq; i corio cōprehēsa. Atq; hæc duo penis corpora ad glādē usq; pri-
 „ uatim singula neruē retinēt inuolucrū, & fungosā hāc substātiā summa diligētia à naturæ
 „ operū studio expēdēdā. etc. Quāq; at (ut postea subdit) uenæ & arteriæ ad penis cor- z ibidē post pau
 „ pora pertingāt: Vix tamē sectionē assequor quo itinere in corporū illorū cāuitatē inferantur, ca.
 „ sanguinē illū nigricātē, & crassū, quē fungosa corporū substātia plurimū possidet, deductu-
 „ ra. Rami tamē cuti hæc corpora induētī, et ante sectionē cōspicui offeruntur, illaq; intercurrūt.
 „ Hæc igitur humani penis structura est, cui nullā in uniuerso corpore partē (nisi fortē papillā)
 „ similē inueniri posse ait. ^a Quæq; tā bellē, diu me adiuuēt, à solertissimo iuuenē (ne sua defrau- a circa principia
 „ demus laude) depicta est, ut res quidē ipsa (præter ualde paucula) nō secus ac ab oīum opif- capitis.
 „ ce constructa est, cuius legēti, etiamsi nunq; oculis eā cōspexerit, promptissimē offeratur. Ego
 „ aut, prius q; Vesalius hæc scripserit, Galenū quadātenus diminutū, ex ijs quæ in dissectione pu-
 „ dendorū cōspexerā, aduertī. Quē nihilominus (cū pro uiribus tantū uirū, et medicinæ Hippo-
 „ craticæ sine inuidia lumen defendere, ubi possibile absq; uolētia fuerit, obnoxij simus) hac uia
 „ defendere nedū excusare enixus sum. Vt. s. unū nō indecēter dicere possimus: tametsi duo Galeni defen-
 „ originis capita existūt. Sic. n. plures corporis musculos, q; q; duo, tria uel capita nonnunq; sint, ad sio.
 „ unū tamē nō Galenus mō, sed uniuersa dissecatiū academia reducere cōsueuit præsertim qā in pro p.
 „ unū usq; aded cōalescūt: ut nō ampliū duo corpora, sed unū duntaxat intermedio nihilominus
 „ septo, ac ueluti mediastino, in dextrū & sinistrū diuisum appareat: fortassis pro ualidiori mem-
 „ bri robore. Nā satis ibecille futurū erat, si cōtēta (ut uidebimus) uenarū atq; arteriarū, & ner-
 „ uorū ligamētosq; præcæteris substantiæ textura uniuersa insimul una in cāuitate cōsisteret.
 „ Ultra cōmunē rōnē: ne. s. nocumētū uni parti factū alteri cōmunicetur. Ita & secūdū quoq; Ga pro 2.
 „ leni dictū defendimus. Quoniā uidelicet cōcauū fistulosū uel neruū, protulit. Ac tertiu, quod pro 3.
 „ sanguine siue oī humore indigum putauit. Etenim utrinq; concauus proculdubio ligamentosus
 „ ille neruus in primis est, qui ab ossibus enascitur, (quāq; in dextrum & sinistrum in medio
 „ diuisum est) sanguinisq; expers. Cū albus, durusq; non secus ac cætera ligamenta, existat.
 „ (Et si quia acutissimi sensus est, non ligamentum simpliciter, at ligamentosum neruum appel-
 „ lamus.) Qua de causa & sicissimis potestate medi camētis, ^a ligamentorum instar, ^b indigere a s. metho. cap.
 „ N quū b 6. meth. ca. 4. ultimo.

e. ut ibidem. f. 6
meth. cap. 4. et 5

Tauri et Arie
tis penis.

d. 14. de usu par
tiu. cap. 13.

f. supra. fo. 156.
uer. finē & 157
in fine.

nota d. p. p.

Cōtra Vesaliū

Cōtra Vesaliū

(quum ulceratus est) à Galeno ponitur: in hoc tamen differētibus, quoniā ad modū sentiens hic morsum acrimoniam uel medicamētōrū facillimē percipit. Cum tamē ligamēta oīs sensus expertia, penēs Galeni. dogmata, sint. De illis ergo quæ à pubis ossibus enascuntur substantijs uerum omninō in primis fuerit, quoniā & caua sunt, instar coriaceæ fistulæ (prout antea ipso met ex Vesalio dictum est) & exanguia. Præter quas quidem ligamētōsas, orbicularesq; substantias, in tauro etiam, & ariete intus quædam mollior, aut (si maius dicere) minus dura substantia continetur. quæ neruea adhuc est, cū à cōtinente circulari ligamento, mea sententia, nascatur latis circularibus uel fibris innumeris contexta. Mollior tamē siue minus dura, quemadmodum prædiximus, & rarior: qua de causa neq; adeo candida ut exterior est (prius q̃ ex diuturna mora exterior pars assiccata iam quēpiam nigrorem adeptā sit) nonnulla in se forami-
nula continens: è quibus compresso pudendo sanguis, ac interdum alba quædam serositas egreditur. Fistulosus igitur, foraminulentusq; et intus rarior substantia neruus taurorū, atq; arietū colis est. In homine autem intrinsecus maior præter ligamētōsas fibras & arteriarum, & uenarum nexus est, atq; etiam neruorum, non elegantiorē modō structuram, sed perfectiorē quoq; sensum præseferens. Hinc ergo accidit ut ex ligamenti q̃ pluribus fibris, uenisq; neruis, & arterijs reti formis quædam admirabilisq; substantia resultet. Quam non aliter Galenus expressit, q̃ arterias, uenas, & neruos per totam colis substantiam (copiosius q̃ pro membri magnitudine requireretur) distributos esse insinuans & fistulosumq; neruum ipsum colē esse proferens. Maximam uerō illius retis portionem fibræ quædam à ligamēto circulari atq; ab ossibus nato suam originem ducentes cōstituunt. Quibus quidem fibris & nerui, & arteriæ atq; etiam uenæ decussatim adeo contextæ sunt sanguinem continentes quem in compressionibus eructant. Ut fungosa, splenisq; instar mollis quæpiam ueluti caro disseccanti Vesalio apparuerit. Nobis autem exquisitissime hanc substantiam uestigantibus, & nō crudam modō, sed elixatam quoq; disseccantibus nullam ibi carnem nec aliquid carni simile uidere permissum est: At mirabilissimum proculdubio rete ex prædictis ligamento si nerui fibris, ab orbiculari ligamento (ut diximus) exortis, nonnullisq; arteriolis, ac uenulis, & neruis usq; adeo diuina quadam arte contextis, & innumeris decussationibus constructū, ut carnis cuiusdam spongiosæ faciē primo intuitu, dum. s. expressus adhuc sanguis non est, præseferat. Exquisitius uerò, atq; ad amussim uestigantibus compresso uidelicet toto ab arterijs, & uenis sanguine, atq; interim eius exitum perpendendo, & uncinis hamulisq; arteriolas, fibrasq; eleuando, nō aliud, q̃ innumeras ligamētōsæ substantiæ, quas dixi fibras & uenulas atq; arteriolas mirabilis (ut dixi) retis instar intricatas absq; ulla carne representari cōtinget. Factaq; totius sanguinis expressione, non amplius rubea, uel nigra, sed penitus alba & neruea substantia uidebitur, præsertim quoties decoctā inspexisse placuerit. Mirabilior autem reticularis hic plexus, q̃ qui in capite, aut circa testes est, dubio procul iudicabitur. Quem profecto plexū non in contenta dumtaxat à circulari concauoq; ligamento substantia, uerū & circa urinarium quoq; meatum, qui & idem spermatis est, si diligenter disseccando perlibraris, orbicularem inuenies. atq; idipsum quoq; Vesalius minimē aduertit. Sanguis uerō in illis arteriolis, uenulisq; nō extra (uti Vesalius credebat) uenas aliquantulum niger crassusq; est. (quanq; rubidior aliquando, ac præsertim quibus statim mortuis, & calidis adhuc, dissectus colis est, apparuit.) Tenuioribus enim portionibus in quauis erectione discussis, crassiores interea remanere necessum est. Quin & ab ipsa natura sic decretum est: ut uel ante quamuis erectionem subniger crassior uel sanguis ad eum locum delabatur: è quo promptissima in spiritum cōuersio fieret. E quibus

bus quidem præstentis nō penem modò increfcere, pleno quidem uniuerso reticularis plexus interstitio, atq; et tota neruea substantia huiusmodi spiritibus, instar illorū qui à repletionē cōueluntur, oppleta: Verū & ipsum quoq; urinae seminisq; meatū tūmefieri, durumq; in erectio- nibus euadere, necessum esse iam liquet. Cumq; ultra medium, quin propē finem glandis fistulosus utrinq; neruus unā cum contenta retiformi substantia ingrediatur. Idcirco & ipsam quoq; glandem (cuius substantia glāiosa est, laxa tamen ac linguæ, ut mihi uidetur, carni ad similes) increfcere, atq; unā cum colis substantia tūmefieri manifestē (uel inuito Galeno) cōspicimus. Præsertim quia rara (ut diximus) glandis substantia est, pluribusq; arteriolis & uenulis per totam eius substantiam dispersis composita: ut spirituiificationis tempore ipsa etiam extendi facillimē queat. tūm extensis tūm factisq; arteriolis, tūm etiam resudantibus spiritibus, ac media spaciola replentibus. Præter glandis ergo tumorem: In quo Galenū defecisse uel experimētū cōprobat: quo ad tria iam dicta f. pertinet, non falsum Galenū, et qui humani penis anatonem penitus ignorarit: At obscurum potius, uel si mauis dixisse diminutum existimabā. ut qui non adeo perlucidē huiusce membri substantiam, retiformem illum plexum omittens, descripserit. Sic inquā Galeni manes, uel non adhuc uisa Vesalii descriptione, perspecta nihilominus ipsius colis anatome defendebam. Sicq; rursus ea perspecta, quin re ipsa exquisitissimē perpenſa, excusari posse confirmo. Etenim si tauri uel arietis penem descripsisse opinatus cum Vesalio sis: pariter & eum, qui sub coriacea fistula, ligamentosa ue substantia à pubis ossibus utrinq; enata contentus fibrosus neruus est, ab eo declaratum non offendes. Cum diuersus hic à continente omni semoto scrupulo conspiciatur. Quemadmodum in canibus etiā, & mustelis usq; adeo differens apparet, ut offea prorsus existat. Vt diminutum ergo, uel si mauis dixisse obscurum potius, q̃ falsum (quem uis penem descripsisse admiserimus) Galenum increpuisse licuerit. A qua tamen rursus calūnia promptius fortassē liberabitur. Cum non ex proposito, ac tanq; Anatomicus ibi & loquatur: Verū ut partium usus actiones ue uefligans. Quo in loco potiores organi partes, non singulas, nisi multoties generatim considerat. Similiterq; de locis patientibus interdū loquenti sat sibi superq; fuerat generatim quæ ad h. 6. de locis aff. propositum suum conducebant tetigisse: cauernosam uidelicet, nerueamq; aut ligamentosam cap. 6. penis substantiam esse. in quibus uacuitatibus cauernisq; spirituiificatione facta membrum erigitur. Fortassis autem libro, quem post eos qui de partium usu (ipſomet authore) inscribuntur i p. de anat. ad composuit: Cui nomen titulus ue est { τριαντατετραων εν γρηγοριαν } quod est i de Anatomis Aggressionibus. & distinctē, ut oportebat, humanum colem dissecuit. Vbi (ut quod piū magis est elegerimus) cum ex proposito intentius quamlibet minutissimam particulam dissecare docuerit: exquisitiū hæc omnia nobis declarasse uero quidem simile est. Locus tamen, in quo & huius & quāplurium aliarum partium anatonem aggressus est, à nobis ad hodiernum usq; diem desideratur: Cum à noni libri dimidio, ad quintumdecimum usq; tam Græcè, q̃ Latine careamus. In quibus quidem deperditis libris & ipse met Vesalius ueriorē musculorū penis anatonem scriptam aliquandō k suspicatur. Quod si neq; in illis (si fortē nonnunq; à tinea iā blattisq; derosi alicubi reperiantur) exquisita, nec nō uera penis anatome à Galeno scripta sit. tūc proculdubio tāq; ab oī excusatione destitutū Galenū ut mātū, obscurū ue cōdē nabimus. Etenim si distinctius humani penis anatonē cognouisset: distinctius me hercle, ac exquisitiū, q̃ libro de locis affectis, ac de partium usu scripsit, eū declarasse autumo. ut aliās cōsueuit

e 6. de locis aff. cap. 6.

Cōtra Galenum.

f supra fo. 156. uersus finem & 157. in fine.

g f. 14. de usu partium ca. p. et 2.

h 6. de locis aff. cap. 6.

i p. de anat. ad mi. cap. p. et 5.

k lib. 2. de humani corporis fabrica c. 49. i fine

l supra fo. 153. et
sequentibus.

m lib. curonum
cap. 128.

n lib. 9. cap. 10.

o post medium
libri.

Definitionū
libri locus.

p 14. de usu par
tū cap. 10. in fine

q 6 de loc. affec.
in fine.

r 14. de usu par
tū ca. 10. i fine

Definitionū
libri locus.

Verum hæc obiter, & præter opinionem dicta intantum hoc loco sint. Ad nostrum ergo propositum reuersi dicamus priapismum esse præternaturalem, ac non desiscentem pudendorum tentionem. Sub cuius definitione satyriasmos, iuxta tertium præassumptum^l significatum, apud Galenum intelligitur. Cui medicorum phæbo tūm Oribasius,^m tūm etiam Trallianusⁿ astipulari uidentur. Etenim, quia nullam de satyriasi mentionem facientes, at de solo priapismo locuti sunt, Galenum insecuti esse omnino uidentur. Definitionum uerò medicarū Author oppositum potius obseruasse uidetur. Veluti enim Galenus sub priapismo satyriasmon comprehendebat. Sic ille innominatus, Galeno tamen ascriptus, Author sub satyriasi priapismum intellexit. Cum nulla de priapismo mentione facta, satyriasin ijs uerbis desinierit. ^{ο σατυρία} ^{εις εστι παθος μετα εντασεως αιδιδιου γινόμενον μετα τ τένεσθαι αυτς τα μόρια} ^{εστι δε ος και σπέρματος εξακοντισμός μετ ιδονς γίγνεται παραφύγοντα δε την} ^{γνώμην: και νεύων τας και σπέρματος γίγνεται} quod est. satyriasis est affectus cum genitalis membri tensione, simul extensis huius particulis. (ubi autē, siue autē, legendum potius q̄, autē, apparet) sunt autem, quibus & seminis eiaculatio cum uoluptate fiat: Mente autem exturbantur, & neruorum tensio, ac spermatis etiam fit. Intelligo autem non omnes, at quosdam mente, ob cerebri consensum, perturbari: & deinceps neruorum, quibus cerebri passio communicata sit, extensionem ijs accedere: ac demum spermatis quoq; ut in epileptis cis nonnunq; fieri (Galeno^p met, præter quotidianum experimentum, erudiente) consuevit, eiaculationem superuenire. quemadmodum nec omnibus, at quibusdam huiusce spermatis cum uoluptate eductionem fieri paulo prius prædictus author insinuauerat. Id quod Galeno minime contradicere opinor. Quauis enim absq; coeundi desiderio talem genitalis membri erectionem priapismo inesse dixerit: Haud quaquā tamen semen eijcere nomūq; posse abnegat, immò posse iam innuit: quum de amico loqueretur, cui, ob nimiam concubitus abstinentiam, rigidus, tumidusq; præternaturam factus penis erat. Curationem nāq; tangens ait. ¹ Tum equidem, illi consului, ut collectum iam genitale semen excerneret, postea uerò & a narrationibus, & spectaculis, meditationibusq; libidinem suscitare potentibus summopere cauere. etc. Quemadmodum neq; inficias iuisse Galenum offendimus, in illius seminis emissionem aliquam posse delectationem homini sic affecto inesse. At id duntaxat expressit. quoniam scilicet præter uoluntatem, & coeundi desiderium accidit huiusmodi præternaturalis pudendi extensio, quem priapismum nuncupauimus. Quum ergo subdit Definitionum medicarū Author: Mente autem exturbantur. etc. Ad eos, qui cum uoluptate semen eijciunt, minime referendum putat ad alios. Qui enim cum uoluptate eijciunt perturbati mente non sunt. Quæadmodū neq; exturbatis, aut neruorum tensione molestatis delectatio uoluptasq; adesse potest. Quamq; instar (ut diximus) epilepticorum eijcere semen aliquandò ualent. Ideoq; ad gonorrhæam Galenus^r reduxit: Vbi quidem inuoluntarius seminis exitus fit. Quas obres sic ultima illius Authoris uerba legerem ^{και σπέρματος εξακοντισμός γίγνεται.} Nam dictio illa ^{εξακοντισμός} id est ^ε eiaculatio ^ς uel supplenda, uel omnino subintelligenda mihi uidetur. Hoc igitur pacto prædictus Author intelligendus uenit. Ni condēnare hominē impie deservimus. Quod si eā ab innominato Authore, Galeno tamē ascripto satyriasin intelligi uolueris, quā Paulus (ut postea uidebimus) descripsit, tuū ē. Ego at ad Galeni priapismū potius accedo: Cū lōgē magis à Pauli satyriasi distare (siquē peregrina mēte cōsideraris) appareat.

Verum

Verum de his usq; adeo dictum sit. Nostrum ergo propositum exequamur. Galenus. n. (ut ad id unde digressi sumus reuertamur) satyriasis siue satyriasmis nomine præternaturalem, ac non desistentem pudendorum tentionem, quam alij priapismum quoq; uocant, tertia iam dicta 4^m. significatione declarauit. Paulus uero (ut quarta insimul nominis significatio subiungatur) satyriasmum à priapismo distinxit: ut longè diuersos affectus intellexerit. Quamobrem & distinctis seorsum capitibus de utrisq; determinauit. De satyriasi prius, hæc uerba scribens. " Satyriasis est pudendi palpitatio, quæ cuidam spermaticorum uasorum inflammatoriæ affectioni cum tensione superuenit. Hæc palpitatio nisi finiatur, in seminariorum uasorum resolutionem, aut conuulsionem delabi consueuit. Ac qui conuulsi fuerint, celesiter intereunt. Obuertes autem uentre insistantur: & frigidum sudorem emittunt. Et mulieribus quoq; sed raro, hoc mali accidit. Deinceps uero seorsum de priapismo sic loquitur, dicēs. " Priapismus est firmum, stabile ue genitalis incrementum, quod in longum, atq; circulum latum ue intumescit, citra ueneris appetentiam. Flatulentus nimirum est spiritus, qui particulam in tumorem attrahit: ex humoribus crassis, & uiscosis, modici caloris opera procreatus. Quam quidē satyriasis, ac priapismi à Paulo positam differentiam & ipse etiam Arabum Princeps obseruasse uisus est. (tametsi apud Barbaros nulla de nominibus: at de rebus potius habenda cura est. Diuersis ergo capitibus de ijs loquitur. De priapismo. s. Græcorum nomine seruato, tractatu primo. deinde autem secundo tractatu de Acrain, siue Arsaco. Quibus Arabicis nominibus Pauli satyriasmum intellexisse, cuius uel leuiter amborum uerba considerati patere potest. Quamq; circa priapismi nomen & à Paulo & Galeno bifariam Princeps differe apparet. Primo quoniam dum in principio affectus est, non adhuc priapismi nomine dignatur: at multitudinem erectionis nuncupat. Quam ueluti medium transitus inter naturalem, ac uoluntariam quodammodo erectionem, & fixum, firmatumq; priapismum posuit. Id quod profecto non ut Galeno, ac Paulo aduersum capio. Sed potius ut rem distinctius enucleans. Ne absq; ullo medio subitus euestigio transitus ponatur. Haud enim sic propriè priapismus nuncupandus uenit: siquidem penitus fixa, permanensq; adhuc talis erectio non sit. Verum quia naturalem modum excedit: Cum sæpius, ac ualidius, firmusq; contingat, q̃ pro naturæ modo esse debeat. Idcirco non temerè multitudinem erectionis, ueluti quandam neutralitatem, aut si dixisse mauis, leuiorem affectum, & medium, priapismi nuntium intelligemus: Quum uero confirmatur, & omnino præter uoluntatem figuratur talis erectio, priapismum tunc fore præsentem quidem animo deterruimus. Secundo Principem à Galeno, Pauloq; differre offendimus: quoniam priapismum ipsis quoq; mulieribus aduenire scripsit: quum de uteri affectibus loquitur. uehementius in satiableq; coeundi desiderium in illis, tali nomine, (ut maior æquiocatio propaleatur) ostendens. Quem quidem Principem plurimi Barbarolatinorum sectati sunt: ut de mulierum priapismo locuti sint. At id quidem à prædictis authoribus alienum longè magis est. Cum non feminis, sed uiris duntaxat priapismum aduenire scripserint. Nec coeundi appetentiam hoc nomine significari, at inuitam, & molestissimam erectionem uoluerint. Quamobrem æquiocè priapismum ab his captum esse, dicendum uenit. Quin (ut æquiocationis confusio uiteatur) non sim Priapismus æpliciter, absoluteq; Sed cum additione {mulierum} priapismum. s. mulierum, pronuntiandum fore quocè nonnulli determinabimus. De quod quidem, ueluti & de alijs æquiocatis (ut logici dicunt) priapismis capitur. postea sermocinabimur. Nunc. n. Pauli priapismum, atq; satyriasmum enarrare propositum est.

N ij Quem

s lib. de tu. præ.
nat. cap. 15.

Satyriasis si:
gnificatū 4^m.

lib. 3. cap. 56.

ca. 57.

u. ca. 56. in prin:
cipio.

x ca. 57. i prin.

20^a fen. 3^a. ca
nonis.

cap. 37. 38. 39.

a cap. 5. & 6.

Aui^a. à Gale
no, & Paulo
bifariam dif:
fert.

20^a.

b. 21^a. fen. 3^a. tr.

3. cap. 15. et 16.

c 9^o. theoricæ. ca.
38. et 8^o practi-
cæ. cap. 7.
d cap. 20.

e cap. 81.

f lib. 9. cap. 2. li-
tera. M.

g. lib. xi. cōtin. ca.
4. et 5.

h litera. f.

i litera. t.

k ca. 4. litera. q.

l post princ. cap.

m uersus finem

capitis.

n 6. de loc. affe-

cap. 6.

o 6. de loc. affe-

cap. 6.

p 3^o. aphorismo

rū apho. 26.

s 3^o. aphorismo

tū apho. 26.

u 3^o. aphorismo

vū apho. 26.

w 3^o. aphorismo

xū apho. 26.

y 3^o. aphorismo

zū apho. 26.

aa 3^o. aphorismo

bb 3^o. aphorismo

cc 3^o. aphorismo

dd 3^o. aphorismo

ee 3^o. aphorismo

ff 3^o. aphorismo

gg 3^o. aphorismo

hh 3^o. aphorismo

ii 3^o. aphorismo

jj 3^o. aphorismo

kk 3^o. aphorismo

ll 3^o. aphorismo

mm 3^o. aphorismo

nn 3^o. aphorismo

oo 3^o. aphorismo

pp 3^o. aphorismo

qq 3^o. aphorismo

rr 3^o. aphorismo

ss 3^o. aphorismo

tt 3^o. aphorismo

uu 3^o. aphorismo

vv 3^o. aphorismo

ww 3^o. aphorismo

xx 3^o. aphorismo

yy 3^o. aphorismo

zz 3^o. aphorismo

aaa 3^o. aphorismo

bbb 3^o. aphorismo

ccc 3^o. aphorismo

ddd 3^o. aphorismo

eee 3^o. aphorismo

Quem non Auicēna modò, sed ipse etiam Hali Abbas⁴ insecutus est. ut qui Pauli Satyriasm⁵ innuit, uirgæ titillationem appellans: atq; hanc à Priapismo, Pauli quoq; instar, secreuit. Razzes uero ante hos Arabes distincta, libro Diuisionum,⁶ capita scripsit. Quorū primum est de multitudine desiderij coitus. Sub qua tam mulierum uocatum Priapismum, q; uirorum inordinatum, superfluumq; , et morbosum, ac demum insatiabilem appetitum intellexisse patet. Quem in uiris quoq; à nonnullis Priapismum: ab alijs uerò satyriasmum nuncupari ostendimus. Alterum caput est de Priapismo propriè dicto.⁷ quem ipse, uel potius eius traductor assiduam erectionem appellat. Quin et libro, quem Continentem uocat, quum de matricis affectibus loquitur: De pruritu matricis, uehementiq; ad coitum cum uiris desiderio determinat. In cuius capitis titulo sic scribitur. De pruritu matricis, et Priapismo mulierum. Et rursum de membrorum generationis affectibus sermocinās. De superfluo appetitu coitus in uiris, seorsum à mulierum (ut in titulo scribitur) Priapismo⁸ determinauit. Præter quæ adhuc distinctum locum inuenies. De superflua extensione et inflatione ueretri: quā corrupto uocabulo prius passionem Marismi appellat: ac iterum⁹ ex Galeno de locis dolentibus¹⁰ hunc affectum describens, corruptissimis dictionibus, utitur, hoc modo. Passio quæ appellatur Carbonisus, uel Sittriasis, etc. Carbonisui n. nomine, priapismum: sittriasis uerò, satyriasmū intelligo. Vbi utrunq; nomen priapismum s. uel Carbonisum, et satyriasm siue sittriasim, ut patet, ex Galeni dogmate confundit. pro uno eodēq; affectu intelligens. E quibus omnibus quanta sit in Barbarorum monumentis confusio, promptissimè colliges. Verum enim uerò in Barbarorum nugis longè plus q; decebat, quadam consequentia tractū retardauimus. Ad Græcos igitur conuertamur. Vbi Galenum inuenimus priapismum à Satyriasmō nihil in pudendorum affectibus differre opinātem. Paulum uerò pro duobus diuersis morbis accepisse. Quē et Princeps, et Hali Abbas, nedum Razzes insecuti (quod ad morborum naturas) sunt. Licet quod ad nomina determinare nil possimus. Cum Arabicis, Barbarisq; et corruptissimis nominibus utantur. His ergo expeditis, quatuor satyriasis, satyriasmū uel significata, et quidem satis diuersa liquent. q; omnia à satyrorum similitudine desumpta sunt. Primum, quia morbū, quē alias elephantiasim, atq; leontiasim, et secundum Arabes lepram nuncupauimus, ostendit. Secundum est quoniam ossium Malarum, siue temporum eminentias præsefert. Tertium uerò est, quia idem Galeno quod priapismus aliquando indigitat. Quartum deniq; quoniam quid diuersum à priapismo, et mulieribus et communem affectum penes Paulū significat. QVIBVS

Succedit quintum quoq; significatum iuxta Hippocratis (uel Galeno¹¹ enarrante) consuetudine: à similitudine quoq; acceptum. Quoniam s. prælonga tubercula partium adenosarum circa aures præsefert. Quomodo Hippocratem in Aphorismis¹² accepisse opinamur: Siquidem ab Hippocrate positam in aphorismo particulam admisserimus. quum de tertia ætate loquens (eorum, s. qui mediam inter illos, qui iam dentes ædiderūt, et qui sunt pubertati proximi, ætatem habent) ait. Grādiōribus uerò factis paristhmia, et uertebræ quæ in occipitio ad interiora luxationes, asthmata, calculi, lumbrici teretes, ascarides, acrochordones, Satyriasmī, strumæ, et alia tubercula, sed præcipuè ante dicta. Si ab Hippocrate inq; in aphorismo scriptam fuisse dictionem Satyriasmī admisserimus. Etenim Galenus ea in Hippocratis codicibus particula caruisse apparet. Cum nil in aphorismi enarratione meminerit. Quāq; singulas alias dictiones minutissimè, uel rationibus, enuclearet. Sed ne aliud quidem ex octauo de Hippocratis

tis ac Platonis decretis ¹ elicitur. Vbi eundem aphorismum recitans Galenus ² Satyriases ³ in ⁴ q. cap. 7^o. uersus
 Hippocratis serie refert. Haud enim ibi de huiusmodi affectu quippiam Galenus enarrat,
 nisi q. aphorismi uerba simpliciter scribit. Possibile autem est aliquem Galeni uerba transcri-
 bentem, & hac dictionem in aphorismo apud recentiores Hippocratis codices legentem eum
 locum correxisse: ac talem quoq. affectum interseruisse. Galeni uero literam infecutum esse
 Philotheum patet, qui nil de tali nomine in aphorismi enarratione tetigit. Quorū profectō co-
 dices & Celsus⁵ etiam confirmare uidetur: qui aphorismum quoq. latinè referens, nil de sa-
 tyriasi meminit. Quāq. neq. Celsi autoritas necessariò nos cogit, ut sic Hippocratis con-
 textum habere opinemur. Cum plures alias etiam particulas omittere consueuerit. Nam uel
 10 in hac sententia uidemus q. asthmata, lumbricos rotundos, ascarides & calculos, in Hippocra-
 tis quidem contextu positos affectus sub silentio præteriiuit. Atq. ita in multis quoq. alijs ab eo
 relatis & in latinum conuersis aphorismis obseruare poteris. Sæpenuerò enim omnia quæ
 ab Hippocrate præscripta sunt, nonnunq. uerò ea duntaxat, quæ sibi placuerint, referre soliz-
 tus est. At enim uerò siue Galenus, Celsus⁶ ue, ac Philotheus hanc dictionem in aphorismo le-
 gerint, siue non: proculdubio nil refert. Nos autem quia in Græco Hippocratis codice repe-
 rimus. Idcirco quidnam Hippocrates satyriasmī nomeclatura intellexerit uel ligabimus. Exqui Satyrias-
 mū igitur cuncta perpendentes tubercula iuxta aures (quemadmodū præassumptum iam est) apud Hippoc.
 in adenosī carunculis oborta intelligimus. à Satyrorum quoq. similitudine impositum esse no-
 20 men cognoscentes. Etenim huius uisuntur modi (Cælio Rhodigino⁷ teste) sub ipsas satyrorū
 aures. Accidunt uerò prædictæ iam ætati hæc tubercula, perinde ac & alijs omnes in aphorif-
 mo præscripti morbi, non ob pituitæ modo abundantiam, sed ob inordinatos etiam motus, præ-
 fertimq. ab assumptis & quidem irregularibus quoq. cibis. Hæc ætas est ad duodecimum ac
 tertiumdecimum aliquandò annum perdurans: quam Princeps concussionis ætatem nuncupaz-
 uit, ⁸ ab eo q. continuo motu, & concussione corporis (ut aliqui uolunt) agitentur. Ea igitur
 tubercula ex Hippocrate intelligimus: quæ therēs & pherēs uocari Celiū⁹ ex Galeno retu-
 lit. Quorundam interea sententiam negligentes, qui inchoantem elephantiasim in aphorismi
 enarratione intelligunt. Cum ab atra potius bili talis affectus suæ generationis initium susci-
 pere (ueluti præscriptum¹⁰ est) soleat. Quicquid humor in ea, de qua aphorismus loquitur, uolum.
 ætate non abundat, quinimò maxima ex parte nullus reperitur. Quòd si alicui ætati magis,
 30 proprium elephantiasis initium, aut ipsa met elephantiasis est: Iuuentuti potius, ubi plurima
 succorum combustio fit, aut inclinanti ætati (quam semicanam, crudamq. senectutem ex Gale-
 no¹¹ appellare consueuimus) in qua magis atrabilarius humor aceruari solet, dedicandus mor-
 bus, aut morbi principium foret. Quarum profectò ætatū morbos iam deinceps proprijs apho-
 risimis enumerauit. Quidam autem pudendorū intensiones intellexerūt: uti Galenus¹² Hip-
 pocratis linguas enarrans adiunxit. Verū in aphorismo talem pudendi dispositionem (quem
 & priapismum aptius nominari prædictum est) intelligere, incongruum reputamus. Haud
 ea quidem ratione quam nonnulli assignarunt: Quia, si uirilī membri erectiones in hac ætate
 non fiant. Falsum nanq. id ipsum est: Quoniam priapismus absq. omni penitus coeundi de sīde
 rio, aut uoluptate (Galeno docente¹³) fit. Sepenuerò autem in ipsis etiam infantulis, ob fla-
 40 tuosi spiritus abundantiam, stabilem, constantemq. uirgæ erectionem conspeximus: adeoq. do-
 lorosam, ut crucientur, ac genitricēs affligant, mirum in modum uociferantes, uagientesq. do-
 nec ca. 7. uer. finem.

q. cap. 7^o. uersus finem.

lib. 2. cap. 2^o.

Exqui Satyrias-
mū igitur cuncta perpendentes tubercula iuxta aures (quemadmodū præassumptum iam est) apud Hippoc.
in adenosī carunculis oborta intelligimus. à Satyrorum quoq. similitudine impositum esse no-
quid.

lib. 14. lectionū
antiquarū cap. 8.
in fine.

1. p. 1. doc. 3. ca.
3. circa princ.
u. ibid. s. lib. 14
cap. 8. in fine.

Cōtra Bras-
pere (ueluti præscriptum¹⁰ est) soleat. Quicquid humor in ea, de qua aphorismus loquitur, uolum.
ætate non abundat, quinimò maxima ex parte nullus reperitur. Quòd si alicui ætati magis,
150. & 151.

5. de tuēda ua-
let. in fine & 2.
prognost. cō. 69.
2. 3^o. aphorif.
apho. 20. et 30.
a in dictione sa-
tyriasmī.

Cōtra musam
b. 14. metho. ca.
7. & 6. de locis
affectis cap. ult.
3^o. de sympt. cau.
cap. 4^o. uer. fin.
& 9. de compo.
med. secun. lo-
nec ca. 7. uer. finem.

nec adhibitis contra flatuosum spiritum præsidijs, tam deuoratis medicaminibus, aromaticisq; electarijs, q; calidis fotibus, unguinibus ue, aut suppositis glâdibus, eructatione tandem, uel crepitu uentus discutitur. Quò tempore statim & eorum penis emollitus iam recidit, & clamor, ac uagitus cessat. Sæpiculè autem & unà meiuunt, multoties uerò & excernunt. Quibus quidem peractis quamprimum incolumes redditi, pristinaq; iam sanitati restituti suauissimè conquiescunt. Itaq; si aduenire infantibus huiusmodi erectionem uidimus, cur grâdioribus accidere non potest? etiam si perfecti nondum sint, ut naturalem cum appetitu erectionem habere queant. Multoq; magis cum in ea quidem ætate ad tertiumdecimum usq; annum protensa, tametsi absq; prolifici seminis reiectione, magna nihilominus prurigine, ac pudendi tentigine molestentur pueri: ut hinc nonnulli concussuam à Principe dictam ætatem reputarint: Quoniã scilicet à flatuoso spiritu mole stati, quapiam dulcedine, ad illius, non seminis eiectionem incitati concutiantur. Non ea igitur, quâ opinati sunt, ratione Hippocratem de priapismo nequaquã intellexisse, compertum habemus. At quoniam huiusmodi affectus illi ætati proprius nõ esset: ut saltem illi magis, q; alijs, præsertim ex grandioribus, dedicaretur. Etenim si cuiuspiam ætati attribuendus hic morbus, ut ei familiarior esset: Vel iuuentuti, cū Galeno^e ascribendus foret. Cū iuuenibus, ob seminis præcipuè retentione, frequentius aduenire diuturnus priapismus cõsueuerit. Vel infantulis, quibus ob frigiditatem continētis, lactisq; præter modum, & ordinẽ ingurgitati corruptionem, sæpius q; ipsis etiam iuuenibus, tametsi minis durans penis erectio cõtingat. Quamobrẽ ad Hippocratis intentionem, simul & ueritatem propinquius accedentes, non id satyriasmĩ significatum: at alterum in aphorismĩ enarratione capiemus. ut. s. prælonga tubercula adenosarum propè aures carniū intellexerimus. Quoquidem expedito, ad alia satyriasmĩ significata pertransire tempestiuum est. Sextum ergo (ut non apud Græcos modò, atq; Arabes, uerum & ipsos quoq; Romanos æquiuocatio propaletur) significatũ est: quoniam ex certa corporis incommoditate, quæ etiam mulieribus aliquando contingit, desiderium insatiabile, & tensionem particulæ, cum assidua patratione auidißimam satyriasis facit: quemadmodum Theodorus Priscianus definiuit. ^d Qui nihilominus inter temporales, atq; et acutas licet sine febribus, quantum ex se est, adueniat) ægritudines connumerat. ut. s. quãdoq; longus diuturnusq; (quĩ leuior est, & grandioribus magna ex parte contingens) quãdoq; autem breuior fiat affectus: quĩ fortior est, ac dolorẽ uehementius excitans, uelut in ipsis infantulis sæpiusculè aduenire prædiximus. Priapismum uerò pro eodem Priscianus accepit. qua de re quẽadmodum satyriasis apud Paulum mulierculis etiam communis est: Ita (cum pro eodem capiatur) priapismus utriq; cõmunis dici queat. Hanc enim passionẽ, (Priscianus subdit,) quã scilicet satyriasim prænominauimus, priapismon aliqui appellauerũt. Nĩ uolueris tũc priapismo duntaxat cõfundi, quĩ uiris contigerit. Intellego autem Prisciani uerba & cum assidua patratione: hoc est, cum frequenti coitus executione, ac complemento, donec uidelicet semen eiciatur: haud quãquam tamen scicietur. Etenim coire iam qui priapismum patiuntur ex Galeno^e iam antea declarauimus. s. tametsi absq; appetitu coeundi Galenus affectum intellexit. Septimum uerò ab hoc sexto (ut mihi uidetur) diuersum significatum satyriasis: apud Celiũ Aurelianum & colligitur. Differre enim à priapismo Satyriasim uoluit: siquidem hæc celer sit, & non tardet in corpore. Priapismus autem multis etiam mensibus durasse inuentus est: De quo quidem antea sic dixerat. Sine ullo dolore, uel consensu tentigo ueretri fiet: & appellatur priapismos.

e 14. metb. ca. 7

d lib. 2. ad The
motu cap. xi. in
principio.e 6. de loc. affe.
uersus finem
f supra fil. 192
g lib. 5. chrono
cap. 9.

10

20

6m.

30

7m.

40

„ priapismos: Sed uocabulum sumpsit à similitudine Priaporum: quòd ita formetur, ut recto ue-
 „ retro fingatur. Huius autem passionis meminit Demetrius Apameus libro signorum. ait enim
 „ senem in se met manu operantem, nec quicq; potuisse peragere: tensionem autem fuisse uere-
 „ tri nimiam, cum paruo dolore, ut cornu putaretur: & ita perseuerasse multis mensibus: nullo
 „ quoq; adiutorio cessasse, ac tardè, atq; longo tempore quieuisse. Quò fiet ut à satyriasi discer-
 natur priapismus. etc. Hæc Cœlius: qui quidem licet sine ullo dolore priapismum ab initio sta-
 tum capitis fieri prædixerit: quemadmodum aliàs^b quoq; prænuntiauerat: Cum paruo tamen
 dolore: semlis ueretri tensionem fuisse adiunxit. Quamobrem absq; ullo penitus dolore, uel sal-
 tem cum paruo, & uix effatu digno dolore, pro suorum dictorū concordia, intelligendū. quanq;
 10 huiusce rei ueritatem, atq; aliorum quoq; sententiā paulò inferiùs discussuri sumus. Atq; hæc
 quidem septem satyriasis, siue satyriasmī significata à satyrorum similitudine desumi cui uis
 8^m. compertissimum est. Octauum uerò ex Oribasiolo¹ collegimus (sic enim diminutiue, ad dif-
 ferentiā Græci Oribasii, aphorismorum Latinum interpretē uocare consueuimus.) Qui quiz
 dem è uerrucarum genere satyriasmī reputauit: in eo nihilominus ab acrochordone (de quo
 prius Hippocrates meminerat) differentem: quoniam acrochordon singulatim fit: Satyriasis
 uerò una excellens uerruca est, cui multæ parue circumstant. Tamen utraq; satyriasis. s. &
 acrochordon, (ut idem Author subdit) ex pituita fit. Verumtamen id postremum satyriasis
 ex Oribasiolo desumptum significatum, uelut ab omni autoritate, ac similitudinis ratione se-
 motum negligimus. Perindè ac plurima etiam alia huiusce farinæ dicta in eius uiri commēta-
 20 rijs inueniuntur. De satyriasmī ergo significatis hætenus dictum sit. E quibus quidem omni-
 1^o. bus exquisitè perpensis, priapismum quadrisariam dici posse iam liquet. Primò ut idem, quod
 satyriasmus iuxta tertium significatum, Galeno præse fert. Quanq; Aetius^k Galeni priapis-
 mum, & Pauli satyriasmum, amborumq; curationem confundit. Atq; id ipsum (ut mihi uide-
 tur) inconsultè, ac tanq; dissonus Galeni recitator scripsit. Cum ex Galeno locuturum in capi-
 tis titulo promiserit. Quemadmodum cui uis tam Galeni, q; Pauli, ac deinceps ipsius Aetij uer-
 2^o. ba consideranti promptissimè perspicuū fieri potest. Secundo autem capitur priapismus apud
 Paulum arctius, q; ut satyriasmī comprehenderet. Quin ut ab ea, penès quartum significatum
 3^o. assumpta, differt. & si non aliud priapismus nunc, q; primo modo, præseferat. Tertiò pri-
 apismos capi consueuit, Vt idem, quod satyriasis iuxta sextum significatum accepta, apud Pri-
 4^o. scianum indigitat. Quarto demum sumitur apud Cœlium Aurelianum, ut à satyriasi septimo
 30 significatu intellecta differt. Quauis non aliud quartus hic priapismi modus ostendat, q; quod
 primus, secūdusq; præscriptus modus insinuauerat. præternaturalem. s. ac non desistentem co-
 lis tensionem, sine ullo tamen, aut saltem pauco penès eundem Cœlium dolore. Penès Cœlium
 inq; Galenus enim nullā de dolore mentionem fecit. Sed ne Oribasius quidē, aut Paulus: Nec
 ipse Arabum Princeps de dolore quippiam tetigit. Nisi q; si perdurat, & non curatur, ad te-
 tanum peruenire, atq; calidum apostema phlegmonē ue inducere ait. Quæ quidem absq; dolo-
 re proculdubio consistere nequeunt. Quamobrem nobis uidetur q; in principio dolor necessa-
 rius non sit: sed temporis progressu, ob nimiam penis, uasorumq; adiacentium extensionē. Præ-
 cipue si quispiā immodicè membrum calefaciens maximæ dilatationis causa sit, spirituiificatio-
 40 nisq; cuius ratione dolorem intendi necessum est. Qua de re nec Hali Abbas cum de priapis-
 mo loquitur doloris aliquo pacto meminit: Quanq; de titillatione sermonem agens, quæ Pauli
 satyriasi

b lib. 2^o. cap. 1^o.
post principia. 1.

Solutio cōtra
dictiōis cœli.

i 3^o. aphorismo:
rum. com. 30.

Contrb Ori-
basium.

Priapif. 4^o.
k lib. 12 cap. 32.

Cōtra Aetiū.

An i priapif-
mo sit dolor.

satyriasi correspondet, ibi calidum apostema posuit. quod sine dolore, in membro praesertim
 adeo sensitivo, fieri non potest. Aetius uero qui hanc Pauli satyriasmum cum Galeni priapismo
 Cetera Aetii. mo (ueluti iam iam praediximus) ineptissime confundit: uehementes priapismo cruciatus inef-
 se insinuat: sic dicens. Ceterum dolores eis contingunt, quales tetanici habent, & hi qui reli-
 quis membris distenduntur. Inflatum. n. & distentum pudendum, conuulsione modo, afficitur:
 & ex praecipiti hoc modo affecti pereunt: Nisi confestim eis auxilium feratur. Quum uero mo-
 riuntur, uentre inflantur, & frigidum exudant. id quod & eis euenit, qui alijs conuulsione mor-
 dis perimuntur. etc. Haec Aetius, quae à Paulo de satyriasi, ubi phlegmone inest, loquente tran-
 scripta esse cui uis etiam candidato iam liquet. Quae si priapismo quidem inessent, non hercle
 diuturnus affectus esset priapismus, at longè acutior, periculosiorq; q; à ueteribus descriptus
 Determinatio sit. In principio igitur uel nullus, uel minimus quidem dolor inest: Temporis autem processu
 dubij. magnus etiam aliquando superuenire potest: Quauis autem octo modis satyriasis, & qua-
 tuor (perinde ac declaratum iam est) priapismus, secundum uaria priscorum placita, capiatur.
 Nihilominus tamen Galenum hic exponentes, pro eodem (ipsius dogmate) assumpsimus. ut
 iuxta tertium significatum satyriasis, primo autem modo Priapismus, pro uno & eodem tu-
 more accipiantur. Quamobrem uigesimum octauum tumorem in catalogo connumerantes: sat-
 yriasmum seu priapismum praediximus. Quidem expedito, iam tempestiuum est ad Achor
 Tumor. 29. ras, nonum. scilicet uigesimum tumorem pertransire: capitis uidelicet cuti, (maximeq; infantium,
 Achor. & puerorum) proprium cum tumore ulcusculum. In cuius quidem enucleatione, insimul etiā
 de fauo, propter morborum affinitatem, determinabimus: Quemadmodum Galenus, atq; om-
 nes fere ipsius æmuli obseruauerunt. Dicitur autem Latine fauus, qui à Græcis κηρίον, à quib-
 usdā uero Græcos imitantibus Latinis Cerion appellatur. Quā tamē in dictione aduertendū
 est κηρίον per se, quod Linacer etiā Galeni interpretes ceria conuertit, aliud significare, longū
 scilicet latumq; lumbricum. Sic enim Græci (Galeno etiam erudiente) huiusmodi uermem ap-
 pellant: quem nostri uulgò cintam in Sicilia nuncupant. Id quod ob eos quidem notaſſe uoluim-
 mus, qui Græcarum literarū expertes sunt. ne in dictione ceria decipiantur. Verum de finit-
 tiones utriusq; affectus contemplerur. Inter affectiones igitur cutis capitis (Medicorū phæbus
 r 14. meth. cap. 17. circa princ. ait) connumeratur quoq; ea, quae Achor appellatur: ex genere tumorum præter naturam exi-
 stens: propriam autem, & singularem appellationem nata, ob symptomatum, quae ad eam
 consequuntur, proprietatem: Valde enim tenuibus foraminibus eroditur: quae tenuem in se
 humorem modicè uiscosum complectuntur. In quibus quidem Galeni uerbis, nomenclaturæ ra-
 tionem habemus. cur. scilicet Achor huiusmodi affectus nominatur. A consequentibus enim sym-
 ptomatibus deductum nomen ait. quae symptomata duo statim adiunxit: & q; tenuibus forami-
 nibus eroditur, & secundò q; tenuem in se humorem, modicèq; uiscosum continent. Quorum
 profectò, secundum Alexander^m declarat, dicens: Achor est uitiū, quod in capitis superficie
 oboritur, exigua habens foramina, ἐξ ὧν ἐξέρχεται ὕγρον ἰχθύνειον. διὰ τὸν το καὶ
 ἰχθύνειον τὸ πάθος καλεῖται: quod est. ex quibus (uidelicet foraminibus) humor ichori saniei ue-
 similis emanat. quam ob causam & huiusmodi affectus Achor nūcupatur. Ab ichore igitur mu-
 tata, i, in, a, achor hic morbus (Alexandro docete) nominatus fuit. Est autem Græcè ἰχθύνειον, La-
 tine uero sanies, atq; à quibusdā tabes, à Serapione uenenum subtile, ab Auicenna autem ui-
 rulētia dicta, sanguine tenuior humiditas, uariè crassa, & glutinosa, & colorata. De qua quiz-
 dem,

dem, ac etiam pure loco deinceps proprio, plura declaraturi sumus. ° Hæc igitur à Galeno ^{o infra cap. 24. com. p^o.} insinuata, ab Alexandro autem expressa nominis ratio, à secundo symptomate sumpta est. Altera uerò à primo quidem symptomate capi potest: quoniam scilicet tenuibus foraminibus eroditur. atq; inde omninò appellatio ἀχώρα ducta uidetur. quòd uidelicet non amplum locū occupent: Sed angustis terminis conclusi, tenuem etiam in se humorem comprehendant. à uerbo ἀχώρα quod est capax sum, seu capio; et priuatiua particula. α. nomine composito.

„ quoniam. s. minimè amplā, capacia ue foramina sint. Conijceres autem (Galenus etiam alibi P. Achoris mater scripsit) pituita id salsa, et nitrosa sobolem esse. Nempè ab ipso sanies quædam (ichor'ue) ria.

„ defluit, neq; aquosa simpliciter, neq; iam crassa sicuti mel: quemadmodum in his, quæ κηρία, ^{p li. de tu. præ. nat. cap. 16.}

10 hoc est fauos nominarunt. Etenim hæc cum tumore quodā, et pluribus foraminibus eueniunt,

„ melleo quopiam humore effluente. Adhuc et horum tumor paruus existit: sed non eatenus paruus, ueluti achores sunt. etc. Maior igitur in cerijs fauis ue tumor est, seu maior dicere minus paruus, q; in achoribus. plura nihilominus, atq; (ut aliàs inquit) maiora foramina sortitus. Quin (ut Alexander ait) adeò minima in achoribus foramina sunt, ut non uideantur: nisi prout ex ijs humor emanat. Quauis autem libro de præternaturalibus tumoribus achoras duntaxat nitrosa pituita ascribere Galenus appareat: Vtrūq; tamē affectum achorem. s. ac cerion ex mista humiditate genitum esse, de medicamentorum compositione loquens determinauit. Quum sic ait. Ad similitudinem uerò eius (hoc est achoris) proximè accedit alia cutis affectio, quæ fauus, cerion ue nominatur, maiora enim foramina habet: in quibus humor hystettio melli similis continetur. Generatio ipsis ex humore misto est, qui partim tenuem, seu rosūq; ac mordacem, partim uerò crassum succū in se habet. Tenuis itaq; humor utpotè mordax primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu uerò temporis, ad scalpturā, tum tumor augetur, tum foramina in ipso erumpunt. Quamobrem Paulus utriusq; affectus originem ex nitrosa salsaq; pituita fieri dixit. Antea uerò ab ipsis achoribus glutinosam defluere saniem ait. Id quod Galeno aduersum esse, apud eos qui corticem duntaxat considerant, præsertim fertur. Cū Galenus libro de tumoribus nitrosam, salisq; pituita: quæ neq; aquosa, neq; et glutinosa sit achoron causam posuit: Paulus uerò glutinosam (uti diximus) saniem defluere ab ijs inter Galenū inquit. Verū peregrina mēte speculantibus, nullam esse discoliam, promptissimè liquet. Etenim haud simpliciter glutinosam esse Galenus abnegauit: adeò ut nil penitus uiscositatis obtineret: sed, non sicuti mel glutinosam esse ait. quemadmodum et si quadantenus aquosa sanies ichor'ue sit, haudquaq; tamen simpliciter aquosam: q. d. non aquæ instar liquidam esse uoluit.

Qua sobres et libro de medicamentorum compositione modicè glutinosum, Græcè ἀτρεμία ^{x lib. p^o. de cōp. med. secūdū loc. cap. 10. in princ. y li. curonū cap. 19. z lib. 6. cap. 68.} x lib. p^o. de cōp. med. secūdū loc. cap. 10. in princ. y li. curonū cap. 19. z lib. 6. cap. 68.

γλίσχεον, humorem ex achoribus emanare ait. Quem locum et Oribasius, et Aetius etiam exscriperunt. Non igitur aquosa simpliciter, nec mellis instar glutinosa sanies est, et leuiter, modicèq; glutinosa. Aduerbium ergo illud ἀτρεμία hoc est leuiter, modicèq; siue ut Aetius inquit μετρίως hoc est mediocriter, moderate ue; Pauli codicibus addendum est. Sicq; ne per somnium quidem ulla contradictio apparebit. Cæterum quia Galenus Quò faui humorem in fauis cōtentum optimo melli assimilat, hystettio uidelicet, ab Atticæ regionis montem Hymetto appellato. Absurdum uerò Cornario uisum est optimo melli ulcerum sordes con-

40 ferre. Idcirco Galeni literam deprauatam esse Cornarius reputauit, ac pro ὑμῆτις ^{a ubi supra. b i annot. cap. 8. secūd. suas distin. à Galeno} a ubi supra. b i annot. cap. 8. secūd. suas distin. à Galeno legendum esse ἰμῆτις uidest in fauo, credidit. Id quod ex Pauli codice, cuius uerba iam

à Galenò transcripta sunt, atq; etiam ex antiqua Galeni translatione confirmauit. quanq; non Paulus modò, sed ipse met Galenus in libro de tumoribus idem insinuasse uidetur: Cum nil ibi de hymettio meminerit: Deincepsq; Oribasius, Alexander, atq; Aetius cōprobare uidentur.

Cōtra Corna qui Galeni uerba transcribētes hymettium reticuerunt. Nos uerò quia nullum prorsus absurdum, optimo cuius melli ulcerum sordes, tametsi pessimas, conferre, arbitramur. Ideò nō deprauatam, sed tanq; à Galeno proculdubio scriptā huiusmodi similitudinē admittimus. Haud enim dulcedini, uel perfectioni, siue odori ipsius mellis comparauit. Verum Glutinosæ potius substantiæ: fortassisq; etiā colori. Probatius enim (Dioscoride^e authore) mel illud est, quod dulci^{us}, odorati^{us}, acre, colore subflauum, non liquidum fluxileq; at ponderosum firmumq; est, ut non facile rumpatur, quin attractum digitos sequaci lentore sequitur. Huius igitur probatoris mellis tenaciori substantiæ, faui iam dicti quidem affectus humorem Galenus cōparauit: Cum tenacissimam eius substantiam insinuare uoluerit. ad illius profectò differentiam, quod aquosum, fluxileq; est. Itaq; cum nomē à uetustioribus impositum Galenus innuerit, ut *κρίον* appellarint, indeq; sic dictum, quoniam maiuscula foramina continet: è quibus humor tenax, crassusq; emanat melli similis. Determinare quidem uoluit similitudinis rationem uestigās cui nā melli similis ille humor esset. Etenim non cuius, sed optimo, quia non aquoso, liquido ue, assimilatur. Cuiusmodi mel nostri lilybætani, Megarense^sq; iuxta hyblæum montem habitantes, ubi perfectissimum (uel Dioscoride^e confirmante) mel reperitur, terminthinatum mel nuncupare consueuerunt. quoniam uidelicet adeò tenax, glutinosum ue sit instar eius quæ à Venetijs, pro uera exquisitiori^q; terminthina, in Siciliā apportatur. Nec substantiæ tantummodò mellis humor hic comparandus est: at (ueluti prædiximus) colori. Cum non albus omninò qui ab ijs ulceribus emanat, uerum ob acquisitam pituitæ corruptionē, atq; aliquantulam affectæ partis erosionem, ultra bilis admisionē (ex mista enim humiditate factos tam achores, q; fauos ex Galeno prædictum iam est) subflauus, aut flauus etiam quasi (ut uulgo dicimus) rancidus humor exire apparet. Quanq; in colore nō magis optimæ, q; alijs mellis speciebus (quæ admodum de substantia præscriptum est) assimilare necessum est. Quin sæpiculè ob intensam corruptionem uariamq; succorum admisionem pessimo, quò ad colorem attinet, melli similis egredi sanies uisa est. Galenus uerò quia substantiæ crassitiem, ac tenacitatem insimul considerabat: optimo melli, hymettio uidelicet, similē esse ab ulceris foraminibus destillantem humiditatem protulit. Quam nihilominus falsam esse pituitam aliquādo (ueluti in achoribus etiā ab ipso met Galeno, ^d ac Paulo^e colligimus. Alexander ^f uerò ab utrisq; diuersus est, qui non unum, aut ex duobus commistum humorem utriusq; affectus causam esse uoluit. Verum triplicem, de achoribus loquens, humoralem causam posuit, quam ^g in cerijs quoq; intellexit, cum achoribus simile cerion protulerit, & *μεγέθει μόνον διαπέγον*, hoc est magnitudine tantū differens. quamobrem ^h eadem utrisq; remedia conuenire subiunxit. Est ergo (ut inquit) ⁱ id quod ab achoribus defluit, interim biliosum, uel pituitosum: interim uerò etiam melancholicū. Internoscere igitur principalem causam oportet: Non enim eadem in omnibus curatio existit. Nam quum recrementum, quod superat, biliosum est, tenue substantia existit quod emanat, et colore suppallidum. Sin autem non tenue substantia & colore suppallidum, sed crassum, et uiscosum extiterit id quod redundat, achoremq; efficit, pituita est. Quòd si nihil horum fuerit, loca uerò unde humor effluit, dura magis, cutim excedentia, & strictiora appareant, ut nequicq;

^d lib. de tu. pret. nat. ca. 16.

^e lib. 3. cap. 3.

^f lib. p^o. cap. 8.

Alexander à Gal. et Paulo diuersus.

^g ibidem cap. 9.

^h cap. 8.

- „ quicq; ab eis effluat aut uix exiguum intelligito melancholicum subesse recrementum, quod
 „ achorem pariat. Cæterum etiam obseruari debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum
 „ ægri, ætas, & gustus. Etenim amarorem sentiunt, quibus causa est biliosa; saltem autem quali
 „ tatem, quibus est pituita. acidam uerò, quibus humor melancholicus. Iam ex tactu internosce-
 „ re poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est biliosum; frigidior autem, in quibus pitui-
 „ tosum. Minus autem frigidus, in quibus melancholicum. Ita sane internosces humores achorem
 „ parientes. Hec Trallianus, cuius uerba in medium adducere decreuimus: ut uarium à Galeno
 „ (cui Paulus adhæsit) pernouerimus. Pro cuius quidem diuersitatis concilio non aliter dicendū
 „ fore occurrit: q; pituita nitrosa sobolem principaliter utrunq; affectū esse, uti Galenus, eiusq; Alexadri &
 „ 10 sēctatores dixerunt. Cui nihilominus pituitæ lentitiem illam, siue paucā (ut in achoribus) si-
 „ ue maiorem (ut in cerijs) habenti, nonnunq; bilim, nonnunq; uerò melancholicum succum, siue
 „ rectius loquendo, atram bilim admisceri absurdum non est: qua de causa uel biliosum, uel me-
 „ lancholicum id quod defluit pronuntiemus. Interdum uerò, absq; ulla effatu digna cuiusuis al-
 „ terius succi commistione, sola nitrosa pituita esse potest, tuncq; absolute pituitosum quod de-
 „ fluit esse proferemus. quin & eadem ratione sanguineum aliquando, propter sanguinis admix-
 „ tionem, & Serapionis, & Rasis, & atq; etiam Auicennæ^l sententia pronuntiare possumus.
 „ Quid uerò Arabes, præsertimq; Princeps de hisce affectibus, ac materiali causa senserint:
 „ deinceps uberiùs enucleare conabimur.^m Postquam Romanorum sententias perscrutarimus.
 „ 20 Celsusⁿ enim sub meliceria uidetur utrunq; affectum comprehendisse: meliceriam interea,
 „ Græcè μελικηρίδιον, à meliceride, Græcè μελικηρίδιος (quemadmodum alias^o præno-
 „ tasse recolo) differentiam subintelligens: Cum melicerida frigidum tumorem, quod eius-
 „ dem generis cum atheromate, ac steatomate sit, meliceriam uerò ulcus foraminulentum, mel-
 „ leoq; fauo simile, quod nunc disquirimus nominarit. Quancq; & meliceriam alibi^p saniei quan-
 „ dam speciem ab ichore distinctam nuncuparit: quæ, sex malis ulceribus, ubi nerui circa arti-
 „ culos læsi sunt, & inter hæc loca maximè genibus. Nonnulli autem ex recentioribus fi-
 „ runt. qui μελικηρίδιον, & μελικηρίδιον, Celsi literam corrigere cupientes, legere malue-
 „ runt. ut in ultima Celsi impressione patet. ubi plures Romani medici coniuncti sunt. Pro qua
 „ fortassis uitanda æquiuocatione interdum non Græco nomine, sed Latino usus est, fauum
 „ scilicet appellans. Ut quum in titulo prius ait: 1. Malagma Protarchi ad parotidas, & fauum,
 „ 30 & mala ulcera. 3. Deincepsq; propositū subdit: Protarchus autem ad parotidas, eaq; tubercu-
 „ la, quæ meliceriæ. i. faui, uel phymata, nominantur: itē mala ulcera. etc. 3. Vbi deprauatā quadam
 „ tenus Celsi literam esse, ac pro meliceria legendum, ut nos fecimus meliceria opinor. Quo
 „ quidem in loco, nō fauos modò, ut phymata quoq; nominasse placuit. Quæ adhuc phymata sæ-
 „ pē maiora furunculis (eodē enarrate^r) sunt. Verū de phymatis nominis æquocatione rursus,
 „ 40 loco proprio, disputabimus. De fauo igitur meliceria uē sic ait. ^r Est etiā ulceris genus, quod
 „ à faui similitudine, μελικηρίδιον à Græcis nominatur: Idq; duas species habet. Alterum subalbi
 „ dū furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiore. Quod ubi mature scit, habet foramina,
 „ per quæ fertur humor glutinosus, et purulentus: Nec tamē ad sanitatem peruenit. Si diuissum
 „ est, multò plus intus corrupti, q; in furunculo apparet, altiusq; descendit. Rarò fit nisi in
 „ 40 scapulis. Hæc Celsus. In cuius quidem uerbis notandum prius est, quod fortē ubi legitur
 „ nisi in scapulis legendum potius foret nisi in capillis: cum ueteres capiti magis huiusmodi
 „ Celsi locus

Meliceria affectus aduenire scripserint. Modus quoque loquendi eius non est: quod ibi tantum siue in scapulis, siue in capillis capite uel contingat: Verum quod raro in alijs partibus, praeterquam in ijs locis, in quibus quidem frequentius accidere consuevit. Cuius igitur corporis parti contingere hunc morbum posse non Celsus tantum, atque etiam (ut uidebimus) Theodorus Priscianus. Sed Paulus, et itidemque Actius confirmarunt. Quoniam inter ulcera passim occurrentia, nedum in capitibus affectuum catalogo, nonnunquam reposuerunt. Nos autem et in capite frequentius, maxime quod puerorum: et in scapulis etiam aliquando: quin et una cum capite, ac scapulis, colloque, alterum latus, ad cauum usque subcartilagi et Ilium commune (qui locus ab Aristotele $\chi\omicron\lambda\omicron\varsigma$, à Theodoro autem Latine cholago nominatus est) serpere hunc morbum, suis cum foraminibus glutinosum ichorem eructantibus, conspeximus. Quem quidem affectum Gregarii chirurgici nostri formiculam nuncupare consueuerunt. et in extremis etiam partibus, ut cruribus, brachijsque aliquando contingentem, nobis praesentibus, curarunt. Quid uero secundum Arabes de affectu peculiariter sede proferendum sit, post haec disquiremus. Nunc autem secundam meliceriae speciem à Celso definitam intelligamus. quum subdit. Alterum est minus super corpus eminens, durum, latum, subuiride, subpallidum, magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quae fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut uisci referens, interdum olei. Si inciditur, uiridis intra caro apparet. Dolor autem, et inflammatio ingens est: Adeo ut acutam quoque febrem mouere consueverint. etc. Quauis autem à Galeno, eiusque sectatoribus in quibusdam Celsus definiendo difformis sit. Mirum nihilominus non est. Cum Galeno uetustior Celsus fuerit. qua de re Galeno conformem fieri non oportuit. Nec Celsum propterea condemnabimus. quoniam innumerae solent morborum complicationes, ac per hoc uarietates aduenire. Quamobrem et aliquando non aliter, quam Galenus descripserit: nonnunquam uero, perinde ac Celsus definiuit, huiusmodi ulcera apparent. Vtrius ergo modo contigerint, ad Galeni cerion, siue athoras: aut (si mauis Celsi nomenclaturam usurpare) ad meliceriam foraminulentus tumor, glutinosam fauiem eructans, reducendus omnino est. Plinius autem nullibi achoris morbi meminisse inuentus à nobis est, tamen si Achorem Aliquando muscarum Deum à Cyrenaicis inuocatum scripsit rui Deu s. Muscarum namque multitudine (ut ait) Pestilentiam afferente, protinus illae intereunt, Postquam litatum est illi Deo. Cerion uero interdum tetigit, ac etiam fauum. Ut quum de peponibus loquens, ait $\{$ Radix sanat ulcera concreta in modum faui, quem cerion uocant. $\}$ Alibi quoque rursum de fici ramulis inquit $\{$ Idem cum melle ulceribus, quae ceria uocantur, illinuntur $\}$ Ob id igitur ulcera haec ceria uocantur: quoniam concreta sunt, in modum faui, quem cerion Graece $\chi\epsilon\rho\iota\omicron\nu$ uocant. Ut nulla in Plinii codice de prauatio sit: quemadmodum Cornarius opinabatur. Melicerias autem oxilapathi radice (quae ex aliorum experimento) curare docet Plinius, haec uidetur potius ulcera intelligere. Cum et lepris eodem praesidio succurrat. Verum quia plurima à Dioscoride Plinius exscripsit: iuxta ipsius placitum id remedium dixisse, alia ex parte, uerosimile est. Quamobrem ex Dioscoride meliceridas, hoc est pituitosos abscessus, mellis instar substantiam continentes, intellexisse promptius est. Perinde ac alias meliloton peculiariter, et contra meliceridas efficacem esse scribens. Ab eodem Dioscoride assumpsisse potuit. Quamquam Dioscorides ad achoras etiam ualere meliloton ait. Cum ergo ambiguus Plinius sit: quia nullibi definiuit, remediaque praetacta, praesertim oxilapathi radix, communia

p lib. p^o. cap. 5.

q lib. 4. cap. 35.

r lib. 15. cap. 11.

s li. p^o. de histo.

aial cap. 13.

Celsus à Ga-

leno difformis

Celsi et Ga-

leni conciliu.

Achor musca-

ru Deu s.

t. lib. x. cap. 28.

u li. 20. natura-

lis histo. cap. 2.

post medium.

x lib. 23. cap. 7.

post principia.

Cōtra Corna-

rium.

y in anot. super

p^o. de cōp. med. se-

cundū loc. capite

de achoribus.

z lib. 20. cap. 21.

uersus finem

a lib. 2^o ca 105.

b lib. 21. cap. 20.

in fine.

c lib. 3. cap. 44.

communia sint. Idcirco ex ijs à quibus transcripsit, meliceridas, & melicerias apud ipsum pro
 abscessu potius caperem: cerion uero fauum'ue de ijs, quæ nunc præ manibus habemus, decla-
 ran. laq; assumpsimus, ulceribus, intelligerem. Tu uero est una cum Hermolao^k melicerias, <sup>k in Plinij glos=
fema'ibus.</sup>
 fauos intelligere, deincepsq; meliceridas pro abscessibus capere. Generali autem nominis circū-
 scriptione dum in capite sunt, manantia capitis ulcera, nonnunq; d' appellat. Generalioriq; adhuc d ut lib. 20. cap.
 descriptione, absq; illa dictione {manantia} per quam quidē glutinosus ille humor emanans in- 21. post princ.
 telligitur {capitis ulcera} interdum^c protulit. Sub qua me hercle descriptione nō achores mo- e ut lib. 21. ca. 19
 dō, ac fauos, at ficosas etiā eruptiones, psyraciacq; exāthemata, & quæuis alia in capite obor uersus finem.
 ta ulcera intellexisse incongruum non est. At alios quoq; Romanos cōtemplemur. Theodorus
 10 ergo Priscianus f Græcorum (ut uidetur) monumenta transcribens, ait. Achoras papillas di- f lib. p^o. ad Ti=
 11 cimus, quæ per cauernas breuissimas humorem pinguisimum mittunt. Hæ frequenter in ca- motheu cap. 5. in
 12 pite, uel facie, & cæteris membris emergūt. Quibus & cæteræ papillæ sunt similes, quas ce principio.
 13 riones appellamus. Sed & distant, q ceriones plures cauernas egestionis habent, & humo- Ceriones.
 14 rem multo pinguiorem emittunt. Achora autem unam cauernam habet & humorem egerit
 15 aquatiorem. Est nanq; utriq; causa una uitiorum nascendi necessitas. Hæc Priscianus. qui ni- Cōtra Priscia
 16 hilominus bifaria de fecit. Primò quoniam papillas morbum quidem apud Paulum & Aetiumq; num.
 17 hab achoribus, & cerijs diuersum, confundit. Secundò quoniam unam esse cauernam in achor- g libro. 3. cap. 3.
 18 ribus ait. Cum tamen & ibi plura foramina sint, quāuis plura, & quidē maiora in cerijs exi- h lib. 6. cap. 70.
 19 stere prædictum iam sit. Ni per cauernam non foramina: sed totam ulceris cavitatem, multis
 20 interim foraminibus perforata cuti coopertam intellexisse malueris. Qua in re laborare nō cu-
 ramus. Haud enim horum triuialium proculdubio medicorum sententias, at nomina duntaxat
 21 uestigare, quibus hi usi sunt, impræsentiarum intendimus. Aemilius ergo Macer^l Græcorum i cap. 7. de Ruta
 22 quoq; nomine achoras nominat, dicens: Et Græcè dictas achoras hoc unguine purgas. Vlcerā
 23 sunt capitis humore fluentia pingui. Marcellus uero communi prius uoce {capitis ulcera} mox
 24 & {ulcera in modū faui cōcreſcentia} nominat, ^k ceria (ut patet) hac descriptione intelli- k li. suo de med.
 25 gens. Postea uero^l tineam uidetur utrunq; affectum nuncupasse. Quem profecto in modum et l ibidem cap. 5.
 26 Plinio quoq; ascriptus liber^m appellat. Quāuis enim antea ulcera in capite manantia genera- m lib. p^o. cap. 5.
 27 tim uocarit. Mox tamē tineas specialius nominauit: priuatim de cerijs alibiⁿ mentionem faciēs. n lib. 14. cap. 14
 28 Quam deniq; nomenclaturam non Arabes modò plurimi, ut Hali Abbas, ^o Abenxoar p & o 3. theoricæ ca.
 29 Constantinus Africanus, 1 uerum & multi horum sequaces Barbarolatini, quin & omnes 18. & 4^l. præti
 30 ferè nostræ ætatis gregarij medici, uulgaresq; atq; etiam mulierculæ usurpant. A similitu- cæ cap. 13.
 31 dine fortassis (uti Rhodiginus Cælius ait^r) uestes abrodentium tinearum. Sic uidelicet capi p lib. p^o they sir
 32 tis cute perforata, uti uestimēta mali genere pertusa euileſcūt. Vel si clariùs dixisse malueris: tr p^o. cap. 2.
 33 quēadmodum in puluerulentis, uetustioribus^{ue} panis repertæ tineæ multo, eoq; tenui morſu, q li. p^o. de morb.
 34 & continua erosione uestes perforant: Sic capitis cutem achores, atq; etiam faui quāmplu- curatione & co-
 35 rimis foraminibus erodūt. Fortassis aut & alia ratione tineas nuncuparunt. Quoniam scilicet gnitione cap 8.
 36 interdum animalcula, uermiculiq; illorum instar, qui ex putrida carne gigni solent, quiq; ue- r lib. 25. lectionū
 37 stes, aut libros erodunt, in huiusmodi ulceribus enasci uidentur. Præsertim quotiēs nudo ca- antiquarū ca. 26.
 38 pite pueruli maneant: adeò ut muscæ gregatim eò concurrentes excernant. Quamprimū prope finem.
 39 enim ubi excreuerint tineas uermiculos^{ue} oriri cuius etiam imperito compertum est. eoq;
 40 citius, quò sordidius ulcus extiterit. Cillam uulgares Neapoli nuncupant. Verum quia Cilla quid.

non omnes, qui tineæ uocabulo usi sunt, æqualiter illius significationem intelligunt. Nonnulli. n. generalius, nonnulli uerò specialius: Quidā adhuc pro eodē cū sabaſati. Quidam uerò ut diuerſum tineæ ſignificatū accipiūt. Hac de cauſa digrediendū rursus pro Arabū nomenclaturis uidetur. Vt cūctos medicinae ſcriptores abſq; ſudore intellexiſſe per facile ſit. Tineæq; inſimul nomen exquiſitiū cōprehenderimus. In primis igitur Serapio de achoribus, ac cerijs eodē capite determinauit: ^s achoras quidē ſub nomine ſabaſati humidæ, ceria autem fauos' ue ſub nomine fauoſitatis intelligens. Qui tamen de ſabaſati ſicca nullū ſpeciale caput adiunxit: ſub impetigine fortaiſſis intelligens. ^t quoniā (ut ex Principe uidebimus) maioris duntaxat minoris uerōne ab ea differt. Rationē quoq; Arabici nominis adiunxit: Cur. ſ. ſabaſati nūcupatus huiusmodi affectus ſit. Etenim aſeſ, & aſaſ, unde dicitur aſaſati, ſiue (ut alij dicūt) ſabaſati, apud eius nationis medicos eū affectū præſerūt, quam Principis interpres deſudationē uertit: ^u cui quidē Hippocratis, & Galeni ^z ὁ δὲ ὤα, Latine ſudamina reſpondent. Vt ijs etiā liquere poteſt, qui Razis caput de alaſaph ad Almafōrē ſcribentis, & de aſaphati libro diuiſionū ^x conſiderarint. De quō tamē affectu, ob multos quidem ſudores, atq; hos mordaciores adueniēre, infra determinabimus. Hac igitur de cauſa Serapio ^y ſtatim ab initio capitis ait. & deſcriuatur hoc nomen proprium Sabaſati ex accidente proprietatis ſequentis eam. quod eſt, quia accidunt cum ea quædam foramina parua tenuia ualde: ex quibus foraminibus reſudat aqua & etiā uenenum ſubtile, in quo eſt uicoſitas parua. etc. Razes autem aliquādō Serapionem ſecutus, ſabaſati ſpecialiter pro achoribus aſſumpſit, à fauis interim diſſerre (pro Galeni etiā, ut patet, dogmate) uolens. Quoniā faui foramē (ut ait) eſt latius, & maius foramine ſabaſati, hoc eſt achorū. Vt Diuiſionum libro ^c id perpendere poſſumus. Interdum uerò & ſi de fauoſitate puerorū, atq; illorū ſabaſati, hoc eſt, achoribus ſeorsum diſtinctis proprijs capitibus determinauit: prout libro de puerorum ægitudinibus ^d liquet. Conformiter quidē & Serapioni, ^e ſibi met ipſi, ^f uelut antea tetigimus. Nihilominus tamē de fauoſitate loquēs, & ait & paſſio, quæ dicitur fauoſitas mellis, eſt ſpecies ſabaſati. & innuens per hæc uerba biſariā capi poſſe ſe nomē ſabaſati. ſpecialim uidelicet, ac generatim. ſpecialim quidē de achoribus intelligitur, atq; à fauis ſeu fauoſitate differt. Generatim uerò, ut commune genus erit nomen ſabaſati ad achoras, & fauos. Quo quidē generali modo ad Almafōrē quoq; ſcribens ^g Arabicam dictio- nem uſurpat. Quin adeo generaliter ibi accepit, ut ſiccas quoq; ſabaſati ab achoribus, atq; fauis etiā diuerſas cōprehenderit: quibus proſectō ſicciſſimæ cruſtæ, rugoſæq; et albæ inſint. Quas quidē ſabaſati ſiccas non ampliùs ſabaſati, neq; fauos, aut fauoſitates: Verū capitis impetiginem potiùs nominare libro Cōtinente ⁱ ei placuit. Nonnulli uerò tineam ſiccā uocant. Priores interim affectus, achoras inq; ac fauos, tineā humidam appellantes. Arabum uerò medicorum Princeps (quo Barbarorū omniū obſcuritates, conſuſionesq; elucidantur.) Generaliùs adhuc, q̄ ullibi Razes ſaſati, uel ſabaſati nomenclatura uſus eſt. ^k Etenim ſeptē ſub ſabaſati morbos intelligere uidetur: ^l Exanthemata inq; ² pſydracia, ſiue pſydraces, ³ & papillas. ⁴ Itēq; achoras, ⁵ fauos, ⁶ balkiati, ſeu balchie, ⁷ & malignā agreſlem' ue impetiginē. Inquit. n. & ſabaſati eſt de ſumma bothor ulcerorū: et cucurrit conſuetudo in pluribus libris, ut dicatur in capite decorationis. Et ſabaſati q̄dem incipiēs eſt bothor parua fixæ pruritū faciētes, læues, diuiſæ in numeratione locorū: Deinde exulcerātur ulceribus cruſtoſis: & ſunt ad rubedinem decliues. His ergo morbis Barbororū Princeps exanthemata cōprehendit: quæ quidem (ui Ale-

- „ xander, illiusq; simia Paulus^m aiunt) superficialiæ cutis exulcerationes sunt, subrubicundæ, et
 asperæ. Quod si n. bothor læues Princeps antea dixerit: Prius scilicet q; ulceratur, intelligendū
 est. Namq; statim q; exulceratur, exasperari necessum est. Præsertim cum plures bothor pu-
 stulæ ue fiant: quod innuit, cum subdit & diuisæ in numeratione locorum. & q. d. multiplicatæ
 in diuersis locis & deinde ulcerantur ulceribus crustosis. etc. & Cum his uerò & psyracia, exi-
 gua quidem capitis (ijsdem definentibusⁿ) tubercula, phlyctenis similia, summāq; cutim exce-
 dentia, comprehendisse potest, è quibus quidem non rite curatis, facillimè in achoras, fauosq;
 transitum fieri possibile est. Quos porro affectus deinde Princeps innuit: dicens. & Quandoq;
 „ etiam emittit urus, & nominatur alfirengi, siue (ut alia habet litera) refrengi: & est sabaz-
 10 fati humida. & Sub hac igitur dictione {sirengi} siue {alfirengi} aut {refrengi} (quouis nāq; mo-
 do protuleris, nil refert. Barbara enim corruptissimaq; fortassis dictio est) & achorem, & fa-
 uum atq; etiā ἐλκὺς, Latinè ulcuscūla à Galeno^o simpliciter dicta: papillisq; (ut Alexan^o p^o. de cōp. med.
 der, & Paulusq; & Aetius^r aiunt) similia, aded ut, nomine à similitudine desumpto, & papil-
 læ & Græcè autem {θυλαί} nominari queant, intellexisse opinamur. Sunt enim ea (ueluti præ-
 dicti authores testantur) parua, densaq;, & subrubra ulcuscūla, in capite adnascētia, mamil-
 larum papillis similia, ex quibus sanies eliquatur. Hæc igitur tria, Achore inq;, fauū, & papil-
 las sub dictione sirengi, quoniā uirus sanguinem ue horum singula emittunt, comprehensa cre-
 dimus: Haud quāq; uerò (quemadmodum Leoniceus^r opinatur) ceria duntaxat. ut uerbum
 scilicet κήριον in sirengi apud Auicennam deprauatum esse machinemur. tum quia nulla di-
 20 ctionis & κήριον & ad {sirengi} conformitas est: præsertim si non sirengi: sed alfirengi seu re-
 frengi (ut aliæ habent literæ) legatur: tum secundo quia de achoribus, & papillis nil prorsus
 meminisset. Demum Princeps ait^t & Balchiati uerò, siue (ut in noua litera legitur) Balchie
 est de genere sabafati malæ & id quod rursus repetit, u^t dicens: & Et quādoq; causa eius est mor-
 sus albaud maligni. etc. & Est autem Balchiati siue, cum articulo, albalchiati (Raze definiēte^x)
 ulcus cū Bothor, & crustis, & cursu uirus: et est simile sabafati malæ. etc. Princeps uerò nō
 simile, sed ex genere sabafati malæ adiūxit. Sub hoc noīe à Galeno uocata ἐκ τῆς σφατῆς (La-
 tine quidam feruentes papulas conuertunt) intelligere possumus. Haud. n. πονδράκια in bal-
 kiati deprauatum nomen Leoniceⁿi sententia^y reputo. Cum Balchiati malignitatem quādā,
 fortassisq; feruorem, aut incendiū, q; in psyracis maius præseferat. Quod si nihilominus psy-
 30 dracia sub ijs comprehendisse contenderis: ut minimi profectò momenti litē negligemus. Aliud
 interim Leoniceⁿi glossēma nequāq; admittētes. ut scinifes. hoc est, conopum morsui, siue tumo-
 ri ex illorum demorsu oborto, balchiati comparatum ab Auicenna sit. Arabicus enim textus
 (ut in Bellunēsis annotationibus liquet) {albaud} habet, absq; aspiratione. quāuis alia litera {al-
 bahud} cū aspiratione habuerit. Est autem albahud cum aspiratione (ipso met Bellunensi in-
 terprete^z) idem quod aldidar, quæ est arbor cimicum. quamobrem {cimicis} conuerterat: ut si
 milem affectum intelligamus morsui cimicis maligni. Quoniam uerò subdit Princeps & Et cura
 eius est cura illius: quasi ad illius maligni cimicis morsus curationem nos remitteret. Eius au-
 tem demorsus curam nullibi posuit: quemadmodum neq; conopis puncturam alicubi curare pri-
 uatim edocuit. quanquā horum conopum (quas uulgò zanzalas nuncupamus) punctiones
 40 maiorem tumorem, quā cimices, ac præscripto tumori. s. Balchiati similiorem fortasse pro-
 ducunt. Hac de causa potius {albahud} sine aspiratione legerem. Est ergo albahud (eodem

a *ibidem.* exponēte ^a) pediculus Pharaonis. quasi dicat pediculus malignus Regi à Deo Optimo Maxi-
 mo in supplicium, ac poenam demissus. Quamobrem sic Auicennæ literam intelligo. { Et quan-
 doq; causa eius } scilicet balkiati, siue sabaphati malignæ { est morsus pediculorū malignorū }
 Pediculi Pha-
 raonis. sæpissimè nanq; malignam sabafati siue (ut uulgò dicimus) tineam in capite puerorū, ac præ-
 cipuè orphanorū, ob pediculorū multitudinem erodentium quidem, atq; exulcerantium genitā
 esse conspeximus. Horum uerò pediculorū internecionem, atq; suorum morsuum, ulcerūq; , et
 b 7^a. 4^a. tr. 3. ca. bothor siue pustularum inde ortorum curationem alibi ^b iā uberrimè pertractauit. ad quē quiz-
 26. et 27. dem locum recurrere promptissimum est. Sunt. autem Pediculi quidam dicti ferales: qui in ph-
 Pediculi fera-
 les. thiriasi enasci consueuerunt, in toto etiam corpore: non consuetæ, ac simplicis duntaxat formæ:
 at nonnunq; ignoti. hoc est latiores, & duri magis, & uehementer morsibus scuietēs. Hos er- 10
 go malignos pediculos intiligemus. cuiusmodi quidem fuerunt, qui Syllam dictatorem, ac phe-
 recidem poetā tragædum admiranda erosione (Quinto Sereno^c teste) enecarunt. De quo ta-
 c cap 5. de men affectu, post hæc, loco proprio, fusius eloquemur. His ergo sabaphati speciebus enarratis,
 Phthiriasi. Princeps demum de alia tumoris specie insimul cum sabafati, eodem capite, meminit. Cui no-
 Albothin. men est, Albothin: corrupto autem apud ipsos etiam pœnos nomine, Aluathin. De quibus quiz-
 Aluathin. dem (tamen si sabafati non est) in eius tamen capite locutus fuit: quoniam de melancholicis ibi
 pluribus alijs Bothor, nedum sabafati mentionem facturum erat. Idcirco & antea de huiusmo-
 di albothin loquēs. ^d Curā eorum esse ait curā uaricū, & ulcerū melancholicorum. Quorū ca-
 2. 22^a. fen. 3^a. tr. nonem libro quarto dicturum promiserat. Id quod deinde obseruauit libro quarto, fen. s. quarta
 2. cap. 27. in fine
 e tr. 3. cap. p^o. 2^o c generatim: fen uerò mox septima f de ijs quæ in exteraneis partibus, summaq; corporis cute 20
 3^o. aduenientes, indecoris, ac turpitudinis occasiones fierent. Itaq; tum quia ex eodem humore cū
 f tr. 3. per totum sabafati, præsertimq; sicca, fiunt: tum quia in summa cuti, uelut illa, gignūtur: Quāuis illa quiz-
 dem potius in capite, rarissimeq; in alijs (ipso met Arabum Principe teste &) partibus: hæc
 g 7^a. 4^a. tr. 3^o. uerò in cruribus potissimum oboriantur. Et de albothin sibi met ipsi placuit in sermone de sa-
 ca. 2^o. post. princ. hafati meminisse. Est autem Albothin, id quod à Græcis τέγωνθος, & τέρεβυνθος nun-
 h li. 6. de morb. cupatur, adnascencia quædam (Galeno auctore ^h) nigra in cruribus præcipuè facta. Cuius
 uulg. cōmētario nomen à figuræ, coloris, magnitudinisq; similitudine, quā cum terebinthorum fructu habet, des-
 3^o. cōmētō. 27. riuatū est. de quo tamen, loco proprio uberiùs loquemur. Malignam deniq; agrestem ue im-
 i infra fo. petiginem sub sabafati nomenclatura Princeps^a intellexit: sabafati siccam appellans. De qua
 a ubi supra. ca. quidem sic ait: { Et quandoq; incipit impetiginosa sicca: & causa eius est humor melancholi- 30
 primo. cus plurimus, cui permiscetur humiditas acuta, quare expellitur ad cutem, & corrumpit, &
 corrodit. Quod autem non omnem impetiginem sub sabafati comprehendit: nisi (ut diximus)
 agrestem, & eam fortassis, quam antea mentagram à Romanis uocatam declarauimus: quā de
 b *ibid* ca. 3^o. in impetigine mox loquitur, ostendit, ^b sic dicens. Impetigo non est longinqua à sabafati, & non
 princ. diuersificatur ab ea, nisi cum re occulta, & proprie alsabafati sicca. & pertransit ut sit alsa
 hafati sicca impetigo malignior, & deterior, & magis corrosiua, & longinquioris profun-
 ditatis. Et causa impetiginis est propinqua causæ alsabafati. Nam est aquosa, acuta (pituitam
 Sabafati secū per hæc uerba salsam innuens) permista iterum materiæ grossæ melancholicæ. etc. Hæc autē
 dū Mesuem. usq; adeò de Principis Arabum sabafati hoc loci dictum iam sit. Mesuas uerò, ^k absq; distin-
 k de ægrediti- ctione humidæ, uel siccæ, sabafati curat. Dū tamen Galenū allegat scribentem multos se sa- 40
 ma 2^a. cap. 3. nasse, qui sabafatim patiebantur, linimento chartarum combustarum, tritarum, & cum aceto
 tēperatū

reperatū (Hoc autem medicamento Galenus¹ ad achoras usum se fuisse testatur) humidam ui-
 detur Mesuas duntaxat saphatim intellexisse, achores. s. ac fauos: sub quibus & eiusdem gene-
 ris morbos (à quibus uidelicet sanies defluit) comprehendere possumus. Hali Abbas autem nō
 saba fati nomenclatura huius generis affectus declarauit: Sed tineam potius nuncupat. ^{m nisi}
 interpretis nomen {tinea} sit: Arabicè autē fortassis saba fati protulerit. Quod quidē ex eo prae-
 cipue coniectandum uenit: quia inter curandum: saba fam, & saba fa nonnunq; in tineae sermo-
 ne uocauit. ⁿ Quicquid tamen sit, quia non Arabica nomina disquirere propositum nobis est:
 Sed ea, quouis modo scripta nostro æuo reperiuntur, intelligere. Idcirco quid tineae nomencla-
 tura uoluerit, cognoscamus. Quinq; igitur tineae species Hali Abbas posuit: quatuor. s. humi-
 10 das: & quintam deniq; siccam. sub quibus quidem humidis non solum fauos, achores, ac papil-
 las, sed ficus etiā comprehendit. Cuius uerba in medium afferre inutile non est. {Tinea ergo
 (inquit Hali Abbas) ulcera sunt parua, quae capiti accidunt: quibus est uestica. Quae species ha-
 15 bet multas. Prima est quae fauosa dicitur: & ex phlegmate fit salso. Cuius signum est: quoniā
 ulcus est, quo capitis cutis perforatur, foraminibus subtilibus: in quo humiditas est fauo (siue
 20 rectius dixerimus, melli) similis. Secunda ficiosa, & rotunda, & dura. Cuius in superioribus
 rubor est, & in concauitate quiddā granis ficuum simile. {Quem quidem tumorem Galenus^o
 inter faciei affectus numerat. Cui porro & Aetius^p aslipulatus est. Paulus¹ uerò inter capi-
 tis, hoc est, cutis eius morbos recensuit. Vt in quo. s. frequentius contingat: tametsi & in reli-
 quo corpore nonnunq; aduenire posse adiunxit. Oribasius autem in amborum catalogo capitis
 25 inq;: & barbæ de hoc ficioso tumore meminit. Quorum profectò Concilium ex Romanorum
 medicorum re & nomine Celso^t didicimus. Qui duas quidem ficiosi tumoris species declarās,
 alteram barbæ: alteram uerò capillis potissimum aduenire determinauit. De quo nihilominus
 tumore aliās uberior à nobis sermo scribendus est. Nūc igitur Hali Abbatis tineā expediāmus
 30 quum subdit. Est & tertia tineae species, quae uocatur ameda. (intellige achorem.) Et sunt ul-
 cera, cū quibus in capite multa sunt subtilia foramina, minora foraminibus, quae in fauosa sunt:
 & ab his humiditas aquae carnis similis egreditur. (quae humiditas non aliud, q̄ Græcorum
 35 ἰχὼρ est, aut quaedam ichoris species) Est & quarta quoq; species pustulae. s. paruae rubae:
 figura quarum uberibus similis est mamillarum: à quibus humiditas fluit aquositate sanguinis
 38 similis. (Hæc est quam nos quoq; papillam, ob similitudinem, uocari posse prædiximus.)
 40 Quinta etiā eius est species, sicca, & colore alba lupino (amaro. s. crudoq;) similis: à qua quæ-
 si cortices, & squamæ fluunt albæ: Atq; hanc ultimam speciem Princeps nonnunq; albaras ni-
 gram: interdum uerò impetiginem excorticatiam uel etiam saba fati siccam: Græci autē (ue-
 lut antea iam diximus^x) lepram nuncupant. Quauis. n. ab initio iuxta humoris affectum pro-
 ducentis, atræ uidelicet bilis, colorē niger affectus locus fiat. progressu tamen temporis, ob ni-
 miam ariditatem, albas euadere squamas in superioribus etiā præscriptū est. ^y Abenxoar^z
 demum, Constantinusq; Africanus^a aliter tineam definierunt. Etenim Abenxoar primò de
 capitis scabiæ locutus est, sagrum suo idiomate uocans. ^b & sunt crustæ, quas in puerorum ca-
 pitibus sæpenumerò uidimus: & uulgares, mulierculæq; iam dicunt, aliud esse tineam, aliud
 45 uerò capitis ægritudinē: intelligentes quidē per capitis ægritudinem, hanc scabiem, seu crustas
 in capite factas: Deinceps autem tineam curare aggressus est: nil pro tineae definitione ad-
 iungens, q̄ passionem esse scabiæ sagro ue grauiorem: curamq; huius prolixiorē esse præ-
 nuntians. ^c

¹ p^o. de cōp. med.
 secūdu loc. ca. 10.

Tinea secūda.
 Hali Abbatē.
 m 8. theoricæ ca.
 18. in medio. et. 4.
 n 4. practicæ ca.
 pite 13. uersus fia-
 nem.

Tinea quid.
 Tineae spēs
 quinq;

Sycofis cui
 parti proprius
 morbus.

^o 5. de cōp. med.
 secūdu loca ca. 3.

Galeni et Pau-
 li cōcilium.

p lib. 3. cap. 14.
 q lib. 3. cap. 3.

Ameda.
 r lib. curōnū ca.

20.

s cap. 69. eius-
 dem.

t lib. 6. cap. 3.
 u supra fo. 171

x supra in decli-
 natione tumoris.

25.

y supra. fol. 131.
 lin. 18. & 19.

z p^o. theysir. tr.
 p^o. cap. 2. & 7.

a libro de morb.
 cognitione & cu-

ratione ca. 6. 7. 8
 b ubi supra ca.

primo.
 Tinea apud
 Abenxoarē.

c cap. 2.

d cap. 7.

Sabafati apud

Abenxoarem

e. de morb. cura

f. lib. 3. cap. 3.

g. ibi supra. c. 7.

Tinea apud

Cōstātinū.

h. cap. 8.

i. ut de tu. prat.

nat. cap. 16.

k. p. de cōposi.

med. secundū loc.

cap. 10.

l. lib. 3. cap. 3.

m. lib. curonū.

n. lib. 6. cap. 63.

o. lib. p. cap. 8.

p. p. breu. cap. 3.

q. lib. 5. ca. 28.

sec. 12.

r. lib. p. ad Thib.

motuū cap. 5.

s. lib. 5. cap. 30.

t. lib. 25. cap. 22.

li. M.

u. cap. 110.

x. cap. p.

y. de morb. cogni.

tione. & curone

cap. 8.

z. cap. 7.

a. cap. 6.

b. 8. theo. cap. 18.

c. p. Theysir. tr.

p. cap. 2.

d. ibid. cap. 7.

e. ibid. cap. p.

f. de ægri cap.

tis summa. 2. ca. 3.

nuntians. Sub hac igitur tinea, tum achores, tum etiam fauos comprehendisse opinamur. a qua nihilominus tinea seorsum de sabafati determinauit. d nomen illud arctius longè, q; Prin-
 ceptis: quoniam diuerso ab aliorum Arabum modo intelligens. Sic. n. definit. Sabafat est ægritudo „
 rubedinis, quæ accidit in carne, coloris pulmonis, cum paruis pustulis. & accidit in cute capitis „
 hæc ægritudo, sicut in facie. etc. Sub nomine igitur sabafati uidetur exanthemata, psudracia, pa „
 pillas, ac magis eczematata, intellexisse (Constantinus autem ijs conuenire nam potest. Prius. n. „
 de pustulis loquitur. e quo nomine Græcorum psudracia uoluisse reor: quæ quidem φλυκτῖς „
 αῖν, id est: pustulis similes à Paulo f esse dicuntur. Mox uerò de fauis distinctè, ac per se des- „
 terminauit: & achoras interim reticēs: ni fortè sub fauis cōprehenderit. Deniq; tineam ueluti à „
 prædictis affectibus diuersam proprio seorsum capite b declarauit. Quo nomine capitis scabiē 10 „
 papillas, ficus, exanthemata, & eczematata quoq; satis quidē confusè intellexisse probabile est.
 Ait. n. {Semotim in capitis cute nascitur scabies uel carbunculi, & nata immiscetur. Nascun „
 tur autem ex putrido sanguine, uel ex cholericis humoribus incensis. fitq; pruritus non modis „
 cus. De quo pruritu quasi squamæ non modicæ, sed maiores delabuntur. Hoc sæpè euenit in „
 fantibus, propter abundantiam sanguinis, & molliem cutis. } Quanta igitur apud Græcos, „
 & Barbaros, eorumq; præcipuè traductores caliginosa cōfusiō sit: quin apud ipsos etiam Ro- „
 manos medicos diuersitas: uel huius dūtaxat me hercle uigesiminoni, ac trigemini iam propo- „
 sitorum tumorū examen ostendere potest. Quæ adhuc uarietas non in nominum duntaxat usu, „
 ac morborum definitionibus offenditur. Verum & in causarum quoq; humoralium designa- „
 tione. Galenus. n. aliquando i pituitam salfam: aliquando k uerò mistum ex tenui, seroq; ac mor 20 „
 daci, et ex crasso glutinosoq; etiam succo, humorem esse tum achoris, tum cerij causam uoluit.
 Paulus l absolute utriusq; affectus originem, nitrosam salfamq; pituitā esse ait. Oribasius, m „
 & Actius n quānam humor sit, nil determinant: nisi p glutinosum humorem ex feraminibus „
 emanare aiunt. Alexander o (ut uidimus) tres humores in causa posuit, bilim. s. pituitam, & hu- „
 morem melancholicum: Serapio p autem quatuor (addit. n. præter hos sanguinem) Celsus q nō „
 aliud, q; glutinosum purulentumq; humorem ex ulceribus defluere ait. Plinius uterq; Marcel „
 lus, Macer nullū quoq; humorem nominarunt. Theodorus Priscianus r non aliud, q; pinguior- „
 rem, uel aquatiorem esse humorem expressit. Razes uerò ad Almāforem scribens s nil de cau- „
 sa tetigit: libro uerò Cōtinente t generatim malos humores causas effem expressit: libro diuis- „
 sionum u non aliud, q; humiditatem subtilem, aut uiscosam declarauit: Galeni (ut patet) uerba 30 „
 transcribens. De morbis autem puerorum. x achoris (quem sabafati uocat) generationē pro- „
 pter sanguinis multitudinem, & cutis humiditatem fieri protulit. Quomodo etiam Constanti- „
 nus de tinca dixit. y qui nihilominus eā ex putrido sanguine, uel cholericis humoribus incensis: „
 fauos z autem ex salso phlegmate, ac pustulas ex nimium calidis humoribus, uel infectō, id est „
 putrido, ac salso iam reddito phlegmate a generationem suscipere ait. Hali Abbas b ex phlegma- „
 te fieri salso tineæ originem uoluit. Abenxoar c nil in tineæ sermone de humoralī causa deter- „
 minauit. Cui quidem achoras, & fauos respondere prædiximus. Quāq; in sabafati, d (ut ipse „
 accepit.) choleram grossitie. q. d. pituitā, uel melancholico humori admistam causam esse po- „
 suit: scabiei e uerò causam, phlegmatis (intelligo salsi) abundantiam expressit, Mesuas autem „
 nil de causa meminit f Multæ igitur prima fronte uarietates in humoris producentis deter- 40 „
 minatione apparet. Nihilominus tamen Galeno cuncti subscripsisse, peregrina mente perpen- „
 si uidebuntur

- uidebuntur. Quauis nonnulli tanq̃ posteriores, & clariùs loqui cupientes, quippiam de alijs, qui falsæ pituitæ admisceri consueuerunt, humoribus adiunxerunt. In primis igitur Galenus ^g primo de cōp. (ueluti iam ab initio præscripsimus^b) falsam nitrosam^b uel pituitam utriusq; affectus causam esse ^{med. sec. loc. cap. 10. in princ.} uoluit: in qua serosæ, nec non (ut diximus) biliosæ etiam quædam partes glutinosas admistæ ^b fol. 166. 167. sint. Galeno autem Paulus^c expressè (ut utrūq; Conciliauimus) subscripsit. Oribasius^k uerò ^{168.} & Aetius^l, ut qui à Galeno transcripserunt, quauis nil determinent; idem quoq; insinuare uidentur. Quamobrem & serosarum, & biliosarum partium, atq; etiā putredinis ratione: quarum ui & erosio fit, inter calidos tumores connumerandum utrūq; Galeni, eūq; sectantiū sententia decernimus. Quod si Alexander^m tactu frigidum tumorem, ubi pituitosum, uel melan-
10 cholicū sit, quod subest, pronūtiarit. Frigidū profectō. i. minis calidum intelligimus: ni ab aere, quoniam debili calore munitum (exhalante præcipuè per foramina spiritu, naturaliq; calido) frige factum ulcus sit. quemadmodum sæpenuerò contigisse uidimus. Intrinsicus autem actu calida materia existit: quæ suæ nitrositatis, ac putredinis rōne erodit, ulcusq; inducit. Bilim uerò aut melancholicum succum addidisse, Galeno (quemadmodum prædiximus) minimè aduersatur. Sed ne ab his quidem Græcis authoribus diuersum, quò ad causam attinet, à Celsoⁿ Plinio^o, sibiq; ascripto libro, P^r Theodoro Prisciano, Aemilio Macro, ⁿ lib. 5. cap. 23. ^o sec. 12. et ^o lib. 20. ca. 2. et lib. 23. cap. 7. lib. 20 cap. 20. et 21. lib. 21. cap. 19. p^r lib. p^o. cap. 5. q^r lib. p^o. ad Timotheum. cap. 5. r^r ca. 7. de Ruta. s^r lib. de medicamētis cap. 4. t^r p^o. breu. cap. 3. u^r lib. de morbis puerorū cap. p^o. x 7^a. 4^a. tr. 3. cap. p^o. atq; etiam Marcello, Romanis medicis exquisitissimè per pensis quippiā didicimus. Quinimò ne ab Arabibus quidem ipsis aliud collegimus: nisi q̃ ex phlegmate falso cui tamen uel bilis admista nonnunq; foret, uel sanguis, aut humor etiam melancholicus (eodem nanq; quo Alexandrum intelleximus
20 glossemate ipsos quoq; Barbaros, ut Serapionem, & Razem^u declarabimus.) Quamobrem & Arabum Princeps^x ait. Et causa quidē sabafati est humiditas mala, acuta, corrosiua, quæ permiscetur sanguini, & humores grossi iterū mali. Quare grossum retinetur, & facit apostema, et resoluitur subtile. Et causa eius, quæ de ea sicca est, est humor melancholicus. etc. Nos autem hic nō siccum sabafati: nec alios, præter cerion, & achoras, tumores declarare, nisi obiter, & sermonis necessaria quadam consequentia tracti intendimus. Alias uerò extuberationes: ut exanthemata, psydracia, papillas, eczematata siue (ut aliqui Latine uertunt) feruētes papulas, cæterasq; id genus sigillatim post hæc, ubi oportebit, enucleare conabimur. Hæc igitur de achoribus, ac cerijs fauis^v ue usq; aded dicta nunc sint. donec tanta penēs diuersorum idiomatum authores confusio elucidata sit. Itaq; trigessimū primum aggredi tumorem oc-
30 casio præceps accelerat: Quem Græci μυρμηκία, Latini formicam appellant: Celsus^y Græcorum nomine seruat, myrmecia nuncupauit: quanquā non fæminino genere, sed neutro, quasi à Græco & μυρμηκίων & deriuetur. In cuius quidem parui tumoris sermone, ob affectuum quoq; affinitatem, non secus hic acrochordonas unā cum formicis definiemus, atq; in achoribus, & fauis antea iam obseruauimus. Vtrunq; igitur horum (Paulus ait^z) cutis ex-
tubératio eminentia ue est, exigua, callosa, & magna ex parte rotunda. Inter se tamen eo discrimine dirimi subiunxit: quoniam formica seu myrmecia latiore, crassioreq; basi insidet, similem in frictionibus sensum, μυρμηκίων, hoc est, formicarum demorsibus inducens. 3^a è qua quidē punctiōnis morsus ue formicarum similitudine id nomen impositum esse Aetius^a quoq; confirmauit. Quauis nigri coloris hanc esse adiunxerit. Id quod absolute proferendum non est. Cū
40 rarissimè contingat, ob atri fortassis humoris abundantiam. Nos uerò maxima ex parte ad albidius huiusmodi extubérationem uergere conspeximus. In qua porro formicæ à Paulo posita

Tumor. 31.

Mirmecia.

y lib. 5. cap. 23.

sección. 13.

Tumor. 32.

Acrochordon

z lib. 4. cap. 15.

et lib. 6. cap. 87.

a lib. 14. cap. 4.

ante medium.

Cōtra Aetiū.

ta definitione, tunc punctione formicæ animalis morsui per simile excitari dicitur: quoniam ab aliquo contrectetur, aut fricetur tumor: Quin & in sola tuberculi compressione, multoq; magis quoniam scalpello, aut nouacula, seu quouis alio instrumento incidi tentetur: talem sentire punctionem, qui passi sunt nobis enarrarunt. Idcirco Paulus^b ait: $\pi\rho\omicron\varsigma\ \tau\omicron\varsigma\ \alpha\ \pi\omicron\phi\eta\varsigma$; hoc est, & ad frictiones, siue attrectationes; quasi dicat, quando attrectantur, seu fricantur, formicarum morsui similem sensum excitant. Dicitur autem $\phi\eta\varsigma$ hoc est frictionis à uerbo $\phi\eta\chi\omega$ quod est frico; ita & $\alpha\ \omega\phi\eta\varsigma$ Latine defricio à uerbo composito $\alpha\ \omega\phi\eta\chi\omega$ id est, defrico; per, n. Quod si per, u. scriberetur $\phi\upsilon\varsigma$ frigiditate significat, à uerbo $\phi\upsilon\chi\omega$ quod est frige facio; ita et $\pi\alpha\rho\alpha\ \phi\upsilon\varsigma$, hoc est, refrigeratio, leuis uel frigiditas à uerbo $\pi\alpha\rho\alpha\ \phi\upsilon\chi\omega$ quod est refrigero, propeq; frige facio. Cum igitur libro sexto^c de myrmecijs repetens quæ iam libro quarto prædixerat, Paulus $\pi\rho\omicron\varsigma\ \tau\omicron\varsigma\ \pi\alpha\rho\alpha\ \phi\upsilon\varsigma$ habeat, literæ deprauationem contra Ander^d non aduertens Andernacus, & $\pi\alpha\rho\alpha\ \phi\eta\varsigma$, per, n. & non per, u. legendum fore minimè aduertens, & ad frigora; sensum formicarum morsibus similem excitare scissiles uerrucas interpretatus est. Cui me hercle interpreti à se met ipso iam facta libro quarto^d eiusdè definitionis expositio ueritatis exemplar eè uel sola potuerat: Cuius dictiones $\pi\rho\omicron\varsigma\ \tau\omicron\varsigma\ \alpha\ \omega\phi\eta\varsigma$ Latine & si quis contrectet; interpretatus sit. (Deprauatè. n. & non treçiet; pro & contrectet; in Latino etiam codice scriptum est.) Sed hæc obiter usq; adè dicta iam sint. Ad myrmeciae igitur definitionem conuertamur. In qua, siquidem attrectentur, aut quouis modo fricentur compressantur uel morsus ille in tota eius basi percipitur. Celsus^e humiliora thymio, durioraq; myrmecia ponens, & quæ radices altius exigunt, maiore quoq; illo dolore mouere ait: Quem quidem & in compressione, ac frictione motu uel quopiam facto, tum ex Paulo, f. tum etiam ex Aetio, & succedere determinabimus. Infra etiam lata, super autem tenuia myrmecia Celsus comprobat: & quæ minus sanguinis (q. s. thymion) mittunt, Quin si fortasse incidantur, aut uchementius exprimantur, Haudquaquam tamen pro apparentis magnitudinis (ut Aetius ait &) ratione sanguinem fundunt. Secus profecto ac in alterius uerrucæ, quam acrochordona uocat, incisione contingit. Etenim longè maiore sanguinis quantitatem, q; suæ radices paruitati congruat, acrochordon incisa reddit. Totum uerò corpus formica (Paulo docente^h) præsertimq; manus infestat. Celsusⁱ autem simpliciter aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum nasci protulit. Acrochordoni uerò nullam cutis partem, in qua frequentiùs nascatur, dedicauit. Nos autem sæpius in palpebris, k atq; etiam collo pensilem uerrucam aspeximus. Est autem (ut hanc quoq; Pauli^l definitione cognouerimus) exigua cutis emmentia, doloris expers, callosa, magna ex parte rotunda, basim uerò angustam habes, ut suspensa esse uideatur. $\kappa\epsilon\lambda\eta\tau\alpha\ \delta\epsilon\ \delta\epsilon\ \tau\omega\varsigma$ $\alpha\ \omega\phi\eta\varsigma$ $\alpha\ \kappa\rho\omega$ $\pi\alpha\rho\epsilon\omicron\iota\kappa\epsilon\upsilon\alpha\ \chi\omicron\rho\delta\eta\varsigma$. quod est. Nominata uerò sic est, quoniam chordæ extremitati respondeat, similis uel sit. Alibiq; idem Paulus^m ait $\alpha\ \kappa\rho\omega$ $\chi\omicron\rho\delta\eta\varsigma$ $\omicron\ \mu\omicron\iota\omega\ \mu\epsilon\upsilon\eta$; hoc est, & extremitati chordæ assimilata. Huic tam definitioni, q; nominis etiã rationi Aetiusⁿ quoq; subscripsit. Quam porrò ad chordæ extremum factam comparisonem similitudinemq; diutius aliquando considerantes: non aliter illi acrochordonas respondere inuenimus, q; si quispiam alicubi chordam rescuerit, extremitatibus illius dissectionis adè dissipari permisit. Ut hinc et inde lineæ fibræ distherentur, in amplum undiq; locum dissolutæ. Tunc enim ueluti quoddam chordæ caput, ipsa met quidem latius, resultare cuius perspicuū est. Sic ergo dicere possumus huiusmodi tumorem chordæ resectæ dissipato iam extremo, summitati uel comparari. Cum tenuior

- 2^a. tenuior in radice ac basi existens, in amplum deinceps progrediatur. Secundò etiam illi chordæ extremo assimilari potest: eò quòd solent ipsi chordarum artifices, uel quicumq; illis in medio dissectis utuntur (ne filamenta in chordæ usu ab extremo exordientia distrahantur: Inde q; chorda paulatim resoluta ruat) extremis utrinq; nodum quempiam annexere. Cui proculdus
- 3^a. biò chordæ nodato iam extremo magis huiusmodi tumor comparari potest. Fortassis autem nò ipse tumor, aut eius uertex chordæ summitati comparatur: Sed eius basis, radix ue, à qua nò secus quidem pendere hunc tumore liquet, ac si quispiam chordæ extremo pirum, uel quod uis aliud subnecteret. Sic igitur tanq; chordæ extremo annexum, & ab illo pendentem acrochordona (quasi Latine dixerimus extremichordum, aut summichordum) nuncupari proferemus. Extremichor
- 10 $\alpha\chi\rho\sigma$ enim extremum Græcè significat, $\chi\sigma\rho\delta\iota$ uerò chordam. E quibus quidem Græcè dum. cis nominibus $\alpha\chi\rho\sigma\chi\sigma\rho\delta\iota\omega\nu$ tumoris nomen compositum est. Itaq; non temerè utraq; nomen: Summichorclatura, $\mu\upsilon\sigma\mu\chi\iota\alpha$ scilicet Latine formica: & $\alpha\chi\rho\sigma\chi\sigma\rho\delta\iota\omega\nu$, Latine, ut diximus (nunc primū dum. formato nomine) extremichordum, siue summichordū, Pauli, atq; Aetij dogmate inter ea quæ à similitudine imposita sunt, connumerari potest. Galenus^o autem in huiusmodi nominum ordi
- ne myrmecias duntaxat adnumerat: Acrochordonas uerò seorsum declarat. Quas quidem inde sic dictas uoluit: $\omicron\tau\iota\ \kappa\alpha\tau'\ \alpha\chi\rho\sigma\ \omicron\chi\alpha\tau\alpha\ \tau\eta\varsigma\ \epsilon\pi\alpha\chi\epsilon\iota\alpha\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \delta\epsilon\rho\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$. hoc est quoniam extremas partes cutis occupat, quasi non quia chordæ extremo assimilatur: Sed ab $\alpha\chi\rho\sigma$, & $\omicron\chi\alpha$, et $\delta\epsilon\rho\mu\alpha$, tribus dictionibus formetur. q. d. $\alpha\chi\rho\sigma\chi\sigma\rho\delta\iota\omega\nu$, id est $\alpha\chi\rho\sigma\ \omicron\chi\epsilon\iota\omega\nu\ \delta\epsilon\rho\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$. q. d. extrema occupans seu trahens cutis. uel à duabus dictionibus, $\alpha\chi\rho\sigma$, &
- 20 $\chi\sigma\rho\delta\epsilon\upsilon\omega$. q. d. extrema lædens seu ligans. etenim $\chi\sigma\rho\delta\epsilon\upsilon\omega$ lædo, scindo, ligo, & alia significat: Latine summicuticeps quasi summa cutis capiens dicere possemus. Quo posito non à simi
- litudine, sed à symptomate sedeq; nomē id impositū esse proferemus. Sed hæc quidē circa nomi
- na contemplationes leuissimæ, ac minimi ferè momenti sunt. Ad tumoris ergo acrochordonis
- definitionem reuertamur. Quoniam Celsus^p aliter acrochordonas definiuisse apparet. In pri
- mis enim Hippocratis aphorismum libri tertij¹ enarrans: ¹ Vbi s. ætas paulum processit, glan
- „ dulæ (inquit) & uertebrae, quæ in spina sunt, aliquæ inclinationes: strumæ: Verrucarum
- „ quædam genera dolentia ($\alpha\chi\rho\sigma\chi\sigma\rho\delta\iota\omega\nu\alpha\varsigma$ Græci appellant) & plura alia tubercula oriūtur}
- Quo in loco dolentes acrochordonas posuisse Celsum uides. Paulus autem $\phi\alpha\tau\omega\nu\omicron\varsigma$, hoc est, Celsi et Pau
- indolorius sit, in definitione ait: ⁵ Cui porro experimentum quoq; aduersus Celsum astipula
- 30 tur. Vel ergo Celsum nò Pauli mō autoritate, sed ab ipsa etiā rei natura cōprobatī cōdēnabi
- mus. Vel fortassis depreuatam esse Celsi literam cōseebimus, atq; ubi {dolētia} legitur: {indolē
- lentia} legendum determinabimus. Vel demū (quod potius reputo) alterum acrochordonis mo
- dum Celsus intellexit, ex calida magis, aut mista materia genitum. Quamobrem & nōnunq; Celsi Acro
- subitò, nedū per se, desinere (eoq; magis, quò minor est) nonnunq; uerò mediocrem inflamma
- tionem excitare ait: et quædam ex eis esse addidit, quæ in pus conuertuntur. E quibus quidem
- uel calidam esse materiam, uel calidæ admistam liquet: cuius ratione dolorem quoq; concomi
- tari uerosimile est. Cui quidē Celsi authoritati innixus Bartholomæus Sylianus, libri De
- definitionū medicarū i terpres, in acrochordonis definitione, proprio Marte addidit {Genus quod
- dam est id uerrucarum dolens.} Quæ uerba sub parenthesi conclusa non Græci authoris, at
- 40 ipsius Latini traductoris sunt. Inquit enim libri author { $\alpha\chi\rho\sigma\chi\sigma\rho\delta\iota\omega\nu\ \epsilon\varsigma\ \iota\epsilon\kappa\upsilon\sigma\iota\varsigma\ \pi\epsilon\pi\eta\epsilon\varsigma$
- „ $\rho\eta\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \delta\acute{\alpha}\sigma\epsilon\nu\omicron\nu\ \epsilon\chi\omicron\nu\sigma\alpha\ \beta\acute{\alpha}\sigma\iota\nu$.} quod est Latine ad uerbum. Acrochordon est exortus
- processus ue

Cōtra Sylva
nūl.

i 3^a. Aph. cō 30.
Cōt^a Orib^m.
u supra. fo. 165.

n uide. 3^a. Apho
risinorū cōm. 26.
x lib. 4. cap. 15.
y lib. 6 ca. 87.
y lib. d. tu. præt.
nat. cap. 16.

z 14. meth. cap.
13. in princ. et ca.
17. in princ.
a 14. meth. c. 17
circa princ.

Verruca quid
b lib. 3. cap. 7.
post princ.
c satyra p^a.

d lib. 37. cap. 12
pest. medium.

processus ue orbicularis, angustamq; obtinēs basim? Cōgruū uerò non est ex alieno dogmate: præsertimq; diuersi idiomatis, à quo Græcus author exscripsisse non potuit: sed ex proprijs quidem monumentis, aut saltem eius quem æmulatum fuisse cognouerimus, cuiuslibet dicta enarrare. Quod autem diuersum acrochordonis modum Celsus intellexit, non hæc tantum ostendunt, uerum & alia plurima: quæ in eius descriptione posita sunt. Haud enim ueluti pendentem tumorem, sed cuti potius affixum, quin & ipsi etiam carni: modo infra, in radice, ac basi tenue sit, supra uerò latius, à Celso data descriptio præsefert. Sic ergo inquit. { Vbi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutē latius, Idq; modicum est, quia rarò fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plura, maximeq; in pueris. etc. } In quo sermone uel hoc speculatione dignum contra Oribasium est: qui (uelut antea tetigimus) acrochordonem à satyriasis (ut ipse interpretatus est) uerruca differre ait: quoniam acrochordon singulatim sit, satyriasis uerò una excellens uerruca est, cui parue multe circumsunt. Celsus enim uix unum tantum eodem tempore acrochordonem nasci, sed ferè plura uoluit. Magis uerò inter Latinos Celsus, quàm Oribasio credendum est. Plures autem in facie, & manibus ortos acrochordonas Antonius Musa in suis filijs expertus est, quin & contagiosum fuisse affectum cognouit. Modicum autem esse acrochordonem Celsus ait: quia rarò fabæ magnitudinem excedit. Modicaq; etiā magis myrmecia significauit, quoniam (ut ait) magnitudine uix unq; lupini modum excedunt. Idcirco Paulus exiguam esse & πικρὰ & σκληρὰ, hoc est, eminentiā, excrecentiam ue de utroq; tuberculo definiuit. Ante ipsum quoq; Galenus achoribus, ac cerijs minores esse tumores acrochordones, tum quoq; myrmecias, quin & psyraces etiam, atq; epinyctides inquit. Nos autem acrochordonas, & myrmecias rarissime ciceris magnitudinem excedere uidimus. De psyracibus aut, atq; epinyctidibus post hæc sermo fiet. Vtraq; igitur, quā nūc disquirimus tumoris species ex toto genere præternaturam (Galeni dogmate) est. Ex eorum nihilominus (ut idē ait) numero myrmecia est, quæ quidem ex mutatione consiunt solidarum partium: ueluti etiam leuce, alphas, elephas, scabies, & lepra. Non autē sicuti meliceris, atheromata, & steatomata, siue uti elmynthes lumbrici ue, ac cætera id genus. Quæ cum prius omnino non fuerint, postmodum sunt orta. At de hoc fusius locis proprijs enucleandum seruauimus. Quoniam uerò non Græcorum modò, sed Romanorum, atq; Arabum quoq; nomina, prout, s. nobis traducta sunt, disquirere propositum nobis est: Quò singulorum phantasias intelligere suis ex definitionibus propèrte queamus: Idcirco Latinū quoq; nomen consideremus. Quāuis enim distincte apud Græcos alterutra species ita dicta nūcupetur, ut hæc μύρμηξ, illa uerò ἀγχόρον δάκτυλος dicatur. Generica tamen dictione apud Latinos, non hæc tantum, sed alia quoq; ut clauis, & thymus, notantur uerrucæ. Quod porro nomē, nō secus atq; prædicta, ipsum quoq; à similitudine impositum est. Nam uerruca (ut omnibus quidem Latinis pernotum est) aditior montis pars est, & (ueluti Celsus Catonis dictum interpretatur) aspera unde & uerrucosa loca dicuntur quæ inæqualia, & diuersas partes eminentes habētia sunt. Vt Persius: { Sūt quos pacuiusq; & uerrucosa moretur, Antiochia etc. } hoc est aspera, inæqualis, & non satis polita. Inde pro tuberculis quibusdam, qui in papillis, ceu eorum uitta quædam, conspiciuntur, uerrucæ nomen intelligitur, ut quā Plinius ait: { in cretibus uariè maculis, ac uerrucis linearū etc. } Hinc etiam & uestes uerducatæ uulgò dicuntur, quæ uerrucatæ, propter inæqualitatem, asperitatemq;

tēq; in illis, ob cōtortū, inuolutūq; sericū, repertā. Ab his igitur mōticulis, aut lapidū tubercu-
 lis desumpta similitudine, extra cutim eminētes carunculæ uerrucæ, aut uerruculæ nūcupari
 solēt. Qua de re Columella^c de caprini pecoris electione loquēs, ait {Caper cui sub maxillis
 binæ uerruculæ collo dependēt, optimus habetur. etc.} Hinc itidē & manus, ac pedes, inter-
 dūq; etiā reliquas corporis partes exasperātia collofa tubercula, & dura, uerrucæ appellari
 à Romanis consueuerūt. Cū ueluti quidā mōticuli supersideant. Harū quæ radicibus affixæ
 sunt, porros uulgò, & porrectos appellāt, eò q̄ intra se fila quædā sæpiculè continēt, porrorū Porri.
 radicibus nō dissimilia. Cuiusmodi præsertim myrmeciae sunt. Latissimis. n. radicibus inhæ-
 rent (Celsus^m ait) Ideoq; ne excidi q̄dē sine ulceratione magna possunt. De oībus uerò sub
 uerrucæ noīe cōtētis spēsbus intellēxissē Quintū Serenū opinor, quū inq̄t f {Interdū existit
 turpi uerruca papilla: Hinc quondā Fabio uerū cognomē adhæsit: Qui solus patriæ cūctādo
 restituit rē.} Sicq; genericè nomē intellēxissē Marcellū autumo: quū uerrucarū genera oīa
 fimi canini exusti cinerē curare impositū ait. & Quāq; alibi^b clauos, seu clauellos à uerru-
 cis distinguit: uerrucas interea minores, congestas, à Græcis myrmecidas appellari adiungēs
 q. d. formiculares. Vt idē illarū nomē deductū eē appareat: quoniā plures, i simul aggregatæ,
 ac paruæ, instar formicarū populi, adsint. Plinius¹ etiā, licet clauos à uerrucis distinguat: plu-
 res tamē spēs sub se cōtinere uoluit, dicēs^k {uerrucas oīum generū tollit. etc.} Idipsum quoq;
 sibi ascriptus liber^l obseruasse uidetur. Sub uerrucæ. n. uoce acrochordonas etiā, et thymion
 comprehendisse apparēt. Celsus autē adeò generale nomē usurpat: ut clauū quoq; cōprehen-
 derit: qn̄ (si exquisitiū perlibraris) nō uerrucas, at uerrucis similes quatuor tumores nuncu-
 pat: Acrochordonē. f. Thymion, myrmecia, et clauū: Noīe tamē à similitudine desumpto, uer-
 rucæ nūcupari queūt. Nōnulli autē Latini Græcorū authorū interpretes, Hermolai^m fortas-
 sis uenia moti, sic traducēdo obseruauerunt: ut myrmecias Latine {formicas,} acrochordones ue-
 rò generis nomine {uerrucas} cōuerterint. Quod tamen æquiocationis ansam, Græcarū præ-
 cipuè literarū expertibus, exhibet. Distinctiū igitur loquemur, si uel Græcis nomenclatu-
 ris alteram speciem, myrmeciā, siue (uti Celsus habet) neutro genere, numeroq; plurali,
 myrmecia: alterum uerò acrochordonē uocemus. Vel (ipsomet Hermolao docente) primam
 quidē sessilē uerrucam: siue, ut alij dicunt, formicantem uerrucā: Secundā uerò pensilē uerru-
 cā nominemus. Abenxoarisⁿ traductōr (ut Barbaros quoq; non omiserimus) uerrucas, &
 porros appellauit, multas esse species sub generico noīe adiungens: ē quarū numero quædam
 est, quæ Arabicè dicitur alchalam, siue alchalim. de qua quidem aliās loquemur. Razes autem
 formicas à uerrucis aliquandō distinxit. Quas. n. nos formicas, & acrochordonas, Græcorum
 instar, uocamus: Ipse, quin (ut rectiū dixerimus) eius traductōr, Latinorū more, uerrucas
 nuncupat.^o Formicæ interim nomine longē diuersum affectum intelligēs: p̄ eum. f. qui à Græ-
 cis herpes dictus est. Adeò ut quemadmodū illi miliarē quendā herpeta posuerūt: sic et Razes
 miliarē formicam habuerit. Quinimō tres libro Cōtinente¹ dicto, formicæ species posuit.
 quæadmodum nos infra^r tres esse herpetis species declarabimus: 1 miliarē. f. herpetem: 2 et
 esthiomenon: 3 atq; generis nomine, simpliciter herpetem appellatum. Sic etiam Razes tres
 formicæ species posuit: 1 formicam miliarē, similem¹ ue panico 2 corrosiuam, ulcerantem² ue
 pellem, & carnem: 3 atq; ipsam simpliciter dictam formicam, siue (ut ex Principe declarabi-
 mus)^r ambulatiuam solam. Cuius nomenclaturam & Hali Abbas^s etiam secutus est, tres pa-

e libro. 8. cap. 6.
 post principia.

m lib. 5. cap. 28.

f cap. 64.

g lib. de medica
 mētis cap. 19 cir-
 ca finem.

h cap. 34.

Myrmecides.

i uide li. 20. c. 12.

in fine li. 21. c. 20.

21. lib. 22. c. 21. 22.

23. 25. lib. 23. c. 7.

& in præf. li. 24.

c. 8. lib. 25. c. 5. li.

26. c. 14. lib. 28. c.

4. 16. li. 31. c. 9. li.

32. c. 4. 10. lib. 33.

cap. 4.

k lib. 24. cap. 15.

& li. 27. cap. 9.

post principia.

l lib. 3. cap. 42.

m in Glossema-

tibus in Plinium

super dictione.

Thymas.

n lib. 20. theysir

tr. 7. cap. 9.

Alchalim.

Alchalam.

o lib. Diuisionū

cap. 124. & 25.

Contin. cap. 12.

p li. Diuif. c. 133.

& 7^a ad Alman

forē. cap. 16.

q lib. 13. Cōtin. c.

10. liera 2.

r cōm. 8.

s 8^a theorice. ca.

10. & 3. pract. c.

29.

e 8^o. theo. cap. 17 riter formicæ species ostendens. Qui nihilominus alibi ¹ seorsum de uerrucis determinauit.
 & 9^o. pract. c. 13. Quauis Pauli ² uerba de uerrucis transcribens aliquando Razes ^x quam ille myrmecim uo-
 u lib 4. cap. 13. cat, hic formicā: acrochordonas uerò corrupto uocabulo { Afrochoon, } corruptioriq; { Aforcā }
 x 13. Contin. ca. cat, hic formicā: acrochordonas uerò corrupto uocabulo { Afrochoon, } corruptioriq; { Aforcā }
 10. litera. 2. ante. appellarit, adeò ut formicā à formica distinguere nescies Auicenna ^y in turpissimū errorē, ob
 mediū capitis. formicæ nominis æquiuationē, ceciderit. Tres. n. herpetis species, et duas uerrucas, myrme-
 y 3^a. 4^a. tr. p^o. ca. ciam. s. atq; acrochordones sub formicæ nomine comprehendit. Adeò ut non tantum Græcos
 6. 7. & 8. rum, atq; Arabum formicas, sed acrochordones etiā, quos corruptissimo uocabulo { acruhas-
 Cōtra Auic. rod } nuncupat, turpissimo errore confuserit. Id quod non absq; magno mortalium dāno, pe-
 riculoq; fieri potest. Natus uerò Auicēnæ hic error est: Quoniam Græci pustulas quasdam
 ex bilioso humore, siue solo, siue pituitæ admisto genitas, erosionēq; cutis, & eiusdem, quin 10
 ipsius duntaxat cuticulæ quandam ueluti adustionem, uno in loco minimè fixas, uerum & ui-
 cinas quoq; partes rependo depascentes, ab huiusmodi serpendi natura, herpetes uocarunt.
 x 2^o. meth. ca. 2. Ritu. n. serpentis bestię (Galenus ait ^z) sicuti nomen ipsum indicat, relicto priore loco, ad al-
 terum transeunt: haudquaq; uerò seruata ueteri sede uicinas partes depascunt. Arabes quoq; 10
 a 3^o. theor. ca. 10. à simili proprietate eosdem affectus formicas nuncuparunt: Quoniā (ut Hali Abbas inquit ⁴)
 discurrunt, & dilatantur per cutem à loco ad locum, quemadmodum formica mouetur. Vt in 10
 hoc formicæ similitudo consideretur, unde nomen impositum est, quia formicarū instar deam-
 bulare uidentur. Præter has autem Arabū formicas Græcorum uerò herpetes, uerrucæ spes-
 cies quædam est, quæ à Græcis (ueluti præscriptum est) myrmecia, id est formica nominatur:
 non eadem porro similitudine: at alia, quoniam uidelicet similem sensum formicarum demor- 20
 sui excitat. Arabes igitur nonnulli, ad Græcorū imitationem, hanc uerrucam, formicam uoca-
 runt. Quò fit ut nomen { formica } penès illos, duobus morborum generibus, quibus natura dif-
 ferentibus æquiucè accommodetur. Hinc Razes confusio principiū dedit. Quoniam eo-
 dem capite libri, quem Continētem uocat, ^b sæpiusculè pro bilioso affectu, herpete inq;, formi-
 cæ nomen usurpat. Semel aut pro uerruca (propriā fortassis uocem ignorās) ex Paulo, quē
 c ante mediū ca- transcripsit, accepisse uoluit: sic dicens. { Paulus dixit: formica & pustula appellata, afor-
 pitis. cam, debent habere pustulas in pelle, similes uerrucis, in rotunditate magna. quoniā formica ha-
 Aforcam. bet radicē latā: et tūc penès pruritū erit sensus, quasi sensus morsus formicæ. Sed Afrochoon
 Afrochoon. habet radicē strictā, ita q̄ credatur eē aliqua res suspensa. etc. } Hinc ergo & Auicēna lon-
 Cōtra Auic. gè maiori cōfusione diuersissimos genere morbos, iisdē capitibus, nō in definiēdo tātū, aut si- 30
 gnificādo, sed (quod peius est) curādo, ineptissimè copulauit. Perindē ac sigillatim locis pro-
 prijs ^d enucleabimus. Nūc uerò ad id, cuius causā hic singula percurrimus, reuertamur. Ex
 d infrā c. 6. 7. 8. humore igitur crasso melancholicoq; myrmecia, & acrochordon fiūt. Quāobrē nulli dubium
 e 7^a. 4. tr. 3. c. 12. remanere opinor ad frigidos utrūq; tumores reducēdū. { Causa ergo (inq; Arabū Princeps ^e)
 in principio. efficiēs eas prima ē expulsio naturæ, et materialis ē humor grossus melancholicus. etc. } Quòd
 si alibi nōnunq; de bothor, paruis uel apostematibus loquēs, ex bili sanguini admista for-
 f 2^a. fen. p^o. doc. clauos, & uerrucas fieri præscripserit: f Deprauatā potius eē literā, q̄ præcipiti iudicio im-
 p^o. ca. 5. in fine. pieq; Principē in re tā manifesta condemnare decernimus. Etenim ostēs surū paulò antè promi-
 Cōtradictiōis serat bothor eē secūdū numerū magnorū apostematū. quoniā. s. uel sunt sāguinea, uel biliosa
 Auicen. solu^o. uel mista, uel ex pituita, uel melancholico succo oborta, demūq; uel aquosa, uel uentosa. uel quo- 40
 et Auic locus. uis mō exhorū aliqbus cōmixta. Ideò subdit. { Earū. n. aliæ sunt sanguineæ: sicut uariolæ: aliæ
 Vide etiā supra uis mō exhorū aliqbus cōmixta. Ideò subdit. { Earū. n. aliæ sunt sanguineæ: sicut uariolæ: aliæ
 de bis fo. 3. ca. p^o sunt

(ut patet) idem, & simile. Si ergo psydracion simile phlyctenis, hoc est, ut diximus, uesiculis bullis' ue est: idem non esse proculdubio sequitur. Quod si non idem cū phlyctēnis est, Cont^a Musā, sed aliquo modo ab illis differt: nec idem quod φλυζάκιον significare φυδράκιον, liquet. et Cornariū. quēadmodum nonnulli determinarunt. Cū non aliud phlyzacion sit, q̄ phlyctēnæ: si Gale- q. 4ⁱ. reg. acut. no medicorum coryphæo confidimus. qui phlyctēnas interpretatus, euestigio subdit ἡ τοῦ το co. 63. uide Hip. γὰρ σημαίνει τὸ φλυζάκιον quod est id enim scilicet phlyctēnas, significant phlyzacia. 3 li. de coarctis præ- not. post princ. Quemadmodum igitur φλυκταίνω, & φλυκτῖς, ἀπὸ τῷ φλύω dicuntur: ita & φλυζάκιον, ἀπὸ τῷ φλύω: quod idem præsefert, & φλύσας (ut ab Hippocrate nonnunq̄; dici- Plyctēnæ. tur) ἀπὸ τῷ φλύσσο. Etenim φλύω, φλύζω, & φλύσσο idem nobis ostendunt, quod bul- 10 lio, ferueo, uomo, eructo. Ex quo φλυκταίνω, pariterq̄; φλυζάκια, & φλύσας, pro bul- lis uesiculis' ue, quæ à feruentibus, acerrimisq̄; humoribus excitantur, & ijs, quæ ab igne, aut feruenti aqua generationem recipiunt, similes sunt, apud Græcos medicos capiuntur. φυδράκιον uerò, & φυδράξ, ἀπὸ φύχου, hoc est, à frigore denominari à quibusdam scribitur, quoniam & ab ipsa etiam frigida exteriori causa: ut continentis fortasse cutim densantis: ac per hoc humoris exitum impediētis frigore, uel ab ipso quoq̄; frigido succo generationem suscipere queat (Id quod tamen de salsa duntaxat pituita uerificari posse opinor.) Fortas- sis autem φυδράκια, hoc est πύχρα ὑδράκια, id est frigida, seu frigidula guttula, si- ue sudores nominantur. Ea propter Celsi^r literam corrigentes, non phlyzacion (ut nonnulli uolunt) sed ex Hermolao^s potius, ac Manardo^t, psydracion legendum fore decreuimus. Cel- 20 sus. n. ad frigidius uel saltem minus calidum uergere hunc tumore insinuat. quū expedito de- narium. suis exanthematibus sermone, subdit. Psydracion autem paulò durior (prædictis uidelicet exanthematibus) pustula est, subalbida, acuta: ex qua ipsa quod exprimitur humidū est. Quar- 30 ti uerò libri de acutorum uictu Author (Hippocrates. n. Galeni testimonio, nō est: quem se- Contra Mu- etari Celsus conabatur) calidum potius, non frigidum affectum intellexit: ut qui παρὰ φρο- sam. σὺν νῦν, id est delirium associari uoluit, & ἐρυθρήματα, hoc est rubores, & σκληρὴν φλεγ- μὸν νῦν, quod est, duram inflammationem (intelligo quam nos hodie specialiter phlegmonen uocamus, ab Hippocrate, cæterisq̄; uetustioribus Græcis οἷον δὴμα σκληρόν τε καὶ ἐπώδυνον, id est tumorem durum & dolentem nuncupari consuetum. ut loco deinceps proprio de- 40 clarabimus^u) Mirū igitur nō est, si diuersis locis Paulus de psydracijs, & phlyctēnis itaq̄; s. de diuersis affectibus meminit: aliūq̄; curationis modū singulis adiūxit. De psydracijs inq̄; 30 libro tertio, x in morborū numero, qui capitis cuti proprij sunt, recēsens: De phlyctēnis ue- z in glossē. in Plinium. rō, bullis' ue, libro mox quarto: y inter eos quidem affectus, qui uniuerso corpori cōmunes fie- a li. 4. c. 8. 9. 10. ri queunt, adnumerans. E quibus quidem præostensis adhuc liquet: si pustulæ nomen, apud b li. 13. cap. 128 lib. 6. cap. 68. & Celsum, genus tribus tumoribus cōmune sit, exanthematibus, psydracio, et epinyctidi. Haud- lib 14. cap. 61. 63 quaq̄; tamē genus esse potest phlyctēna (ut Hermolaus innuit) phlyctēnas Græcorū, Celsi Catra Hermo pustulis æquē cōfundens. z Etenim phlyctēna & ab exanthematibus, & psydracijs, atq̄; ip- laū Barbarū. sis etiā (ut uidebimus) epinyctidibus differt. Qua de re Paulus, a atq̄; et Aetius^b seorsum de φυδράκιον = ijs oibus, distinctis inq̄; capitibus, locuti sunt. Ad psydraciō uerò reuertamur. è quo noiē & φυ- τόν. δράκιον τόν formari pōt, quod est, psydracijs occupatū: quasi diceremus psydraciātū corpus & φυδράκιον τόν. i. à psydracijs liberū. Vnde et Dioscorides de butyri potestatibus lo- 40 quēs ait^c καὶ α. φυδράκιον τόν τῆς αἵματος hoc est: & psydracijs imune corpus cōser- uat. 3

u infra c. 3. cō. 6

x cap. 3.

y cap. x.

z in glossē. in

Plinium.

a li. 4. c. 8. 9. 10.

b li. 13. cap. 128

lib. 6. cap. 68. &

lib 14. cap. 61. 63

Catra Hermo

laū Barbarū.

φυδράκιον =

τόν.

α. φυδράκιον =

τόν.

c libro. 2^o. c. 64.

uat. 3 Introduc[t]orius autem Galeno ascriptus liber d in oculorum quoq; candido, qu. n & uni d cap. 15. de ocu-
 uerso etiam corpore aduenire communiter dictum psydracion uoluit. Sic dicens & u d p a z lorū affect. bus.
 „ κιον δ' ἐστὶ κινῶς λεγόμενον ὁ περι πᾶν τὸ σῶμα, καὶ περι τὸ λευκὸν τὸ ὀφθαλμοῦ post mediū.
 „ γίνεταί, ὅιον ἐξ ἀνθρώπου ἐξ ἄκρῃ ἐρευνθῆς 3 quod est 3 psydracion autem cōmuniter di-
 „ ctum, est quod circa totum corpus, & circa oculi album fit, uelut efflorescentia, in summo
 rubicundum. 3 Caelius autem Rhodiginus, 4 quū in naso nascitur, mendacij signum esse e lib. 24. cap. 26
 psydracion ex antiquorum lectionibus, testatur. Sic. n. inquit 3 superstitionis antiquæ uel 3 psydracion
 „ gia in Græcorum commentariolis pridem obseruauimus: quæ & uarietatis gratia, quam an Mendacij
 „ xie nimis, ac sollicitè affectat plerunq; humanus animus, huic loco suppingā. Moris est (inz signum.
 10 quiunt) nonnullis quæ naso adnascuntur psydracia (est autem eo nomine pustula durior, acu
 „ ta, & subalbens) nuncupare mendacia, quoniam ferè sint mendaciloqui argumenta. Sed &
 „ ad ipsum id spectat, quod lectum quoq; est: Siculos consueisse ionthos, qui se parte eadē osten Ionthi mēdas
 „ tant: & u s s appellare, id est uanos, mendacesq; quia id genus homines per ea naturæ indiz ces.
 cia planè significarentur. 3 Atq; huius quidem psydracij (ne quod præcipuè intendimus ob 3 psydracij
 „ liuiscamur) causa est falsus nitrosus ue humor, uel si bilis, aut sanguis in causa sit: cū in sumz humor.
 mo rubicundū esse Introduc[t]orij Author adiūxerit: nō sine huiusmodi pituitæ admissione fie-
 ri opinor. Quamobrem inter mistos ex calido & frigido hunc tumorem connumerari posse
 apparet. Ego autem ob pituitæ sub cuti putredinem, atq; etiam sanguinis, uel bilis admistio-
 nem, inter calidos reponendum assero. Eo tamē longè calidior phlyctæna est, Phlyzacion' ue.
 20 quod uel ipsum nomen præsefert. Arabes uerò sub sahafati huiusmodi tumorem cōprehē-
 disse, præscriptum iam est. 5 SED trigessimū quartum ordine tumorem, Epinyctida inq; r supra fo. 172.
 Græcè, Latine uerò nocturnum aggredi tempestiuum est. In quo longè præstantiores nodi 36. et fo. 173. post
 soluendi occurrent. Adeo ut multi non secus, atq; morbi nomen præsefert, in nocte, ac tez med. fo. 176. 6. 7
 nebris palpantes, præsertimq; Barbari, & eorum sequaces magnoperè aberrarint. Epinyz Epinyctis.
 ctis ergo æquiūocum nomen est. Commentarios. n. (Hermelao teste f) nocturnos. i. rerum f in Glossēma
 noctu gestarum aliquandō significat. quemadmodum & alios interdū. f. factarum rerum cō tibus in Plinium.
 mentarios, ephemeridas nuncupant. Somniorum quoq; libros (ut ait Synefius) epinyctidas
 appellant. Plinius uerò 8 ulcus aciem hebetans, & in angulo oculi perpetim humorem emaz g lib. 20. cap. 8.
 nans, ita uocari ait. id quod αἰγίλωφ. à Græcis medicis (ut postea uidebimus) nuncupatur.
 30 Nos autem hic neq; cōmentarios, neq; oculorum anguli ulcus aliquod intelligimus: Sed tu-
 morem quendam inde sic (uel Galeno b erudiente) nominatū, ὅτι νύκτῳ ἐγίγνετο. id est b 20. meth. cap. 2
 quoniam noctū enatum est. Oritur enim (Celsus 1 quoq; ait) in eminentibus partibus, & fe uersus finem.
 rē noctū. Vnde nomen quoq; à Græcis ei ἐπινυκτίς impositum est. Quod si tūm Paulus k 14.
 tūm etiam Aetius 1 non ab eo quod noctū oboriatur: at Potius quoniam uehementius per noctē k lib. 4. cap. 9.
 eiusmodi cum tumore ulcus hominē excruciat: sic nominari autumant. Galeno tamen ac Cel l lib. 14. cep. 61.
 so minime aduersantur. Eadem nanq; hora, qua ortum est, & exacerbari ob refluentes sucz li & Aetij, cū
 tos, atq; cutis etiam superuenientem eo tempore condensationem, uerissimum est. Vtraq; igit Galeno et Cel
 tur insimul iuncta ratione à Græcis epinyctis dicitur. tūm quia noctū enasci consueuit. tūm fo.
 quia noctū quoq; dolore homines torquere plurimum inuenitur. Quid uerò tumor huiusmoz
 40 di, qualis ue sit: à Galeno definitum non legimus. Etenim omnibus notam affectionem de tu
 moribus præternaturam loquens m reputauit. A Paulo igitur hanc definitionem prius edis m cap. 16.
 P iij camus,

n libro. 4. cap. 9 camus, sic scribente. [¶] Epinyctides ulcuscula sunt, sua sponte erumpentia, $\phi\lambda\upsilon\kappa\tau\alpha\upsilon\omicron\epsilon\iota\delta\eta$,
 hoc est, phlyctænis, bullis'ue similia, subrubra: Quibus disruptis cruenta sanies defluit. Per
 diemq; non magnoperè excruciant: per noctem uerò graui, magis, q; pro ratione ulceris, dolo
 re torquent. [¶] Paulo autè Aetius^o ad uerbum suscripsit. Pollux pustulas subliuidas, modicè
 tumescentes, & plenas sanguine, in tibijs et pedibus, ferè noctu maximè infestantes esse ait.
 p libro. 20 ca. 6. Inde q; Plinius [¶] fortasse inquit quidam eo nomine appellant pustulas liuentes, ac noctibus
 circa principia. inquietantes. [¶] Celsus uerò non uno tantum colore infecta, sed tribus hanc pustulam describit.
 Quin & pessimam esse dicens, ex alijs quoq; symptomatibus eā longè manifestius ostendit.
 Sic scribens. [¶] Pessima pustula est, quæ $\epsilon\pi\iota\nu\kappa\tau\iota\varsigma$ uocatur. Ea colore uel subliuida,
 uel subnigra, uel alba esse consueuit. Circa hanc autem uehemens inflammatio est: & quum
 adaperata est, reperitur intus exulceratio muccosa. Color est humori suo similis: Dolor ex
 ea supra magnitudinem eius est. neq; n. ea faba maior est. Atq; hæc quoq; oritur in eminenti-
 bus partibus: & ferè noctu. Vnde nomen. etc. [¶] E qua me hercle Celsi, ac Pollucis etiam, &
 si, & Plinij Plinij definitione exquisitissimè perpensa, horum epinyctida à Pauli, & Aetij epinyctide
 epinyctides à differre statim apparet. [¶] Quoniam hi pustulas, Illi uerò ulcuscula: ^{2o} Itemq; hi liuentes, aut
 Pauli & Aetij epinyctidas, quin (uti Celsus addit) interdum subnigras, interdum uerò albas huiusmodi
 pustulas definierunt: Illi autem subrubra ulcuscula pronuntiarunt. ^{3o} Præterea Celsus
 bus differunt adaperata pustula mucosam intus exulcerationem reperiri, atq; hanc humori, ex quo facta
 tripliciter. pustula sit, per simile colore dixit: Paulus uerò, atq; Aetius cruentum sanguineum'ue icho-
 rem, ac per hoc subrubrū ex ulcusculis emanare protulerunt. Celsi autè & ratio, & quorundam
 Barbarorum authoritas astipulatur. ut ipse potius, q; Paulus, & Aetius epinyctidas cognouerit,
 uereq; definierit. Etenim si albus tumor est: a salsa nitrosa'ue pituita gignitur: perinde ac
 subliuidus, aut liues, ex atrabili: magisq; si sub niger extiterit. Vtriusq; uerò succi motus,
 atq; exacerbationes in nocte maiores, uehementiores'ue fieri cuius pernotum est. quemadmodum
 sanguinis, aut bilis, interdum uehementior, & acrior exagitatio fieri solet.
 q 5^o. Breu. ca. 8. Atq; id ipsum à Serapione quoq; de efferis loquente, [¶] ac ipsum ex scribentibus, Raze, [¶] et
 Quæ uerior Hali Abbate^s comprobatur. De quibus tamen Barbaris postmodum sermo fiet. Vera igitur
 epinyctis. tur epinyctis est, quam Celsus, Polluxq; ac Plinius descripserunt. Cuius quidem causa, nitro-
 r 25. Cont. ca. 18. s 8. theori. ca. 17. circa medium quædam admista fuit: unde subliuidus sit, aut (si maior copia superuenerit) liuidus, uel des-
 & 4. pract. c. 3. niq; subniger, ubi plurimum huiusmodi bilis atræ coniungatur. Ob adiunctam nihilominus
 in omnibus, quam diximus, pituitam, adaperata (ueluti Celsus ait) pustula, mucosa intus exul-
 ceratio reperitur. quemadmodum antea de achoribus quoq; ac cerijs dictum iam est. Quæ
 Cōtra Paulū, autem à Paulo, atq; Aetio ut epinyctis definitur, aptius (mea quidem sententia) $\epsilon\phi\eta\mu\epsilon\rho\iota\varsigma$
 & Aetium. hoc est. Latine diurnus, diarius'ue affectus nuncupari debet: quoniam ex bilioso cruore ge-
 $\epsilon\phi\eta\mu\epsilon\rho\iota\varsigma$. nerationem suscipiens, interdum frequentius, & acrius molestare hominem solet. Quamq; &
 Diurnus. hunc noctu interdum, ueluti, & epinyctidas nonnunq; die inuadere, ac uehementius torquere
 Diarius. posse inficias non ibimus. Dummodò affectum, ab eo, quod maxima ex parte euenit, denomi-
 nasse placuerit. Quod si refractaria nihilominus minerva eundem esse morbum, qui à Pau-
 lo, & Celsi definitur, contenderis: differre q; duntaxat humoris diuersitate. Adeo ut ab ini-
 tio statim suæ generationis pustula existens, abrupta mox ulcusculū resulet: id ipsum quoq;

circa principia fortassis subrubrū, in liuidum, aut nigrum deinde permutetur. Illud interim abnegare neutiq; potueris: eam, quæ à sanguine, uel bili, aut ex ijs misto humore facta pustula est, interdū magis: quæ uerò à pituita, uel atra bili, aut cōmixta ex his materia, genita sit, noctū potius hominem torquere. Quā etiam ob rem & Pollux in tibijs, & pedibus subliuen Quā partē ma
tes huiusmodi pustulas generari ait. quoniam. s. atrabilarius sanguis libentiū eò descēderet, gis affligat ea
q; ad superiora persultet. Cui porro sententiæ Cornelium Celsum aduersari offendimus. pinyctis.
Etenim de quibusdam antea pustulis ulcusculis ue loquens, dixerat. & Maximeq; id euenit in
„ ætate puerili: rarò in medio corpore, sepe in eminentibus partibus; eodem quoq; pacto de
„ epinyctide pustula, mox scribens, subdit. & Atq; hæc quoq; oritur in eminentibus partibus. et
10 ferè (q. d. maxima ex parte) noctū. etc. & Si ergo in eminentioribus partibus, supra medium
corpus aduenire huiusmodi tumor consueuerit: Non in tibijs, & pedibus contingere Pollu Cōtra Pollucē
cis opinione decernendum. Id quod proculdubio uerum, uti Celsus refert, maxima ex par
te opinor. Cum ex feruore quopiam, & humoris cuiuscunq; existentis quadam corruptione
huiusmodi pustula fiat. Cuius feruoris ratione sursum petere liquet. qua etiam de causa et
circa hanc uehemens inflammatio (Celso itidem referente): & dolor ex ea, supra magnitudi
dinem eius est. Vt hinc etiam quod præsertim disquirimus elucescat: calidum. s. non frigidū
epinyctida, omni semoto scrupulo, determinandū. Magisq; adhuc si Pauli, et Actij, à cruen Epinyctis cali
ta bili obortum epinyctida intellexerimus. Pollux uerò id quod rariū aduenerit, considerat: dus tumor.
inferiores inq; partes epinyctide uexatas. Vbi enim grauior, minusq; feruens atra bilis fuerit,
20 ac præcipue si ualidior Natura extiterit, cuius propriū munus est ad ignobiliores plurimū
partes demittere: Crura, tibijsq; & pedes tūc magis, q; supremas molestare partes offen
demus. Quam non adeò calidam, & pessimam in hisce locis, quemadmodum in superior
ribus experiemur. Paulus uerò, Aetiusq; nullam determinatē sedē nominantes: toti corpori
aduenire suas epinyctidas posse reputarunt. Verū hæc omnia leuissima sunt. Si quidem ad
Barbarorum confusionem referantur, Itaq; Græcorum pariter, & Latinorū epinyctidibus
omissis: ad Arabum esseras Pauli (ut uidetur) atq; Aetij epinyctidibus, pro parte, responden Effere Aras
tes conuertamur. In primis igitur Serapion^t duplicem esserarum speciem posuit, absq; ulla bum.
tamen (ob uulgarem fortassis morbi aduentum, ut unicuiq; notissimus per se ipsum affectus t s. Bren. cap. 8.
sit) definitione, Alteram ex sanguine cholerico factam declarauit: quam ex caliditate (ut
30 ait) complexionis infirmi cognoscere possumus, & acuitate ipsius tumoris, & ex rubedia
„ ne, quæ apparet in eo, & ex æstuatione eius in die secundum plurimum. Alteram uerò ex
„ phlegmate salso, albaurachi (hoc est nitroso) deinceps ostēdit: ex æstuatione. s. eius in nocte,
„ & paucitate rubedinis, quæ apparet in ea. Quarum primam (si speciale nomen quispiā ue
stigarit) ephemeridem, siue diurnam, aut diariam: Secundam uerò, epinyctidem siue no
cturnam uocare condecens est. Serapionis uerba Razes^u interdum exscripsit: quāuis unam u 25. cōm. c. 13
duntaxat speciem libris Diuisionum, & Almanforis^y curauerit: eam. s. quæ ex choleris x cap. 122
co sanguine generationem suscipit. utpote quæ frequentius aduenire conspicitur. Quibus in y lib. 5. cap. 29.
locis nil de huiusce affectus definitione tetigit, Libro autem Cōtinēte Hippocratis, Galeniq;
exanthemata, & epinyctidas, cum esseris confundit: Sic à primo statim exordio incipiēs In
40 primo capitulo libri Megategni dixit de uitio appellato, sera, filia noctis: eò q; sera excita
ta magis in nocte; intellige per megategni Methodum medēdi. Voluit autem id uelut bal
butiens

z cap. 2^o.

Razis locus.

butiens insinuare, quod 2^o. libro methodi^z de epinyctide legitur. Qua de re legēdum potius
 { In secūdo capitulo. etc. } sēpenumerō. n. capitulum pro libro accipere consuevit. Id quod uer-
 ba statim sequentia confirmant: quū subdit { In sexto capitulo dixit pruritus pustularum
 capitum acutorum uehementior sit. quia humor de quo fiunt, est calidior, & acutior. tamen
 capitum applanatorum alborum, erit minor: quia humor ipsorum est frigidior. } Quæ uerba

a aphor. 9^o.b cōmentario. 2^o
tex. & cōm. 29.

quis non apertè uidet ex libro sexto aphorismorum^a transcripta fuisse? quū Hippocrates
 ait. { Lata exanthemata non admodum pruriunt. } Quod si non sextum aphorismorum uo-
 lumen intellexisse per sextū capitulum libeat: sed de morbis uulgaribus sextū. Idem quoq;
 ab Hippocrate, Galenoq; ipsum enarrantē ibi perlegimus.^b Quū lata exanthemata (pustu-
 las Celsum imitati interpretes uertunt) non admodū pruriginosa esse ait, quales Simon hye
 me habebat. etc. Vides igitur quomodo epinyctidibus exanthemata, propriam (ut uidetur)

Cōtra Razē.

uocē ignorās Razes cōfundit. Deinceps aut post pauca Pauli epinyctidas commiscet, earūq;
 curationem, sic dicens { Paulus dixit: si accidit sera in nocte uehemens: dissolue assam fœti-
 dam in aqua. etc. } σίλφιον, Græci uocant, Latini la serpitum & la serem, corruptè autem
 Barbari assam appellant. Hinc ergo, quia Razes non Pauli modò epinyctidas, uerū & ip-
 sa quoq; Hippocratis exanthemata effere nomine, siue (ut ibi legitur) sera confusit. Cæcū
 ducem insequens Hali Abbās, ita serie definiuit (idem. n. uolunt effere, sera, serie, seria,
 uel quouis alio corrupto nomine protulerint) { Serie autem pustulæ sunt aliæ parue, aliæ
 magnæ extensæ, & lati capitis: quæ cum prurigine incipiunt magna. quæ cum scalpuntur,
 humiditas ab eis fluit rubiginosa. etc. } in qua quidem, si exquisitè perlibraris, definitione,
 tam exanthemata prædicta, q; Pauli epinyctis cōfunditur. Mox uerò Serapionis distinctio-
 nem prosequitur. quoniam. s. quæ ex cholerico sanguine ortum duxerunt, in die uehementius:
 quæ autem ex falso plegmate oriuntur, noctu magis molestare consueuerint. Hos igitur tā
 Græcos, q; Arabes cum legerit Auicenna, eadem auget potius q; diminuat confusionem. Si

d infra cap. 13.
tex p^o.e lib 4. cap. 9.
f lib. 14. cap. 61.

quis enim ab ipso^d datam esset definitionem, atq; unā Pauli, ^e Aetiūq; f pro epinyctide
 assignatam descriptionem exquisitiū perlibrari: Idem proculdubio Auicennam esset nos
 menclatura, quod illi epinyctida uocant, intellexisse q; primū denuntiauerit. Præsidiorum uerò
 mox utrobq; genere perpenso, aliud à Principe intentum reputabit. Cū ex ijs, quæ ad epis-
 nyctidas illi scripserunt, nullum assumpserit. quæ tamen haud secus ac ipsam definitionē ex-
 scripsisse opportunius fuerat. Verū à Raze, ac Serapione, atq; etiā Hali Abbate (ut loco

g ibidem. ca. 14.

deinceps proprio scrutabimur) & ferè singula transcripsit. Nostrā igitur in tam ardua con-
 fusione sententiam interseruisse certum est, quò manifestius rei ueritatem, atq; unā uulga-
 tas Arabum esset pernouerimus. Enimuerò quolibet abiecto scrupulo, firmiter tenemus
 Arabes quidem præscripto nomine eum affectum intelligere, quem nos in Sicilia uulgò di-
 cimus scotulum: nonnulli uerò pilum ceruinum appellant. Florentiæ (ut Niculus^h ait) ar-
 tetica ab idiotis uocatur. Quin communissima nostrorum omnium idiotarum cōparatione fa-
 bescere corpus dicimus Vulgò farse faue faue. Quippè tuberculis fabarum sēpenurò ma-
 gnitudine, paulo uē maioribus, aut minoribus uniuersum corpus quasi ex improviso non
 nunq; præcipueq; in æstate, circumuenitur. Perindè ac si à uestpis undiq; demorsus esset. uel
 sæuiori quauis urtica perfrictæ carnes eius extitissent. Quiquidem affectus ex biliosi sanz
 guinis feruore magna ex parte aduenire consuevit. Tuncq; (prout experimento quotidie

cernimus

h sermone. 7^o.
m. 5^o. summa p^a.
cap. 29.

cernimus) interdū frequentius hominem inuadit. Magisq; horam circiter unde uigesimam
 excruciat. Interdū uerò duodeuigesimam, aut etiam decimam septimam. Quo tempore tū
 præassumptus cibus in corpus distribui occeperit, tū diei calor & lumen uehementius præ-
 ualuerint. Fieri autem & talem affectum nitrosa ex pituita impossibile non est: huncq; noctū
 magis, q̄ luce ipsum ægrotantem affligere Serapion, ¹ eiusq; authoritati innixus Razes, ^{k i 5^o. Breu. cap. 8.}
 & Hali Abbas ^{k 25. cont. c. 18.} testes sunt. Princeps uerò phlegmaticæ uehementiā in noctū plus esse ait, ^{l 8^o. theoricæ}
^{m q̄ sit uehementia sanguineæ. Sed quia rarius ex pituita huiusmodi morbus fieri consue-}
 uit: Ideò priorem duntaxat Razes libris Diuisionum, ^{cap. 17.} & Almanforis, ^{m infra cap. 13} (ubi propria ma-
 gis ex opinione loquebatur) curare aggressus est, ueluti sæpius occurrentem. Quoniam li-
 bro, quem Cōtinentem uocat, ^{n cap. 122.!} ubi præter ordinem uarias authorum sententias refert, ambas
 ex Serapione recitat. Quinimò Iudei authoritate, quatuor humores, quatuorq; inde obor-
 tos efferarum modos ostendit. Eueniunt autem subito effere, præsertim cholericæ, atq; ter-
 tianam febrem patientibus, maximeq; continuam. Sæpiusculè autem ipsæmet febrem antece-
 dunt. quamobrem Princens quoq; ait. ^{q ibidē tex. 4.} 1. Cum effere (sic enim indeclinabiliter ait) inuadit
 locum amplum: tunc, si non fiat phlebotomia, timetur febris tertiana. Et oportet ut fiat phle-
 botomia in spacio, quod est inter initium. Efferas autem sæpissimè lassitudo phlegmonosa,
 uel ulcerosa præcedere solita est. Nullo tamen topico medicamento deleri, uel in memetipso
 febriente expertus sum. præter innumeros, quos quotidie sanatos conspeximus. At sola uenæ
 incisione, interaneaq; feruentis bilis, ac sanguinis facta, uel frigida copioso potu, uel cuiuspiā
 alterantis cremoris ui, refrigeratione. Quin interdū sanguinis duntaxat missione corpus adeò
 refrigerari periculum fecimus: ut extemplo detumuerit cutis, atq; ex aspera læuis euaserit.
 Qua de re in synonymis Serapionis ita scriptum legimus. ^{r litera S. i. prin.} 2. Sara, id est tumoribus, qui citò
 fiūt, et citò redeūt, & præcipuè cū aliquis se scalpit. Sæpè autē & bilis adhuc feruorē exci-
 tātis purgatio necessaria, pro tumorū quiete, fuit. Ad topica uerò peruenire nō nisi rarissimè
 opus fore occurrit. Quamobrem nec Serapio, nec Razes libro Diuisionū, & quinto ad Man-
 forem, ubi quæ sibi magis placuerunt, refert, Neq; etiam Princeps loco huius libri proprio, ^{s infra cap. 14.}
 locale quopiam in exterioribus admouendum medicamen declararunt. Extincto enim feruo-
 re, semotaq; illius causā, quamprimū defuerit sanguis, & frigesit tandem, atq; pristina
 corpus leuitatem, coloremq; recuperat. Sed ne pustulam quidem ullam, è qua uel sanguis, uel
 ichor, quæ uis alia humiditas emanarit, conspexisse nobis permissum aliquandò est. Per
 halitum nanq; sensui occultum diffantur. Cū uapores ad locum (ipso etiam Principe ac Ra-
 ze ^{20.} testibus) non humores acruentur. Adeò ut uaporosus tumor nūcupandus ueniat. Inde q;
 succedit tam subita tumoris tum generatio, tum resolutio. Sin autem id euenisse nonnunq; ab
 aliquo excedenter, ob acrem, sæuamq; pruriginem, acutis nimium unguibus scalpente uisum
 sit: Phænice quidem rarius id contigisse opinamur: tuncq; sculpturæ, non tumoris naturæ
 tale ulcus, indeq; fluens liquor referenda sunt. Aliud itaq; non modo epinyctidum uniuersa-
 liter ferè, ac perpetim, nocte magis (unde & nomen obtinuerunt) q; die molestantium pustu-
 larum uoce apud Celsum, Pollucēq; et Plinium intelligimus, q; sint Pauli, Aetiūq; ulcuscula
 phlyctænosa, epinyctidis quoq; nomenclatura ab ijs Græcis authoribus expressa: Verum &
 40 Serapionis efferas uaporosos quidē absq; ulcere tumores, diuersum ab utrisq; epinyctidibus
 affectum esse opinamur. ut qui præter id, quod ulceris, ac pustularum (q; tum ex se est) ex-
 pers

pers inuenitur: Interdū quoq; plurimum, noctū uerò rarissimè hominem excruciat. Ab illis er
 Cōtra Manar go tametsi doctissimis uiris omninò dissentimus, qui Græcorum pariter, atq; Latinorū epiny
 dū, et Tagaul tīdas cum esseris Serapionis, cæterorūq; Arabū confundunt. Cuius porro phantasiæ causa
 tium. fuit primò Razes in confusissimo illo chao quem continentem uocat. ^x Vbi Pauli epinytīdas,
^{x li. 25. cap. 18.} & Serapionis esseras pro uno eodemq; morbo accepit. Ex eo quidē fortasse deceptus: quo-
 Cōtra Razē. niam phlegmaticæ apud Serapionem ^y noctū magis hominem grassari leguntur: quamobrem
^{y 5.º. Brev. ca. 8.} non indecenter illis nomen id (epinytīs inq;) aptari potest. Hic igitur & generatim cunctis
 esseris conuenire censuit: Rursusq; nominis ratione deceptus Pauli epinytīdas idem cum es
 seris Arabum esse opinatus est. Quem deinde secutus, absq; ulla (uti fas erat) consideratio-
 ne, Princeps, à Paulo definitionē, ^z à Raze autem, Serapioneq; & Hali Abbate diuersa
^{z infra cap. 13.} præsidiorum genera transcripsit. ^a Oblitus interim quod à Serapione, illūq; æmulantibus
^{a ibidē cap. 14.} Contra Aui- Raze, atq; Hali Abbate præscriptum iam erat: quæ. s. ex cholerico sanguine genitæ sint, per
 cennam. diem frequentius inuadere, atq; inuadentes uehementius ægrotantem affligere. ut sub epiz
 nyctide comprehendi non debeant. Speculatione igitur digna morborum diuersorum à Raz
 ze prius, dein ab Auicēna facta commistio est: ut qui Græcorum simul, atq; Arabum libros
 coram se apertos retinentes, hinc, & inde (ut sibi offerebantur) plurima exscribebant. Nos
 autem loco proprio specialius, ac sigillatim cuncta perlibrabimus. Nunc uerò nostrum exez
 quamur propositum. Epinytīs ergo Pauli, & Aetij, quidnam sit, definita iam est. Itemq;
 Celsi epinytīs, cuiusmodi & à Polluce, et à Plinio intellectā esse rati sumus, descripta etiā,
 Dubitatio. ipsomet ex Celso, est. Dubium uerò interim haud negligendum occurrit. Etenim si Arabum
 (præcipueq; uetustioris inter eos, qui præ manibus nostris existunt, Serapionis) esseræ ad
 Pauli epinytīdes reduci nequeūt: Aut ergo nouū esse morbum, Græcis quidem authoribus
 ignotum proferre oportet: aut aliquem à Græcis definitum affectum inuenire necessum est,
 Responsio. ad quem reducēdus huiusmodi uaporosus tumor sit. Cui me hercule ambiguitati respondere
 cupientes, ad Græcorū exanthemata generatim capta, quæq; ulceris expertia sint, referendū
 rati fuimus q̄q; nullibi Galenū, aut alius quisuis Græcorū speciatim huiuscemodi affectū cu
 rauerit. De quibus quidem exanthematibus plura post hæc declaraturi sumus. Nunc autem
 ad epinytīdas reuertimur. Quas quidem non esseras, apud Arabes, præsertimq; Auicēnā,
 Cōtra Manar sed Benat noctis (quicquid Alij scripserint) uocatas esse arbitramur. Atq; idipsum à nomi
 dū, et Tagaul ne primitus indicatur. Etenim Benat noctis (uti bellunēsis ^b quoq; interpretatus est) sunt ea,
 tium. quæ mouentur, uel excitantur in nocte. Sed ne aliud quidem epinytīs Græcum nomen præ
 Benat noctis. sefert. Secundo ex modo generationis morbi à Principe descripto confirmatur, qui & idem
^{b in interpret.} proculdubio epinytīdarum est. In quo quanuis definitio non exprimitur. Colligi tamen po
^{Arabū nominū.} test, ut dicamus q̄ est Bothor, siue pustulæ paruæ, nocte aduenientes, & uehementius, prur
 ritu prius, deinde etiam uehementiori dolore, q̄ pro pustulæ ratione sit, excruciantes, ob fri
 goris cutem densantis, porosq; oppilantis aduentum, etc. Vbi autem dolorosus pruritus inest
 ac per hoc fortis frictio, scalpturāq; ab ægrotante fit: multas illarum pustularum rumpi ne
 cessum est, & ulcuscula oboriri. Adeò ut nil ad epinytīdis uel à Paulo datam definitionē
 deficiat. Præsertim si ex eruptis bothor, genitisq; ulcusculis quippiā defluerit. Haudqua
 uerò obstat, quod epinytīdis definitionem expressius de esseris loquens à Paulo uenatus sit.
 Quoniam perinde ac præscriptum iam est, propriam ibi uocem ignorasse, suo cum authore
 (quem

(quæ exscripsit) Raze apparuit. Efferas. n. ab epinyctidibus plurimum distare præostensum
 3. est. Præter hæc autem, quod maioris momenti est, id perpendendum uenit. quoniam quæ ad
 benat, siue (ut quidam uertunt) plânta noctis præsidiorû genera Princeps edocuit: epinycti
 dibus omnia conferre nulli dubium fuerit. quanq̃ ea non sunt, quæ Paulus, uel Aetius posuit:
 Quod si eadē pro utrisq; remedia disquisueris, neq; ullum à Paulo Aetioq; pro epinyctide
 præscriptum in Auicennæ dictis efferis inuenies. ut autē Benat manifestius cognouerimus:
 „ ipsius Principis uerba contemplemur: quum ait: *Si quis passus est densationem cutis, &* c 7^a fen. 4^a. u. 3
 „ oppilationem pororum, & bonitatem digestionis, quandoq; accidunt in frigore noctis pruriz
 cap. 10.
 „ tus, & asperitas, & bothor paruæ, quæ nominantur benat noctis. *In quibus quidem uer-*
 10 *bis non cutis tantum, pororumq; oppilationem huiusmodi affectus causam esse uoluit: quæ ob*
aeris superuenientem in nocte frige factionem fit: uerum & coctionis bonitatem in simul ad-
iunxit. Cuius ratione sanguis libenter ad extrema distribuitur. Fit uerò (uti iam liquet) ua-
lidior noctu, q̃ interdiu concoctio, indeq; alimenti distributio. Quicumq; igitur ob diurnam lu-
cem, calorem uel, & exercitia, superficalem ad partem tracti humores sint, superuenien-
te statim cutis (ob nocturnam simul frigiditatem, & quietem) densitate, ac pororum ob-
structione, retineri sub cuti, ac repente astringi cōsueuerunt. Id quod eò facilius aduenit, quò
densior cutis, propria ex creatione, fit. Quamobrem & ipsemet Princeps statim subdit: Et
 „ *causa est retentio eius, quod oportet ut resoluaetur, propter constrictionem ultimam in radice,*
 „ *seu creatione, quam adiuuat, & in qua addit soliditas frigoris, & propriè in hora, in qua mul-*
 20 *tuplicatur digestio. & sequitur multitudinem eius multitudo uaporis, & aer noctis. & pro-*
 „ *pter illud nominatur benat noctis, quia plurimum accidentium eius est in nocte. Et de disposi-*
 „ *tionibus huius passionis est, q̃ pruritus in ea fit uehemens, & delectat prius, deinde perducit*
 „ *ad dolores uehementes, quos efficit in locis pruritus. In quo Principis contextu deprauatam*
 esse literā circa principia existimo: etiam si Arabicus textus idem haberet: & pro uerbo **Auicenn. locus.**
 „ *desudationem* legendum fore, uti nos legimus *densationem* si quis uidelicet passus est
 densationem cutis. etc. De sudoribus. n. præcedenti capite locutus fuerat. *Quod si* **d cap. 8. & 9.**
 „ *densationem* legisse malueris: in idem profectò redibit. Nam præsudasse corpus supponit.
 Cuius ratione multæ crassiores partes, uel atræ quidem bilis, uel nitrosæ pituitæ, ad cutim cō
 motæ, exeunte interim sudore, pertrāsierint: ibiq; ob superueniens nocturnum frigus, cutim
 30 ipsam porosq; cōdensans, remansissent. Vt deinde prænarratū pruritum induxerint. Verum
 enim uerò haudquaq; ob id sequitur hunc affectum oīnò idem ipsi desudationi fore: quā Ara-
 bicè Princeps **hasef**, Græciq; (ut uidebimus) **ὕδρωα** nuncupant. Etenim benat noctis, post **Hasef.**
 sudorem, aut factam nutrimenti distributionem, superueniente, quæ resolutionem impediat, **ὕδρωα.**
 constrictione, fit: **hasef** autē sudamina uel, ipsimet sudores sunt proprio uitio, uel horū fæces cu
 ticulæ annexæ in ipso, etiā caloris tempore mordentes. Vltra quòd non adeò acris, moderāsque
 materia in ipso benat est. Vt potè quæ nisi ob noctis frigiditatem adstringeretur, magisque cor
 rumpèretur, non eroderet. Sudamina uerò siue **hasef** usque adeò ex se acria sunt: ut aquæ fri
 gidæ balneo, alijsq; tum refrigerantibus, tum humectantibus medicamentis, eorum quidem
 acrimoniam retundentibus occurrendum sit. Quamobrem (quia. sc. acerrima sudamina sunt)
 40 non ulcerare modò cōtingit: uerum incrementum mox intantum Princeps posse ait: ut nonnunq;
 ad finem maximum corruptionis affectam partem perduxerint. Quare erit cura eorum, cu- **e cap. 9. in fin.**
 eiusdem.
 ra

ra adustionis ignis. ex flaua. n. bili potius, uel aliquatenus affata fiunt. Mihi tamē magis arri-
 det legendum esse {densationem cutis} quemadmodum prædiximus. tibiq; similiter peregrina
 Sudamina qd. na mente singula perpendenti uidebitur. Sunt autem sudamina, Græcè ὑδρώα (Galeno f
 ὑδρώα. enarrante) ex genere exanthematum, in summa hærentium corporis cute, quæ ἐλκωδῶς. i.
 f 3^l. aphor. cō- ulcerosè cutem exasperant. Proueniunt autem (quemadmodum & ipsum ostendit nomen) 11
 mento. 21^o. propter multos sudores, qui uel biliosiores, uel omninò mordaciores existunt. Mordēt. n. hi cuz 11
 tem, & pruriginosam efficiunt, & ulcerosè exasperant.} De ijs ergo Hippocrate in apho- 11
 rismo intellexisse Galenus uoluit: quū inter affectus æstati familiares connumerauit. quanq; 11
 g lib. 2^o. cap. 7^o. non hæc Celsus, & at resoluentes hominem sudores aphorismi uerba enarrans, retulit. quos ta 11
 ante mediū. h 3^l. aphor. 6. men sudores ex alio potius aphorismo collegisse debuerimus, quū ait. b {quādo æstas fit ue 10
 i lib. 23. cap. 4. risimilis, sudores in febribus multos expectare oportet.} Hæc autem, quæ ὑδρώα ab Hippo 11
 ante mediū. Papulæ sudor- crate, & Galeno uocata prædiximus, à Plinio¹ papulas sudorum aliquandò nuncupari offen- 11
 rum. dimus: quū. s. de oleo lentiscino loquens, ait {utuntur eo & contra nimios sudores, papulasq; 11
 k supra fo. 138. sudorum. etc.} Appositè autem exanthemata sudorum, Plinius papulas sudorum Latine ap- 11
 l 25. Cōtin. c. 23. pellat, ut qui papularum uoce (quemadmodum & antea^k demonstrauiamus) calidiora, necnō 11
 & lib. 5. ad. Man acutiora exanthemata intelligit. Quæ igitur Græci ὑδρώα dicunt, nos Latine sudamina, & 11
 forē cap. 30. papulas sudorum nuncupare possumus. Razes¹ autem, atq; ipse etiam Auicenna^m asef, uel 11
 m 7^a. 4^l. tr. 3. c. cum articulo, alasef, siue basef, & alhasef, seu alhasaf. quin interdumⁿ asafati scriptum legi 11
 8^o. & 9^o. mus. Hali Abbas^o asefa, & asafa similiter habet. Quouis. n. nomine utaris, idē significat. E 11
 n ut lib. Diuif. 6. 123. quibus quidem illud quoq; confirmatur, quod supra p nos diximus, nomen. s. sabafati ab asef, 20
 o 8^l. theor. c. 17^o. siue asaf (iuxta Serapionis¹ sententiā) deriuari, quod sudorem significat. Inquit. n. in Conti 11
 & 4. cap. 3. nente^r Razes, Galeni (ut patet) uerba in commento aphorismi¹ iam iam præscripta¹ referens 11
 p fo. 172. {Ideò Græci appellant asaf: cum nomine deriuato à sudore} quasi asaf significet desudatio- 11
 q p^o. Breu. ca. 3. nem, siue sudamen à sudore deductum. Nos uulgò in Sicilia huiuscemodi affectum nominas 11
 r lib. 25. cap. 23. mus, Bruxoli, seu Brusoli, quia ueluti combustio quædam cutis apparet. Alij sunt qui uulga 11
 in principio. ri etiam idiomate in Italia cocturas appellāt: à coquendo similiter deducto nomine. ex ingens 11
 s 3^l. aphor. 21. t hic paulò antē. Brusoli. h. n. & quasi coquente calore fieri solent. Notissimus hercle affectus & pueris, & iuuenis 11
 Cocturæ. bus, præsertimq; temperamento calidioribus, & præter ordinem interdū, æstatis tempore 11
 u 7^a. 4^l. tr. 3. ca. toti potest corpori accidere. fiunt autem (Princeps^u ait) bothor spinosi: hoc est (ut in Arabi 30
 8. ante medium. corū nominū interpretatione Bellunenſis edocuit) qui habent extremitatem acutam, Itaq; iā 11
 esse non semel experti sumus, ut spinarum instar acutæ appareāt, & ipsos etiam patientes 11
 expungant. Mili tamē grano, circa initia, magnitudine per similes existunt. qua de re Nea 11
 Miglarinum. poli uulgares {miglarino:} quasi miliare, seu Miliarinū dicerent. quia. s. granis milij similes 11
 x lib. 5. cap. 28. pustulæ sint. Celsus^x uerò papularum uoce (uelut iam prædixisse² recolo) non exanthe- 11
 sec. 14. mata, sed Græcorū lichenas, Latine uerò à Plinio, Cæterisq; Romanis impetigines uocatas 11
 y supra fo. 137. intellexit. Nec sudamina (prout nonnulli uolunt) exanthematis nomine significauit. Cum sit 11
 138. milia ijs pustulis, quæ ex sudore nascuntur exanthemata dixerit. Quod aut simile est (quæ 11
 z supra fo. 138. admodum aliàs^z quoq; præassumpſimus) idem non est. Verum sub tali Græcorum nomen- 11
 clatura, tum uariolas uulgò dictas, tum ipsos quoq; morbillos comprehendisse autumo. Dicunt 40
 Variolæ unde tur. n. uariolæ à uaris, quibus similes, præsertimq; ab initio suæ generationis, sunt. Pustulas 11
 dicuntur. autem

autem uaris similes esse exanthemata Celsus posuit. Exquisitiuſ autem ſingula conſidera-
 „ bimus, ſi Celiſi uerba referemus: quſm ait.^a { Puſtulæ maximè uernis temporibus oriuntur. ^{a lib. 5. cap. 28.}
 „ Earum plura genera ſunt. Nam modò circa totũ corpus, partem uel aſpredo quædam ſit, ſi ^{ſec. 14.}
 „ milis his puſtulis, quæ ex urtica, uel ex ſudore naſcuntur: ἐξανθήματα Græci uocant: eaq;
 „ modò rubēt, modò colorē cutis nō excedūt nōnūq; plures, ſimiles uaris oriūtur: nōnūq; maiores
 „ puſtulæ, liuidæ, aut pallidæ, aut nigræ, aut aliter naturali colore mutato: Subeſtq; his humor.
 „ Vbi hæ ruptæ ſunt, infrā quaſi exulcerata caro apparet, ἑλκῶδες Græcè nominatur. ſiūt
 „ uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. } In qbus quidē uerbis, quadruplex eiſmo-
 di exanthematũ cauſa, pro quatuor ſuccorũ diuerſitate indicatur. In primis. n. ſanguis, aut fla-
 10 ua bilis, uel ex ambobus cōmiſta materia ſignificatur: quſm ait ἑαῖ; modò rubēt. } Mox uerò
 falſa nitroſa uel pituita oſtenditur: quſm ſubdit. { modò colorē cutis nō excedūt } deinceps uerò
 atrā bilim, atrabilarium uel ſanguinē, liuidæ, aut nigræ puſtulæ præſeferūt quēadmodũ palli-
 dæ bilim quoq; pallidā demonſtrāt. Quæ oēs, cū ex feruētibus ijs, putre factisq; humoribus gi-
 gnātur, in calidorũ numero proculdubio reponendæ ſunt. Nec temerè inter Græcorũ exāthe-
 mata, generatim nihilominus capta, cōnumerari poſſunt. VERVM enim uerò quoniā de exā-
 thematibus obiter hic meminimus, uariolisq; & morbillis, itemq; de uaris. Idcirco ut expediret
 20 tior, penitusq; oī reiecto ſcrupulo, maniſeſtus ſermo reddatur: De ijs quoq; hoc loci nōn nihil
 adiūgamus: Ab exanthematibus (quæ Hippocrates nōnūq; ^b ec̄thymata etiā nūcupaſſe uiſus
 eſt) exordiũ ſumētes. Dicūtur. n. ἐξανθήματα, ἐξανθήσις, et ἀνθήματα: q. d. Latine efflo-
 20 reſcētē, ſiue efflorationes: quoniā florũ inſtar, forās exiliūt. Dicitur aut, ἄνθος, Latine flos
 (unde ἀνθήμα, ἐξανθήμα, et ἐξανθήσις deriuatur), παρὰ τὸ ἄνω θέν, ἐν τῷ ἀνέσθαι, ἄνθος.
 quod eſt, quoniā ſurſum currit, acceleraſq; dū augetur. Sic itaq; tumores hi ſponte in cute aut
 iſpis etiā aliquandò uiſceribus effloreſcētēs, nō ſecūs ac plantarum gemmæ ad florē uergē-
 tes, tument: à craſſioribus quidē humoribus originem ducentes. Tenuēs. n. (uti Galenus^c ait)
 humores exulcerationem potius faciunt, q̄ tumorem: (fortaſſisq; per inſenſibile halitũ diſcu-
 tiuntur) craſſi uerò in tumorē cutim extollunt. Craſſos intellige, qui nō adeò tenuēs ſunt, ut hi
 qui erodunt, ulcerantq; aut per halitum digerūtur: haudquaḡ; uerò propter hoc frigidos, craſ-
 ſiſſimos uel: ut pituitam, uel humorem melancholicũ obaudias: niſi eos tātũ, q̄ pruritus quoq;
 cauſæ ſiunt: ut falſam, nitroſam uel pituitam, ſanguinē uel atrabilarium, uel bilioſum, aut ipſam
 30 quoq; craſſiuſculam, & quadantenus aduſtam bilim: aut fortaiſſis atram aliquandò bilim intel-
 ligere debemus: adiuuante intereā primā expulſionis cauſam, uirtutem inq; expultricem, ſan-
 guinis feruore, quemadmodum in uariolis, ac morbillis, conſpicuũ eſt. quæ exanthematũ quæ-
 dā ſpecies ſunt. Hippocrates^d eadē (ueluti prætaḡtũ iā eſt.) quæ alibi exanthemata prædixe-
 rat, ^e ἐκθύματα, q. d. impetuoſas, feruidasq; eruptiōes, παρὰ τὸ ἐκθύνειν, ὅτι ἐστὶ ἐξορμαίν, ^f
 (uti Galenus ^f idem ait) quod eſt, ab impetuoſè erumpēdo, nūcupaſſe uidetur. Quāuis nō-
 nulli differre ab exanthematibus ec̄thymata, proprio potius marte, quā ullius authorita-
 te fulciti dixerint. Horũ ut dixi quædā ſpēs ſunt uariolæ, ac morbilli uulgò nōiati: quoniā. ſ. nō
 ad aliũ ab antiquoribus præſinitũ tumorē, q̄ ad exanthemata, ſiue ec̄thymata, appoſitè reduci Variolæ &
 poſſūt. Quāq; aliqua ex parte nouos eē morbos, uel nō adeò ueteribus Græcis, aut Romanis morbilli mor-
 40 medicis cognitos apparet. Etenim longè diſtinctiũs deſcripſiſſent: Pluresq; ſi non omnes, diſ-
 ferētias, quas uel mulierculæ indies conſpiciunt, annotaſſent. Curamq; deinceps & propriā noui ſunt.

Q eius

^b 3^o. de morbis
uulg. cōmētario
3^o. tex. 51.

Ec̄thymata.

ἐξανθήματα.

ἀνθήματα.

ἀνθος.

^c ibidē in cōm.

colligiturq; lib. de

tum. præi. nat. 10

^d 3^o. epidem. ſec.

3. tex. 51.

^e 3^o. de morbis

uulg. cōmētario

3. tex. 19.

^f 3^o. de morbis

uulg. cōmētario

3^o. cō. 51. i prim^o.

Cōtra Ferne

eius methodum minimè postergassent. Qua proculdubio distincta, & affectui peculiari, iam indigere, quotidiano quidem experimèto, pernouimus. Cur. n. Hippocrates in puerilium morborum albo affectum nullo minùs familiarem puerilis non recensuisset: & siquidem huius naturā exquisitiùs nouerit. Quauis etiam inter uerni temporis morbos ἐξανθήσεις ἐλκιδες, idest efflorescentiæ, siue (uti Celsus Latinè conuertit) pustulæ ulcerosæ ab Hippocrate^b cōnumeratæ sint: Haudquaquā tamen ob id uariolas magis, q̃ morbillos, aut potius hæc, q̃ aliam quā uis ulcerosam pustulam, efflorescentiam^u ue intelligere cogimur. Quæadmodū et si in epidemijs, uel ethymata, ¹ uel exasperationes miliaceas, culicumq; morribus maximè similes, ^k aut exanthefies, uel exanthemata ^l protulit: nihilominus tamen uariolas, morbillos^{ue}, satis confusè, atq; imperfectè definitos intelligemus. Quòd si nonnunq; distinctiùs, ¹⁰ ac specialius, exanthemata descripsit, ^l dicens ἐξανθήματα ἐρυθρὰ, ὑπογύλα, σμυκτὰ, ὀϊον ἰόνθον, quod est pustulæ siue efflorescetiæ rubræ, rotundæ, paruæ, uaris similes, in quibus uerbis uariolas descripsisse, aut (si mauis) ipsos morbillos apparet. Verū tamen uti rem aliquandò contingentem definit, Galenusq; sic etiam in cōmento, & medendi libro^b pertransit: Non, uti nos quotidie cernimus, homini familiariissimū, atq; (ut multis ex Arabibus uisum est) ab ortu naturæ congenitum. Quem profectò Arabes, præsertimq; inter eos Auicenna, & proprijs inditijs depinxerunt, & exquisitè (ut potuerunt) curare enixi sunt. Epidemius. n. affectus uterq; sæpenuerò est, tam. s. uariola, q̃ morbillus: quin, ut postea uidebimus, rossalia, & ab aeris dubio procul omni continentis uenenosa quapiam cœlitus induta qualitate commotus. Intrinsicam nihilominus affecti corporis dispositionem, ob remanentem quandam menstrui sanguinis, quo infans genitus: nutritusq; est, aut lactis etiam infectio-

tem, potissimam eiusmodi morbi causam esse, unā cum Arabibus, teneo. Id quod multæ mercule coniecturæ persuadent. Ac maximè. Cū uideamus aded cuius destinatum esse: ut si puerulus adhuc existens passus non sit: Iuuenis tandem, aut etiam senex, modò ualida expultrix facultas remanserit, afficiendus ueniat. Quòd si adamussim plurima exanthematum copia expurgatum corpus sit: Rursus non afficitur. Sin uerò paucis id genus pustulis emundatū exquisitè non fuerit: iterū & secundò (q̃uis rarò) quinetiam & tertio (q̃q; rarissimè) corripit ab eodem morbo corpus experimento comprobauius. Cumq; uariarum materierū, ac diuersæ qualitatis, pro diuersa exanthematum specie, mundificatio fieri soleat: diuersi quoq; affectus generari contingit. Variolæ. n. crassiora, & quidem sanguinea recremēta. ³⁰

Morbilli. Morbilli autem (quas etiam blaccias Rasis interpres, ^m nuncupat) biliosa, uel sanguineis, aut pituitosis admista expurgant. Præter quas ambas species, & alias adhuc duas passim aduenire conspeximus. quarum alteram nostri uulgò Rossianam, siue Rossaliam uocant. alteram uerò Crystallinos. quoniam scilicet in hac quædam per uniuersum corpus dispersæ pustulæ efflorescunt, lupini magnitudine, plus minus^{ue}, albæ, ac instar crystalli resplendentes: quibus deinde apertis, aquositas quædā effluere uisa est. Alteram uerò idcirco rossianam nuncupāt: quoniam maculæ per uniuersum corpus plurimæ magnæ, ac paruæ, ignitæ, ac rubræ, cum uix effatu digno tumore, instar multa seorsum distincta erysipelati, dispersæ sunt: ut totum corpus ignitum appareat. Vtrunq; horum uulgares, ut eiusdem generationis cum Crystalli qd. uariolis, ac morbillis existimant. Verū crystallos non aliud, quā phlyctenas, bul-

las^{ue} (Auicennaⁿ uesicas nuncupat) esse opinor. de quibus postea sermo fiet. Quod autem

g li. 3^o. aphoris
ab aphorismo. 24
inde.

b lib. eodē apho
rismo. 20.

i lib. 3. cōmētaz
rio. 3. text. 51.

k ut lib. 2^o. 17^{pe}
state. 3^a. post prin
cipia, et lib. 5.

l ut lib. p^o. eiusdē
cōmētario 3. text.
19.

b lib. 5^o. metho-
d. cap. 12.

Variolæ.

Morbilli.

Blaccias.

Rossalia.

Crystalli

m 18. Contin. ca.
3. litera. 3.

Crystalli qd.

n 3^a. 4^a. tr. p^o. ca.
11. & 12.

40

autem nonnulli aiunt, morbillos ab Hippocrate sub herpetis nomine comprehensos: quum scilicet ait, ^r & Herpetes multi magni & satis nouum, & ab Hippocratis mente alienum opinamur. Herpetes. n. intelligimus, in proprio à Galeno semper definito significato, ulcera serpentia, præsertimq; esthiomenos: atq; hos magnos cum Galeno etiam in cōmmento audimus, uel quia magnum occupabant locum, quia plurimū. s. extendebantur: uel quia cum maligna cōtingebant erosione. quorum utrunq; humoris efficientis uitio contingere palam est. Nonnulli cunctas eiusmodi affectiones, quas ad exāthemata reduximus, pestilicias uocant. At Neapoli solas rubras, ac lenticulares quasdam absq; tumore maculas, quæ in pestiferis, ac malignis febribus repente nōnunq; per uniuersum corpus dispersæ apparere solent, pestilicias uocāt, nomē haud temerē à peste deducētes. Tres igitur dūtaxat eius esse naturæ opinor: ut sanguinis mēstrui quāddā occultā infectionē insequatur: Variolas. s. morbillos, et quā nuper à uulgaribus rossaliā, siue rossaniā uocari prædiximus. Quorū quidē affectuū duos tantū primos Auic. plurimiq; Arabes expresse definierunt. Rossaniā uerò ab illis descriptam nō offendimus. ni sub dictione. ¹ Alhamica ² ipsam cōprehēderimus, ut ego cōprehēdendā opinor. Est. n. Alhamica (Auicēna^o definiente) siue, ut antiquus codex habebat, Alhumera, aliquid de uario lis, & morbillis, hoc est, ex genere uariolarum, et morbillorum. & est saluior ambobus. quæ definitio (ut expertis liquet) uulgò dictæ rossaniæ congruit. Hali Abbas ¹ uerò solus hanc speciem distinctē definisse apparet, sub nomine rubeolæ, morbillos interim sub uariolæ nomine cōprehendens. qui sic ait. ² & in rubore, species est aliqua, quæ uocatur rubeola, quæ ex sanguine fit calido & subtili, & non multū malo, & hæc species, cū ad statum peruenerit, si milis fit milij granis, aut paulò maior, et eius color rubeus, nec aperiūtur pustulæ. sed fluūt; id est resoluuntur. Serapio ¹ sub nomine uariolæ cūctas species cōprehēdit. Dicitur autem ab Auicēna^o etiā morbillus, uariola. Razes aut morbillos interdū² aliquando uerò³ blaccias uocat. Abenzoar, ⁴ & Auerrhoes⁵ uariolas, & morbillos distinctē, ut Aui. uocarunt. Itaq; sic solent hi tres affectus unicuiq; aduenire. ut cū uehementius febricitent pueri, uel infantes, non medici modò, sed ipsæ etiā expertæ mulieres aliquē horū futurū pertimeāt. Præsertimq; in æstate, ac multò magis si exuperās in urbe quæpiam species ex ijs sit. Nec decipiuntur postea: sed ita, ut timebāt, sæpissimè successit. Quinimodò, quod maioris momenti est, si puer quidem febriens uariolas antea passus sit: non eas, at morbillos expectant. Quod si utrunq; horū præcesserit, iam rossaliā timent. Præsentī autem animo permanent, nil horum formidantes: cū omnes iam species expertus antea puerulus fuerit. Rarissimèq; falsæ sunt. quia. s. bis aut ter eandē morbi speciem repatiantur. Idipsum uerò maxima ex parte obseruatum à nonnullis est: ut uariolæ morbillos præcedant, ac demum rossalia, siue rubeola adueniat. Prius. n. crassiorē sanguinē natura expurgat, dein uerò bilim sanguini tamē adhuc mistā. & deniq; puriorē bilim, sanguinēq; nō adedò impurū eijcit: nō secus ac in cæteris etiā expurgationibus cōtingit. ut. s. quod secūdo feruore reijcitur tenuius, ac minùs recremētosū sit. Quāq; nonnulli sunt qui morbillos idē cū rossalia esse existimāt. Nos autē sæpissē distinctos esse affectus, nostris met oculis, nō aliorū dūtaxat relationi confidentes, inspeximus: Ultra id quod tūm ex Principe, tūm ex Hali Abbate prædictū est. Nec solum cuti, sed uisceribus etiam oculisq; & auribus, ac demum (ut uno uerbo me expediā) toti corpori efflorescere singulæ species uisæ sunt. Quāq; morbilli racematim (ut ita dixerim) uenire solent. qbusdā. s. per interualla par-

Q ij tibus

Contra Mas-
nardū, & Ta
gaulium.

r 3^o. de morb.
uulga. cōmētac-
rio. 3. xx. 52.

Alhamica.

Alhumera.

o p^o. 4. l. 4. ca.
6. circa finē.

Rubeola.

p 3^o. theoricæ. 2.
14. 2. 4. præctis
ca cap. p^o.

q 5. Bren. ca. 22.
r p^o. 4. l. 4. ca. 6
& 9.

s ut lib. diuisionū
cap. 159. 27. 10.
ad Almanfo. 18.
t lib. Cōti. 18. ca.
8. litera M.

u 2. theysir tr. 7
cap. 3. in prin^o.

x 3. colliget capz
8. in fine.

Cōtra Gētilē
et Nicolū.

tibus accruati: Variolæ autem non secus ac stellæ tum dispersæ singulatim per se, tum alicubi etiam aggregatæ adueniunt, profundiusque interim occupantes id quod causæ cicatrices post sanitatem ostendunt. Quibus porro uariolis diruptis, atque in crustas denique resolutis, tanta corporis fixitas, grauissimisque foetor inde succedit, ut ægrotantem sui quoque uel necessariissimi auer sentur. Nil enim turpius hoc spectaculo ad deterredos pueros excogitari potest. Quæ quidem symptomata, ueluti et alia quæ plurima, proprio loco uberius enucleanda, nullus Græcorum, quem uiderimus, aut Romanorum antiquorum expressit. Quæobrem uel prioribus illis seculis incognitis cognitas tres exanthematum species, uel ob exquisitiorem uictus rationem, maioremque in tuentia uariolæ da uale tudine diligentia, rarissime contingentes decernendum, qua de causa ut symptomata pomorbilli, et tuis pestilentialium exitiosarum uel febrium, quæ ut in proprio per se capite reponendas, propriamque curationem efflagitantes, affectiones reputarunt. Nostro autem æuo, tum ob uitiosissimam uictus rationem, tum fortassis ob occultam quampiam de cælo, stellisque influentem, nostrisque corporibus inductam aliquando qualitatem, indeque spermati, ac menstruo potius sanguini communi nica tam, notissimus hic morbus, et cuilibet ferè homini, uel in ipsa infantia ætate, uel in seculo frequenter ætatibus, proprius familiarisque, et quasi ab ortu nature destinatus, redditus est. Quomodo alios quoque priscis ignotos affectus habemus, ipsique ueteres multos cognouerunt nostra ætate penitus aboletos: perinde ac infra demonstrabimus. Fiunt autem (ueluti prædiximus ex feruenti sanguine uariolæ, ex bili morbilli, et rossaliæ, quæ uis et nonnihil sanguinis bili admistum quoque hic (et in ipsis præcipue morbillis) sit, Quæobrem calidos esse affectus calidi affectus nulli dubium fore opinamur. Cum non calidus tantum eos generans humor sit, sed et ob feruorem excitatus, quo feruore ipsius à natura expurgatio fiat. Qua de re feruidus humor effectus est. Quem quidem feruorem non intrinsecam solum uitiosa qualitas, sed ambientis quoque aeris calor, aut uitium, uel deprauatum regimen, adiuncto expultricis facultatis robore, concitare solet. Verum de his plura loco deinceps proprio disputabuntur. **NON** autem An ex menstrui digredi quadantenus placuit. Ne quispiam, antequam ad proprium caput de uariolis, et morbilli sanguinis perueniamus, anceps, indeque sollicitus remanserit, quoniam ex menstrui sanguinis, aut semine uitio hi morbi nis etiam, infectione huiusmodi morbos prouenire prædiximus. Id quod multis nonnulli per suasionibus reijcere conati sunt: ad commune potius, abditamque quandam causam toti aeri conpositio Ferne speram huius morbi originem referentes. Futile igitur minime fuerit horum coniecturas hic li. obiter pro uiribus enodare. In primis ergo sic arguunt. Ex ea ipsa causa mulieres, quibus **RO** prima suppressi menses in omne corpus redundant, iisdem malis obnoxie iacerent, quod tamen rarum uideas. Secundo Galeni sententiam redarguit, quæ asseuerat foetum in utero non de foetore illo sanguine menstruo, sed de materni purissima portione alimentum capeffere. Tertiò. neque si quid menstrui sanguinis foetui cadit in alimentum, id tandiu potest per multas febres, per multos morbos superatos, in annum ætatis trigésimum, aut quadragésimum perdurare, qua nos ætate non paucos uidimus hisce exanthematis grauissime conflitari, alios occumbere. **4**. Adde et quarto unumquemque his aliquando in uita necessario conflitari debere. Et neminem denique his posse secundo, aut tertiò prehendi. Quorum utrumque manifestè falsum animaduertimus. Hæc sunt quæ nonnullos ex recentioribus etiam Latinis oppositam suslinere sententiam induxerunt. Quibus quidem et sexta poterit ratio adiungi quoniam sanguis **40** menstruus in substantiam membrorum pueri conuersus est. Membra uero illa feruere nequeunt.

Ex

Ex illo igitur menstrui residuo non fiunt. Septimò adhuc firmari potest. quoniam si ab in-
 teriori causa originem hic morbus nancisceretur, q̄ primùm in lucē æditus infans est, feruor
 concitaretur. Quòd si exterior etiā causa necessaria est, ut feruens aeris constitutio, uel de-
 prauatus uictus: Cur ijs existentibus, non semper, neq; oībus egrediuntur: hyeme autē, atq;
 ordinato & irreprehensibili regimine utentibus interdum adueniunt? Octauò rursus, et præ
 dictis fortasse ualidiùs quod dicitur comprobari potest. Quoniā Hippocratis ætate, atq; ante
 ipsum quoq; à mundi prima origine, exceptis Adamo, et Eua protoplastis, ac primis nostris
 parentibus, reliqui oēs hoīes è menstruo sanguine, ac uirili semine formati sunt. Itaq; primus
 oīum natura morbus hic fuisset: uetustissimiq; non secus ac hodierno tempore conspiciamus,
 10 notissimus affectus, & eiusdem sanatio foret. Cuius tamen oppositum iam iam præscriptum
 est. Præter hæc autem & Nonò sic arguere possumus. quoniam infectio contracta ex con-
 ceptione fœtus, tempore menstruationis, cuius ratione leprosus secundū Arabes, elephantiz-
 cus uel homo euadit, deterior est, q̄ ea, quæ in sanguine fœtum nutriente infectio cōsistit. Sed
 illa non ad eò citò demonstratur: nisi ut Azaraius inquit: Si aliq; concipiatur prima die, qua
 mulier incepit mēstruari: fiet leprosus duodecimo anno, et antè (hoc est à primo usq; ad duo-
 decimum.) Et si concipiatur in secunda die, fit leprosus in anno decimotertio, uel usq; ad uige-
 simum quintum. Et si concipiatur tertia die: fiet leprosus à uigesimo sexto anno usq; ad trige-
 simū sextum. Et si die quarta menstruationis suæ: fiet leprosus à trigésimo septimo usq; ad
 20 quadragesimum octauū annū. Si ergo naturalius, ac opportunius conceptionis tēpus, cessan-
 tibus mensibus (Hippocrate, & atq; Aristotele² docentibus) est: Quauis & incipientibus
 30 ijsdem, naturalis quoq; nonnūq; fieri (uel Galeno teste⁴) queat: Eorum qui abeuntibus mē-
 bus geniti sunt, uariolæ, ac morbilli, ultra quinquagesimum annū egrederentur. Id quod ma-
 xima ex parte contingeret. Quod tempus tantò diuturnius fuerit, quantò post quartum men-
 struationis diē tardior conceptio facta sit. Contra uerò, eorū, qui aduenientibus mensibus cō-
 cepti sint, exanthemata, usq; ad eò accelerarent: ut magis dū in utero adhuc embrio persistit,
 eū iuaderet, q̄ postea, qum ab aere tū frige facta tū assiccata cutis durior reddita est. Quorū
 profectò nullū conspiciamus. frequentissimè. n. infantibus morbi huiusmodi cōtingūt: deinceps
 uerò ad septimū usq; annū. Eoq; rariùs, quò maior natu febris extiterit. Decimò seque-
 tur, q̄ equi, & boues, cæteraq; animalia uiuipara, quæ mēstruari magis minus uel solita sunt,
 30 ut Aristoteles^b testatur, non secus atq; homines præscriptis exanthematibus uexarentur.
 Deniq; id ipsum quod propositum est, astruere possumus, quoniā si ex menstrui sanguinis em-
 brionē nutrientis uitio, nec ambientis aeris maligno feruore huiusmodi affectus fierent, fe-
 bris necessaria non esset, ac feruor. Sed quemadmodum aliæ quoq; pustulæ, ac lepra, & scar-
 bies, expultricis facultatis uitiosos humores ad exteriora eijcientis ratione, absq; ulla fe-
 bre, aut feruore, siue ebullitione aduenirent. Hæc sunt, & alia parū ab ijs differentia ar-
 gumenta, quibus fulciri posset, qui à menstrui sanguinis uitio primā suæ generationis originē
 sumpsisse uariolas, & morbillos, atq; ipsam quoq; rossianam, inficias ire decreuerit. Verū
 enim uerò quia non penitus contēnendi uiri eam tuentur sententiam. quoniam scilicet ex men-
 strui sanguinis residuo talis infectio facta sit: eaq; potissimū ratione astruunt, quia nullus
 40 ferè ab ijs liber, immunisq; est, nisi morte præreptus fuerit. Quamobrem appositè (ut mihi
 hi uidetur) Auerrhoes^c inquit. Et etiam fiunt ex hac (.s. expultrice facultate) uariolæ,
 Q iij &

y libro de fetus
 natura post prin.
 z 7. de histo. ani
 maliū cap. 2.
 a lib. de diffec.
 uteri uersus finē

10.
 b 61. de histo.
 animalium. 18. post.
 mediū & 71. e.
 iusdem. 20. post
 medium.

Deter°. cōtra
 Fernellium.

c 30. colliget. ca.
 8. in fine.

& morbilli. & propterea quia nullus euadit ab ijs duobus, nisi habeat hæc. Et non potest di-
 ci qd fiant à causis extrinsecis: quia illæ non sunt necessariae in omni homine. & ista ægritudo
 do est sicuti naturalis: & propter hoc dicitur, qd hæc ægritudo prouenit à mala materia fixa
 in cibo embrionis. etc. Id quod à Principe prius dictum quoq; est, ijs uerbis dicitur: Et de hoc est,
 cuius causa est res quasi naturalis, faciens ebullitionem sanguinis: ut expellatur ab eo illud,
 quod admiscetur ei de reliquijs nutrimenti sui menstrualis, quod erat in hora impregnationis. &
 Atq; id ipsum clarius Abenxoar exponit, dicens. Et accidunt quidem in hominibus uariolæ,
 & morbilli: ita generaliter, qd pauci, uel nulli reperiuntur, quibus non eueniāt. Et materia ha-
 rum passionū est sanguis corruptus, & malus menstrualis, ex quo embrio in utero matris per
 umbilicum nutritur, & augmētatur. Cum autem post natiuitatem natus incipit inualescere,
 & fortificari, natura confortata expellit hūc humorem malum, & corruptum ad exteriora:
 Et quū mouetur natura ad hanc expulsionem faciendam, excitatur pro maiori parte febris
 ualida: & aliquandō cum ea fit alienatio. etc. Hali Abbas f autem non in sanguine tantum,
 ex quo tū genitus, tū nutritus embrio sit, uerū & in lacte, quod itidem ex eodem men-
 struo sanguine ad mammas regurgitante, ibiq; recocto fit, huiusmodi latens uitium consi-
 derauit. ex quo mox lacte ab ortu infans nutritur. Oportuit ergo naturam aliquandō roboratam,
 & ab exterioribus causis excitatam, quod infectum paulatim huiusmodi uitio sit, extra-
 pellere. Id quod siquidem exquisitè robusta expultrix est, decenter, atq; optatō succedit, ut
 crisi quidem facta, expurgatōq; admissim corpore, salubrior deinde homo euadat. Sin uerō
 uel nimius feruor adueniat, uel diminutē, aut superflue corpus euacuetur: ad mortem aliquan-
 dō, uel ad insalubriorem statum conuerti nonnunq; solet. Est autem eorum motus (inquit idem
 Hali Abbas) uel ab exterioribus, nāc. s. assistentibus causis, ut pestilenti aere, uel aliorum
 propinquitate, qui uariolas patiuntur, morbillos uel ita & rubeolam. Aded ut eorum anhelis-
 tu alter inficiatur. Adde si nimium feruens cœli status sit, uel alia quæpiam abdita, cœlitusq;
 influens, & aeri communicata malitia. Hæc. n. intrinsecos humores iam dispositos, & præ-
 narrato uitio infectos exagitant. Præter hæc autem & præcedens uictus, calidos, feruorq;
 promptos succos aggregans, atq; uitiosos, huiusmodi ebullitionis, et exagitationis causa fie-
 ri, uel in hyeme optima uel quauis aeris constitutione, fieri potest. Princeps autem conside-
 rans fortasse quoniam Serapio, ac Razes ad humorum potius ab ortu genitorum, ac sensim
 aceruatorum in uenis uitium, uel ad aeris malignam pestilentem uel qualitatem hanc ebullitio-
 nem, & exanthematum egressum referunt: nullam de menstrui sanguinis malitia mentionē
 facientes. Ex alio tamen latere Hali Abbas, Isaac, & Abenxoar ad menstrui prauitatem, ac
 uitiosam qualitatem redducunt: deprauatum uerō regimen, atq; aeris infectionem, excitantia
 feruorē aiunt: Vtranq; uisus est causam acceptasse. Ut. s. nonnunq; hæc, nonnunq; uerō illa pra-
 uitatis humorum causa sit. Quamobrem prædicta naturali causa, ob menstrui sanguinis resi-
 duum, alteram innuit, subdens. Aut generatur in ea post illud ex cibis fœculentis. etc. in
 quibus uerbis ciborum, è quibus geniti humores sunt, uitium publicat. Aeris uerō qualitatem
 postea subdit, dicens: & de hoc est, cuius causa est res extrinsecus adueniēs, ebullire faciēs,
 occulta siue (ut alia habet litera) spargens quæ permiscet humores cū sanguine etc. Aded
 ut, si mauis tres dicere uarias ebullitionis causas, unā cum ipso Arabū Principe queas. Quaz-
 rum porrō Prima, quæ ad menstrui qualitatem refertur, & Secunda, quæ ad succorum ex ma-
 lo

lo regimine ortorum prauitatem reducitur, quodammodo naturales sunt. Vbi. s. natura no-
xios humores expurgare conatur. Tertia uerò quæ. s. ab exterioribus tantum causis ortum
habuerit præternaturalis omninò est, & quæ maxima ex parte ruinam, non secus ac pestis
minatur. Verùm de his omnibus, proprio mox capite, uberiùs loquemur. Nunc autem ad id
quod propositum est reuertamur, Principis sententiam ut magis à contradictione remotā su-
stinentes. Vt neq; ob menstrui uitium semper aduenire cum Abenxoare, Hali Abbate, atq; tertia iter alios
Auerrhoë determinemus: Neq; ob uictus uel aeris uitium duntaxat fieri ex Serapione, ac Arabes me-
Raze colligamus. Verùm fieri maxima ex parte ob menstrui qualitatem: nonnunq; uerò & lior.
ex aeris infectione, uel succorum uitio, præter ullum menstrui uitium decernimus. Haud. n. Nota pro A-
10 tantorum philosophorum, ut Auicennæ, atq; Auerrois: nedum medicorum, ut Abenxoaris, rabibus.
Hali Abbatis, & Isaac sententia penitus negligenda: quia. s. Arabes sunt. Cùm non æquè om-
nes condemnandum fore Aristoteles præceperit: sed uidendam esse rationem uoluerit, qua
mouentur. Nam ubi quidem Barbari, quicunq; sint, uel Hippocratis uel Galeni, aut alterius
cuiusuis Græci authoris mentem enarrantes, rem acu non tetigerint, sed dissonè recitarint:
proculdubio tanq; dissoni recitatores, ac mendaces reprehendendi ueniunt. Vbi autem uel il-
lis aduersari decreuerint, uel (ut hic habemus) rem nouam contemplati sint: non (prout ali-
qui temerariè obseruant) liuore præ oculis inducò, condemnandi sunt, quia. s. Græci talem
sententiam non scripserint. Itaq; ad rationes in appositum factas cōuertamur: singulasq; eo-
dem, quo propostæ sunt, ordine soluamus. Ad primum ergo dicendum simile non esse de mus-
20 lieribus, quibus quidem suppressi menses fuerint. Etenim quicquid uitio menstrui, à genera-
tionis initio, atq; etiam lactis, diuturni quidem nutrimenti, contingit, aut inseparabile penitus
est, aut nō sine maxima difficultate secerni pōt. Quinimò nec reiici unq; possibile foret: nisi
ab ipso statim initio naturæ molestū fuerit. Adeò ut tunc euestigò si fortis natura extitisset,
illud proculdubio secreuisset. quemadmodum in salubribus simpliciter semper corporibus, ut
tēperatissimis contingere opinamur. Ea igitur cōditione, ac pacto, eius interim prauitatis mi-
nimè oblita, suslulit: ut quamprimùm occasione sibi, atq; extrinseco nonnunq; refugio succe-
dente, reiiceret. Quemadmodum in simpliciter dictis tertij significati neutris etiam cōtingit:
ut à generationis quoq; primordijs elephantici, uel hæreditarij podagrici, atq; alij, qui à gene-
ratione prima intermediam quandam naturalem potentiam sortiti sunt, ut in adolescentia salu-
30 bres, in sequentibus uerò ætati bus insalubres, uel contrā, uitam degerēt. His de causis non si-
ne maximo (ut diximus) labore, ac difficultate secerni tale uitium potest. Idcirco uehemens
feruor, indeq; sæuissima symptomata contingunt. Adeò ut plurimi etiam in tali pugna, supe-
rata demum natura, uitam cum morte commutarint. In mulieribus uerò ipsis adultis, quibus
suppressi menses fuerint, quia non à generationis initio, nec in membrorum substantia commi-
sta uitiosa qualitas est, at in uenis retenti humores, ad caput, & alias quoq; partes euaporatio-
nem, fumosq; transmittunt, uaria symptomata, uariosq; morbos producentes: facilius à natu-
ra, & absq; feruore, uel ad cutim, uel ad aliam quam uis partem eijciuntur, uel abscessus ibi
genituri, aut quēpiam ex alijs tumoribus præter naturam, uel fortassis per insensibilem hæ-
litum, aut aliquem manifestæ uacuationis modum expurgandi. Quin & si quēpiā illius men-
40 strui, uitiosi q; sanguinis portio, nutrimenti uice, in membrorum substantiam permutata fue-
rit: Cùm non à primordijs generationis infixæ, atq; exquisitissimè commixta sit (quemadmo-
dum

Ad argumen-
ta in oppositū
Ad p^m.

i 2^o. de celo &
mundo text. 34.

Ad 2^m.

dum in embrionis generatione cōtingit) ab expultrice facultate longè promptius, et facillimè, absq; ullo, uel satis paucò fortassis interdum feruore, cum ualidior natura euaserit, uel ab ali qua causa irritata sit, expelli cōsuevit. Et hæc quò ad primā rationem intantum dicta hic sint.

Ad secundam igitur accedamus, ita dicentes, decantatam esse non Galeni modò sententiam, at ipsius etiam Aristotelis, menstruum sanguinem, & generationis, & nutritionis quoq; ma teriam esse. Etenim quanq; Galenus carniformes, pinguesq; duntaxat partes ex eo sangui ne principium duxisse determinat: Aristoteles uerò cunctas etiam solidiores partes ex huius modi sanguine primā generationis originem duxisse credidit. Vterq; tamen, eorumq; sectato res, quinimò ante ipsos medicorum non iniuria protoplastus Hippocrates, cuncti quidem ex menstruo sanguine singulas nutriri, augeriq; partes affirmant. Quapropter cessantibus iam, 10 uel incipientibus menstruis, aptissimū concipiendi tempus (uel ipso Galeno ^k referente) est maximeq; cessantibus. perindè ac non ab eo ^l tantum, sed ab Hippocrate, ^m atq; etiam Aris totele ⁿ didicimus. Quo quidem tempore tantum ex huiusmodi sanguine remansit, quantum satis est pro conceptione: ut spermatis alimentum fiat. Vbi. n. affluerint satis (inquit Aristo ^o) quod remanet, consistit. Cum igitur multum quidem effluxit, sed adhuc effluit, tamen non tantum ut semen elabatur, tunc concipiunt. etc. Qua etiam de causa quæ mensibus carent 20 foeminae steriles (ut idem ait) ^p magna ex parte existit. Verum fieri potest, ut aliquæ etiā sine eorum profluuio concipiāt: uidelicet quibus tantum humoris colligitur, q̄tum ijs, quæ pur gantur, restare solent: q̄q; non tanta copia, ut & foras possint profluere. Itaq; generationē ex menstruo sanguine fieri, ratione optima apertum esse alibi ^q etiam scripsit. Sunt. n. men- 20 strua (ut ait) non purum semen, sed indigens confectionis. Quomodo in fructuum generatio ne adhuc imperfecta, inest quidem alimentum, sed confectionē ad puritatem desiderat. Quā obrem ut menstrua geniturae admista generant: sic alimentū in fructibus gignendis mistum alimentō sincero alit. etc. Hinc ergo est, q̄ natura uenarum uteri ad mammas consensum (Ga leno docente ^r) fabricauit, ut menstruus quidem sanguis in conceptionis tempore, pro embrio nis generatione, ac nutritione retentus, ad mammas deniq; à partu regurgiret, quò ibi reco- 30 ctus, atq; in lactis substantiam commutatus, & editi iam infantis nutrimentum euadat. Vnde lac menstruo germanum esse ait Hippocrates. ^s Quæ causa est cur eodem tempore menstrua bel lè procedere nequeant, & foemina lactare. Altera. n. pars, dum sanguis ad alteram transfer- tur, sicca semper relinquitur. Quamobrem (Hippocrates etiam inquit) ^t si mulier, quæ neq; 30 grauida est, neq; peperit, lac habet: huic menstrua defecerūt. Ac mulieri utero gerenti si lac multum è māmis effluat, foetum imbecilem significat. ^u Siq; purgationes eant, impossibile est foetum esse sanum: ^x siquidem ille, qui fortis est, ad sui alimentum utitur illo sanguine, qui ex toto corpore ad uteros fertur. ^y Sed quid multis immoramur? Ex menstruo enim sanguine tum generari, uel totum, uel partes, tum nutriri, atq; etiam augeri foetum omnibus nedum Ga leno confessum esse inuenimus. Quam ob causam & de corpore illo interdum loquens Gale nus, quod prima nostræ generationis materia fuit, nostrāq; substantiā compleuit & quid aliud 40 quæso sit, q̄ sanguis menstruus semenq; ^z adiunxit. ^z Atq; idipsum alibi ^a confirmat, dicēs. Et quidem alterum nostræ generationis principium, sanguis menstruus uidelicet, humi dum natura est. etc. Quinimò Galenus non materiale tantummodò nutriendi rationē hu iuscemodi sanguini attribuit: uerū illi uim quandam, ac facultatem in ipsa generatione acti- uam

k lib. de diffec.

uteri uersus fine

l p^o. de sem. ca.

2. in fine.

m lib. de fetus

natura post prin

cipia.

n 7^l. de hist. ani

malium cap. 2. et

p^o. de generatio-

ne aīaliū cap. 19.

uerfus finem.

o p^o. de genez

ratione aīaliū 19

p 7^l. de Histo.

aīal 2.

q p^o. de genera

tione aīaliū cap.

20. post prin^a.

r 14. de usu par

tū cap. 8. & 7^l.

eiusdē ultimo.

s ex libro colligi

tur de natura fe

tus. & li. de glan

dulis in fine. &

lib. p^o. de morbis

muliebribus.

t 5^l aphorif. 39.

u ibidē aphorif.

52.

x ibidē aphorif

mo. 60.

y ut Galenus in

cōm. 60.

z lib. contra Ly-

cū cap. 9.

a p^l. aphorif. cō.

14. ante mediū.

uam ascribit. ^b E quibus me Hercule non uehementer admirari nequeo: unde nam moti sint qui menstruum sanguinem, pro Galeni dogmate, generare, ac nutrire foetum, inficias eunt. Id ipsum nihilominus uerissimum, ac phœbo clarius est (etiam si nullus dixisset) ex illo puriorem, ac perfectiorem omnino portionem ab ipso embrione, pro sui nutrimento, attrahi. Cū id attractricis præcipuum munus sit, quod perfectius uidelicet sit, trahere. Peindē ac expultricis aliud ab hoc diuersum est, scilicet quod peius, naturæq; molestius fuerit, eicere. quēadmodū ex Galeno^c etiam didicisse promptum est. Quauis autem natura quod perfectius est, ac purius ex menstruo, pro embrionis nutrimento, ac totius uel saltem maximæ partis, musculosæ, s. ac pinguis generatione attraxerit: Aliqua tamen uitiosa qualitas in pluribus ex ipso menstruo, atq; infecta etiam matrice remansit. quæ alimentum quoq; paulatim, & quotidie superueniens inficit, expurganda nihilominus, quū id naturæ possibile fuerit. Nec mirū alicui esse debet ex ijs, qui in aliquo fortassis uase allia, carnes, & oua, siue quoduis aliud commiscuerit, effatūq; digno spacio permista dimiserit: dein uerò abiectis alijs, reliqua secreta iā comesse tentarit. Etenim, uelit, nolit, redolere in eis allia percipiet: Ni multo mox feruore, longaq; elixatione, usq; ad eò repurgentur: ut omnis penitus alliorum odor deleatur. Itaq; experti sumus in purissima etiam phiala: si quis aromaticum uinum, uel Hippocraticum dictū, uel claretum imposuerit. Postea uerò huiusmodi uino remoto, quoduis simplicissimum uinum, aut ipsam quoq; aquā iniecerit, etiam si ter, & quater, atq; exquisitissime lauuerit. adhuc illius aromatici uini odorem, quodcunq; deinceps appositum fuerit, redolere inueniet. Donec pluriēs, feruentiq; etiam aqua perpurgetur. Immo, quod maius est, non odor modò, sed uirtus quoq; præpositæ rei per aliquod effatu dignum spatium remanere consueuit. Quēadmodum si lac in aliquo etiam uitreo uase reponatur, in quo uinum antea extiterit, coagulari lac illud experimento demonstratur. Itidemq; in Abenxoaris^d exēplo manifestum fit. si quispiā in uase uel optimè uitreato diutius reclusum fermentum obseruarit. post multam. n. ablutionē (ut ait) si posueris ibi pastam azimam, fermentabitur absq; fermento aliquo. quod non fiet in uase nouo, in quo fermentum non extiterit. Et hoc scemate forma'ue commiscetur aliquid modicum cum ex dicto sanguine in embrione. sed fortitudine matricis, & ex alio multo & bono nutrimento, quod recipit, non læditur dum permanet in matrice. Post exitum autē ipsius ab utero, nutritur infans, & coadunatur calor naturalis in eo, & augmentatur, & confortatur natura, & conatur digerere, & subtiliare prædictum humorem malum, & nociuū. Et ipsum exterius expellere. Et hoc fit cum labore forti, & angustia magna, & febre ualida, atq; graui. quemadmodum & illi qui extrahunt butyrum à lacte, non faciunt illud nisi cum labore magno, atq; forti ualde, & motu laborioso, atq; graui. etc. Ex optimo igitur, puroq; ac laudabili sanguine nutriri embrionē Abenxoar prædixerat, quanq; ex hoc aliquatenus mala menstruorum qualitate (ueluti prænotauimus) infecto. Si. n. ex menstrualis sanguine, qualis est ille, qui à mulieribus expellitur, & purgatur, embrio generaretur, aut nutriretur, non uiueret ullo modo (inquit idem Abenxoar) aut saltem (ut ex Azarauio prædiximus) leprofus ille fieret. q̄q; Azarauius de prima generatione duntaxat loquens in menstruationis tempore facta, leprosum euadere determinat. Quòd si continuò deinceps eodem corrupto sanguine nutriretur, minimè uitalem fore cum Abenxoare opinor. Qui iā (ut patet) Galeni atq; ita Hippocratis, Aristotelisq; autoritatē glossat, quū hi ex menstruo sanguine gigni, ac nutriri embrionē

b lib. 2. de sem. cap. 2^o. in fine. Cōtra Ferne lium.

c 3^o. de pot. natu. ral. cap. p^o. 8. 11. 12. 13. & sequen. tibus, & alibi sē. pē. Ex^m. primū.

2^m.

3^m.

4^m.

d lib. 3. theysir tr. 3. cap. 4. uersus finem.

brionē

brionem pronuntiarunt. Quoniā. s. omnem sanguinem ad uulū descendē menstruale ap-
 pellant. Nos uerò eius quod Abenxoar de hac re scripsit, magnā partem admittimus. Quos
 qua laudatur. niam uidelicet ex puriori sanguine fœtus generetur, ac nutriatur, atq; eodem aliqua uitiosa
 menstrui qualitate infecto. Præter id autem, & aliquam eius menstrui portionē in fine pur-
 gationis retentam, cuius ratione retentum semen est, ipsius conceptus generationem ingredi
 concedimus. Quem nihilominus, tametsi uitiosum, ac minimè concoctum sanguinem à semine
 e ut colligitur p^o perfici, concoqui, & exquisitissimè elaborari cum Aristotele^e decernimus. Itidēq; de aliqua
 de generatione ei^o eiusdem menstrui sanguinis portione ad nutriendum descendente proferendum est. Coquis
 a^o alium. cap. 20. tur. n. ibi rursus quæ melior pars est, & ad cauam iocinoris perueniēs, repurgatur. Impurior
 post principia. f. 14. de usu par uerò pars ad circūstantes uenas, ueluti ad promptuarium quoddam (Galeno docente f) retru
 tium cap. 8. ditur, à partu statim expurgāda. Cuius adhuc aliqua portio ad māmās ob uenarū consensum
 ascendēs in uitiosissimum lac (quod colostrum Latine uocamus) cōuertitur. Non ergo sic, ut
 à mulieribus expurgari solet, crudū, impurūq; ac uitiosum generationis, & nutritionis ma-
 teria est. haud. n. uiueret. ueluti prædictum est: sed eius perfectior pars, atq; hæc seminis ui-
 elaborata, nec non perfecta, & repurgata, et si aliquam in pluribus uitiosam qualitatem rez-
 doleat. Cū uerò eādē esse facultatem quæ in semine reclusa corpus efformat, ac deinde ad fi-
 nem usq; uitæ nutriat, augeat, ac deniq; custodiat, tū ex Aristotele, tū etiam ex Galeno
 reputemus (prout alibi disputandum reseruamus). Vitium, quod conceptionis tempore imbez-
 cillior, ac multa humiditate summersa existēs natura, secludere in pluribus nequiuit: Ab ortu
 postea, cū uigorata hæc fuerit, per uariolas, morbillosq; & ipsam deniq; rossaliā, expur- 20
 Ad 3^m. gare, præsentī quidē animo, determinamus. Quibus quidē uisis, ad tertiū aduersantium argu-
 mentum conuertamur, dicentes primò absurdum non esse, aliquā radicalis humidi ex uitiosa
 menstrui parte conflatam portionem, atq; alijs perfectioribus partibus commistam, diutius
 perdurare. Cū ad finem usq; uitæ radicale humidum, spiritūq; innatum, uel eundem nume-
 ro, q̄uis copia diminutum persistere, iam alibi demonstrauerimus. Secundò longè minis ab-
 surdum esse uitiosam duntaxat, absq; ulla materia, qualitatem, atq; infectionem, pluribus an-
 nis, quin ad senectutē usq; immutatam perdurare. Id quod pluribus exemplis facillimè osten-
 ditur. Etenim hæreditarios podagricos uidemus: quibus à patris spermate nonnunq; infectio
 Ex^m. primū. communicata est: Ad annum tamē trigesimum usq; plus, minus ue, abdita perdurauit, nec fi-
 lio podagram ad illam usq; ætatem publicauit. Idem quoq; de leprosis aliquando conspexis 30
 2^m. mus. Lucidiusq; id fit, si Azaraij sententiam admiserimus, de ijs, qui nō in secūda modò, aut
 tertia, sed quarta etiam menstruationis die concepti sint. A quibus quidem, & si q̄ plurimi
 intercefferint morbi, multaq; purgationes, haudquaq; tamen deleri ea qualitas potuit. donec
 3^m. eū induxerit morbū, qui sibi proprius est. Verū quid multis immoramur? siquidē Gallica nos-
 tra tempestate, oborta lues manifestissimè id ipsum cōprobat. Multos. n. uidimus, qui huiusce
 modi contagio turpiter, ac scēuissimè infecti sunt. Mox uerò siue unctionibus ex hydrargyro
 cōditis, siue ex cīnaprio uocato, uel alio quouis medicamēto tali morbo dicato cōpositis suffiti-
 bus, aut demū guaiaci ligni decocto, tenuissimōq; interim uictu, & pluribus interpositis pur-
 gationibus, pristina (ut optarūt) sanitati restituti sunt. Post multos tamen annos. atq; interdū
 post trigesimum quoq; reuiuiscere, absq; ulla noua conuersatione uisa est. Non ob aliud quid 40
 dem, q̄ ob retentam, atq; in intimis uisceribus reseruatam uitiosam qualitatem, quæ paalatim
 adue

adueniens nutrimentum infecit. donec uigere supra corpus huiusmodi nefanda lues poterit: doloresq; tunc immodicos, ex æthemataq; ac instabilia quidem, & insana (ut ita dixerim) symptomata renouarit. Itaq; mirum non est, si per multos morbos atq; annos etiam superatos uitiosa menstrui qualitas, aut seminis quoq; occulta permanferit. donec uel fortior effecta naturam superarit. quemadmodum in elephaticis, podagricis uel hæreditarijs liquet, uel eam potius natura potentior reddita debellarit, penitusq; expurgarit. Perinde ac in uariolis, ac morbillis patere sæpenuerò potest. Quasobres non temerè Galenus & ait. *Qui minimè g lib. de cibis bo*
 „ exercentur summa æstate, quum uehementi calore urgentur, fontis aqua bibant, niuisq; usum *ni & mali succi i*
 „ uitet. Hæc. n. q; uis protinus nullam iuuenum corporibus sensibilem læsionem inferat: sensim *fine. & libello de*
 10 tamen, occulte q; crescente uitio, quum iam ætas progressu temporis inclinari: articulos, ner- *renu aff. dignot.*
 „ uosq; & uiscera ijs morbis uexat, qui uel difficulter admodum, uel omnino tolli non possunt. *& rem. cap. de*
 „ Neq; id quidè temerè. Namq; ea pars corporis, quæ natura imbecillissima est, à lædente quos *aqua. in fine.*
 „ libet patitur. etc. Iam ergo uides quomodo niuis læsio in iuuentute homini inducta sæpissimè *Niuis usus q;*
 me ad senectutem usq; abdita reseruatur. Ad Quartum uerò argumentum dicimus minimè *læsiuus.*
 necessarium fore unumquemq; in uita huiusmodi morbo conflictari. Tum quia tametsi natura- *Ad 4^m.*
 20 turalem affectum diximus: Haudqua q; tamen omnibus eam qualitatem, infectionemq; inesse *1.*
 determinauimus. Cum ipsos simpliciter semper dictos salubres, optimè uel cõstitutos exceperimus. In quorum profecto generationem quodlibet à natura uitium superatum esse, atq; adamusim expurgatum supponimus. Aliter. n. semper sanum permanere, ex intrinseca aptitudine, ac naturali potetia, aptum dici non poterit. Tum secundo quoniam usq; adeo magna mens- *2.*
 30 strui sanguinis infectio, aut alijs fortasse uitijs adiuncta esse nonnunq; potest, ut insaluberrimum simpliciter semper corpus generetur, uel elephanticum, uel continuò leprosum, aut scabiosum, uel ulceribus, siue in capite, siue in cruribus, aut in alia quauis parte scatens, ut non modò insaluberrimum simpliciter semper nominandum tale corpus ueniat, uerum & semper ægotans. In hoc igitur quia semper natura uarijs morborum generibus occupata, non eiusmodi tantum uitio, sed pluribus quoq; alijs succumbit: Nunq; poterit naturalem expultricem accersens, uariolas, aut morbillos, siue rossaliam generare. Tum tertio prædictis morbis *3.*
 unumquemq; in uita uexari necessarium non est. quia uel febre, uel quopiam alio exitioso morbo, aut fortassis uiolentiè, ob aliquam exteriorem causam præoccupari ad mortem pot: prius *40*
 30 scilicet q; horum tumorum ullus apparuerit. Cum præcipuè non omnibus idem præfinitum uariolandi tempus sit. Quauis. n. maxima ex parte in infantia, uel ad septimum usq; annum contingant. Nihilominus tamen quibusdam in sexagesimo anno, nedum intermedijs ætatibus, aduenisse compertum est. Quin & medicus quidam Neapolitanus (ut aiunt) ferè septuagenarius eiusmodi morbo cõuictus iterijt. Itaq; si prius, q; talis feruor superuenerit, mortuus ille fuerit, absq; uariolis, & morbillis, atq; etiam rossalijs, ad aliud proculdubio seculum per- *Ad 5^m.*
 migrasset. Ad Quintum uerò sic respondebimus, dicentes mirum non esse bis, ter uel iisdem affectibus prehendi. Tum primò, quia si exquisitissimus, feruor, perfectaq; expurgatio facta non sit (quia fortassis nõ adeo robusta uirtus fuerit, uel exterior irritans causa imbecillis, aut aliquod impedimentum superinciderit) iterum secundo, ac rursus tertio natura commouere, atq; euocare pugnam potest, quò exquisitiùs à tali uitio corpus expurgarit. à qua quidem perfecta purgatione, salubriùs degere hominem, pro compertissimo habemus. Tum *etiam*

etiam secundo, quoniam possibile est primam ebullitionem (ut aiunt) perfectiua esse. quemadmodum in exemplo musti à Principe assignato liquet. Quum residentia sequitur, ac unum purissimum resultat. Secundam uero ex humorum à uitiosis cibis genitorum praua qualitate, ac per hoc naturam stimulantem contingere. Atque hanc rursus, siquidem ualida uirtus sit, perfectiua euadere. uel fortassis hanc secundam, aut denique tertiam, uel (si quandoque contigerit) quartam, possibileque etiam est in optime constitutis saluberrimis uel simpliciter semper dietis corporibus accidere, ex aeris epidemia quapiam corruptione, aut praua quadam abditaque qualitate. Atque hanc corruptiuam potius nuncupant, & maxima ex parte ad mortem, pestis instar, perducentem, feruorique uini similem: quum corrumpitur, aut in acetum permutatur. Ad

Ad 6^m. Sextum quoque dicimus, quoniam illud menstrui sanguinis residuum impurum, quod à natura expurgandum tali morborum genere quaeritur, in uenis non est, sed praua praesertim qualitas in membrorum substantia remanens, & à primordiis impressa, necnon radicalis humidi, calidi uel innati excrementosa quaedam portiuncula, sunt quas natura secernere intendit. Horum uero ratione humores, qui in uenis existunt, atque in dies gignuntur, eadem inficiuntur qualitate. Idcirco non membri substantia feruet, sed humores in uenis infecti iam, mox uero & ipsa etiam in membri substantia consilens caliditas incenditur, excandescitque; ut feruere non indecenter dici queat. donec, scilicet impurioris partis expurgatio fiat, uniuersumque ferè corpus immutetur, et calidi spiritus uel innati substantia rectificetur: discussis nimirum non qualitate modo, at aliis quibus quoque minimis illius menstrui humoris impurioribus portiunculis, ipsi quidem purissimae radicalis humidi substantiae admixtis. Quod si non membri calorem, at membrum ipsum

Ad 7^m. feruere dixeris: haud graue quidem loquendo peccatum commiseris. Ad Septimum uero conuertamur, dicentes non esse necessarium ab ortu statim pueris aduenire, nisi quando dispositum corpus sit, naturaque potentior reddita, & exteriores causae irritantes opportuna sint. Quae pro uaria corporum dispositione, atque aptitudine, in diuersis quoque temporibus, aduenire solent. Vt huic in aestate, illi uero in hyeme praeparatum corpus existat. Quamobrem & plures homines uisi sunt, quos in aestate, ac feruentissima temporis constitutione, nulla febris, aut caloris excandescencia inuasit: Hyeme autem, & quo tempore alij salubrius degunt, acutissima etiam febris aggressa est, aut etiam aliqua praedictorum exanthematum species. Itidemque nonnulli reperiuntur, qui nil tempore pestis passi, dein uero saluberrimo succedente tempore, uarijs morbis, ac pestifera etiam febre correpti sunt. Cum in corpore duntaxat disposito, ac parato anchoras suas iacere uel Galenus ipse comprobauit. Eodem igitur modo nonnullis in infantia, nonnullis uero in iuuentute, aut alijs aetatibus sic dispositum corpus reperitur: ut tunc, & non alia aetate praenarratum sanguinis menstrui uitium à natura expellatur: ut uariolae, uel morbilli, aut alia denique exanthemata (quouis nomine appelles licet) generentur.

Ad 8^m. tur. Ad Octauum praeterea sic respondebimus: uerum, scilicet esse admittentes, menstrualementem infectionem à mundi prima origine extitisse. Attamen non adeo malignam, ob exquisitiorem ab illis obseruatam uictus rationem, fuisse: Quemadmodum nostro corruptissimo saeculo contingit. Quae de re non sic natura à uix effatu digna malitia (ueluti nunc irritabatur ad eius purificationem. Cum penitus abdita, & à temperamenti robore superata recuberet. Praesertimque in temperata Graecia, & magis in temperatissima Hippocratis regione in quibus quidem plurima (Galeno¹ referente) corpora temperata inuenta sunt. tum ob aeris temperiem, tum etiam

¹ p^o. de diff. febrii cap. 4. & li. de morb. causis cap. 2.

¹ 2^o. de tuenda ualitudine cap. 13.

etiam ob exquisitissimam antiquorum uictus rationem. Indeque semen, & menstruus quoque san-
guis purior. Etenim quicumque rectiori utitur regimine, rectiores etiam humores hunc gignere
cui uis perspicuum est. Eoque magis, quod temperatius corpus extiterit. Quam ob rem tametsi an-
tiquissimus hic morbus dici potest: Græcis tamen (è quibus omnis ars principium, & per-
fectionem recepit) rarissimus intantum fuerat, ut non (ueluti nos) naturalem ferè morbum
cognoscerent. at exitiosa potius febris, pestifera uel nonnulla adueniens symptoma, & in-
ditium reputarint. Nouum ergo non simpliciter, sed aliqua ex parte, pronuntiauius. Vides
licet quia non sic ueteribus communis, nec adeò pernotus fuit. Possibile autem est ex cœlesti 2.
quapiam abdita causa, influxu uel nouam esse huiusmodi corporum, siue mensui sanguinis,
10 aut etiam seminis infectionem. Vt quæ antiquitus in pestilentibus duntaxat febribus, atque na-
tura malignis adueniebant, Nunc pluribus (impressa iam ea infectione, ut posteris commu-
nicetur) naturaliter contigant. Multos enim nouos, & ueteribus prorsum ignotos morbos
nostra ætas experitur. quemadmodum contra, priscis quidem plurimi accidere consueuerunt,
hodierno tempore penitus incogniti (perinde ac ab ijs, in alio tumorum catalogo recensēbi-
mus.) Idem nihilominus humores, eademque hominum species, atque idem sol, & luna à mun-
di prima origine, ad nostra usque secula sunt. Fortassis autem non secus ac de Gallici uocati 3.
morbis ortu nonnulli referunt: Ita & huiusmodi specialium exanthematum origo prima fuit.
Ex celeberrima enim quadam meretrice, cum qua elephanticus quidam concubuerat, uene Gallici morbi
rea nunc dicta lues originem suam primam duxisse referunt. quoniam scilicet ab elephantici origo prima.
20 concubitu, plurimi deinceps coeuntes, in illius utero impressam malignitatem susceperunt.
Quam & hi mulieribus alijs, illaque iuuenibus adeò communicarunt, ut in uniuersum ferè or-
bem tale contagium à Valentia Hispaniæ Ciuitate exordiens extensum sit. Nouus ergo hic
morbus, & ueluti quidam filius elephantiasis spurius, celerius tamen contagio inficiens, Gallicus mor-
bus præsertim circa sui ortus initia, genitus est. Cui non corporis modo aptitudinem, at cœli-
bus filius spu-
tus quoque aliquam eo tempore defluentem dispositionem suppetias tulisse autumo. Alias enim rius elephan-
plurimè elephantiosi cum feminis coiuerunt, Haudquaquam tamen huiusmodi morbus genit-
tiasis.
tus apparuit. Quod si (ut alij uolunt) ex nuper inuenta quadam insula ueteribus incognita
ubi frequentissimus, uti endemius morbus, est, in hanc quam nos incolimus habitabilis terræ
portionem, per Hispanos, qui illuc nauigarunt, importatam apparuisse huiusmodi luem credi-
30 derimus: magis adhuc quod de cœlesti dicimus influxu, aerisque peculiari contagio, pro morbi
prima, & antiquissima origine, comprobatur. Quemadmodum igitur uenerea iam dicta
lues ex elephantiasi sub tali cœli constitutione orta uehementius, ac celerius mouetur, & homi-
nem excruciat, celeriorique contagio inficit, Adeò ut ab elephantiasi longè diuersum affe-
ctum quisque iudicet: Ita mirum non esse debet, si uel ex quopiam degenerans morbo, aut pes-
tifera febre talis infectio, in hominum corporibus, aliquo sub cœli statu inceperit, mox
uerò deinde maiori contagio non eos modò, qui cum infecto conuersati sint, sed ipsos etiam
hæredes afficiat. Videmus enim aliquos podagricos, non à patre, sed prauo ipsorum rez Opt^m. ex^m.
gimine redditos, dein uerò filijs, ac nepotibus etiam podagram communicasse. Cur igitur
tur alijs uel frigidis affectibus hæreditate quadam descendere licet: Variolis autem, ac
40 morbillis calidissimis, & exquisitiùs afficere substantiam nostram potentibus non licebit?
siue à cœlo siue à terra primam suæ generationis originem susceperit? A qua uis autem cau-

sa inceperit: id ipsum nostro, & Arabum quoque scriptorum seculo compertissimum est: quasi Dei filium uulgo nuncupari eum, qui ab huiusmodi exanthematum speciebus intactus, immunisque euasit. Cuiusmodi rem à nullo ueterum Græcorum, aut Romanorum scriptam esse inuenimus. E quibus quidem præostensis adhuc sequitur, eius infectionis ratione, aut nulum, aut phænice (ut dicitur) rariorem hominem saluberrimum simpliciter semper, optimèque constitutum nostro æuo inueniri. Salubrem uero simpliciter multum, qui alia qua uis intemperie, aut uitio destitutus sit, hac duntaxat menstrui qualitate reseruata, quanquam rarissime, reperiri tamen aliquando contingit. Reliqua uero omnia, uel neutra simpliciter, uel (quod frequentius contingit) insalubria simpliciter nata sunt. Cum non à menstruo tantummodo sanguine, sed à uirili etiam (ueluti prædictum est) semine tam huiusmodi uitium, q̄

Ad. 9^m. reliqua multa originem duxisse consueuerint. Ad nonum uero respondemus: Azaraij prius sententiam perpendentes. Etenim an uerum sit experti non sumus, nec alium ex antiquis au-

thoribus id dixisse uidimus. Auerrhoes^k tamen ut rationabile dictum approbat, ac se expertum ait. Cum fiant mutationes tempore crisis annorum (ut subdit) quod natura ordinauit:

& hoc testificatur mirabilis Zacharam (intelligo Azaraium) & ego expertus sum. Est

autem annorum crisis (perinde ac ex Galeno,^l quin & ipso etiam Hippocrate^m interpretari possumus) pro quatuor ætatum diuersitate. Prout illarum temperamenta uariantur. Quam obrem si prima die menstruationis conceptus embrio sit: In pueritia, ad annum uidelicet duodecimum usque, leprosum fieri, elephantiumue determinauit. Quoniam prima die maior est sanguinis malitia, Cum ab initio quod molestius est, impuriusque à natura eijciatur. Hac de causa non potest longiori tempore perdurare, quin temperamentum naturale superetur. Eoque citius aduenit, quò imbecillior pueri natura fuerit. Melius autem, aptiusque dixisset, si ad pubertatem usque protulerit. Quæ à quintodecimo circiter anno exorditur. Ut primam hanc ætatem ad quartumdecimū usque annum determinarit. Et si quia certo annorum numero determinari ætates nequeunt: ad duodecimum, uel quartumdecimum protulisse parum interest. Qui uero in secunda menstruationis die concepti sunt: quoniam non adeo malignus qui excernitur sanguis est, diutius quidem abdita scæuities illa remanet: ut in prædicta ætate discooperiri adhuc ne-

queat. Quoniam uero in pubertate magnæ fiunt (Galenoⁿ docente) corporis mutationes. tunc enim (prout aliàs^o inquit) effulgentiæ caloris gignuntur. Idcirco tunc temporis etiam elephantiasis, lepraue à Barbaris nuncupata propalatur. Quòd si non ab ipso statim puber-

tatis initio: In ea tamen ætate, quæ à quintodecimo anno, uel (ut ipse Azaraius ait) à tertio decimo ad uigesimum quintum usque, protenditur, fiet. Pubertatis enim tempus (ait Galenus^p) est post quartumdecimum annum, usque ad uigesimum quintum. Sin uero in tertia menstruationis die conceptus embrio fuerit: In iuuentute potius discooperiri uoluit. Cum remissa eius sanguinis malitia sit. Itaque à uigesimo quinto anno, uel uigesimo sexto, usque ad trigesimum quintum, seu trigesimum sextum, huiusmodi morbus comparere solet. Quinta enim septimana

(uti Galenus ait^q) hæc ætas terminatur. Nil autem refert (ueluti iā iā diximus) unum, aut duos annos adiungere, uel demere. Cum has ætates certo annorum numero circumscribere, quemadmodum nonnulli fecerunt, Galeno admonente, non deceat: nisi forte in latitudine quadam. In iuuentute igitur elephantiasis lepraue detegitur, ob mutationem ex humido in sic-

cum. quia calida & sicca temperies adustionem efficiens resultat. Sin autem in quarta die conceptus

^k 3^o. colliget ea.
7. post principiu.

^l lib. 3^o. aphorif.
cō. 28. 2^o. eiusdē
45. 5^o. eiusdē. 7^o
Et. 6. de morbis
uulgaribus com-
mentario p^o. cō-
26. libro de salu-
bri dieta cō. 7. et
alijs pluribus loc.
^m Ibidē & lib.
de carnibus uer-
fis finem.

ⁿ 3^o. aphorif. cō.
28 in fine.
^o 6. epid. cōmē-
tario p^o. cōm. 4^o.

^p 5^o. aphorif. 7^o
in fine.

^q 3^o. aphorif. cō.
30. in principio.
^r 6^o. de tuenda
ualetudine post
principia.

conceptus embrio sit. Cum satis diminutum eiusmodi sanguinis uitium remanserit: tam citò naturam superare non ualet. Nisi diuturno tempore atræ bilis copiam aceruarit. tuncq; iam supra naturæ uires poterit. Ab anno scilicet trigésimo quinto, uel trigésimo sexto, ad annum usq; quadragesimum octauum, uel quadragesimum nonum, aut etiam quinquagesimum. quæ quidem ætatis constituta, uel semicana, crudaq; senectus, ab Hippocrate, ac Galeno¹ appellatur, atq; in duabus post quintam septimanis (Galeno met² didascalo) terminatur, atræ bilis copiam, q; præcedentes ætates, magis aggregans. ¹ p¹ aphorif. 13. ² i¹ progn. co. 69: ³ 5^o. salubriū. in fine.

Qui autem in quinta die cōceptus sit: Cum maxima ex parte per purgatus uitiosus ille sanguis sit, si quid remanserit quidem, ad uariolas potius, ac morbillos, uel Græcorum fortasse lepram, q; elephantiasim, Arabum uel lepram perducetur. Nec enim in senectute quum iā pituita plurimum abundare inceperit, calorq; diminui, huiusmodi Arabum lepra generari potest. Ni fortassis in præcedentibus iam ætatibus antehoras suas iecerit. Ad aliam ergo ætatem Azaraius, post quadragesimum octauum annum, non pertransiuit. Hæc porro uoluimus dixisse pro Azaraij sententia ab Auerrhoe^x comprobata. Nos autem (ut supra iam diximus) experti non sumus, difficillimumq; (si recte perpenderit) est, ut experimento sæpissime fallaci cognoscatur. Etenim si nonnunq; id accidisse compertum sit, per accidens tamen contigisse potest. Cum iuxta uariam temperaturam, mensuramq; malitiam, siue in prima, siue in quarta die conceptus embrio sit, pro uaria quoq; regione, ac uictus ratione diuersitas hæc aduenire queat. Rarissime autem huiusmodi morbus elephas inq; lepra uel à Barbaris dicta oritur. Cumq; aduenit paucissimi ex ijs qui affecti sunt in medicorum examen ueniunt. Cum Sancti Lazari procuratores præripiant, extraq; urbem secludant. Qui uero à medicis opem efflagitant, quoniam adulti iam plures sunt: raro matres uiuentes adhuc habent, à quibus conceptionis horam, an menstrui tempore facta sit, uel non, disquiramus. Quin si hæc superstites adhuc sunt, nil certi maxima ex parte proferre ualent. Cum uel conceptionis horam ignorarint, uel si menstruorum tempore facta sit, diem non scripserint: aut forte, quia statim suppressi menses ob conceptum sunt, finitam esse purgationem reputarint. Et nos puerulum quidem triennem elephanticum aliquando uidimus, natuq; paulo maiores. Vnde autem aduenerit, cognitu non difficillimum modo, sed impossibile fuit. Quinimmo (si exquisitè perlibrarimus) cum incipientibus quoq; nedum cessantibus mensibus conceptio fieri naturaliter soleat, Quicunq; incipientibus conciperentur, leprosi, pro Azaraij sententia, euaderent. Id enim ex menstruo sanguine deterius, quod ab ipso statim initio natura secernere tentarit. Quod si à semine concoqui, atq; elaborari adamussim id potest: Cur & illud quod in secunda, uel tertia, aut etiam quarta die expellitur, ab eodem semine concoqui, & exquisitè elaborari nequit? Itaq; (ut ad argumenti uim conuertamur) pro iam dictorum, atq; aliorum quoq; multorum uarietate tum lepra, tum uariolæ, aut morbilli diuersimode generari queunt. Quancq; lepra elephantiasis uel magis in iuuentute, crudaq; nonnunq; senectute accidere solita est. Ob nimiam uidelicet atræ bilis copiam. Variolæ autem frequentius in pueritia, magisq; in infantia, ob intensiorem corporis cum calore humiditatem. Quorum profecto ratione, maior putredo, atq; ebullitio fieri solet. Qua de causa, quoniam scilicet infantibus, puerulisq; familiarior morbus est: cum Plinius (quemadmodum antea^x tetigimus) Elephas cui ætati famis liarior. Variolæ quæ ætate frequentiores. ¹ x¹ supra fo. 138.

Boas, ipsas rubentes papulas nuncuparit, pueruli fortassis mala omnia buas, siue ob illorum bulbiem, repetita prima syllaba Bubuas uocare docentur. Quoniam uero nonnulli bouas etiā dicūt,

Inde opinor Neapoli Bonas nuncupare consueuerunt: quasi boas, siue boas, uel (quod potius reputo) bouas mutata litera { u } in { n } ob alicuius primi scriptoris defectum. quod nomen deinceps ab alicuius medici ore promanans, in uulgarium consuetudinem permigravit.

Ad. 10^m. Ad decimum quoque promptissima solutio occurrit. quoniam quicquid uitij ex utero relinquitur, in pennas, uel pilos, ungulasque, aut cornua permutatur. Id quod paucissimum quoque, & uix effectum dignum in illis est, ob eandem causam: quia scilicet in eadem quoque maxima ex parte conuertebatur. Adde quod nec ulla uictus mutatio facta in illis animalibus est: quemadmodum hominibus contigisse praediximus. E qua maximam principij partem huiusmodi affectus generationi exhibitam retulimus. Idcirco talis uariolarum, siue morbillorum generatio necessaria in alijs animalibus non est. **Ad. 11^m.** Ad undecimum denique argumentum respondemus, dicentes in alijs quidem siue pustulis siue quibusuis cutaneis morbis necessariam non esse febrem ac feruorem, uel non adeo ualidam: Cum nonnullos in uenis praecipue contentos, aut nuper inspersos humores expurgandi necessitas insit. Hic uero quoniam eius quoque impurae humiditatis, ac uitiosae qualitatis in ipsa solidorum substantia a generationis initio infixae, tenaciterque adhaerentis mundificatione complenda est: Idcirco necessarius omnino feruor, ac febris est, quin saeuissima quoque, & periculosissima symptomata (uelimus, nolimus) adueniunt. In lepra uero a Barbaris uocata, etiam si ex generatione ortum haec habuerit: quemadmodum praedictum iam est, necessaria tamen febris non est, aut feruor. Cum non expurgatio prauae illius qualitatis, ac malignae humiditatis superante natura fiat: Verum corruptio potius membrorum substantiae, nedum in uenis contentorum humorum sit, ac uictoria eiusdem, quae sensim detegitur, qualitatis contra naturam. Haud parum ergo uariolae (post quas mundum, ac salubrius maxima ex parte corpus remanet, ni pestilentis aeris uitio aduenerint) a lepra elephante ue, morbo quidem satis tyranno, atque ad mortem usque concomitante, differunt. Haec autem obiter, & ulterius quod opinabamur, dicta nunc sint, propter eos, qui uariolas, & morbillos a menstrui sanguinis uitio superuenire posse, toto pectore, omnibusque neruis obnegarunt. **RELIQVVM** Est (si quae promissimus complere uoluerimus) de uaris, unde uariolae nomen deductum esse praediximus,

Vari.

Ionthi unde.

y lib. 24. lectio-
num antiquarum
cap. 26.

z 2^o. meth. cap.
2. circa medium.

a 5^o. de compo.
med. secundum loc.
cap. 3. et libro. de
rem. parat. fac.
cap. 51.

Ficosi tumores.

res.

α κ ν η

b lib. 8 cap. 13.

c in glossematibus
i Plinii.

α κ μ η.

nonnihil adiungere. Hos ergo Graeci ἰόνθος uocant: quoniam scilicet instar ὀνθός, id est fic-
mi, de honestamento faciei (Caelio^o referente) sint: eamque conspurcent. quod ὀνθίλας εἶναι di-
citur. Vel alia fortassis ratione: quoniam scilicet in aetatis flore, qui Graece ἀνθος appellatur, 2.
protuberent. Quo Ionthi nomine primum quoque prodeuntes pilos nuncupare solent: ἀπὸ τοῦ ἰόνθους 30
uariolae quod est, uenire, atque egredi, & ἀνθῆν, quod est, efflorescere. Inter ea uero nomina Ga-
lenus recenset, & quae nec locum affectum repraesentent, neque causam, quae eos effecit. Subin-
dicare nihilominus affectam sedem id nomen potest: eo quod faciei morbo impositum est. De quo
sic interdum Galenus quoque ait. & Tumor durus, & paruus in faciei cute oritur ionthos ap-
pellatus: a crasso uidelicet succo congregatus. & Differunt autem ab eo ficosi tumores (Pe-
rimde ac postea Galenus subdit) eo quod non solum crassus sit, qui hos tumores efficiat, humor.
Sed & serosa tenuitate participet. ob quam etiam cito exulcerantur, si non apposite curentur. etc.
Ionthus ergo, uarius ue, quoniam serosa huiusmodi tenuitatis expers omnino est: Idcirco prurigi-
nosus non est, neque ad sui scalpurae stimulan. Vnde α κ ν η etiam a quibusdam (Aetio teste) nomi-
natur siue α κ ν α, quod Hermolaus non α κ ν α legit, sed α κ μ α. ut sic uidelicet huiusmodi affe-
ctus uulgo a Graecis nuncupetur, quoniam in uiginti maxime aetate, quae α κ μ η dicitur, prouenire
consueuerit

cōfueuerit. Galeno autē Paulus,^c ac magis ipse Aetius^d subscripserūt. Celsus uulgo notas affe-
 ctiones tam uaros, q̄ lenticulas ait. quas quidem curare penē ineptias esse ait: nisi scēminis, a
 quibus eripi cura cultus sui non potest. Dicuntur autem à Latinis uari fortasse quia uarios hoc
 mines ostendunt. Siculos enim antea f quoq; Celi rhodigini & testimonio diximus, consueſſe
 ionthos qui seſe in naſo oſtentant, & uari appellare, iſdeſt uanos, mendacesq;: quia id genus ho-
 mines per ea naturæ inditia planè ſignificarentur. Arabum Princeps^b (ut mihi uidetur) bo-
 thor lenes, ſiue lacteos, appellat. Varis enim ſiue ionthis illorum bothor definitio cōgruere quæ-
 dantenus uidetur: quareq; deinceps curatio non ionthis, at ephelidibus propria ſit. Quoniam non
 mollientibus, atq; unā diſcuſſorijs medicamentis (ut ionthorum curatio eſt) ſed reſoluentibus,
 10 inſimulq; deſiccantibus occurrit. Mirum uerò non eſt. Cum non ſemel diuerſi generis morbos
 commiſcere conſueuerit. E præſcriptis ergo patet Marcellum Virgiliumⁱ à uero mirū in mo-
 dum aberrare, dum ionthos non tumores puſtulas ue, at puſtularum exanthematum ue cicatriz-
 ces eſſe, Pauli etiam ſententia, opinatur. Parui enim tumores ſunt à craſſis humoribus geniti,
 ac per hoc duri, quemadmodum prædiximus. Quamobrem inter frigidos tumores reducendi,
 omni reiecto ſcrupulo ſunt: præcipueq; calloſi. alij enim aliquando ſolet nonnihil inflammatio-
 nis adiungi. Sed tunc ſimplex uarus non eſt. Verum enim uerò de his intantum hoc loco dictum
 ſit. Nāq; productus hucusq; ſermo eſt. quanuis de epinyctidibus loquendum fore ſtatuerimus:
 Quia diuerſa Celsi, ac Plinii, et Pollucis etiam epinyctis, à Pauli, atq; Aetij epinyctidibus uiſ-
 ſa eſt. Propterea & horum, atq; illorum epinyctides contemplari operæpretium duximus. Quo-
 20 niam uerò Arabes, & præſertim Razes, atq; Princeps ſub eſſeris ab ipsis uocatis Pauli epis-
 nyctidas comprehenderunt. Idcirco quid ſint eſſeræ pluribus oſtendiſſe neceſſarium fuit. Rur-
 ſus quia Princeps caput habet de benat, ſeu planta noctis, quæ aliqua ex parte cum epinycti-
 de congruit: ob id etiam de uocatis ab eo benat noctis locuti fuimus. Atq; huius deinde cau-
 ſa de ipsis quoq; deſudationibus ſiue ſudaminibus. Cum nonnulli Benat noctis, non epinyctis
 das, at Græcorum ὕδρωα, Latine uerò ſudamina eſſe crediderint. Quoniam uerò his ſudami-
 nibus exanthemata ſimilia eſſe Celsus poſuit: Nonnulliq; benat noctis Auicennæ, Celsi exan-
 thematibus reſpondere uoluerunt. Idcirco de exanthematibus etiam loqui conſequentiæ neceſ-
 ſitate ducti fuimus. De quibus deniq; ſermocinati, ſpecies adhuc nonnullas percurrere decreui-
 mus. Inter quas & uariolas, & morbillos, & robeliam, ſiue roſſaliam inuenimus. Qua de re
 30 neq; ſub ſilentio præteriſſe huiusmodi exanthemata libuit. Rurſus quoniam hoc loco nos ſin-
 gulorum tumorū cauſas, pro ſeptima Principis præpoſita^k diſtinctione, ueſtigamus: Quò deinceps
 ceptus an calidi, an uerò non calidi ſint pernouerimus. Eapropter horū quoq; exanthematum ge-
 nerationem diſquiſiuiſimus. In cuius examine uariolas ex putrido magis ſanguine fieri, Mor-
 billos autem ex bilioſo, Robeliam uerò, ſiue Roſſaliam ex tenui feruentiq; nihilominus ſanguis-
 ne, haud maligno, inuenimus. Adeò ut neceſſariò in calidorum, quinimò feruentium tumorum
 albo connumerandos huiuscemodi affectus decretum ſit. Demum quia uariola nomenclatur-
 ram à uaris, quibus ſimilis aliquando ſit, deductam eſſe nonnulli autumant. Ideò & de uar-
 ris quoq; obiter hic nonnihil tetigiſſe opportunum fuit. Quos tamen inter frigidos deniq; tu-
 mores adnumerandos præſertimq; calloſos recensuiſimus. QVIBVS tandem enucleatis ad
 40 quintū & trigeſimum ex Galeno propoſitum tumorē pertransire tempeſtiuū eſt. Dothienem
 ſcilicet, de quo quidem, libro, quem interpretamur, de tumoribus inquam præternaturam, ſic

c lib. 3. cap. 25.

d lib. 8. cap. 13.

e lib. 6. cap. 5.

Vari unde

f supra fo. 185.

linea. 12.

g lib. 14. ca. 26.

h 7^a. 4^a. tr. 3. c. 5.

Bothor lenes.

Bothor lactei.

Contra Mar-

cellū Virgiliū

i In cōmento Dio-

ſcoridis lib. p^o. ca.

53. de lilino uns-

guento.

Epilogus.

post nominatas myrmeccias, acrochordones, psydraces, et epinyctides, quas omnibus notas esse affectiones prædixerat: statim subdit ὅτι οὐχ ἡμεῖς καὶ οἱ ὁδοὶ ἔστιν. quod est, Notus uero non minimum est etiam dothien, furunculus ue. Quibus me Hercule Galeni uerbis intellectis, non uehementer admirari, simul ac non dolere nequeo maximam nostri seculi infelicitatem. ut in quo uarijs, & innumeris ferè morborum speciebus continuò uexamur, præsertimq; ob deprauatam uictus rationem, huiusmodi tumore indies affligimur: adeò ut notissimus proculdubio affectus sit, Nomen tamen eius non secus atq; epinyctis, & psydracion plurimis adhuc in ambiguo sit. Vt inde morbi proprium caput, & curationis methodum apud Latinos, atq; ipsos etiam Latine loquentes Græcos, aut Arabes inuenire difficil-

Contra Marcellum nobis fiat. Marcellus. n. Virgilius uir alioqui tum Græcæ, tum Latine linguæ peritissimus
 cellum Virgiliū hallucinasse penes huiusmodi Græcū nomen ὁδοὶ uisus est. In primis enim non eos mor-
 1 lib. 2.º. ca. 156. do tumores, quos Græci chæradas uocant, sed ab illis etiam nuncupatos dothienas, à Plinio
 de asphodelo. m ut lib. 2.º. ca. Latine strumas, absq; distinctione, appellari ait. Mox uero deinde, quanq; huiusmodi Plinij
 14. de nascitio in fine & lib. p.º. traductionem minime comprobauit (longo enim interuallo dothienes à strumis differre
 cap. 149. deficiis, non temerè uoluit) Nihilominus tamen in eam, quam refutauit, interpretationem cecidit. Adeò
 post prin. ut pro dothienibus apud Dioscoridem aliquando strumas Latine conuerterit, nonnunq;
 n ut lib. 2.º. cap. uero, ut inconstans in huiusmodi Græci nominis interpretatione existens, furunculos Latine
 76. de tritico & ne traduxerit, interdum autem nominis Latini ambiguitatem ueritus, pluribus quidem dis-
 lib. 4. cap. 165. de Pycnocomo. ctionibus circūscripserit. Veluti quum Græcè Dioscorides habet. ὁδοὶ καὶ ὁδοὶ ἔστιν
 o ut libro. 2. cap. Marcellus Latine interpretatus est tubercula, & in carnosissimis partibus ex crassa materia tu-
 156. de asphodelo. midi abscessus. Quinimmo, quod peius est, in eodem capite reprobata à se Plinij traduc-
 p lib. p.º. ca. 149. tionem omnino sectatus, cum ὁδοὶ ἔστιν prius, & dein uero ὁδοὶ ἔστιν in textu noster
 de ficis. q post prin.º. cap. Græcus Dioscorides habeat: utrunq; & strumas ipse traduxit. Bisariam igitur peccat Mar-
 r post medium. cellus, dum ὁδοὶ ἔστιν Latine & strumas & nuncupat: tum quia in id incidit, quod à semetipso
 s li. 2.º. cap. 156. reprobatum aliquando est, tum ante id, quoniam Plinij sententiam esse hanc reputauit. Id
 de asphodelo uer fus sine comēti. quod proculdubio falsissimum est. Nam si quæcunq; Plinius dixit, à Dioscoride transcripsisse
 t lib. 3. cap. 89. se, uelut eius interpretem hunc uolueris, Cum quæ de Galbano, Pycnocomo Sale, atq;
 u lib. 4. cap. 165. aphronitro Dioscorides ad dothienas ait: ad furunculos Plinius applicuerit: non hercle
 x lib. 5. cap. 80. strumas, at furunculos potius à Plinio uocari Græcorum dothienes agnoueris. Ac præser-
 y lib. 5. cap. 85. tim in eodem considerans capite seorsum furunculos, atq; strumas nominasse. Sin (quod po-
 z lib. 24. cap. 5. tius reputo) non semper Dioscoridis interpretes Plinius est: sed ab eo, atq; alijs etiam plurima
 de galb. de pyc- præsidiorum genera transtulit. Quid mirum si quodpiam remedium Dioscorides uni mor-
 nocomo. aut li. 26. bo applicuerit, Plinius tamen alteri, cui & conferre quoq; potest, ascripserit? Cum nullum
 cap. 12. de sele li. præsidium uni duntaxat morbo sic proprium sit, quin alteri, atq; etiam pluribus confer-
 31. ca. 9. de aphro- re queat. Nil ergo miri est, si asphodelum, ac fici, & caprifici grossos Dioscorides dothien-
 nitro lib. 31. ca. 10. bus furunculis ue conferre ait: Plinius tamen, nulla de furunculis mentione facta, stru-
 a ut lib. 20. cap. mis congruere testatus est. E quibus fortasse, aut similibus deceptus Marcellus Græcorum
 17. post prin.º. li. dothienas à Plinio strumas nuncupari existimauit. Cum ergo sexcentis in locis Plinius de fur-
 24. cap. 5. uersus runculis seorsum à strumis meminert, Græcorum dothienas ab ipso furunculos, quemadmo-
 fine li. 28. cap. 7. dum à Celsò etiam, uocatos: Græcorum uero chæradas, ab ijs strumas nuncupari certo cer-
 uersus finem. tius opinor. At hæc obiter, ne quispiam in nomine decipiat, Plinium (Marcelli dogmate) 40
 b lib. 2. cap. 156. sectari
 de asphodelo. at
 de grossis lib. p.º.
 cap. 149.
 c lib. 22. cap. 12.
 de asphod. 53. de
 gross. lib. 23. ca. 5.

sectari existimans, usq; adeo dicta nunc sint. Quæ autem maioris sunt momenti prosequamur.
 „ Passim ergo, & in quacunq; parte, ac maximo incommodo nascuntur (perbelle Plinius d
 „ ait) qui furunculi uocantur: mortiferum aliquando malum confectis corporibus. In quacunq;
 „ ait parte. sc. corporis nasci. Quamobrem inter nomina ponitur {dothien} à Galeno, quæ nec loz
 „ cum affectum repræsentant, neq; causam, quæ morbos effecit. Mortiferum uerò aliquando ma
 „ lum est, quum uidelicet multum inflammati sunt, ac profundius consistentes. Mitior enim huz
 „ iusmodi tumor est (inquit Galenus, f cui Paulus & ad uerbum subscripsit) quum in sola
 „ cute constituitur, Malignus uerò, quum profundius magis ue in altum constiterit. Vidimus
 „ autem huiusmodi: & quidem extreme malignos dothienes diebus elapsis quendam ferè se
 10 xagenarium plurimos insimul obsidentes, in multis quidè thoracis partibus, ac brachijs etiam,
 et hypochondrijs adeo altè obortos, ut uix in exterioribus tumor effatu dignus appareret. Ma
 „ gis tamen ex rubore, ac duritie unà cum aliquantulo dolore affectus deprehendebatur. quo
 „ mox dissecto maxima puris, & quidem crassissimi copia emanabat, donec ampla cauitas, ac
 „ fouea, fieret. Vnde medicorum fœx, ac ineptissima chirurgorum grex anthracem ab antro
 „ nuncupare, nobis interim subridentibus, minimè desistebat. Vsq; adeo nihilominus maligni
 „ erant, ut promptissime gangrænâ efflagitarent, & quibuslibet demum præsidiorum ge
 „ neribus medium unguem porrigentes, plurimiq; continuo uoui renascentes, ac uix aliquibus
 „ ex primis ad sanitatem reductis, ualidissima cum febre, affectum hominem ad Iouis cœnam,
 „ quanuis inuium, & omni penitus appetitu destitutum transmiserunt. Interdum uerò absq; ul
 20 la ferè, aut q̄minima inflammatione roborati dothienes oboriuntur. Quæ de re duplex horum
 „ genus esse Galenus b ait. Aliqui enim (ut quispiam dixerit) iouē dēas, Latine uarosi, du
 „ ri, & ægrè concoctiles: aliqui uerò inflammati, in quibus aliquando etiam febres consistunt,
 „ & tumor in magnitudinem excrescit, & in pus transmutatur: primum genus nonnulli cla
 „ uum, aut spinam appellare consueuerunt. Quauis autem ex similibus, aut natura uicinis huz
 „ moribus ijs, ex quibus uari generantur, furunculos etiam fieri Galenus i prædixerit: Haud
 „ quaq; tamen ob id ex eodem penitus succo generari furunculos, & uaros opinandum est. Cū
 „ inter calidos tumores furunculi, quemadmodum inter frigidos uari numerandi sint. Verum
 „ ex crassiori sanguine, ac pituitoso, uel fortassis etiam atrabilario, dothienes furunculos ue ge
 „ nerationis originem suscipere, uaros autem ex pituita, cui nonnihil atrabilarij crassioris ue
 30 sanguinis admisceri consueuit, factos esse reputo. Adeo ut, quia in his pituita superabundat,
 in illis uerò sanguis, hos ex calidorum, illos uerò ex frigidorum albo deleuerimus. Idcirco
 „ Galenus k dothienes, & phymata, de quibus postea sermo fiet, inflammabundos affe
 „ ctus nūcupat. Paulusq; l ac Arabum Princeps m inter calidos hunc tumores connumerant. Inz
 „ quit enim Princeps: Aldemenul (sic enim Græcorum dothienem Arabes uocant, siue absq;
 „ articulo demenul) iterum sunt de genere exiturarum. Et plurimum eorum fit ex malitia di
 „ gestionis ex motibus super repletionem, & quæ currunt cursu illorū: Razesq; ante ipsum
 „ scripsit n Adememil (sic enim ab eo nonnuq; uocatur) est genus apostematis calidi, quod
 „ multiplicatur in eo, qui multum utitur cibis multiplicatibus sanguinem plurimum. Alibiq;
 „ sub nomine Carbunculi, ait: Carbunculi ex multo sanguine, & uectatione, & labore post
 40 saturitatem oriuntur. Hinc uulgares nostri uocare consueuerunt Carbuncho. Quo in nomi
 „ ne, prius q̄ dothienis naturam exquisitijs uesligemus, commemorandum quadantenus uisum
 „ est

d lib. 26. ca. 12.
post principia.

e 2º. meth. ca. 2.

f lib. de tu. præ.
nat. cap. 17.

g lib. 4. cap. 23.

Historia.

b 5º. de cõp. me.
secundū loc. cap. 3
post principia.

Clauus.

Spina.

i Ibidem.

Furunculus si
ue Dothiē cas
lidus tumor.

k li. de tu. præ.
nat. cap. 18.

l lib. 4. cap. 23:

m Infra cap. 32.

et 34.

Aldemenul.

Demenul.

Adememil.

n lib. diuis. cap.

131.

o lib. 7. ad Man
forem cap. 10.

Carbun
menul

p supra fo. 85.
Anthrax.

q infra cap. 2. et
10.

r 2. meth. cap. 2.
s cap. 133.

Erysipilla.

Ignis persicus

t lib. 7. ad Man-
fore cap. 17.

u lib. 17. Contin.
ea 3. litera. S.

x 2. ad Glau-
cap. p. 9.

y 13. Contin. c. 10
z circa medium
capitis signo. f.

a uersus finē ca-
pitis litera. S. et p.

b saepe ibidem si-
gno. f.

c ante mediū ca-
pitis signo. f. ex
Pauli autho. &

uerfus finē capi-
tis signo. f. e. 2.

d lib. Diuif. cap.
135. & 18. Contin.

cap. 8. signo. x. et
e 13. Contin. ca. 4.

litera. G

f ibidē cap. 10.
litera G.

g cap. 17. 18. &
24. p. doc. p. c. 5.

h 7. ad Manfore
cap. 10. & 13.

Contin. cap. 4. li-
tera E.

i li. Diuif. c. 131.
k infra ca. 33. 34.

Carbunculi
Romanorū.

l lib. 5. cap. 28.
in principio.

m 2. ad Glau-
p. post medium.

n 14. meth. ca. 10
post prim. idēq;

innot lib. de atra-
bili. cap. 4. post
principia.

est, Præsertim quia Razes q plurimis chirurgiculis non paruam errandi, ac uarios morbos cō-
miscendi ansam præbuit. A' v̄ḡ ᾱ enim Græcè dictus affectus (quem ordine decimum antea
p declarauimus) Latine carbo dicitur, quia scilicet instar igniti carbonis pruna' ue comburat,
ac demum ut extinctus carbo niger euadat. Ex combustis enim lignis factus carbo apud Græ-
eos α' v̄ḡ ᾱ nuncupatur, à cuius similitudine huiusmodi morbus nominatus etiam α' v̄ḡ ᾱ est,
eademq; ratione ab Arabum Principe l pruna, & ignis persicus uocatur. Idcirco non temere à
Galeno r inter ea nomina quæ à similitudine imponuntur connumerata hæc dictio est. Razes au-
tem (uel eius fortasse ineptissimi traductores) Libro Diuisionū s uocato, erysipillam, & ignē
persicum, utroq; insimul nomine, prædictum Græcorum anthracem appellat. ad Mansorem ue-
rò scribens t, ignem persicum duntaxat eundem nominat. In confusissimo autem continente sa-
tis uaria, & inconstanti nomenclatura describit. Aliquando enim, uel in eodem capite, u modò
ignem sacrum, modò ignem persum nominat. Aliquando autē Galeni uerba x transcribere co-
natus, in uno insimul etiam capite, y prius z erysipillæ nomine, deinceps a uerò ignis sacri di-
ctione circūscribit. Quodq; peius est, in eodem quoq; capite, idem nomen scilicet erysipilla, non
modò pro Græcorū anthrace, sed etiam subinde pro erysipelate, b atq; interdum pro herpete c
capitur, addita nihilominus dictione i procedens ut Græcorum herpes, apud eum i erysipilla
procedens nuncupetur. Anthracis autem uoce d Razes eam uel anthracis maligni pestiferi ue-
speciem intelligit. quā ipsemet alibi e i thaim, i & apostema pestilentielle, i nonnunq; f uerò
i epidimiā nominat. Princepsq; infra g althoin, & thahun siue althai uocat. Carbunculi autē no-
mēclatura idē Razes (ut ad id unde digressi sumus reuertamur) nec Græcorū, neq; suū anthra-
ce, sed leuiorē longē morbum intelligit, h eum scilicet, quem à Græcis θοβιλῶα, à Romanis ue-
rò furunculum, atq; ab ipsemet alibi, i nedum ab Arabum Principe, k aldememil nūcupari præ-
diximus. Ex his ergo patet cur triviales chirurguli Razis monumēta insequentes, eademq; Aui-
cennæ duntaxat capiti comparantes, Græcorum interm caudicibus minimè perpensis, anthra-
cem, atq; althoin pro eodem perpetuò, ac uniuersaliter assumunt. Id quod tametsi in Rasis &
Auicennæ doctrina, error nequaq; (nisi penes nomina) est, perdelirā tamen sententia est, Raz-
is anthracē, Galeni, reliquorumq; Græcorum anthraci confundere. Longeq; sc̄uior demen-
tia est i α' v̄ḡ ᾱ Græcum nomen ab antro, Latina dictione deriuasse. Præsertim (quod peius
est) quoniam nonnulli satis ineptē, atq; insipide antrum deinceps, id est cor interpretantur. Ex
prædictis etiam euenit nonnullos Razis carbunculum (quem & anthracem, ob foueam, uocat, 30
ab antro, perinde ac dictum iam est) Romanorum carbunculo confundere. Vnde quanta in res
medijs incommoda, & uitæ pericula succedant, cuius iudicare in promptu est. Verum enimue-
rò quoniam de Romanorum carbunculo meminimus, hic etiam obiter, ac ueluti per transennam
Plinij, & Celsi carbunculos indigitare, non inutile, quin operæpretium fore iudicauimus. An
scilicet ab ijs uocati carbunculi, Græcorum medicorum anthracibus respondeant? Inspec̄ta. n.
Celsi l descriptione, quod dubium excitare magis potest id ipsum est, quoniam sensu destitutum. 1.
affectum morbum ue siue (ut rectius diximus) affectam partem ait: Galenus m autem effer-
uescentem, grauemq; dolorem inferre uoluit. Deinceps te ambiguum reddet, cū Celsus disjunt- 2.
ctiue inquit i nonnunq; horror, aut febris oritur, aut utrunq; i inueniens quidem per hæc, nō sem-
per febrem adesse: Galenus uerò inquit n quod autem necessariò febricitent qui ita sunt affecti, 40
idq; non minùs, immò magis, q illi, quibus erysipelatoza est phlegmone, id utiq; latere neminem
potest. i

3. potest. Adhuc magis anceps me hercule fies Plinij monumentis attente consideratis, quum ait. ^o 0 lib. 26. cap. p^o.
 „ Paulo. Q. Martio censoribus primum in Italia carbunculum uenisse annalibus conscriptum
 „ est peculiare Narbonensis prouinciæ malum: quo duo Consulares obiere. Nascitur in oculis
 „ tissimis corporum partibus, & plerumq; sub lingua, duritia rubens uarijs modis, sed nigricans
 „ capite alias liuido, corpus intendens, neq; intumescens, sine dolore, sine pruritu, sine alio, q; som
 „ ni inditio, quo grauatos in triduo aufert, aliquando & horrorem asserens, circaq; pustulas par
 „ uas, rarius feriens stomachum: faucesq; cum inuaserit, ocysissime exanimans. Ex ijs enim Plinij ^{p 21. epid. i pri^o}
 uerbis diuersum esse carbunculum a Galeni anthrace apparet: Cum in occultissimis corporu ^{& 31. eiusde co^o}
 partibus fieri dicat, quod Hippocrates, ^p & Galenus, ¹ cæteri q; deinceps Græci medici in ^{mentario. 3. tex.}
 10 exterioribus gigni descripserunt. Itemq; sine dolore, sineq; pruritu Plinius posuit. Id quod ^{12. 50.}
 non modo grauiter dolens esse Galenus ait: uerum & ab initio pruritum necessario in ^{q 14. meth. cap.}
 ducens. Cuius quidem pruritus ratione scabunt ægrotantes, indeq; pustula quædam oritur, ^{10. 21. ad Glauc.}
 aut crebræ instar milij pustulæ gignuntur: quibus disruptis mox ulcus cum crusta euadit. ^{p^o 61. aphor. 4 s}
 Quas ob res nō inter inflammationes modo Galenus ^{de tum. præ.} annumerat, uerum & crustosum ulcus ^{nat. ca. 7. et p^o de}
 aliquando ^{reperamētis cap.} appellat. Cum aliter (ut ait) consistere nequeat. In carbunculis autem qui per ^{4. lib. de atra bile}
 Asiam populatim sunt grassati, etiam citra pustulas nonnullis excoriata statim cutis est. ^{cap. 4. & sæpē.} ^{r ut Paulus li. 4}
 4. nibus tamen (ut dixi) crustosum ulcus fit. Quid quod Plinius non intumescere huiusmodi af ^{cap. 25. & Ac-}
 5. fectum protulit: Galenus autem in tumorum præternaturalium catalogo connumerauit. De ^{tius lib. 14. ca 59}
 mum ipse quoq; Plinij æmulus Marcellus Romanus ^{s 21. ad Glauc.} uelut ab anthrace diuersum carbunculū ^{cap. p^o.}
 20 nominat, dicens & ad carbunculos sanē, & anthraces, & escharas. etc. Vi hic quoq; dubitan ^{t 14. meth. ca. 10}
 „ di ansam adaugeat. Quos tamen nodos dissoluere promptissimū fuerit, Romanos interim ostend ^{& ita Hip. i prin}
 dendo Græcis, nedum sibi metipsis congruere. Illi enim præsertimq; Celsus, ac Plinius quan ^{cipio. 21. epidem.}
 dam uidentur anthracis speciem, non ipsum genericè sumptum anthracē intellexisse: malignio ^{u 21. ad Glauc.}
 rem scilicet, ac (ut ita dixerim) uenenofo ex sanguine genitam anthracis formulam. Quæ des ^{p^o 14. meth. c. 10}
 structa quidem affectæ partis essentia, temperie uel sensum quoq; abolere cōsueuerit. Id quod ^{de tum. præ. nat.}
 in gangrænâ prius, deinceps uerò in sphacelon conuersa phlegmone, atq; etiam (uti ui debi ^{cap. 7.}
 mus) ^{Ad p^m.} Cancer interdum efficere solent. Quantum uerò ex se est, ab inflammatione, prurituq; ^{x 6. aphorism.}
 ac pustulis exordium suscipit. Quamobrem doloris expers esse nequit. Dolentem ergo Quin ^{cōmento. 45.}
 „ tus quoq; Serenus suo carmine supposuit, ^{y lib. de morb.} m dicens & Horrendus magis est, perimit qui corpo ^{diff. capite. 12.}
 30 ra carbo, Vrit hic inclusus, uitalia rumpit acerbus. Nunc ueteres quondam uarijs pepulere me ^{z 14. meth. cap.}
 „ delis. Tertia namq; Titi simul & centesima Liui, Charta docet ferro talem cādente dolorem, ^{10 in principio.}
 „ Executū. etc. Fortassisq; circa suæ generationis primordia (maximeq; si in extremis corporis ^{a 14. lib. de tum.}
 partibus oboriatur) absq; ulla febris nota suas anchoras iacere huiusmodi morbus potest: q; q; ^{præ. nat. q; 2^o ad}
 temporis processu, cum increfcere occeperit, necessario sibi febrem (Galano docente) ^{Glaucōne. et. 14.} comi ^{meth. & sæpē.}
 tem adiungit. ac si neruosam quampiam partem inuaserit, uel in suppurationem conuertatur, ri ^{Ad 2^m.}
 gores quoq; aut horrores uel ordine interdum destitutos obtinere potest. Qua de re Celsus ^{b lib. suo de me-} dis ^{dicamentis cap. 7}
 iunctiuē ait. Nonnunq; horror, aut febris oritur, aut utrunq; In primis enim (ueluti præ ^{uersus finem.}
 dictū iā est) absq; his exordiri aliquando potest: mox aut horror, ab hoc uerò febris, ac demū et ^{c ifra i declar}
 horror & febris uicissim affligere hominem solent. Præcipueq; si thoracis, capitis uel, aut in ^{tione distin. 21^o.}
 40 fimi uentris quampiam partem talis affectus comprehenderit. Itaq; Paulus ^{m cap. 39.} f etiam non sem ^{d 14. meth. cap.}
 per, at magna potius ex parte annexam esse febrem insinuat, dicens ^{10 & lib. de a-} ^{tra bile cap. 4.} ^{e lib. 5. cap. 28. i} ^{principio.} ^{f lib. 4. cap. 25.}

ἡτοι οὐκ ἐπὶ τοῖς. } quod est } Plurimis uerò febres etiam insimul contingunt. } Quauis
 Ad. 3^m. autem non secus ac phlegmone, uel erysipelas uiscera huiusmodi tumor aggredi queat: Ex-
 timos tamen subcutaneos uel musculos maxima ex parte molestare conspiciuntur: sicq; à medicis
 omnibus tam Græcis, q; Arabibus, atq; etiã Latinis describitur, hocq; modo ab iisdem curatur.
 Haud enim Plinius in occultissimis corporum partibus nasci scribens, in uisceribus generari
 eo loquendi modo uoluit. uerum occultissimas quidem partes sub cuti positos musculos intellexit.
 Quemadmodum & ante ipsum Celsus (à quo nonnulla Plinius surripuit) intellexisse per-
 spicuum apparet: Quum ait. } Eius hæ notæ sunt. Rubor est, superq; eum non nimium pustula
 eminent, maxime nigra, interdum subliuida, aut pallida, in his sanies esse uidetur. infra color
 niger est. Ipsum corpus aridum, & durius q; naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est: 10
 eaq; inflammatione cingitur. Neq; in eo loco leuari cutis potest, sed inferiori carni quasi affix-
 xa est. etc. } E quibus porro uerbis non modo quod intendimus patet: sed cur etiam non intume

Ad. 4^m. scere Plinius ait. Exterius enim euidentem non apparere tumorem idcirco uoluit, quoniam per-
 nitius in carne, ob sui crassitiem, atrabilarius sanguis retinetur, ad cutim, bilis instar uel erysipe-
 las uel herpetem producentis, penetrare minimè ualens. quamobrem attolli cutem, ut illiusmoz-
 di succi expertem, non contingit: sed inferiori carni (perinde ut Celsus inquit) quasi affixa
 inflammatio est. Quamq; neq; id ipsum omnino uerum est. Nisi parum eleuari cutem pie intellex-
 erimus. Etenim tum ob ipsius subiectæ carnis tumorem, tum ob nonnullas tenuiores atrabila-
 rj sanguinis portiones ad cutim penetrantes (quarum quidem ratione pruritus, ac dein crusta
 siue crustosum ulcus in ipsa etiam cuti fit, colorq; in primis ruber, mox uerò liuidus, aut niger 20
 euadit) aliquantulum attolli cutim, & si non pro uniuerſi tumoris ratione, cuius perspicuum fo-
 re opinor. Quod si nullatenus eleuari tumesceriq; cutem, ob tumoris profunditatē, appareat. Haud
 quaq; tamen ob id à tumoris natura & definitione degenerare huiusmodi affectum proferens
 dum est. Si quidem eorum, quæ de tumoris essentia, in secundæ distinctionis declaratione, circa

g supra. 75. in
 fine & 76. in
 principio.

Obiectionis
 solutio.

h com. præce-
 denti.

i ibidem sæpe.

k cap. 26. eius-
 dem libri quinti
 principio.

l lib. 26. cap. p^o.

m lib. 36. ca. 27
 circa finem.

huiusce commenti primordia tetigimus, & obliti minimè fuerimus. At ne præostensis quidē Cel-
 si uerba opponuntur: ut qui ab initio statim capitis ait } Ab his quæ extrinsecus incidunt, ad ea
 ueniendum est, quæ interius corrupta aliqua corporum parte nascuntur. E quibus non aliud
 carbunculo peius. etc. } In quibus profecto uerbis interius carbunculum fieri insinuasse, corticē
 duntaxat perpendentibus uidebitur. Sed non id Celsi propositum est, uerum non ab exteriori
 causa (quam procatarcticam præincipientem uel nuncupari non semel antea declarauimus) b na
 sci carbunculum, cancrum, therioma, sacrum ignem, cæterosq; de quibus postea sermocinatur,
 tumores, at ab interiori, abditaq; seu corporea, quam antecedentem antea quoq; nuncupauimus,
 originem ducere uoluit. De quibus quidem prius k iam, cum quinq; malorum genera proposue-
 rit, secundo loco, post uulnerum, ulcerumq; extrinsecus incidentium curationem, se locuturum
 insinuauerat. Quamq; Plinius l duos Consulares obijisse carbunculo refert, quorū alter scilicet
 Iulius Ruffus medicorum inscitia sectus, alter uerò Q. Licanius Bassus appellatus pollice læ-
 uæ manus euulso acui ab semet ipso, tam paruo uulnere, ut uix cerni possit. Quamobrem ab exte-
 riori tunc causa superuenisse carbunculum Plinij relatione apparet. Nos autem gangræna for-
 tass is eos obijisse suspicamur, quam tamen imperitus qui spiam medicus carbunculum nuncupas-
 rit. Marcelli autem Romani medici cōtextum deprauatum esse autumo, quum ait } Ad carbun- 40
 culos sanè & anthracas. etc. } loco enim dictionis } sanè & } legendum puto } siue } ut sic les-
 gamus

Ad. 5^m.

Marcelli Ro-
 mani locus.

- gamus {ad carbunculos, siue anthracas} idem enim sunt. Nec absurdum porro fuerit sic etiam, uti se habet, legere {ad carbunculos, sanè, & pro, id est anthracas. etc.} Quouis autem modo literam legisse fas est: dummodò non duos, at unum morbum carbunculi anthracisq; nomine intellexerimus. Quod si cuiusdam occultissimas corporum partes, uiscera potius apud Plinium ^{b lib. 26. cap. 6.} intellexisse libeat: particulatim capere uerbum { nascitur } oportet, ac (ut logici dicunt) indefinitè: ^{l lib. 30. cap. 12.} quasi dicat { Nasci potest } seu interdum nascitur. { Vbiunq; enim carbunculos Plinius curat, in exterioribus ipsum partibus supponens, impositis, illitisq; medicamentis discutere, aut delere, siue maturare, aut rumpere docet. Veluti quum ait ^{m lib. 22. cap. 23.} { carbunculus fimo columbino deletur per se }, illito, uel cum lini semine ex aceto mulso. Item apibus, quæ in melle sunt immortuæ, impositis: ^{post principia.} ^{n lib. 23. c. primo.} ^{post principia.} ^{o Ibid. c. 4. post principia.} ^{p Ibid. cap. 6.} ^{q Ibid. c. 7. ante medium.} ^{r lib. 24. cap. 11.} ^{s li. 28. c. 18. uersus finem.} ^{t lib. 32. cap. 10.} ^{u lib. 20. cap. 13.} ^{x Ibid. circa finem.} ^{y Ibid. cap. 19.} ^{z Ibid. cap. 20.} ^{a lib. 22. cap. 25.} ^{b lib. 23. cap. 3.} ^{c Ibid. post pauca.} ^{d Ibid. cap. 8. ante medium.} ^{e lib. 24. cap. 7.} ^{f lib. 36. c. ult.} ^{g lib. 3. de re medica cap. 30.} ^{h 7. ad Māforē cap. 10.} ^{i libro. 18. ca. 28.} ^{etiam post medium.}
- lentaq; imposita in spersa. Si in uerendis sit, cæterisq; ibi ulceribus occurrit, è melle æsypum cum plumbi squamis. Item fimum pecudum incipientibus carbunculis. { Atq; id ipsum alibi quoq; non semel ex eiusdem Plinii dogmatibus collegisse promptissimum est. Quemadmodum ubi de La- fere ^{m uua passa,} ^{n oleastri folijs,} ^{o cotoneorū lanugine,} ^{p ficis maturis,} ^{q jabina,} et suis fœminæ cerebro, ^{r coracinorūq;} deniq; salsamenti, aut mullorum salsamenti cinere ^{s locutus est,} apertis fimum fit. Foris enim illiniri, ac superimponi huiusmodi singula medicamenta, pro carbunculo- rum curatione, determinauit. Nec aliter aliquando nasturtium, ^{t rutam,} ^{x ceratilis eam speciē,} quam aliqui glaucion uocant, alij (eodem authore ^y) paralion, pariterq; coriandrum ^{z eruū,} ^{a succum foliorum oleæ,} ^{b oleastriq;} fructus, ^{c ueterem nucem,} ^{d picē,} ^{e atq; ipsum deniq; quer- neum carbonem f carbuncolorum præsidia, fuisse ab eo scripta, nisi ut imposita, illitaq; uide- tur. Quemadmodum & alter quoq; sibi ascriptus liber præsefert, & qui et oculum pullinaticum hu- iusmodi affectū ex aliorum sententia nuncupat. Sed cur in tam clara re ambigimus? Siquidem ipsemet Plinius. Q. Lucanum Bassum carbunculo in pollice, ob acu factam puncturam, ena- to uitam cum morte commutasse refert. Haud igitur occultissimas adeò partes intellexit: ut subcutaneos musculos exclusisse uoluerit. Verum de hoc obiter, ac ueluti per transfennā hoc lo- co intantum dictum iam sit. Plura enim proprio carbunculi anthracisue capite enucleanda re- seruantur. Nunc uerò ad id, unde digressi sumus, regredi tempestiuum est: Dothienes in- quam, quos quidem (ueluti præscriptum iam est) Razis interpres aliquandò ^{b carbunculi uoce} ostendit. Adeò ut æquiuocum nomen id sit ad Romanorum carbunculum, Græcorum uerò an- thracem, & alium tumorem, qui ab his dothien, ab illis uerò furunculus appellatur: siquidē Bar- baros nedum Græcos, ac Latinos authores omnes contemplari decreuerimus. Sed ne in ijs qui- dem duobus tantum, aut tribus (si carbonem quoq; igneum, extinctumue adiecerimus) signifi- catis, carbunculi, siue carbonis æquiuocatio consistit. Verum & in alijs quoq; (ut dialecticorū nomenclatura utitur) æquiuocatis. Etenim & uitium quoq; morbumue præcipue uitibus aliquan- dò aduenientem, alijsq; nonnunq; arboribus carbunculi nomen præsefert: à quo & { carbuncu- lare } uerbū, { carbūculariq; }, atq; etiam { carbūculatio } deriuantur. Quamobrem Plinius hoc mo- do scriptum reliquit: { In hoc temporis interuallo (tertij scilicet ac sexti, prout nonnulli inter- pretantur, Idus Augusti) res summa uitium agitur decretorio uuis fidere illo quod caniculam appellauimus. Vnde carbunculare dicuntur, ut quodam uredinis carbone exusta. Non compa- rantur huic malo grandinis procellæ, nec quæq; unq; annonæ intulere caritatem. Agrorum quip- pe mala sunt illa. Carbunculus autem regionum latè patentium, non difficili remedio, nisi ca- lumniari naturam rerum homines, q; sibi prodesse malent. } Idemq; alibi tetigerat de alijs}

lib. 17. ca. 24.
ante mediam.

lib. 12. cap. 7.
post principiu.

Brechmasis.

m. lib. 17. c. 27. 1.

prin. 2. lib. 18.

cap. 19. uersus fi.

nem.

Carbunculus

gemma.

n. lib. 37. cap. 7.

in principio.

o. lib. 17. cap. 4.

circa medium.

p. lib. 2. cap. 13.

in medio.

Carbunculi si

gnificata sex.

q. lib. 7. ad Man.

furum cap. 10.

lib. 5. cap. 28.

sec. 3. 1.

Furunculus qd.

Furunculi uen-

tricus.

Furunculi ra-

dix.

s. supra fo. 211.

t. lib. de tu. præ-

nat. cap. 17.

etia arboribus communiter dicens

Sideratio tota e caelo constat.

Quapropter & grando in ijs

causis intelligi debet, & carbunculatio, quod pruinarum iniuria euenit.

Hæc enim uerno tem-

pore inuitatis, & erumpere audentibus satis mollibus insidens, adurit lactescentes germinum

oculos, quod in flore carbunculum uocant.

Idcirco & cum de Piperis arboribus loqueretur

antea sic scripserat & uerum et ijs sua iniuria est, atq; cæli intemperie carbunculantur, fiuntq;

semina cassa & inania, quod uocant brechmasin, Indorum lingua sic significante aborsum.

Quin & huiusce arborum præcipueq; (uti diximus) uitium affectus curationem quoq; non

nunq; tetigit. Præter id autem aliud quoq; carbunculi significatum est: quoniam pretiosissimam

quidem gemmam præsefert, sic quoq; ab igniti carbonis similitudine appellatam. Ut cuius quis

dem fulgor nec tenebris uincitur. adeo ut ueluti flammæ ad oculos uibret. Principatum ha-

bent carbunculi (dicebat Plinius) à similitudine ignium appellati. Cum ipsi non sentiât ignes:

ob id à quibusdam apyroti uocati. Deniq; terræ genus quoddam carbunculus significat nigrum,

& in quo tessellæ lapideæ, & nigræ inueniuntur. De quo Plinius etiam inquit: Affligit agri

colam & carbunculus terræ, quæ ita uocatur. Emendari uitem hac terra putatur. Palladiusq;

ait: carbunculus nisi stercoretur (idq; ut supposuit, mense Ianuario) macras uineas reddit.

Quinq; igitur apud Romanos carbunculi nomen præsefert, primò quidem exustorum lignorum

siue adhuc succensorum, siue iam extinctorum frustula, à quorum similitudine reliqua deinceps

eadem nomenclatura uocata sunt. Secundo affectum quem supra descripsimus, tumorem scilicet

ignitum, pustulosumq; ac deniq; crustosum: qui à Græcis ἀνθράξ nuncupatus est. Tertio ar-

borum, præcipueq; uitium quendam aborsum. Quarto pretiosissimum lapidem. Quintoq; demum

terræ quoddam genus significat. Præter quæ sextum apud Rasis interpretem aliquando si-

gnificatum offendimus. Ut scilicet eum tumorem nobis indiget, quem præ manibus enarran-

dum ordine trigessimũ quintum assumpsimus: quæq; à Græcis dothienem, à Romanis furunculũ,

à Barbaris uerò demenul, siue aldemenu, aut adememil nuncupari demonstrauius. Cuius

definitionem à Celso positam contemplari, pro exactiori quidem furunculi notitia futile non

est. Arrectis ergo ipsum auribus intellige, cum ait. Furunculus est tuberculum acutum cum

inflammatione, & dolore, maximeq; ubi iam in pus uertitur. Qui ubi adaperitus est, & exit, superapparet pars carnis in pus uersa, pars corrupta, subalbida, subrubra, quem uentriculũ quidam furunculi nominant. & fortassis quoniam instar animalium uentriculi comesse uidetur, indeq; alimentum uniuersus tumor arripiat. Qua etiam de causa fortasse Chirurgorum grex antra-

cinæ radicem appellat, nunq; sanari posse dicens, ni ea radix, uentriculus ue remoueat. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atq; erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. sic proculdubio succedere maxima ex parte uisum est: adeo ut nullum periculum insit: eoq; magis, quò ad cutim apertius uergit. Nonnunq; tamen ob sanguinis uitium, aut multitudinem, aut (quod peius est) utrunq; intantum scæuire, qui altius constituti sunt, offenduntur, ut gangrænam, indeq; (ni exquisitiùs ac sedulo curentur) mortem induxisse uisum sit. Quemadmodum in casu à nobis prænarrato cuius palatum fieri potest. Verum enim uerò ad Galeni definitionem, libro quem nunc enucleandum assumpsimus relictam conuertamur. Quam ait. Notus uerò non minimum est furunculus dothienue, mitis quidem existens, cum in ipsa sola cute constituitur, malignus uerò si alitè exoritur. Sic enim phymati similis est, ab ipsaq; phymate sola duritie talis furunculus differt. PRO cuius

cuius quæ similitudinis, ac differentie perfectiori notitia, phyma quoque ipsum (ut unâ trigessimū
 sextum in catalogo propositum tumorem absoluerimus) enucleare operæpretium est. Ambo **Tumor. 36.**
 enim affectus inflammabundi sunt (subdit Galenus) phyma scilicet, ac furunculus. Bifariam **Phyma.**
 uerò à Græcis nomen id {φύμα} (quemadmodum sibi respondens apud Celsum ex plurimum φύμα. 2.
 interpretum usu tuberculum) capi solet. Communiter scilicet, generatimque, ac speciatim, seu pro- u li. de tu. præ:
 prie. Communiter quidem pro omni tumore (ut Pauli uerbo utar) ἐκφυόμενος, hoc est erum- nat. cap. 18.
 pente, siue perse ac sponte sua enato sumi à ueteribus consuevit. Ab ijs enim quæ in terra ena **Generatim.**
 „ scuntur, progerminant ue (Galenus^x ait) homines phymata uocarunt eos præter naturam tu-
 „ mores, ὅσοι τὸ πᾶν αὐτοῦ τὸ ἐξωθεν αἰτίας γίνονται hoc est quicumque absque ulla omni-
 „ nò externa causa ortum habent. In quibus quidem uerbis dictionem {τὸ πᾶν} considerare
 oportet. Haud enim cum Paulo Crasso & plerumque interpretati sumus: at secundum priorem **Cōtra Paulū**
 uocabuli significatum omnino: cum idē sonet {τὸ πᾶν} quod {τὸ ἐκ πᾶν} quod est in to- **crassum.**
 „ tū: siue omnino: siue in uniuersum: quanquā pro eo quod est magna ex parte: seu & ple- **x 6. de morb.**
 „ runque alibi capi posse inficias non ibimus. Galeni enim sententia, siquidem peregrina mente spe **uulg. comētario.**
 culabimur, non est omnes, qui absque euidenti causa exoriuntur, tumores, phymata (uel ex Hip- **p^o. com. 12.**
 pocratis intentione) nuncupare. Sic. n. ex interna defluxione obortā phlegmonen, erysipelas, her-
 petem, œdemata, scirrhus, atque omnes demū tumores, qui sponte sua oborti sint, phymata uocaren-
 tur. Adē ut parū deesset, quin idem φύμα, quod ὄγκος, (quod est Latine tumor) Græcis præ-
 seferret. Verū eos duntaxat præter naturam tumores intelligit, quorū natura est oīnò. q. d. sem-
 „ per ab interioribus perse, ac sponte, siue calidi, siue frigidi sint, emergere. Vt hi sunt, quos præ-
 „ manibus habemus: atque ipsi etiā furunculi, Itidemque acrochordones, satyriasmī, strumæ (prout ab
 Hippocrate nōnūq³ collegimus) et id genus quod plurimi perse ad exteriora protuberantes tumores. **3. aphoris. 26.**
 Externā uerò causam in præsentiarū intelligimus. ut cōfusione in loco, uel ulcus in pede, uel bras-
 „ chys, aut collo. Cuius rōne in inguinibus, aut alis uel post aures tumores fiāt. haud. n. strumæ ob-
 „ id uel acrochordones, aut huiusmodi alij tumores fiūt. sed phlegmonæ. E quibus tamē deinceps in-
 „ decēter sæpenuerò curatis ad horū quēpiā fieri cōuersio pōt. De qua quē alibi rursus uberiū
 „ sermo fiet: Potissimū uerò (subdit Galenus²) eos hoc nomine dignatur, quod ad exteriorē corporis **z ubi suprā. 6.**
 „ locū extuberant. Verū ob nominis alterius inopiā, latos etiā planos ue, ac paulò eleuationes eo, **epidemiorū.**
 „ quod secundū naturā esse debet, interdū hoc eodē nomine appellāt. Id quod Hippocrates etiā ser-
 „ uauit, bona esse phymata. tubercula ue dicens extuberantia, hoc est, quibus insignis tume- **Phyma unde**
 „ factio **inest, aut quæcunq; non introrsum, sed extrorsum uersus augefcunt.** & Seruauit quidem Hippo- **dicitur apud**
 crates id quod prædictū iam est: scilicet non extuberantes modo, elatosque in exterioribus tumo- **Galenum.**
 „ res phymata nuncupare, bona esse dicens: at planos etiam, parumque à naturali superficie emer-
 „ gentes eodē nomine subintellexisse, in eiusdem contextus calce adiungens & contraria uerò, mas-
 „ sa, & si quod plurimum cōtraria, pessima. In qua Galeni cōmentatione, duo præ cæteris nostro
 „ proposito cōducētia notanda sunt. Primū quia cōmunissimè non elatos tantū, sed planos quoque tumo-
 „ res (modò sponte oborti sint) phymata nuncupari à Græcis ostendit. Minus autē cōmuniter, ele- **Phyma unde**
 „ uatius extuberantes tumores eo nomine donari ab ijsdem testatur. Secundū uerò est, quod à Ga- **dicitur apud**
 leno præ oībus assumptū fuit: Vtrouis inque modo phymatis nomē usurpes, ab ijs quæ sponte ex **Galenum.**
 „ terra pullulant plantis deductam esse nomenclaturam. Videlicet ἀπὸ τῶ φύματος, quod est, na- **Speciatim.**
 „ sci. Vnde & nos uulgò nascentiam dicimus. Præter communem uerò, generalemque phymatis, **a 2. ad Glau. c. p^o**
 „ apud Hippocratem, cæterosque ueteres illū emulantes usum: Specialis quædam apud Galenū **& 3. aphoris. in**
 „ **S significatio fine.**

significatio describitur. Vt phlegmonem significet nō absolute quālibet, aut i quouis loco existē
 tē, sed quæ in adenoſa carne spontē quoq; oborta, statim augetur, atq; ad suppurationē festinat.
 Citra ulceris enim occasione in adenoſis carnibus phymata cōtingere Galenus^p ait. Quam ob
 rem & si nonnunq; inter nomina, quæ nec locum affectum, neq; causam dictione repræſentant,
 Galenus^b reposuit: Ex eorum nihilominus numero est, quæ impositorum Placito affectam par
 ticulari subindicare uidentur. Vt qui primi morbis plurima nomina imposuerunt, non minus
 hoc nomine, aut bubone, uel phygethlo, q; pleuritide, peripneumonia, ophthalmia, & cæter
 e 2^o. ad Glau.
 p^o. uersus finem. ris id genus nomenclaturis (Galenus^c etiam dogmate) insimul & passionis ipsius, & patient
 tis particulæ compositum intellectum interpretari uoluerint. (Celsi uerò speciale significatum
 postea contemplabimur, atq; Galeni phyma expediuerimus.) Pro qua quidem nuper dicta
 d 3^o. aphorif. cō.
 26. in fine. phymatis significatione, Philotei sententia, de nominis inq; ratione, atq; impositione, conside
 randa uenit. quā scilicet ait. d 3. Vocat autem phymata, ducta metaphora ab ijs, quæ in terra na
 Phyma unde scuntur, δὲ τὸ τὰ χεῖρας φύεται, καὶ ἀνέσθαι, καὶ ἐκπύουσι δὲ αὐτὰ. quod est, & quoniam
 dicitur apud celeriter nascuntur, & augentur, & suppurantur. In qua phymatis enarratione, tametsi de
 Phylotheū. speciali phymatis à Galeno^e declarata significatione, quod à Philotheo dicitur, uerum fieri po
 e 2^o. ad Glau.
 cap. p^o. test: Ab optimi nihilominus interpretis munere in eo semouetur, abestq; quoniam authoris
 Cōtra Phy quem enarrare intendit, mētem minimè attingit. Hippocrates enim in eo, quē Philotheus inter
 lotheum. pretatur, aphorismo acrachordones, strumas, satyriasmosq; & alios id genus frigido ex succo
 genitos tumores, phymata (uel eiusdē Philothei confessione) appellat: quorum profectō nullū uel
 citō generatur, uel augetur, minusq; ad suppurationē perducitur. Id ipsum uerò inde successit,
 Quoniam speciale Galeni phyma à generico Hippocratis phymate distinguere non aduertit.
 f lib. 4. cap. 22. Quem tamen Hippocratis & Galeni usum Paulus^f exactissimè pernouit. Cū de bubonē,
 phymate, ac phygethlo iuxta Galeni dogmata loquens sic ab initio confertim exorsus est & se
 g 2^o. ad Glau. p^o cundum Galeni sententiam, & bubo, phyma, & phygethlon adenoſarum partium affectus
 sunt: Bubo quidem inflammatio, phyma uerò glandulæ inflammatio ad suppurationem uer
 gens. Aliorum uerò quorundam opinione, communiter omnes præter naturam erumpentes, in
 quouis membro, ceu abscessorij apostemosiue tumores phymata nuncupantur. Inquit enim
 b 4^o. aphorif.
 aphorismo 82^o. Hippocrates: b Quibuscunq; in urinario meatu phymata nascuntur, ijs suppuratione facta,
 i Ut 2^o. aphorif. & eruptione, Solutio morbi fit. Quo etiā pacto alibiⁱ non semel Hippocrates id nomen usur
 15. & 7^o. eiusdē pat. Adeò ut nonnunq; k id quod in alijs ipse met Hippocrates solitus est uocare ἐμπύμα,
 8. 3^o. 20. et 26. 4^o. hoc est, suppurationem, in aphorismo tamen φύμα genericè quidem nominarit. Itaq; uehe
 45^o. & sæpē. menter non admirari nequeo Philotheum: qui si alia Hippocratis loca minimè recordaba
 k 7^o. aphorif. 80 tur: nec eius, quem interpretabatur, aphorismi uerba exquisitiū perlibrauerat, cū ait καὶ
 τὰ μὲν φύματα: μάλιστα δὲ τὰ περιεσφηνέναι quod est & alia phymata, sed præfer
 l in fine cōmēti. tim antedicta & saltem Galeni sermonem, in eiusdē aphorismi enarratione, l perpēdisset. Vbi
 prius genericum phymatis significatum ostendit, eoq; usum esse Hippocratem insinuat, dicens
 & omne autem ipſorum genus phymata nominat: ita deinceps scribens, acrachordones, strumæ, et
 alia phymata. Mox uerò deinde ab aphorismi enucleatione iam expeditus Galenus, ueluti pa
 rerigon, speciale phymatis significatū adiūxit: sic dicens. & Nominatur autē ἐξαιρέτως (i. præci
 puè, specialiter) ue, aut propriè, siue uti Leonicenus uertit, præcipuo uocabulo quædā phymata,
 inflammationes quæpiā spontē nascētes, & subito factæ, celerrimeq; in altum acumē elatæ, ac ce
 lerrimè etiā suppuratæ. Et plurima est harū in iuguinibus, et alis generatio. quoniā et in his par
 tibus

„ tibus plures sunt adenes, qui apti natura sunt ad superfluitates in se promptè excipiendas. His
 aut de speciali phymate declaratis, Galenus strumas hoc speciali modo phymata dici non posse
 innuit: quoniam ad suppurationem minimè properant, nec unq; facile (uti Celsus^r ait) mature-
 scunt. Neq; inflammationes sunt: cum non ex calido, sed frigido humore fiant. Quam ob re sic
 „ euestigio subdit. Horū aut adenū passio quoq; struma est, non ex calida materia, neq; ad sup-
 „ purationē properante: sed potissimum frigidiorē, ac pituitosiorē. Verū enim uerò habita dupli-
 ci phymatis significatione: generica inq; & speciali: Ad Galeni comparationem reuertamur.
 „ Cum s. de dothiene furunculo ue loquens, ^m ait sic. n. phymati similis est: ab ipsoq; phymate
 „ sola duritiæ talis furunculus differt. Quo in loco speciatim, suoq; non Hippocratis more, Gale-
 10 nū phymatis nomen usurpasse liquet. tum quia si generatim phyma capitur: dothien quoq; phyma
 est. qua de re phyma phymati compararet, duriusq; phymate phyma esse dixisset. Id quod
 promptam unicuiq; absurditatem præsefert, tum secūdo quia inflammandū esse affectū unā cū
 dothiene supposuit. ⁿ Quamplurimæ uerò generatim capti phymatis species sunt ab omni prorsus
 inflammatione immunes. Similis aut phymati dothien est, in eo q̄ mite illud etiam est, cū in ip-
 sa sola cute constituitur: Malignū uerò q̄m alte exoritur. Idcirco dictione sic^r usus est, dicēs sic
 „ n. phymati similis est. A quo nihilominus phymate differt sola duritie. Quoniā durior dothiē
 furunculus ue est: ut qui ex crassis (Paulo docēte)^o humoribus gignitur, uicinisq; (ueluti Gale-
 nus^p ait) ijs, ex quibus uari fiunt. Præsertimq; illi, qui uarosi, duri, & ægrè cōcoctiles existūt.
 Phyma uerò mollius est: quoniā ex calidioribus, atq; ad suppurationem promptioribus succis ori-
 20 ginē ducit. Qua de causa citò enascitur, augeturq; & ocyssimè ad suppurationē cōmigrat. Cel-
 sus¹ autem non¹ duritiæ tantū: sed² figura etiam, ³ q̄titate seu magnitudine, ⁴ flamma, ⁵ dor-
 lore, ⁶ puris modo, ⁷ uētriculo, ac deniq; ⁸ ijs quibus adueniunt ætatibus, differre uoluit. Cuius
 quidem uerba in medium adducere operæpretium fore duximus. Cum ex eius descriptione
 apertissimum exemplū fiat, nec Hippocratis in modum, genericè, nec Galeni specifica de-
 terminatione phymatis nomen à Celso intellectum esse. Haud enim Hippocratis sententia com-
 munitè omne spontè emergens tuberculum nec Galeni placito adenosarum partium phlegmoz-
 nen esse uoluit, neq; furunculo citius ad suppurationem tendere. Quin eo planius, latiusq; &
 minus interim inflammatum, minusq; dolorificum esse referens, furunculo ad suppurandum
 tardius phyma supposuisse uisus est. Ex quo tantū abest, quin mollius non sit: ut durius fur-
 30 runculo proferendum potius ueniat. Quis enim perspecta phymatis à Celso posita definitio-
 ne, ex frigidiori, crassiori; materia phyma, q̄ furunculum fieri ambigeret? Adeo ut non te-
 merè speciale Celsi phyma nō à generali tantūmodo Hippocratis, at alio quōq; speciali Galeni
 phymate differre decernendū sit. Quod interim Celsi phyma simul et phigethlon apud Pliniū,
 huiusq; sectatores panum, uel paniculam nominari certo certius autumo. Quāq; Celsus non
 phyma sed phygethlon duntaxat à Romanis panum uocari declarauit. Verū de pano deinceps
 sermo fiet. Nunc uerò Celsi phyma contemplemur, dum sic monumētis reliquit^r phyma uerò
 „ nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius, & Planius sæpè etiam maius. Nam fu-
 „ runculus oui dimidij magnitudinem rarò explet, nunq; excedit. Phyma etiam latius patere con-
 „ sueuit: sed inflammatio, doloresq; sub eo minores sunt. Vbi euulsum est pus, eodem modo ap-
 40 paret uentriculus: quod in furunculo non inuenitur. Verū omnis corrupta caro in pus uerti-
 tur. etc. In quibus quidem iā iam relatis uerbis id præ cæteris notandum est. Græco. s. nomine

^r lib. 5. cap. 28.
 sec. 7^a.

in libro de tum.
 præ. nat. ca. 17^o.

n ibidē ca. 18. in
 principio.

o lib. 14. cap. 23.
 p 5^o. de cōp. med.
 secūdu loc. cap. 3.
 sec. 5.

q lib. 5. cap. 28.
 sec. 9.

Phyma apud
 Celsum quid.

Plinij panus.]
 Celsi panus.
^r ubi supra.

usum esse Celsum, non (ut aliqui opinantur) Latino, nisi genericè. Haud. n. propriè, speciatimq;
Tuberculum. id quod Græce phyma dicitur Latine tuberculū nuncupandū ait: Sed genus esse ad phyma, &
 furunculū, aliosq; fortassis etiā tumores id nomen tuberculū insinuat, dicens { phyma uerò nomi
 s lib. 5. cap. 28.^o natur tuberculū furunculo simile. etc. } Itemq; de furunculo prius loquens, ^s dixerat { Furuncu
 sic. 8.^a lus est tuberculū acutum. etc. } Alibiq; ^t melicerias & phymata sub tuberculo cōprehendit, dicēs
 1 Ibidē cap. 18. { eaq; tubercula quæ meliceria. i. faui, uel phymata nominantur. } Haud. n. idem esse melicerias
 sec. 15. fauos' ue & phymata uoluit. Cū longè diuersos esse affectus ex ijs, quæ hic et antea dicta iam
 n supra fo. 169. de meliceria sunt, liqueat. Porro nec obstat, quoniam sæpè hoc loquēdi modo usus est { ad orien
 x lib. 5. cap. 18. tia tubercula quæ phymata uocantur } ^x aut sic ^y { ad omne tuberculū, quod phyma nomina
 sec. 13. 15. tur } aut sic ^z { tubercula etiā quæ φύματa Græci uocant } ut hinc nonnulli tuberculū Latine
 y Ibidē. sec. 16. 17. nis idē specialiter præferre, quod Græcis φύμα (Celsi dogmate) crediderint. Est. n. talis lo
 z lib. 6. cap. 18. quendi modus eius potius, qui confusum uniuersalēq; genus determinare intenderit. Quēadmo
 sec. 2.^a in fine. dum si quispiā hominis nomen Latine ignorans, dixerit { Animal, quod Græci ἄνθρωπον uo
 cant } sicut etiam proferre iam consueuimus { piscis, quem Græci ἰχθυόσδον ^a appellant }
 a De quo pisce Galeni uide 3.^o Haud. n. ex hac proferendi forma uel animal à Græcis anthropon, uel piscem ab illis uranofco
 de usu partiū c. 3 pon uo cari concludendum est. Verū innominatæ apud Latinos cuiusdam speciei nomen ostend
 ditur. Quod si non aliud Romanis tuberculū, q; Græcis φύμα præferret: frustra me Her
 b ut lib. 5. ca. 18. cule toties uel Græcorū duntaxat nomine ^b usus esset { phymata } proferens: uel { tuberculū } no
 sec. 19. 20. 28. minans. statim ex Græcorum idiomate illius nominis determinationē addidisset ^c sic dicēs { tuber
 c ut ibidē. sec. 13. cula, quæ φύματa Græci uocant. etc. } Genus ergo tuberculū est. Quod si ut speciale pro phy
 15. 16. 17. & lib. 20. mate nonnunq; usurpasse dura ceruice contenderis. Bisariam tunc tuberculū sumi posse (ue
 6. cap. 18. sec. 2. in fine. lis, nolis) confiteri cogeris. generatim. s. ac speciatim. perindē ac apud Græcos quoq; dupliciter
Tuberculū ^z capi phyma præscriptum iam est. Cū ipsum quoq; furunculū (à quo phyma pluribus differ
 re ostendit) tuberculū esse desinierit. Qui de re nos antea ^d bisariam quoq; apud Celsū ca
 d i prim^o sermo pi tuberculū, non simpliciter, at ex plurium interpretum usu statim ab initio pronuntiauius. A
 nis de phymate. e lib. 5. cap. 18. tuberibus uerò terræ quorum similitudinem referunt, & tubercula, et aliquandō ^e etiam tubera
 sectione. 14. Tuberā unde à Celso nominantur. At omiſſa nominis ratione ad alia, quæ maioris momēti sunt, permigremus.
Dubitatio. Inquit enim Celsus phyma describens. { Vbi euulsum est pus, eodem modo apparet uentricu
 lus: quod in furunculo non inuenitur: uerū omnis corrupta caro in pus uertitur. } In quibus
 quidem uerbis non contemnenda difficultas occurrit. Quoniam de furunculo prius paulō determi
 nans, uentriculū illi apparere, ubi adaperitus est, & exit, iam iam protulerat. Nunc uerò in phy
 mate (ubi euulsum est pus) illum apparere uult: in furunculo tamē minimē inueniri adiungēs.
Confirmatio. Quinimmodò quod magis intellectu perturbat est, quoniā simul affirmans idem abnegare uidetur.
 Etenim dicēs. { Vbi euulsum est pus, eodē modo apparet uētricus } furūculo cōparare inuit. q. d.
 eodē modo, quo in furunculo prædictū est. q. primū uerò obnegat subdēs. { quod in furūculo non
 inuenitur } Pro huius ergo nodi solutione, deprauatā esse literā aliquādo suspicati sumus. Itaq; le
 gēdū fore dubitauimus { eodē modo nō apparet uentriculus, quod (uel q) in furūculo inuenitur } ut
 in furūculo uētriculū esse admiserit: quē tamen in phymate reperiri abnuerit. quoniā. s. omnis in
 hoc corrupta caro in pus uertitur. qua de re uētricus radix ue nō apparet. Aliter autē intelligi
 posse Celsi sententiā reputauimus. ut in phymate uentriculus euulso pure appareat: nequaquā ue
 rō in furunculo: tamen si quidam carnis partem corruptam subalbidā, aut subrubrā, uentriculū
 furunculi

furunculi nominarunt. Ex aliorum enim quorundam opinione uentriculū in furunculis prædi-
 xerat. Secūs autē & tertio Celsum interpretari possumus, in ea persistentes phantasia, q̄ uen- 3^a.
 tricoli nomine eam corruptæ carnis, & in crassissimum glutinosum uel pus tendētis portionem
 intellexerimus: quam chirurgici radicē uulgō nuncupare consueuerūt. Sic. n. quosdā uocare hu-
 iusmodi substantiam ait. Quam ob rem Celsi mētem ita enucleare conabimur. { Vbi adaper-
 „ furunculus est, & exit quod suppuratum est, super apparet pars carnis. etc. Quē uentriculum
 „ quidam furunculi nominant. } Quoniam uerō calidior furunculi materia est. ob id omni penitus
 euulso pure, uentriculus ille disperibit. Sed in phymate cum frigidior, crassiorq̄, ac glutinosior
 materia sit: ubi euulsum est pus, eodem modo (scilicet quemadmodum antea iam apparebat) ap-
 10 paret uentriculus. quod (.s. ut educto pure adhuc eadem substantia perseueret) in furuncu-
 lo non inuenitur. quā de causa non ait. { qui? .s. uentriculus in furunculo non inuenitur: at { quod }
 in neutro genere. q. d. quod, iterū euulso iam pure uentriculum apparere, in furunculo non inue-
 nitur. Sed enim quæ magis arridere Celsi sententiæ, nostrōq̄ intellectui uidetur, quarta exposi- 4^a.
 tio hæc est. Vt uentriculi nomenclatura eam intellexerit membranulam, quæ in apostematibus
 nonnunq̄ inueniri consueuit. Vt in strumis, steatmate, atheromate, ac meliceride Paulus f. eā f. lib. 6. c. 35. cir-
 posuit. In quorum deinde apostematum huiusmodi membranula inclusorum curatione id cauē-
 dum præcepit. & Ne. s. membrana uulneretur, unde humor, qui cōtinebatur, profusus operatio-
 nem impediāt, & ne pars ipsius relinquatur. nam renascendi occasionem sæpenuerō exhibet. g. ibidē c. 36. i.
 Vbi ergo euulsum in phymate pus est, eodem modo. s. adaperto tumore, quemadmodum de fu-
 20 runculo prædixerat: non eodem modo apparet uentriculus. Vbi igitur eodē modo euulsum pus
 in phymate est: apparet tunc uentriculus (ea. s. tunica quæ instar cuiusdam uentriculi humorē
 continet) qui uentriculus in furunculo non inuenitur. Cū non adeo tenax illius humor sit, ut
 eiusmodi tuniculam generet. In furunculo tamen pars carnis corrupta subalbida subrubra uel
 amoto pure apparet, quam nonnulli uentriculum furunculi uocarunt: Attamen uerē uentriculus
 non est. quem in phymate reperiri uoluit. Tuum uerō est quam uis ex prædictis sententijs eli-
 gere. Difficillimum nanq̄ est Celsi phantasiā diuinare. Cū & ab Hippocrate, & Gale-
 no diuersum eius phyma cognouerimus. Nec ante ipsum Hippocrates, neq̄ post eum Galenus,
 aut quispiam ex alijs uel Græcis, aut Latinis, uel fortasse Arabibus huiusmodi notas quas ali-
 cubi legerimus tetigerit. Id ipsum autem phyma (ut singula, quæ Celsus ait, perlibrarimus)
 30 in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur. } Sæpius inq̄ nascitur: tum quia plurimo san-
 guine, ac pituita abundant, ac per hoc pituitofo sanguine, tum quia præter ordinem assiduus agi-
 tantur motibus. ut ad cutim illiusmodi pituitosus sanguis moueatur, tum tertio quoniam prom-
 ptius illorum tenera cutis, & caro laxantur: ut crassos eiusmodi succos recipiant. Mox uerō
 deinde facilius in pueris phyma tollitur: et quia leuior generationis causa extiterat, & quia ua-
 lidior illorum calor, ac demum promptior in illis faciliorq̄; ob cutis raritatem euaporatio fit. } In
 iuuenibus rariū oritur } ut potē biliosis existentibus, ordinatiusq̄; multo in motibus & cibo ui-
 uentibus. } & difficilius curatur } cū à fortiori nascatur causa, & difficilior, ob maiore cutis car-
 niumq̄; siccitatem, atq̄; inde illarum densitatem, euaporatio fiat. } Vbi ætas indurauit, ne nascitur
 quidem } ob carniū cutisq̄; duritiem, & caloris ad exteriora pellentis imbecillitatem. Quan-
 40 uis enim crassi humores in illis multi sint: ad suppurationem tamen perducī nequeunt. Cū
 non adeo sanguini ut in pueris commisi sint. Potius ergo frigidos uel tumores, uel alios quos-

libet affectus: aut putre facti febrem gignent, q̄ phymata. Præsertim quia calor ad exteriora propellere impotentior euasit. Est autem tumorum in exterioribus generatio, quædam naturæ operatio, crisisq̄ (permutationis inq̄) species: quæ, ni aliquo modo uirtus superet, fieri com-
 mode non potest. E præscriptis ergo omnibus (ut ad nostrum propositum conuertamur) qua-
 drifariam capi phyma iam liquet. Primò quidem communissimè, pro omni spontè emergente tu-
 more, siue in altum acumen protuberet, siue in latam planam uel, & q̄ minimam tumefactionem
 eleuetur. Secundo & minùs quidem communiter, pro omni spontè etiam in altum acumen ele-
 uato tuberculo. Vtrunq̄ autem iam dictum significatum ex Galeno in epidemijsh antea collegi-
 mus. Tertiò deinceps pro Celsi iam descripto speciali phymate. Quartoq̄ demùm pro specia-
 lissimo Galeni (anteq̄ ipsum, ut uidetur, Dioscoridis) phymate: partium scilicet adenosarum ca-
 lido, & statim genitò, statimq̄ crescente, ac ad suppurationem tendente tuberculo. Atq̄ id-
 ipsum est, quod à Galeno intelligitur (quemadmodum prædiximus) cùm dothieni furunculo uel
 comparauit: duritie furunculum à phymate differre proferens. Excepto autem primo signifi-
 catu, qui ad calidos pariter ac frigidos tumores cõmunis est: reliqui prorsus calidi (præsertimq̄
 quarti modi) existunt. At priùs q̄ ad alium tumorem pertranscamus: unum de Celsi phyma-
 te adnotandum remanet. quoniã scilicet à Plinio idipsum, ueluti & phygethlon, Latine panus
 appellatur. q̄q̄ uerò Plinius panũ non descripsit: Ex eius tamen admotis pano remedijs tã Celsi
 Græcorũq̄ phyma, q̄ phygethlon intelligimus. tametsi Celsus Græcorũ dũtaxat φύγεθλον à
 Romanis panum, siue panẽ uocari ait. SED De pano, ac phygethlo rursum loquemur. simul ac
 septimum & trigessimũ tumorem explanarimus: Bubonem inq̄: quem ut tertium à prædis-
 ctis duobus inflammabundum tumorem. Galenus adiunxit. Est autem ΒσΒων propriè adeno-
 sarum duntaxat carniũ nomen: quæ in inguinibus utrobq̄ sunt. Mox uerò Græci medici non
 ipsa tantũ inguina, eorum uel adenosas carnes: at inflammabundos quoq̄ earundem partium tu-
 mores, nomine quidem à sede affecta desumpto, Bubones nuncuparunt. Quinimò non earum
 partium modò, inguinũ scilicet inflammationem bubonis nomine denotarunt: Sed omnium quoq̄
 adenosarum partium inflammationes, siue in inguinibus, siue in alis, axillis uel, aut in ceruice, uel
 post aures sint, bubones appellare (Galeno teste) m̄ consueuerunt. Quæ tamen in præscriptis
 omnibus huiusmodi partibus phlegmonæ siquidem citò augentur, celerrimeq̄ suppuratur, phy-
 mata: sin aliquid erysipelatis admixtum habuerint, phygethla interim nominarunt. Quòd autem
 Bubon' inguinis nomen priùs sit, deinceps uerò cunctarum adenosarum partium, nò modò in-
 guinis, phlegmonen præferat, Galeni uerba exquisitè, atq̄ adamussim perpenſa ostendunt.
 quũ ait n̄ { Sic igitur fit, ut & propter ulcus, quod in pedis, aut manus digito sit, οἱ κατὰ τὸν
 ΒσΒων, καὶ τὸ μασχάλην ἀδένες ὀζαίρονται τε, καὶ φλεγμένονσι. } quod est { quæ in
 inguine, & axilla sunt glandulæ tũ intumescant, tũ phlegmone occupentur. } E quibus quis
 dem uerbis ΒσΒων pro ipsa, in qua tumor fit, sede, siue in qua glandulæ consistunt: inguine
 scilicet à Latinis uocato capi apertissimũ fit, quemadmodũ in libro etiam de tumoribus præ-
 ter naturam ō ysdem Galeni uerbis apparet. Mox uerò deinde, pauculis quibusdam interposi-
 tis uerbis, ait. { Quinetiam in collo, & secus aures, sæpenuerò glandulæ, ijs quibus in collo, ca-
 pite, uel aliqua uicina parte ulcus est natum, intumescunt. Nominat autem ipsos adenas, cũ sic
 intumuerint, ΒσΒωνας. } Vbi non ampliùs pro affecto membro, sed pro cuiusuis glandulæ
 inflammatione capi ΒσΒωνας liquet. Id quod alibi p̄ quoq̄ non semel affirmat. Celsus de bu-
 bone

Phyma. 4.

b 6. Epid. cõmẽ-
 tario p^o. cõ. 12.
 i supra fo. 217.
 k li. de tu. præ-
 nat. cap. 17.

Phyma tumor
 calidus.

Tumo. 37.

Bubon.

l lib. de tu. præ-
 nat. cap. 18.

m 2^o. ad Glau-
 c. p^o. & 13. meth.
 ca. 5. circa prin^a.

n 13. methodi. c.
 5. circa princ^a.

o cap. 18. & idẽ
 apparet in lib. de
 def. med. cũ de
 finitur phygeth-
 lon, & 3. aphor.
 cõ. 26. uersus fi-
 nẽ, & sæpẽ.
 p ut 2^o ad Glau-
 conẽ p^o. & libro
 de tu. præ-
 nat. c. 18. et alibi sæpẽ

bone

bonè proprium caput à phygethlo seorsum non scripsit. Videtur ergo sub phygethlo pano ue
 bubonè cōprehendisse. Sub quo tamen Galeni etiam phyma intelligi non potest. Quoniam Celsi
 phygethlon (ut postea uidebimus) tardè mature scit, neq; magnoperè in pus uertitur. Galeni aut
 phyma celerrimè in suppurationem uergit. Plinius Græcorum bubones interdum¹ inguina, se
 dis etiam affectæ nomine: interdum² uerò inguinum tumores appellat. Vnde & herba quæ à
 Cræcis Βρῶνιον dicitur: quoniam scilicet bubonum præsentaneum remedium sit, ab ipsomet
 Plinio, cæterisq; Romanis inguinaria Latinè uocatur: eò quòd inguinibus prodest, de qua sic idè
 ait³ {Inguinaria (quam quidam argemonen uocant) passim in uepribus nascens, ut pro fit in
 guinibus, in manu tantum habenda est.} Qua de causa nonnulli Græcorum interpretes, ubicūq;
 illi Græcè {Βρῶνις} habent, de tumoribus adenosarū partium loquentes, hi Latinè {inguin
 na} conuertunt. E quibus omnibus id elici, concludiq; potest, bubonem apud Græcos, atq; apud
 Latinos inguen trifariā capi posse. Primò, & quidem propriè, pro ea parte, quæ inter femur et
 pubem est: ubi glandulæ consistunt. Secundò pro illius partis inflammatione: quomodo Plinius
 uterq; ac Marcellus Romanus⁴ præcipuè intellexisse inguinis nomine uidentur. Tertiòq;
 demum communiùs, pro omnium adenosarum partium, ubicūq; sint, phlegmone. Quèadmodū
 in libro de tumoribus à Galeno⁵ sumptum bubonis nomen opinor. Quas ob res non, ut Cælius
 Rhodiginus inquit,⁶ Bubon prius omnem, in quauis parte factus, sit, tumorem: deinde coar
 ctato uocabulo, adenosarum duntaxat carniū, quæ scilicet in inguinibus, alis, & collo consi
 stunt, tumorem, priuata quadam significatione ostendit. Quem Cælius Brasauolus⁷ æmula
 tus est, id deniq; adiungens: quòd tertio uidelicet significatu magis uocabulum coarctantes re
 centiores ad id deduxere, ut solum panum significet, id est tumorem in inguinibus, què Celsus
 phygethlon appellari dicit. {A speciali enim potius propriòq; membri, hoc est inguinis signifi
 catu, ad eius tantū partis affectum, ac demum ad generalem morbi significationē, cuiusuis inq;
 adenis phlegmonen, haud omnem (ut aiunt) tumorem, transumptio facta est. Multoq; minùs
 uerū est, quod à Galeno bubon appellatur, panum esse, Celsiq; phygethlon, quemadmodū Bra
 sauolus credit.} Quanq; sub phygethlo pano ue Celsi, comprehendì posse bubonem inficias nō
 ibimus. Sed hic uir aded in bubone, phygethlo, & phymate anceps fuit, ut multa quidem à uete
 rum sententia aliena declararit. Perinde atq; expedito bubone, ac phygethlo demonstrabimus.
 Bubon igitur (Galeni, quem nunc interpretamur, dogmate) adenosarum partium exquisi
 ta phlegmone est. Vulgò nostri quotiès in inguine fit, nominare solent {pertico}: {Neapoli {dra
 guncello} Longobardi {tinchone} quidā {bognone} atq; alij demum à Latina uoce pano, seu
 panicula, deducto per corruptionē nomine, dicunt {panocchia}. Quòd si uel erysipelacea phleg
 mone, uel inflammatum erysipelas, ob flauæ, pallidæ ue bilis admistionem, in prædictis adeno
 sis car nibus oboriatur, phygethlon priuatim (Galeno⁸ docente) nominatur. Sin uerò scirrhusa,
 ob pituitæ, uel atrabilarij succi cum sanguine miscellam, phlegmone ibidem fiat, Χοιρεῖς, Latī
 nè struma nuncupabitur. Multoq; magis si exquisitus earundem adenosarum carniū scirr
 hus sit. A T Enim uerò singula seorsum perpendere operæ pretium est. A phygethlo exor
 si, ut unā trigessimū octauum tumorem absoluerimus. Inquit ergo medicarum definitionum
 Author f {φύγεθλον ἐστὶ κατὰ Βρῶνιαν γινόμενον ἀπόσμημα}. quod est {phygethlon pa
 nus} ue est abscessus in inguine obortus. Rectius autem iuxta Galeni dogmata dixisset {φλεγ
 μονή} id est inflammatio, q; {ἀπόσμημα} hoc est, abscessus. Non semper enim abscessus fit
 sed libri.

q lib. 21. cap. 20.
 circa medium. lib.
 26. cap. 9. lib. 27.
 cap. 5. et. 13. i me
 dio. lib. 28. cap. 4.
 uersus finem.

r Vt lib. 22. cap.
 24 uersus finem
 lib. 27. cap. 7. cir
 ca finē. li. 28. c. 4.
 ante mediū. li. 30.
 cap. 8.

Bubon & In
 guen triplicis
 ter.

s lib. 26. cap. 9. i
 prin^o. et. 27. s^o. i
 medio. uide Apul.
 Madawren. de uir
 tut. herbarū c. 60

Cōtra Cæliū
 Rhodiginum.

Cōtra Brasa
 uolum.

t locis præscrip
 tis, & sibi ascrip
 tus lib. de re me
 dica uolu. 2. c. 43.

u li. de med. c. 32
 x cap. 18.

y lib. 12. lec. anti
 quarum. cap. 6. in
 medio.

z lib. 4. aphorif.
 cōm. 55.

a ibidē & 3^a. az
 phorif. cōm. 20.

b 2^o. ad Glauc.
 c. p^o. et. 13. meth.

cap. 5. lib. de tum.
 præ. nat. cap. 18.

& sæpè.

c 2^o ad Glauc.
 cap. primo.

d ut. 13. meth. c. 5
 e ut 14. meth. ca.
 11. & lib. de tum.
 cap. 18.

Tumor. 38.
 f uersus finem.

ut 2^a ad Glau
conz c^o p^o elicetur
b lib. de tu. præt.
nat. cap. 18.

sed perpetuo tamen uel erysipelacea phlegmone, uel inflammatum erysipelas est. 8 Qua de cau
sa nonnullos esse ait b ἰδερμότῃτι ἃ μα καὶ τὰ χα γενέσεως ἃ φορὶ ῥοντες τῶν ἃ λων φυ
μοίτων } quod est } caliditate simul, & generationis celeritate ab alijs id phymatibus tubercu
lis ue distinguentes. } Iuxta quem loquendi modum phymatis nomen largius, Hippocratis uideli
cet more, intelligere necessum est, ut dothienes furunculi ue, ac bubones, nedum propriè dicta
phymata, sub phymatis nomine cōprehendēda ueniant: quibus iam iam dictis, uel si maius alijs
quoq; omnibus comparatio fiat. Dicens enim Galenus } ab alijs phymatibus } ipsum etiam phy
gethlon sub generico phymatis nomine comprehendi posse insinuat. ut quanq; phyma id quoq;
est: ab alijs tamen phymatibus differat. etc. Quoniā igitur non propriam, sed aliorum opinionem
refert. Idē pro illorum usu nomen generatim protuliss, & secus quidem, atq; paulo prius pri
uatim usurparat, absurdum non est. Præsertim quia Hippocratis etiam loquendi modus est. ue

3^a aphorif. 20^o.
k supra fo. 217.
119.

luti quum ait. i } καὶ τὰ μα φύματα } quemadmodum uberiùs iam antea^k declarauimus.
At magis quidem nobis arridet, ut } ἃ λων } superfluat, ac ab aliquo potius incauto scriptore
interpositum sit. Legendumq; appositè sit } ἃ φορὶ ῥοντες τῶν φυμοίτων } hoc est } à phy
matibus distinguentes. } Vt differre uoluerint phygethlon à propriè sumptis, & iam iam de
claratis phymatibus calore simul & generationis celeritate. Verosimilius autem est non com
muniter, at priuatim, proprièq; sumptum phyma Galenum intellexisse. Quoniam id paulo prius
iam proposuerat: à quo differre statim duritie dothienem prædixerat, quamprimùm subdens
} Ambo autem affectus inflammabundi sunt. quos præter, tertius quoq; ipse bubo, quartusq;
quem nonnulli phygethlon uocant, à phymatibus calore simul, & generationis celeritate distin
guentes. } Quous autem modo Galeni uerba legantur: Tām si generatim phyma capitur: ut
alijs siue prædictis tribus, siue omnibus phymatibus, tuberculis ue comparetur: q; si priuatim
sumitur: ut ad propriè dicta phymata phygethlon referatur: Illorum sermo à Galeno (ut ui
detur) minimè reprobatus, ita uerus esse demonstrabitur. Quoniam scilicet phygethlon san
guini admistam continet bilim, quia uel phlegmone erysipelacea, uel erysipelas inflammatum
est. Bilis ergo, succi omnium, qui in corpore sunt, humorum (Galeno^l teste) calidissimi ratio
ne, calidius phygethlon est non propriè sumptis modo phymatibus, at bubonibus quoq; ac furun
culis: Multoq; idem calidius est uerrucis, strumis, satyriasmis, atq; alijs huiusce farinae uel pa
rum, uel nil prorsus caloris continentibus tumoribus: quos sub generatim capto phymate ab
Hippocrate comprehendi iam antea declarauimus. Celerius quoq; phygethlon generabitur eaz
dem ratione. quod enim calidius est, perpetim (quantum ex se est) frigido, uel minùs calido ci
tius compleri solet. Quoniam faciliùs, promptiusq; ad affectum locum calidi humores defluunt.
Quanius igitur ocysimè generari propriè dictum Phyma præscriptum iā sit. Nihilominùs ta
men phygethlon ut potè ipso phymate calidius (q; tum ex se est) celerius eodē generari potest.
Dixi } q; tum ex se est } quasi obseruata in reliquis omnibus paritate. Nam pro uario corporis
tēperamēto, adenis imbecillitate, regione, tēpore, atate, repletionē, cōsuetudine, uictus ratione, atq;
primùm quoq; iam exordientis tumoris regimine, cæterisq; plurimis concurrentibus, horum ge
neratio uariari potest. Verum & si celerius fieri phymate phygethlon contingit. Contra ta
men: phyma phygethlo citius ad suppurationem uergit. Cū illius finis terminus ue maxima
ex parte suppuratio sit. Phygethlon uerò, admisti erysipelatis ratione, ad suppurationem non
adeò tendit. suppuratio enim (Hippocrate^m authore) in erysipelate mala est, putredinem po
tius,

tius, malignitatemq; præferēs, q; felicem tumoris euentum: Quas ob res & ante Galenū La-
 tine Celsus ait. "Phygethlon tumor est, nō altus, sed latus: in quo quiddam pustulæ simile est;
 nō altus quidem (ait) sed latus. Bilis enim ratione magis in orbem sub cuti extenditur, q; in altū
 eleuatur. Id quod in exquisito erysipelate, atq; herpete patet. q; q; ratione commisti sanguinis, ali-
 qua in altum, profundumue, pro ipsius sanguinis portione, tumefactio fit. Bilis uerò causa pustu-
 losæ quædam miliaceæq; asperitates fieri solent. Idcirco ait & in quo quiddam pustulæ simile est;
 Eiusdemq; caloris, ac ueluti cuiusdam feruoris ratione & Dolor, distentioq; uehemens est: &
 maior q; pro magnitudine tumoris. Interdum etiā febricula. Idq; tardè maturescit, neq; magno-
 perè in pus uertitur. Quòd autem in adenositis etiam partibus fieri Celsus teneat, statim osten-
 dit, subdens. & Fit maximè aut in uertice, aut in alis, aut in inguinibus. Panum, ad similitudinem
 figuræ, nostri uocant. & aliqui tamen codices habent & panem; utroq; autem modo legi potest. ue-
 luti doctissimè Hermolaus ait. ° Panum uerò alibi p quoq; Celsus nominat, sic dicens & Aduer-
 sus panum tamè primū orientem, quod φυγεθλον Græci uocant. etc. & Ad similitudinem figuræ
 (ait Celsus) nō, ut nonnulli interpretantur, ad similitudinem extensi panni, quia eleuationem nō
 habet. Satis enim ridicula similitudo hæc est: præcipueq; cum subdant, panum plerūq; tumorem
 habere, ac non aliud esse panum, q; Galeni bubonē. Decepti fortassis ex Varronis uerbis, adeo
 deprauatis, ut nullam nobis idoneam sententiam ostendant, sic enim apud eum legitur ¶ & panis,
 quòd primò figuras faciebant, ut mulieres in lanificio pannus. Postea q; ei figuras facere insti-
 tuerūt, aliàs à pane & faciendo panificium cæptum. etc. Quorum profectò uerborū contextū,
 ac sensum, nec eius libri castigator Michael Bentinus animaduertisse apparet. Ingeniosissimus
 uerò Hermolaus rem acu tetigit, sic in primis Varronis contextum legens. & Panis dictus, quòd
 primò figuras faciebant, ut mulieres in lanificio in quo panus. Et sic, postea q; ei figuras face-
 re instituerunt alias. & panus ergo (Hermolaus ait) in Varrone capiunt pro fili glomere in ip-
 so radio textentium. ad cuius glomeri similitudinem panes primo fangebantur: sub rotundi scilicet,
 atq; aliquatenus oblongi. ut quidam hodierno etiam die panes figurare solent. Subdit autem
 deinceps Varro & Et sic & quasi dicat, panis adhuc dictus est & postea q; ei figuras facere insti-
 tuerunt alias. & id est panis adhuc nomen remansit, etiam si postea non ampliùs instar glomeri
 textricū subrotundos, at secundum quaslibet alias figuras panes facerent. Quemadmodum enim
 ex pano textricum glomere lanificium in figuras multas digeritur. Ita ex concretæ farinæ glo-
 bo panificium uarias capit imagines. Et quemadmodum in illis addita simplici litera & n & pan-
 nus dicitur, Inde q; panniculus. Ita panificio mutata & u in & i differentia causa, panis uocatur. Pa-
 nus uerò textricum nomen quoq; dedit phygethlo apud Latinos (Celsi authore) unde & pa-
 nicula etiam dicitur. Quo diminutiuo nomine Plinio ascriptus liber, ac Marcellus etiam Roma-
 nus utitur. Panus ergo tumor, quem præ manibus habemus, appellatur ad similitudinem (uti
 Celsus ait) figuræ. Idemq; est si panem legerimus. Quoniam panis instar subrotundus aliquate-
 nus oblongus, ac latior q; altus tumor est. Sed hæc ad Grammaticos. Nobis uerò sat superq; fue-
 rit scire q; panus, & panis, & panicula huiusmodi affectus, apud graues authores, nominatus
 offenditur. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint (subdit Celsus) generale nomen
 trahit latius uitium ad suppurationem spectans. E quibus Cornelij uerbis id elicitur. quoniam
 scilicet omnis instar pani uel panis, subrotundus, cum aliqua latitudine tumor phygethlon Græ-
 cè, Latine autem panus uocari potest. Haudqua; tamen sic obseruatur. Sed generale nomē tras-
 hit

n. lib. 5. cap. 28.
 sec. 10.

Panus unde
 dicitur.

o In glossematibus
 in Plinium in
 in dictione furus
 culus. et panus.

Cōtra Musā.
 p lib. 5. cap. 18.
 sec. 16.

q lib. 4.º de La-
 tina lingua. in di-
 ctione Panis.

Varronis lo-
 cus.

Panus pro-
 priè quid.

r lib. 3. de re me-
 dica. cap. 27.
 s de medicam.
 cap. 32.

**Obiectionis
Solutio.**

de comp. med.
cap. 263.

Plinij panus.

u cap. 32.

x lib. 24. cap. 4.

y lib. 24. cap. 2.

z Diof. 4. 149

Plin. 20. 1. 10.

a Diof. 3. 65.

Plin. 20. 20.

b Diof. 4. 148

Plin. 22. 15.

c Diof. p. 147.

Plin. 23. 70.

d Diof. 3. 94.

Plin. 24. 40.

e Diof. 3. 89.

Plin. 24. 6.

f Diof. 2. 152.

Plin. 24. 110.

g Diof. p. 106.

Plin. 24. 13.

Cōtra Mar-

cellū Virg.

h lib. 5. cap. 101.

i lib. 35. cap. 17.

circa principia

k Diof. 5. 13.

Plin. 23. 20.

l Diof. p. 122.

Plin. 23. 10.

m Diof. 4. 37.

Plin. 22. 17.

n lib. 4. cap. 89.

o lib. 22. cap. 13.

hit latius uitium ad suppurationem spectans. q. d. speciatim, proprieq; panus, phygethlon uel id dicitur, quod latius est, & suppurari potest. Haud tamen per hæc uerba celerrimè suppurari panum intelligemus. Vt inde Galeni phyma sub Celsi pano, seu phygethlo comprehensim acciperimus. Quoniam & si ad suppurationem huiusmodi tumor spectat: tardè nihilominus (ueluti prædixerat) maturefcit, neq; magnoperè in pus conuertitur. Quod autem panus, uel panicula Romanis idem, quod Græcis phygethlon ostendit, non Celsus modo, at ipse etiam Scribonius, & Marcellus confirmant. Plinius uerò nullibi, quod uiderim, panum definiuit: nisi q. multorum esse generū aliquando insinuat. Perinde ac ubi de uisco loquens, ait {cum resina, et cera panos mitigat omnis generis.} è quorum numero aliquod esse difficilis concoctionis genus aliàs innuit: dicens {uitex uomicas, panosq; difficile cōcoquentes cum farina hordeacea mollit. etc.} Superius tamen Plinij panum tam Celsi phyma, q. phygethlon comprehendere diximus. Quoniam nullibi de phymate, aut phygethlo meminisse Plinium legimus. Nisi sæpiissimè de pano. Est autem phyma (perinde ac ex Celso præostendimus) tuberculum furunculo rotundius, et planius, ouiq; dimidi magnitudinem non infrequenter excellens. adeò ut pano etiam texturicum, aut pani non absimile existens, pani quoq; uel panis nomenclaturam obtinere queat. Quinimodò non solum Celsi phyma, sed speciale etiam Dioscoridis phyma, quod idem, & Galeni quoq; phyma esse reputo, sub pano Plinius intellexisse apparet. Quæcunq; enim Dioscorides phymatibus conferre, præter alios morbos, scripsit: Plinius eadem (pluribus aliorum morborum distinctè nominatis.) Pano proficua esse recensuit. Quemadmodum in syluestri cucumere, coriandro, paruo sesamoide, Mori arboris uulnerati liquore, uisco, ammoniaco, struthio siue radícula, paliuro, & alijs fortasse non paucis, cōtemplari promptissimum est. In quibus quidem omnibus, ac similibus, Dioscoridè φύμα speciatim sumpsisse, cuius perspicuū fore opinor. Cū strumas, parotidasq; et alia huiusmodi tubercula interim sæpiissimè recēscat, quæ sub phymate cōprehensa fuissent, siquid phyma generatim intellexisset. Quo tamen generali significatione nonnunq; utitur. Vt quā de cimolia creta loquens, ait {παρωτίδας καὶ τὰ ἀλλὰ φύματα.} quod est {parotidas abscessus uel post aures, et alia phymata, tubercula uel} hac. n. loquēdi formū la parotidas ex phymatum cōmuniter tamē sumptorū genere esse insinuat. Quo in loco Marcellus Virgilius, ut qui panum pro phymate, in præscriptis omnibus medicamentis, Latinè conuertit, præassumptam phymatis distinctionem non aduertens, ubi Græcè dicitur {καὶ τὰ ἀλλὰ φύματα} ipse interpretatus est {panos, tuberculaq; alia} ut idem nomen {φύματα} simul panos, & tubercula, quoddamq; speciale, ac generale, turpiſſima quadam confusione præſeferat. Eo fortasse deceptus Marcellus. quoniam Plinius eandem cretam panos, & parotidas cōhibere ait, à Dioscoride (ut uidetur) exscribens. At Plinio uel cuncta immutare licuerat: quorum tamen fido interpreti uel minimum perturbare non conuenit. Quod autem Plinius non solum phyma, sed phygethlon etiam sub pani uoce intellexerit, inde persuaderi potest. quoniam quæ Dioscorides phygethlo prodesse uoluit, Plinius eadem pano conferre ait. Perinde ac in aceto, & oleæ cinere & helxine comprobari potest (quāq; ubi Dioscorides acetum Plinius acetum foecem atq; ubi Dioscorides oleæ syluestris, Plinius domesticæ cinerem habet.) Quodq; magis nostram sententiam confirmat, est. Quoniā Dioscorides urticam phymatibus, ac phygethlis & parotidibus mederi scripsit: Plinius panis, parotidibusq; utilissimam (tametsi ex Phania physico) posuit, ubi nil de phygethlo cū meminerit: sub pano tam phyma, q. phygethlon comprehendisse

prehendisse compertum est. Quo interim loco^p Marcelli Virgilij traductionem, falsam quidem, p super Diosc. li
et inconstantē animaduertere opus est. Vt cognitō etiam falso, ueritas magis elucescat ubi φύ- 4. c. 89. de uirga
γεθλον Dioscoridis, Latine furunculum tradacit: φύμα uero, panum. Id quod alibi quoque in
phygethlo obseruat. Falsum tamen, quia furunculus idem quod Græcis dothien est, ut uberius
anteā declarauimus. Inconstans uero, quoniam idem nomen φύγεθλον aliquando non am-
plius furunculum, sed panum interpretatus est. Adeo ut modo phymati, modo phygethlo panum
attribuerit. Verum tamen si Celsum sectamur, phyma panus minime nuncupatur. Sin uero Pli-
nium, tametsi tam phyma, q̄ phygethlon sub pano (uti diximus) comprehendatur. Nihilomi-
nus tamen generis nomine singulas species interpretari non decet. Etenim cōfundere potius est,
10 q̄ interpretari. Tutius ergo est Græcum nomen apud Latinos etiam transferre, q̄ in tot tan-
tasq̄ æquiuationes miserculorum ingenia præcipitare. At omisso Marcello, ac reliquis interea
multis Græcorum interpretibus, sæpenuerō traditoribus potius, q̄ traductoribus nuncupan-
dis: Cum nostra intentio non sit aliorum errata detegere, sed Galeni, & Priscorum tumores
enucleare. Ad Galeni contextum reuertamur: qum de phygethlo iam loquens, subdit. & sunt
„ uerō etiam qui phygethlon in inguinibus, & alis tantummodo fieri proferunt. Cum tamen ade-
„ nosarum carniū inflammationes sint, sic enim ultimā Galeni uerba intelligo φλεγμονὰς
ὑπὸ τοῖς χόροις τῶν αἰνῶν. Galeni ergo sententia est, nonnullos fuisse medicos, qui specialius
phygethlon capiebant, ut non in omnibus adenosīs carniū fierent. Haud enim in collo, mamillis,
post aures, aut alijs huiusmodi glandulis generari phygethlon admittebant. Sed in alijs duntax-
20 at, atq̄ in inguinibus. Quorum nihilominus opinionem reprobare Galenus apparet: subdens, q̄
adenosarum carniū phlegmonæ sunt. q. d. glandularū inflammationes sunt: ubicunq̄ glandu-
læ, siue in alijs, aut inguinibus, siue in collo, aut post aures, uel in quauis alia corporis parte exis-
stant. E quibus quidem omnibus exquisitè, atq̄ adamussim (ut operæpretium est) perpensis
p^m. plurima, quæ antea referre sponndimus, Brasauoli^x errata propalantur. Primum q̄ phyma
ta, & phygethla ab eadem materia fiunt, aut consimili. Etenim phyma à sanguine, siue quarta
substantia, siue uniuerſa quatuor humorum iuxta proportionem disposita cangerie sit: adeo nihi-
lominus humida calidāq̄, & putredini obnoxia, promptaq̄, ut ad suppurationem eueſtigio uer-
gat: atq̄ idipsum Galeni decreto. Celsi autem sententia, ex sanguine, cui nonnihil frigidor-
um succorum admistum sit. Ex quo & dolor, & inflammatio minores, q̄ in furunculo fiunt.
30 Phygethlon uerō erysipelas inflammatum, uel inflammatio erysipelacea, ob effatu dignā bilis
admissionē, est. Vt tangentibus phymate calidius phygethlon, licet qum suppurat Galeni phy-
2^m. ma, phygethlo feruentius ab ægroto sentiatur. Hinc & aliud erratum liquet. Qum, s. ab eo di-
citur sed phymata sunt inflammationes erysipelatodes, uel erysipelas cū inflammatione. Eodē
modo phygethla. Pariterq̄ statim aliud innotescit, dū subdit & quanuis & in istis (scilicet
3^m. phygethlis) materia etiā pituitosa esse possit. Si enim pituita cuius horum admisceatur, usq̄
adeo scilicet multa, ut pituitæ symptomata cognosci queant: nec simpliciter phygethlon, neq̄
phyma nominandum uenit. Sed phyma potius, uel phygethlon œdematosum, aut scirrhosum. Sin
gulorū autem per se capta natura ea est, quā diximus, si quidē Galeno adhæsisse, nec nostræ uo-
4^m. litati assentire decreuerimus. Quid quodd re uera in inguinibus solū panos appellari ante hæc ait?
40 Cum Celsus in alijs quoq̄, ac uertice panum à Latinis uocari præscripserit. Plinius² autem
uterq̄ seorsum ab inguinibus, inguinūq̄ tumoribus de panis, aut paniculis determinarit, ut po-
tius 43. et 3. 27^o

p super Diosc. li
4. c. 89. de uirga
Cōtra Mar-
cellū Virg^m.

q Vt lib. 4. cap.
37. de belxine.

r fo. 210. & se
quentibus.

s ut lib. p^o. cap.
122. de agrestio

lea. & cap. 149.
de ficis. et 5. 13^o.

de acetis.

adum in 5b
adum in 5b

lib. de tu. pre-
cap. 18.

u supra. fo. 118.
lin. 28.

Brasauoli ers
rata.

x 3^o. aphorism.
cōm. 20.

de præ ceteris li.
20. cap. 21. circa

medium. et li. 26.
ca. 9. Alterū sibi

ascriptū. uide. 2^o.
43. et 3. 27^o

tius oppositum uerum dici queat: panum. *sim alijs glandibus propriè magis, saltem Plinij dogma*
te appellari. Idcirco & Marcellus Romanus ² *in inguinibus paniculas* ³ *determinationis gra*
tia, nonnunq; protulit. Verum de his nimis q; satis, ad nauseam usq; dictum iam sit. Ex Arabi
bus autem Princeps de his tribus tumoribus, qui in glandulis fiunt, insimul determinat. ⁴ *De ue*
nenosis quidem pestiferis ue prius, ⁵ *sub nomine thaun, siue althaun, siue thoim, & althoim.*
De non uenenosis autem postea. ⁶ *Vbi corruptissimis Græcorum nominibus usus est. Etenim*
phymata scribit, chumata corruptius carmata, et carmakile, phygethla uerò Mecacali
us ⁷ *ut mihi uidetur, atq; etiam furios. f. Quoniam uerò (ut infra uidebimus) & Oribasius*
tumorem Græcè dictum τῆς μύθου phymatis speciem esse ait, phyma interim communiter, &
Hippocratis in modum intelligens: Princeps autē phymatis speciatim, & Galeni more sumpti ¹⁰
speciem intellexit. Propterea & hic inter ea, quæ glandulis adueniunt, terminthum adnume
rans, corruptissime turcios nominat. h. quem tamen alibi minius corruptè turmusios nuncu
pat. Phymata (ut uidetur) siue chumata, uel carmata, aut carmakile: Itemq; phygethla seu fu
rios, aut mecacalius inter uenosa connumerans. Idemq; terminthum, siue thursios, quem ta
men inter exituras alibi sub nomine turmusios repetit. Verum singula proprijs locis uberius
enucleabuntur. Razes autem, uel (ut rectius dixerimus) eius interpres de omnibus his loquitur
non pestiferis quidem, sub titulo ^m *de apostematibus emunctiorum, & carnis mollis. non*
nunq; uerò sub exituræ nomine cum alijs cōprehendit. ⁿ *De pestiferis autem, anthracis, seu fil*
tracis, uel thaun, uel epidemice nomenclatura significauit, quemadmodum antea iam ostendi
mus. ^o *Hæc de adenum inflammatione dicta sunt. QV AE quidem si ob assiccata pituita ma* ²⁰
gisq; atrabilarij succi cōmisionem, scirrhusa eandem partium phlegmone (uti Galenus ait) ³
fiat: χοιράς Græcè, Latine autem struma, Tumor quidem ordine trigessimus nonus, generabi
tur. Qui tumor & si (quemadmodum Galenus inquit) scirrhusa, circa suæ generationis ini
tia, phlegmone sit: Mox tamen in scirrhum prius non exquisitum, ac deinceps non infrequen
ter exquisitum conueriti solet. Qua de re non ad œdema (quemadmodum nonnulli opinantur) sed
ad scirrhum reducenda struma est. Quauis enim ex pituita, maxima ex parte fiat. Haud ta
men ex aquosa, tenui ue pituita huiusmodi tumor, perinde ac œdema, gignitur: uerum ex crassa,
glutinosaq; ac demū assiccata, quin & atrabilario nonnunq; succo admista sit. Ex quo inter fri
gidos tumores connumerandam esse strumam, cui libet compertissimum est. Etenim non ex cas
lida materia, neq; ad suppurationem, phymatum instar, properante (Galenus ait.) Sed frigis ³⁰
diore, ac pituitosiore consistit. Quamq; calidis, & pus mouentibus medicamentis longo tempore
adhibitis, nonnihil puris excitari nonnunq; in ea consuevit. Quam ob rem non perpetuò, gene
raliterq; sed particulatim in quibusdam ueram esse Celsi ^u *sententiam autumo: quum ait & stru*
ma est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine, quasi glandulæ oriuntur. &
Haud enim omnes maturescunt, ut in se ipsis pus comprehendant. Idcirco & ipse met Celsus
quāprimū subdit. & Quæ uel præcipuè fatigare medicos solent: quoniam & febres mouent,
nec unq; facile maturescunt. & Quod etiam de febribus ipse inquit, uerum aliquando, sed non
semper est. & Nasuntur maxime in ceruice: sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus.
In mammis quoq; feminarum se reperisse chirurgicus Meges author est. & Iulius autem Pol
lux circa mesenterium etiam strumas fieri uoluit. Id quod tamen si à Grammatico dictum, uerū ⁴⁰
nihilominus est & à Galeni monumentis minime alienum. Cum hic induratas esse glandulas
definierit.

Struma i me
 senterio.

definierit. Plurimas uerò circa mēſenterium glandulas eſſe, quæ indurari poſſunt: ac ſtrumæ fieri, ex anatomicis adminiſtrationibus compertiſſimum eſt. At harum proſectò glandularum ſtrumæ non, niſi poſt obitum, noſcere poſſumus. Quam ob rem neq; curandi anſa me-
dico relinquitur. Nos autem hanc Pollucis ſententiam, niſi aliquandò ueram eſſe exper-
ti fuiſſemus, me Hercule ueluti ridiculam floccipenderemus. Anno enim à noſtri Redem-
ptoris aduentu Milieſimo, Quingentefimo, Trigeſimo nono, Panhormi, Spectabilis dominus
Caſtor à Portu dictus, Baron ſummatini, & Urbis tunc temporis meritiſſimus, iuſtiſſimusq;
præſectus, Capitaneus ue, ut uulgò noſtri uocant. Quem proſectò uſq; adeò magiſtratus inte-
gerrimū uirū oſtendit: ut rursus anno. 1546. & demum anno præſenti. 1550. ad candē
10 gubernationem uel inuitus à Proregibus aſtriçtus ſit. Hic inq; in primo ſui magiſtratus an-
no, quendā nigrū natū ſeruū, libertū tamē poſteà redditū, à ſe ob furta laqueo ſuſpēſum, atq; à
nobis ad anatomicas adminiſtrationes petitū, quā libetiſſimè, ut omnigenæ uirtutis amātiſſimus
publicè diſſecandū præbuit. In huius ergo mēſenterio (quemadmodum ab omnibus, qui diſſe-
ctioni aſtiterunt, uiſum fuit) ſtrumæ circiter ſeptuaginta offendimus. præter quas in glandu-
lis exiſtentes totidem ſerè externæ inteſtinorum, præcipueq; craſſorum tunicæ adhærentes tu-
mores propria ſingulos membranula, cuiuſdam ueſiculæ inſtar, cōtētos, non ſine magna qui-
dem aſtantium admiratione, inuenimus. Hos porrò, qui exteriori inteſtinorum tunicæ adnati
fuerunt, ſtrumarum nomine, quia ſcilicet in glandulis non erant, minimè dignati ſumus.
Vtriuſq; autem generis tumores uaria quantitate & magni, et parui erāt, atq; inter extremos,
20 qui ad oui gallinacei magnitudinem perueniebant, & minimi ciceris paruitatem, quampluri-
mi intermediæ quantitatis gradatim uiſi ſunt. Nō ſecus hercle ac in fertilis gallinæ utero ouo-
rum gradata multitudo (quam uulgares noſtri Ouærolam uocant) inuenitur. Sed ne in hoc qui-
dem ſolummodo aſtantium, noſtræq; admiratio fuit. Verum & ſingulis tumoribus diſſectis
quaſi ſtrepitus admirantium effectus eſt: Cū nonnulli lapideum gypſum, nonnulli uerò glu-
tiſam, muccoſamq; & intereà liquidam quandam ſubſtantiam ſub ea membranula contine-
rent. Nonnulli autem per gradus quoq; intermediam comprehenderent. Vt poſtremo, ac nouiſ-
ſimè genitum tumorem liquidior: Antiquiorem uerò ſolidior ſubſtantia præſefferet. Ex medijs
uerò unum & item alterum tumorem ſumpſimus: Domūq; per diem ac noctem exiccari per-
mittentes, tenuiſſimum deinceps quendam ab ijs pollinem extraximus. quo multis quidem die-
30 bus, donec ſcilicet conſumptus totus ſit, Arenæ uice, ad exiccandas, ne delerentur, nuper iā
ſcriptas literas, & quidem opportunè uſi ſumus. Vt alios omiſiſſe pænituerit. In reliquis uerò
corporis partibus, præſertimq; in Iocinore, ac Splene ſaluberrimum corpus uidebatur. Itaq;
ab ijs, qui eum antea uiuum cognouerant, relatum conſermiter eſt. ſaniſſimum ſcilicet, donec
ſuſpenderetur, extitiſſe. Vt nos coniectaremur Naturam, ad eas partes, uniuerſi corporis re-
crementa transmittendo, ſic ipſum expurgaviſſe: ut in reliquis, maximeq; naturalibus uiſceribus
ſanitatē conſeruaret. Verum de hoc obiter. Ne ob Pollucis raram ſententiam quiſpiam ambis-
35 guus remanſerit. & Sunt ergo (ut ad propoſitum conuertamur) ſtrumæ carnes, prout ex Leo-
nida Aetius refert, & ſubcandidæ, facile augeſcentes, in membrana cōtēta, & in ſumma glan-
40 dulæ indurata: quæ in collo, ſub alijs, ac inguinibus oriuntur. Vbi glandulæ uafis ſubſtratae
„ carne eorundem locorum fiunt: quæ affinitate quadam ad ſtrumarum naturam uertitur, &
„

x lib. 15. cap. 5.
in principio.

materiae accessione augetur. } Hæc Aetius ex Leonida. Qui duplicem (ut patet) generationis
 Duplex stru strumarum modum ostendit. Primum quidem, ut non secus ac aliæ quævis particulae siue affic- p.
 marum origo. cata pituita, siue atrabilario succo, aut utroque penitus inperso humore indurescant, scirrhusque
 nuncupato tumore occupentur. Veruntamen glandulae istiusmodi humore oppletæ, atque indu-
 ratae non communiori nomine scirrhum, at speciali quadam à porcis desumpta (ut uidebimus) 2.
 nomenclatura, Græcè χοιράδης pati dicuntur. Secundum uero generationis modum esse in-
 nuit, quoniam ipsamet glandulosa carnis substantia quapiam ex causa persicca indurescit. Quæ
 tamen atrabilario deinceps humore, uel sicca pituita paulatim nutrita præter naturam incre-
 Quem fortassis secundum modum Medicarum definitionum Author solum considerauit: quum „
 sic Strumas definiuit } χοιράδης ἐστὶ σκῆξ, καὶ δύσλυστος. } quod est } struma est caro sicca, 10
 y post medium libri. & quæ difficulter soluitur. } Galenus autem quia in idem (si exquisitè perpenderit) uterque
 generandi modus incidit, hanc differentiam sæpius neglexit. Vnâque sub definitione utrumque „
 appositissimè cōprehendit. dicens } τῶν τῆς δὲ σκῆξ ῥοθέντων ἀδένων, τὸ δὲ πάθος ὀνομαζέ- „
 z li. de tu. præ- } λεταὶ χοιράδης. } quod est } Induratis autem glandulis, affectus hic struma nuncupatur. } Idemque „
 nat. cap. 18. alibi p. de iisdem chæradibus strumis uel loqui exordiens, ait } γίνονται δ' αὖτοι σκῆξ ῥοθέντων „
 p. ut. 14 meth. } ἀδένων } id est } fiunt autem hæc durescentibus glandulis. } Aded ut Galeni simia Paulus, „
 cap. 11. in prin. } ita definierit } χοιράδης ἀδένων ἐστὶν ἐκ σκῆξ ῥοθέντων } hoc est } chærades strumæ uel glan- „
 a lib. 4. cap. 33. } dula sunt indurata } Princepsque b demum (alijs omiſſis) hæc ait } et scrophulæ ad ultimum „
 e lib. 6 cap. 35. } sunt glandulæ sephyroticæ. } Nonnunquam uero Galenus secundum ex prædictis generationis „
 in principio. } modum tetigit. Veluti quum inter morbos in aucta magnitudine constitutos, ipsas strumas colloca- 20
 b Tract. sequenti cap. 9. text. a. uit, } Auctis præter naturam testibus, linguæ, aut mammis, atque oculorum quoque angulis assimi-
 q li. de morborum differētijs cap. 9. in fine. lans. Non ex defluxu, at nutritione, ac in propriam substantiam transmutatione (prout exquisi-
 tè perpendentibus liquet) earum partium incrementa supponens. Cuius quidē sermo, quod ad stru-
 mas attinet, ni particulatim de quibusdam, ijs uidelicet quæ secundo generationis modo factæ
 sunt, intelligatur, condemnandus tanquam falsus ueniret. Sed de his quidem uberius multo deinceps
 proprio loco disputabimus. c Impraesentiarum uero quod præcipuè intendebamus, prædictum iam
 e tr. sequenti ca 9 per totum caput. est. Strumam. s. tumorem esse in frigidorum catalogo reponendum: ac pituitosum præcipuè,
 nonnunquam uero atrabilarium, aut mistum (pro septima distinctione) tumorem existere. Quod ue-
 rò nonnulli (Cælio referente d) colligunt: strumam in tergo esse quandam extantiam, sicuti in pe-
 d lib. 30. lectio- } ctore habeatur gibbus uel: Veluti à priscorum omnium setetia alienum id libetissimè negligimus. 30
 nū antiquarū c. 26 Vsq; adeo nihilominus turpis, ac sordidus, nec non sceleratus huiusmodi morbus est. ut hinc sum-
 Struma ciuita- } pta similitudine Pater eloquentiæ Cicero e strumam ciuitatis aliquando, ipsius ciuitatis turpitu-
 tis. dinem, sceleratque nuncuparit. } Non ea (inquit) est medicina, cum sanæ parti corporis scal- „
 e i oratione pro } pellum adhibetur, atque integræ. Carnificina est ista, & crudelitas: Hi medentur reipublicæ, „
 Sextio uer. finē. } qui execant pestem aliquam, tanquam strumam ciuitatis. etc. } Idemque alibi f Vatinij scelera, turpitu- „
 f lib. 20. episto- } dinemque, & sordes eodem nomine ostendit: sic dicens } proinde isti licet faciāt quos uolent Cōsules, „
 larū ad Atticum } Tribunos Plebis, denique etiā Vatinij strumam sacerdotij διβαφω uestiāt. etc. } Distus uero mor- „
 epistola 24. post } bus hic à Græcis } χοιράδης } Latine autē, nomine Græcæ dictioni respondēt } scrophula. } Etenim „
 medium. } unde } apud illos } χοῖρος } porcū significat. quæadmodam scrofa nobis porcā, et quæ sæpius quæ pepe-
 Xoiράδης } rit (Gellio, & ex Helij Melissi differētia teste) præsefert. Porcetram uero, uel Pomponij cōfirma- 40
 dicitur ratio } ne sex. } tione, quæ semel peperit, suam propriè significat. Cum igitur non unicū fieri tumorem huiusmo-
 g lib. 18. cap. 6. } di

di maxima ex parte contingat. Verum plures insimul, instar racemi, sæpenumerò coaceruari soleant. Adèd ut primus cæteris maior, ueluti mater aliorum existimetur. Hac de causa non temerè à nostris uulgò scrofula nuncupatur. Tametsi ab ijs, qui latiniùs loqui optarunt, struma passim uocatur. Quòd si unicus aliquandò, ac per se talis tumor offendatur: Haudquaquã tamen ob id chæradis nomen, aut si uis etiam scrofulæ deperdit. Sat enim superq; pro similitudinis ratione fuerit: quoniam porcorum instar (Paulo, b Aetioq; i ex Leonida testibus) multiplicis par-
 10 nus, numerosq; scobolis esse propria ex natura compertum iam est: quanq; aliquandò sterilis tam huiusmodi affectus, q; ipsa etiam porca sit. Sed ne in hoc quidem solo fecunditatis numero similitudinis prius, ac mox eiusdem nominis ratio consistit: uerum & in eo, q; aliter porcis
 20 assimilantur. quoniam scilicet in horum gutture, iuxta mandibulas, adnati quidam tumores, globuli ue reperiuntur, quibus strumæ similes sunt. quemadmodum Aetius k ex Leonida tes-
 tis est (si quidem rectè huius interpretes traduxerunt. Nam ad hodiernum usq; diem octo duntaxat primos Aetij libros Græcè uidisse permissum nobis est.) Sunt autem hi adnati in
 porcorum, non omnium quidem, sed tamen multorum gutturibus sæpenumerò pendentes: quas uulgò nostri mamillas nuncupare consueuerunt. Ab hac autem, diuersa (quam Paulus l retu-
 lit) similitudinis ratio apparet. Ni & Aetius quoq; idem proprio idiomate pronuntiarit. In-
 „ quit ergo Paulus { ὁ π τοῖς τῶν δασ οἱ χοῖροι τρεῖς ἔχουσιν. } quod est { quoniam talis
 „ modi colla porci habent. } Quæ quidem uerba sic intelligo. Nam strumatorum hominum col-
 la, cum ob frequentes, numerososq; utrinq; tumores, plena, breuia, curta ue, & grossa fiant, sic
 20 milia porcorum collis apparent. Id quod fortasse Princeps insinuasse uoluit: quum ait m { Aut
 „ propterea q; figura earum secundum plurimum assimilatur porcis. } Haud enim earum. s. scrofu-
 larũ figurã porcis similem intellexisse congruum est. Ni Principem condemnare statim impie decreuerimus. E quibus Andernaci crimen euestigiò liquet: dum præscripta Pauli uerba sic
 Latinè interpretatus est { quòd colla habeant glandulosa } quod enim Græcè Paulus ait { τοῖς
 τῶν δασ: } hoc est, ut nos uertimus, { talis modi } ille traduxit { glandulosa } sed hæc obiter
 Aliam uerò nominis rationem ab ipso etiam Paulo n ante has edocti sumus. Quoniam scilicet
 ἀπὸ τῶν χοῖρῶν τρεῖς, id est, à chæradibus petris (nonnulli scopulos interpretantur)
 sic fortasse nominatus morbus fuit. Est enim χοῖρῶν, perinde ut quidam aiunt, saxum sub ma-
 re nigrum, asperumq; & aliquantulum eminens, ut porco nanti simile uideatur. Cui quidem
 30 scopulo, ob tumoris asperitatem, huiusmodi morbus assimilari potuit. Atq; hanc profectò aspe-
 ritatem non tam in uno, q; in pluribus propemodum coniunctis, magnopereq; uicinis considero.
 Sin uerò ad eiusmodi saxa scopulos ue factam esse comparisonem inde uolueris. quoniam in
 profundis magis hi tumores residant: quanq; & extra quoq; aliquantulum eminent: adèd ut
 natantium quoq; porcorum effigiem præferant: atq; hinc Principem dixisse contenderis { q;
 „ scilicet figura earum scrofularum secundum plurimum assimilatur porcis. } Me hercle in-
 tegrum tibi est. Illud nihilominus à te perpersum interea cuperem, quod omnibus compertissi-
 mum est: uidelicet non hunc modò affectum, sed alios quoq; plurimos tumores penitus retentos,
 supereminere in exterioribus posse. At quintam adhuc nominis rationem uideamus. cur à chæ-
 ro, porco ue chæras huiusmodi tumor nūcupatus sit. Etenim quia porcis suibus ue frequēs, ac fa-
 40 milaris (Plinio o teste) est: quemadmodũ Columella p etiã supposuisse uidetur: dũ ipsius curatio
 nem adiungit. Hac de causa scrofulam, siue (quod in idẽ uenit) chæradẽ Princeps dictã quoq;
 fuisse

b lib 6. cap. 35.

in principio

i lib 15. cap. 5. f

principio.

2^a.

k lib. 15. cap. 5. f

principio.

3^a.

l lib. 6. cap. 35. f

principio.

m infra. tr. sequẽ

ti cap. 9^o. tex. 6.

Cõtra Ander

nacum.

4^a.

n ubi supra.

χοῖρῶν: qd

5^a.

o lib 3. cap. 51.

p lib 3. cap. 10.

T y fuisse

q tr. sequenti ca. fuisse a t^o dicens: & uidetur q non nominatur scrofula, nisi propterea q multum accidunt
 9. tex. 6. porcis, propter gulositatem eorum. Quoniam uero porcis aduenire hic morbus ex Plinio^r, &
 r lib. 8. cap. 51. Columella^s consuevit: & propter gulositatem quidem eorum, uti Princeps^t ait. Hanc ob cau-
 s lib. 8. cap. 10. sam & sextam possumus nominis ratione deniq; cōtemplari. Quoniam. s. hominibus, porcorum in
 t tr. sequenti c. 9. star, gulosis, ut præcipue pueri sunt, familiarissimus morbus sit. Ob gulam nanq; & omnis
 10. x. 6. prorsum ordinis, ac rationis expertem appetentiam innumeræ cruditates, et lentæ pituitæ gene-
 rationes fiunt. Sed de nominis quidem, ac similitudinis ad porcos ratione, usq; adeo dictum hoc lo-
 co sit. Quicquid uero præter iam dicta reliquum est, loco deinceps proprio enucleabitur. Impræ-
 sentiarum autem sub silentio minime prætereundum fere duximus: non diuersum modum ab hoc
 affectum esse, quem suis familiarè esse Aristoteles^u inquit: uerum et illius quoq; nomen. Vo
 10. Cōtra Gazæ, cauuit enim Græcè {νεαυγᾶν} quod Theodorus Gaza traduxit {strumam} ut inde fortassis
 Hermolaū et tum Hermolaus, x tum Rhodiginus quoq; Cælius, y alium esse morbum in sue strumæ ex Ari-
 Cæliū. Rhodiginū. stotele collegerint: Negligentia siquidem occupati (absit. n. in re tam minima tantis uiris igno-
 rantiam ascribere) Græcè loquentem philosophum non considerarunt. Dum tribus morbi ge-
 neribus laborare suos scribens, primum proprio nomine Βεῶγχος (Latine Raucedinem dici-
 mus) appellat. quanq; nos faucibus, gutturiq; tantummodo raucedinem ascribimus. Aristoteles
 autem maxime fauces, maxillamq; brancho, raucedine ue inflammari ait. Sed idem nihilominus
 malum, uel in alia qualibet corporis parte contrahi posse subdit: ut plerumq; in pedem, alias uero
 et in aurem procubuerit. Adeo ut nec appositè huiusmodi Aristotelis Βεῶγχος, Latine rau-
 cedinem conuertere queamus. At omisso quidem brancho, reliqua duo morborum genera ad no-
 strum propositum cōducentia disquiramus. Subdit. n. Aristoteles {δύο δ' ἄμα ἐστὶ λεγέται δὲ
 νεαυγᾶν ἃ μὲν} quod est {Duo autem genera sunt: dicunturq; ambo clangores (siue mas-
 uis per uerbum dicere) clangere.} Nil ergo, si aduissim singula perpenderis, de strumis
 ibi locutus est philosophus: At ex tribus morbi generibus suos affligere consuetis. primum qui-
 dem ab eo Βεῶγχος dicitur: ob eam fortasse causam, quia raucescunt suos: & si non statim à
 morbi primordys (præsertim si uel in pedem, uel in aliam quam uis à faucibus remotissimam
 partem affectus decumberet) necessario tamen temporis processu. Quoniam, ueluti Philosophus
 ostendit, ad pulmonem deniq; putredo, serpensq; ulcus peruenit: quo tacto, mors sequitur. Reli-
 qua uero duo genera cōmuni uocabulo {νεαυγᾶν} i. clangere dicuntur, siue speciatim grun-
 nire, aut νεαυγᾶν hoc est clangor siue (speciatim in suis loquendo) grunnitus. Sic. n. aptius
 τὸ νεαυγᾶν interpretabimur, q; dicendo strumam. Quo fortassis nomine Aristoteles utrumq; di-
 gnatus est: quoniam uehementer uociferare, atq; obstrepere suos consueuerint, quoties horum
 altero laborent. Est autem (ut ait) horum alterum dolor capitis, & grauitas, quo plurimi la-
 borare solent, Alterum alui profluium est, quod irremediabile incidit. Vtrumq; autem quàm à
 Romanorū struma distet, clarissimum esse cuius indaganti potest. At nostrū de strumis, scro-
 fulis ue propositum sequamur. Romani uel Latina dictione usi strumas, uel Græca choeradas
 nuncuparunt. Quam ob rem & Theodorus Priscianus ait^z {sin uero magno phlegmate ius
 perueniente solui nō potuerit furunculus, uel parotis sed callositate permanēte, choeradas fecerit.
 etc.} rursumq; statim {choeradas, quas frequenter in collo, uel sub mento, uel sub a cellis nasci no-
 uimus, hac cura uisitamus, qua durities indigestibiles soluere possemus. etc.} Deprauatè autem
 {cyradas,} corruptiusq; {cyratas} apud Authorem libri de re medica Plinio ascripti legimus,
 a pro

z lib. 10. ad Ti-
 motheum. cap. 9.
 post prin^m.

"pro {choeradas} Quod si scribens eiusdem libri Author, {Ad cyradas, et strumas} Iterūq; a lib. 3. cap. 28
 {strumis, & cyradis} diuersos affectus intellexisse insinuauerit: non secus ac ubi dicit. {Ad Plinio ascriz
 cyradas, & paniculas.} Verūtamen aut eum, qui scripsit, propriam uocem ignorasse, uel (quod ti lib. locus.
 potius reputo) alterum nomen ab aliquo transcriptore, interpretationis causa, interpositum esse b infra tract. sez
 determinandum. Arabum Princeps, b anteq; ipsum Razes, c ac Serapio, d Itemq; Hali Abbas, e quenti cap. 9. 10.
 Auerrhoes, Canstatinus Africanus, & Albucasis, h ac demum ferè omnes Barbaram scēianz c 2. p. dec. p. a.
 tes medicinam scrofulas (prout traducti apud nos sunt) huiusmodi tumores nuncupant. cap. 5.
 QVIBVS porro de strumarum nomine, ac materia perpensis, ad alia permigrare tempesti- c 13 Cōtin. ca. 5
 uum. Queadmodum igitur induratis iam glandulis hunc affectum choerada, siue strumā nun- litera, h. li. Diu. f.
 cupant: Ita & durefcentibus quidem testibus (inquit Galenus i) ὄνομα τῶ νοσήματι παρὰ cap. 129. 7. ad
 10 "κοκίλλω ἐν τῷ quod est {nomen morbo sarcocelen imposuerunt.} Nos pro Aristotelis k et 9. p. tract. ca. 11
 uenia, perspicuitatis quidem gratia, Latinis ex dictionibus compositum nomen effingemus, car f 7. collig. ca. 31
 nhermiam uocantes, idest carnosam herniam siue carniramicem. Etenim κίλη omnem, apud g cap. 50. & in
 antiquos, præter naturam tumorem (Aetio l teste) significabat. Vnde & βεβονοκίλη, idest chirurgica cap. 15
 inguinis tumor, & βρογχοκίλη, hoc est gutturis tumor, atq; alia in testibus plurima tumorū h lib. 2. cap. 4. 2.
 11 genera (ut uidebimus) nominantur. {πᾶς γὰρ ὁ γένος ἐν ὁσχείῳ κίλη λέγεται} inquit Me- Tumor 4. c.
 dicarum Definitionum author, m quod est, {et omnis. n. tumor in scroto cele, siue maui dicere ce- Sarcocèle.
 la (Latine autem à quamplurimis ramex) nuncupatur.} Quam ob rem & Galenus r etiam i lib. de tu. præi.
 ait. {Recentiorum medicorum nomen, omnes testiculorum tumores κίλης nominantium pri- nat. cap. 13.
 20 ma syllaba per. n. elementum, & non per. α. prolata, ut ab Atheniensibus.} Atq; idipsum de k in prædicamē
 11 scroti. s. tumoribus dici, promptissimam quoq; euidentiam habet. Nā si omnis tumor generatim to relationis.
 in quauis parte obortus fuerit cele dici (Aetio referēte) potest. Omnis quoq; tumor, qui in scroto l libro. 15. cap. 6
 nascitur, tanq; sub eodem genere contentus, cele necessariò uocabitur. Aded ut non temerè Gale in principio.
 nus de intestinorum, atq; omenti ramice nonnunq; obiter mentionem faciens, quamprimum sub- m uersus finem
 11 diderit {et ἡ δὲ τῷ κίλη λέγεται, quod est {et hoc iam cele, seu ramex nominatur.} libri.
 Quauis autem κίλη omnem, ueluti prædictum est, tumorem (cuiuscunq; partis sit) signifi- n libro. 5. de ano
 carit, præsertimq; (ut specialior deinceps nominis significatio demonstratur) qui in scroto gene- to m. administ.
 retur, aut testibus, guttureq; & inguine, specialissima nihilominus, & passim usitata signifi- post me. m. libri.
 30 catio est. ut quum simpliciter proferatur {et κίλη} in testibus, aut scroto duntaxat factum tumor-
 rem præferat. Sed ne hunc quidem cuiusuis naturæ existentem (Haud enim harum partium
 phlegmonen, uel erysipelas ostendit) Verum eos tantummodò tumores, in quibus aliqua in euis
 denti, amplà ue cavitare recepta substantia continetur, usurpato apud omnium aures significatu
 demonstrat, Quam ob rem quoties in alia à testibus cavitare, & eorum operculo sinu ue nobis
 manifesto, quem Græcè οσχέον, Latine scrotum (Celfo etiam docente o) nuncupamus, huz o lib. 7. cap. 18.
 iusmodi tumor sit, non simpliciter κίλη, at adiuncto sedis affectæ nomine, utpotè βρογχοκί- post prin.
 λη, idest gutturis ramex, sic & βεβονοκίλη, quasi dicat inguinis hernia, siue ramex, proz
 ferri consueuit. Sin uerò in testibus, aut scroto sit, absolute κίλη, Latine ramex à recens-
 tioribus, aut hernia dicitur. Quod si nonnunq; ex alijs quoq; nominibus compositio fiat: non à
 patientis membri nomenclatura, sed uel eius, quod contentum est, siue id humor, siue quauis
 40 alia substantia sit, totius nominis compositio fit. (quemadmodum ὑδροκίλη, ἐνπεροκίλη, ἐπι-
 πλοκίλη, σκεροκίλη, ἐνπεροεπιπλοκίλη, siue, quod idem est, ἐπιπλοεππεροκίλη, &

huiusmodi reliqua, de quibus deinde sigillatim rursus determinabimus) uel eorundem quoque testium uenosam repletionem huiusque modum adiuncta dictio præsefert. Perinde ut in hoc nomine $\kappa\alpha\tau\alpha\kappa\lambda\eta$ apparet. In omnibus enim huiusmodi nominibus, absque ulla patientis sedis mentione, ab ipso nihilominus impostore, nobisque deinceps utentibus, ea subintelligitur. quem admodum paulo post uberiùs, ex ipso etiam Galeno, declarabimus. Nunc igitur ad nostrum de sarcocoele propositum conuertamur. Quia enim $\kappa\lambda\eta$, herniam significat, $\sigma\alpha\kappa\epsilon$ uero carne: Idcirco & à nobis, lucidioris doctrinæ gratia, Carnhernia seu carniramex, nuper composito nomine, uocetur. Est autem $\sigma\alpha\kappa\epsilon\kappa\alpha\kappa\lambda\eta$, siue maius dicere Carnhernia, aut carniramex eiusdem generis (Galeno & docente) cum scirrhis. Etenim (prout idem alibi quoque scripsit) induratis testibus affectus huiusmodi fit. eo modo, quo induratis alijs glandulis gigni strumas prædictum iam est. Quocirca si conueniunt strumæ, & sarcocelæ: quoniam si quemadmodum strumæ durescentes glandulæ aliæ sunt: sarcocelæ autem indurati testes: Non adiacetium testis membranarum, uel aliarum fortasse partium, sed ipsius met testium substantiæ affectum esse sarcocelam à Galeno didicimus. Quamobrem nec ut hydrocele, aut epiplocele, aut aliæ plurimæ ramicum species fiunt: defluentibus inque uel humoribus, uel alia quauis solida substantia, dilatato peritonæo in erythroidis, scroti uel cavitatem, ita & sarcocoele apud Galenum gignitur uel noua fortassis caro, præter ipsius testis substantiam, nascitur: Verum (uti præscriptum iam est) testium substantia durescente. siue huiusmodi durities frige factam congelatam uel phlegmonem, aut eandem importunè tenuioribus succis discussis, assiccata secuta sit: siue ex defluentibus ab initio statim atrabilarijs crassisque humoribus originem duxerit. Celsus autem non hanc modò testium duritiem, sed neruorum quoque (quos Græcè $\nu\epsilon\upsilon\mu\alpha\tau\epsilon\varsigma$ uocari, & per eos ab inguinibus pendere testiculos prædixerat) duritiem, & in crescentem etiam inter tunicas carnem, sarcocelen dici uoluit. Dum sic prius ait $\{$ Rarò, sed aliquando caro quoque inter tunicas increfcit, $\sigma\alpha\kappa\epsilon\kappa\alpha\kappa\lambda\eta$ Græci uocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert. Et nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina, atque ilia peruenit, partesque hæc intumescunt: Neruus ex quo testiculus dependet, plenior fit, si mulque indurefcit. $\}$ Atque idipsum rursus ad huiusmodi affectus curationem descendens confirmasse uidetur. quum ait $\{$ De carne, quæ inter tunicas testiculorum increuit, & de neruo indurato. $\}$ Hæcque in titulo. Quamprimùm uero subdit $\{$ caro quoque, si quando inter tunicas con- creuit, nihil duby est, quin eximenda sit. etc. At si neruus induruit, curari res. etc. $\}$ Paulus autem (cuius uerba Hali Abbatem exscripsisse apparet) non inter tunicas testiculos ambientes, at in ipsis tunicis, uasisque, & teste, ac demum (ut uno expediam uerbo) in quauis parte ex ijs, quæ scrotum testi adiungunt, & ipsa etiam testiculi substantia, carnis ramicem fieri posse ostendit, esseque hunc, uel carnis incrementum, uel nouam eiusdem generationem, uel denique (uti prædiximus) testiculo fluxionem, indeque scirrhum experto, non carnem (tametsi nomen inde suscipit) sed carnosæ tamen testiculi substantiæ duritiem. Cuius uerba in medium adducere non grauabor. Sic enim Græcè ait $\{$ $\Sigma\alpha\kappa\epsilon\kappa\alpha\tau\alpha\pi\mu\epsilon\rho\varsigma\gamma\iota\nu\omicron\mu\epsilon\kappa\alpha\tau\omega\nu\tau\omega\nu\delta\omicron\chi\epsilon\omicron\nu\kappa\alpha\tau\alpha\pi\lambda\epsilon\kappa\omicron\nu\tau\omega\nu\sigma\omega\mu\alpha\tau\omega\nu$, $\tau\omicron\sigma\alpha\kappa\epsilon\kappa\alpha\kappa\lambda\iota\kappa\omicron\nu\epsilon\rho\gamma\alpha\lambda\epsilon\tau\alpha\iota\pi\acute{\alpha}\theta\omicron\varsigma$. $\}$ quod est $\{$ Caro in parte aliqua corporum, quæ scrotum (testis) connectunt, oborta carniramicosum, seu carnherniosum (ut ita dixerimus) affectum producit. Subditque statim $\{$ Nascitur autem hic ex occulta causa, testiculo defluxionem suscipiente, ac durescente. uel ex plaga, uel ex inexperta post herniæ dissectionem

Carnhernia

Carniramex.

p 14. meth. cap.

17. in prin^o.

q li. de tu. præ.

nat. cap. 18.

r lib. 7. cap. 18.

in fine.

sibi dicit circa eius-

dem capitis initia

s ibidem in fine

capitis.

a lib. 7. cap. 23.

in prin^o.

x lib. 6. cap. 63

y li. 9. theor. ca.

37. circa finem.

et 9. pract. c. 48.

dissectionem curatione. } intellige post herniæ, scilicet aquosæ, dissectionem. de qua iam iam
 præcedenti capite locutus fuerat. ² Id quod Hali Abbas recte comprehendisse uidetur, dicens. ^a ^z cap. 62.
 „ } aut herniæ aquosæ cura, cum non, ut oportet, exhibetur. } Addit uerò post nonnulla Paulus
 „ ^b } Testiculum autem, qui cum adnata carne coaluerit, ceu alienum. etc. } carnem testiculo adna- ^a lib. 9. theoricæ
 tam, per hæc uerba præseferens. Aliter enim exponi posse non uidetur } τὸν συσσευκθὲν τῷ ^{cap. 37. circa fis-}
 δίδυμον } q̄; incarnatum (ut ita dixerim) siue carni adglutinatum testem Quod autem in testi- ^{nem.}
 culorum quoq; tunicis, aut uasis huiusmodi carnis additamentum fieri contingat: sequentibus ^b lib. 6. cap. 63.
 „ uerbis q̄; primum ostendit, subdens } sin hæc carnis generatio in tunica aliqua, aut uase fiat. etc.)
 Quoniam uerò Paulus in sua, quam antea ^c descripserat, anatome, erythroiden uocatam tuni- ^c Ibidē ca. 61.
 „ cam in posteriori parte ipsi testiculo adnascere supposuerat: Idcirco & ibi carnis generatio-
 „ nem contemplatus, post prænarrata inquit } εἰ δὲ ἢ ὁ μῖσθις αὐτὸς σφραγισθὲν. etc. } quod
 „ est } Si autem posterior adnascencia carne fuerit obducta, siue (ut sic dixerim) incarnetur. etc. }
 Ex ijs ergo cunctis imperfectam esse illorū sententiam, patet, qui sarcocelen, testiculi scirrhum
 duntaxat definierunt: pariterq; illorum, qui inter tunicas testiculorum adnascentem carnem
 huiusmodi esse affectum solummodo determinarunt. Cum & duritiem, & carnem, non in tes-
 tibus modo substantia, sed in uasis quoq; ipsis, aut tunicis adnatam, sarcocelen nomine donare ne-
 cessum sit. Quam profecto sententiam exquisitiùs à Celso, & Paulo, q̄; à Galeno didicimus.
 QVONIAM uerò tam Celsus, q̄; Paulus testiculorum, atq; ipsos integumentum partium ana- ^d Digressio de
 tomen, et minùs quidem recte, describunt: Ne cuiquam erroris ansam aliquando fortassis offerat: ^d testibus eorū;
 „ Paucissimis quidem, ut possibile fuerit, eam pertransire operæpretium fore duximus. Inquit, ^d q̄; operculis.
 „ enim Celsus ^d, ut singillatim cuncta perpendamus, } Igitur testiculi simile quiddam medullis ha- ^d lib. 7. cap. 18.
 „ bent. Nam sanguinem non emittunt, & omni sensu carent: Dolent autem in ictibus, & inflam- ^{in princ.}
 „ mationibus tunice, quibus hi continentur. } siste pedem: quia sensus expertem testiculorū sub-
 stantiam posuit: sentire tamen ambientium tunicarum ratione. Cui tamen dicto Galeni dogmas ^c Cōtra Celsū.
 ta omnino repugnant (omissa medullarum similitudine.) Siquidem testes glandulæ sunt, non ut
 stabilimentum diuisionis uasorum ordinatæ, Sed ad succos animanti utiles generandos compa-
 ratæ: adeoq; (uti liquet) utiles, ut ijs demptis proculdubio animalium innumeræ species ruant.
 Secundo autem glandularum generi non uenas modo, & arterias, uerum & neruos, pro sensu ^e 16 de usu par-
 sus participatione, Galenus ^e inesse uoluit. quemadmodū alteri deesse, ac per hoc innatam dunt- ^{tiū cap. 2. et. 14.}
 „ taxat facultatem inesse, alibi f supposuit. Qua de re nonnulli non glandulas, sed glandulosa ^{de usu partiū ca.}
 uocant (Galeno & referente) corpora ea, quæ utilis cuiuspiam humiditatis generationi præsent, ^{11 cū quibus uide}
 neruosq; recipiunt. ut quæ non paulo, q̄; reliquæ glandulæ, & rariore sint, & magis spongio- ^{s aphorif. 39. et}
 sa substantia. Nos autem, pro maiore Celsi destructione, Galeni etiam distinctionem postergan- ^{2. de sem. cap. 6}
 tes, omnibus glandulis sensum à cerebro communicari, cunctasq; influentem suscipere facultas ^{uersus finem.}
 tem inferius ^h ostendemus. Nunc igitur de his obiter intantum dictum iam sit. Itaq; supposita nō ^c Cōtra Gales-
 ex Galeno ⁱ solū, at ex anatomicis administrationibus ^k neruorum in testes insertionem: Cornelij ^{num.}
 „ reliqua & maioris quidem momenti, perpendamus. dum subdit } Dependent uerò ab inguinibus ^f ut 2. art. med.
 „ bus per singulos neruos, quos νεμῶσες Græci nominant: cum quorum utroq; binæ descen- ^{tex. 12.}
 „ dunt & uenæ, & arteriæ. } falsum quoq; magis idipsum est. Haud enim nerui sunt, quibus ab ^g 14. meth. c. 11.
 „ inguinibus testiculi dependent, sed musculi: quos recte νεμῶσες q. d. Latine suspensoria, ^h cap. 17. cō. 2.
 „ (ἀπὸ τῆς νεμῶσας, siue νεμῶω, quod est, pendo, & appendo) nominare consueuerunt. ⁱ colligitur. 14.
 „ } Quod ^k Vide Vesaliū ^{lib. 5. cap. 13.}

l 14. de usu par-
tium cap. ultimo
in fine.

p lib 2^o. de sem.
cap. 5^o. post me-
diū. & uide Ve-
salii lib. 2. ca. 33.
& 34.
m cap. 11. in fi-
ne. ita & cap. 18.
uersus finem.

Cōtra Ander-
nacū et Sylua-
num.

u lib 6. cap. 61.

Cōtra Albas-
num & alios
multos.

o 2^o. lib. de sem.
cap. 5. ante med.
p ut Vesalius cō-
tra Galenū lib. 5
cap. 13.
g uide. 14. de
usu partū c. 11.

p Ibidē. f. 14. de
usu partū ca. 11.
licet antiqua lit-
ra legat paraſta-
m.

Quod enim testes in mare essent penduli (Galenus¹ ait) ob id & musculus ad ipsorum utrumque unus ab ilibus peruenit, ut ij etiam motus uoluntarij sint participes. Hi uero musculi non nerui sunt: sed membrana exterior, ex ijs, quæ testiculos inuoluunt, à peritonæo quidem obor- ta, & instar panniculi (ut uocant) carnosī, tam in dextra, q̃ in sinistra parte, carneas quasdam, secundum longitudinem, fibras à summo (unde originem ea membrana duxit) peritonæo, ad humillimam usq; testis partem obtinens: & in posteriori duntaxat sede. Adeo ut longi, strictiq; cuiusdam musculi naturam referat. Eadēq; ratione cremasteres à peritonæo in carnosas fibras, atq; musciculum degenerante, in mulieribus inueniri Galenus² aliquando testis est: quanq; nō extra, quemadmodum in uiris, sed intus à musculis ilium descendentes posuit. Interpretum ue- rò cætus Græcæ dictioni Latinam ex Celso dedicasse opinati, & Paulum, & Introductorij, seu medici Authorem in eundem errorem uel inuitos atq; insontes perducunt. Vbi enim Græcè in Introductorio^m legitur {δρα τῶν νεφροσπέρων} interpretes Andernacus, cūq; eo deinceps Syl- uanius uertit {per singulos neruos ab inguinibus dependentes, Græci νεφροσπέρων nomināt.} quod n. uno uerbo facilius explicare poterant, dicentes {per suspensoria} multis quidem Cel- si dictionibus rem adeo perturbauerunt, ut Authorem uel inuitum ad errorem impulerint. Idemq; Andernacus Paulum enarrans obseruauit. Quin ibi grauiorem errorem commisit. Nam ubi Paulus Græcè habet {περὶ σπέρματος, καὶ νεφροσπέρων} quæ tantum duæ dictiones (præter in- termediam copulam) sunt. Latineq; dici possunt {assistentes (siue clarij, opitulatores) & suspensicula.} Sunt autem, ut uidebimus, diuersa hæc duo membra abinuicem. s. assistentes, & suspensicula: Multis tamen interpretes dictionibus Celsum imitatum esse opinatus, atq; insimul utrumq; Græcum nomen pro eadem particula accipiens, ita Latine conuertit {At nerui testiu, quos Græci paraſtatas, & cremasteras ab eo appellant, quod ex illis genitales partes depen- dent.} Adeoq; increuit huiusmodi de neruis opinio, ut Albanus etiam, pluresq; alij neruos in- terpretetur. Sunt autem paraſtata (ut inexcusabilem pariter ipsius Pauli errorem detegamus) duplices, scilicet uaricosi, & adenosi. Varicosi quidem, Græcè νεφροσπέρων περὶ σπέρματος, sunt quæ uulgò uasa deferentia nominantur, seu delatoria seminis à testibus, seu epididymide ad pe- nis radicē. In quo loco & alij sunt paraſtata adenosi, aliam quoq; præter genituram, fœmineo semini persimilem humiditatem generantes. Quorum utriusq; generis paraſtatum usus alibi declarandus reseruatur. Nunc enim sat superq; est nominum significationes, ad enucleandas æquiuationes, ostendisse. Quatuor ergo sunt (Galenus³ testimonio) paraſtata, siue n. duo corpora, siue unum, p̃ in dextrum tamen & sinistrum diuisum, adenosum paraſtatem intellexeris, nihil, aut minimi quidem refert. Sic autem ab Herophilo⁴ prius, deinceps uero à Galeno, & reliquis nuncupati sunt: quoniam περὶ σπέρματος sunt, qui alicui, ut auxiliarij, uel socij assis- tunt: ut pedes equiti auxiliarij, et qui præſultori secundus est, περὶ σπέρματος nominatur. Assis- tunt autē hi, opitulatoresq; testium sunt, ad genituræ tum perfectionem, tum quoq; promptam ei aculationem. qua de re Latine assistentes, siue aslites, siue auxiliarij, aut quouis alio, quod idē præferat, nomine designari queunt. Nonnunq; uero glandulosum illud penis radicē assistens corpus, non περὶ σπέρματος, sed νεφροσπέρματος, distinctionis gratia, legimus. Quauis n. in idem ue- niat, aliud tamen quidpiam adiungit. Quod. s. primum assistens, & in acie occurrens differat- tur. q. d. præſidens. Primum nanq; in Veneris perfectione, ac genituræ tandem ei aculatione assis- tens, glandulosum illud corpus est. Quod quidem, quouis nomine appelles, neq; neruus est, neq;

- neq; nerueam naturam obtinuit. Varicosi autem assidentes, quanq; nerueam quandam substantiam (Galeno etiam teste) præferunt, nerui tamen minimè sunt, neq; ex neruis aliquibus contexti. Cremasteres ergo musculi sunt, testiculorum ueluti suspendicula, & ab assidentibus parastatis uel aut prostaticis, loco, substantia, & usu mirum immodum distantes. Nec à spinalis medullæ membrana (ut ad Paulum reuertamur) uel cremasteres, uel parastatae, siue prostaticae originem ducunt. Sed cremasteres quidem à peritonæo: Idq; rursus ex ligamentis, quæ lumborum uertebrae connectunt, & quæ sacrum os Ilium ossibus committunt, peritonæum utrinq; principium ducit. Id quod demum à tertia (uel Galeno teste) membrana, quæ geminas spinalis medullæ tuniculas extrinsecus ambit, suæ generationis originem obtinuit. quem admodum dissecantibus perpendere propriissimum, atq; integerrimum est. Huiusmodi uero tertiam tunicam à duabus cerebrum contegentibus membranis, crassa inq; tenuiq; meninge diuersam esse, cuius perspicuum fore opinor. Quam ob rem Pauli defectum longè magis augent Interpretes, qui cerebrum, quod in textu Græco non est, adiungunt: dicentes { ex cerebri membrana etc. } Pauli ergo uerba ab interpretibus minimè percepta hæc sunt: *οἱ δὲ παρὰ σάτου, καὶ κρεμαστῆρες ὀνομαζόμενοι, ἐκ φύσεως ἐστὶ τῷ σπινθηρῶν μνηνιγῶς, οὐν φλεβῶν, ἀρτηριῶν δὲ σπιν, ἐν τοῖς διδύμοις κρεμασθῆναι, οἱ δὲ τῷ σπινθηρῶν μνηνιγῶς ἐς τὸ αἰδοῖον γίνονται, πρόοισι.* { quod est } Assistentes & suspensores nominati, propagines quædā sunt exortus uel à spinalis medullæ membrana, unā cum arteriosis uenis, ad testiculos pertinentes: per quas seminis effusio in pudendum fit. Itaq; si Paulus idem esse parastatas, & cremasteras intellexerit: summo per se deuius à uero est. Sin diuersas partes uoluerit: ambas tamen à spinalis medullæ membrana oriri credidit, Non minùs quoq; mendax est. Sin demum nō parastatas assistentes uel, at cremasteras duntaxat suspendicula uel à spinalis medullæ membrana ortum ducere insinuarit, quanq; non immediatè (prout intellexisse Paulum apparet) id uerum est: Quatenus tamen peritonæum inde originem, atq; hanc rursus mediatam sumpsit. Ex quo quidem peritonæo cremasteres oriuntur: Ita uerum quadantenus esse potest à spinalis medullæ non quauis, sed tertia, omniumq; extrema membrana generationem cremasteras obtinuisse. Quod uero subdit Paulus unā cum arteriosis uenis ad testes pertingere: Verum quidem est, non de arterijs modo (has enim per arteriosas uenas intelligo) sed de uenis quoq; simplicibus, à caua, uel emulgente, uena obortis, & utrisq; capreolorum uitis, aut hederæ instar conuolutis, ac semen testium coctioni præparantibus. Quæ nihilominus tum uenæ, tum arteriæ insimul coniunctæ non eandem partem testiculi cum cremasteris attingunt. Quemadmodum ex anatomicis exercitationibus liquet. Paulus autem per arteriosas uenas, neq; prædicta intellexisse uasa apparatus, præparantia inq; sed quæ nos uulgò delatoria nuncupamus. Cum ita prius dixerit: { per quas, scilicet arteriosas uenas (haud. n. ut interpretes uertunt, ad neruos relatiuum illud, διὰ τῶν, referendum est) seminis effusio in pudendum fit } statimq; adiungat: { seminaria autem uasa, uenæ sunt à caua uena in testiculos sinuosos anfractibus pertinentes. Vnde testiculi nutriuntur. } Etenim præparantia nunc uasa intellexit. In quibus tamen adhuc deficit, quoniam uenas à caua ponens, interim arterias ab Aorta descendentes omisit. Qua in re Celsus rectius se habuit, qui & uenas & arterias utrobique descendere iam posuit. Quid uero certi à Paulo de uasis illis delatorijs, aut suspendiculis doceamur, nō habemus. Etenim cremasterē suspendiculi m. uel deinceps obiter describens, nil aliud: q; uas genituræ delatorium designare uidetur. Nil enim aliud

p^o. de sem. in fi
ne et. 14. de usu
partiū in fine.

Cōtra Paulū.

Vesalius lib. 5.

ca. 13. ante mediū

u. Idē lib. 5. cap.

2. post principia.

x lib. de ossibus

ad Tyrones ca. 8.

& 11. & 12. de

usu partiū.

y uide Vesaliū

lib. 2. cap. 40. 4.

11. et uide p' eius

dem. 14.

Cōtra Ander

nacū & Tos

rinum.

z uide Galenū

lib. 8. 11. et. 12. de

usu partiū.

1.

2.

3.

a uide Vesal. li.

5^o. cap. 12.

Cōtra Paulū.

Testiculi tunicæ

b cap. 64.

e cap. 61.

d cap. 64.

e 14. de usu
partiu cap. 10. in
fine.f lib. 7. cap. 13.
post principiu.g ut Andernaz
cus, & Vasseus.h li de uteri dis
sectione cap. 12.
Cōtra Celsū,
et Paulū An-
dernacū Vaf-
seum & plus
res alios.

i ut Vasseus.

k ea. 62. in fine.

aliud eiusmodi, quam describit, substantiæ ibi conspicitur. ut apud dissectionis peritos liquet. Sunt
atem Pauli uerba (ut anatomes professores iudicent) hæc : & cremasterem , suspendiculum ue
ad inferiorem partem depellemus. Facile autem is dignoscitur, ut qui tenuior uasis sit, solidiorq;
& renitens, ceu potens, ualidusq;. Aeger quoq; ad ipsius depressionem dolet, & iuxta colem
confunditur. Quod si uas delatoriū (quod arteriosam uenam ante a nominauerat) idem &
suspendiculum est. Quomodo ergo à spinalis medullæ membrana ortum habet suspendiculum?
Quomodo etiam id unā cum arteriosa uena descendit, si idem arteriosa uena est? Quomodo etiā
post prædicta uerba seorsum de uasis meminit, d subdens & uasa autem digitis nostris. etc? Vel
ergo Paulus ut parum in anatome exercitatus propriam uocem ignorauit, uel eius mysterium
non intelligo. Id ipsum duntaxat uerum esse inficias non ibimus, tamen si non à Paulo consideraz
tum, uasa. s. deferentia uocata non indecenter posse nonnunq; suspensoria nuncupari. Quoniam
uidelicet testes aliquando suspendant. Modò interim uasa hæc esse ea, quæ originem à darto con
traxerunt, præcognouerimus. Suspendunt inq; coitus tempore. quum s. ueluti conuelluntur ad
seminis emissionem. perinde ac exquisitè Galenus edocuit. Contracta enim tunc temporis
eiusmodi uasa, & testes quoq; ipsos aliquantulum contrahere uerisimile est. Aded ut non à sus
pensorijs tantummodò musculis (quos uerè νεμωσῆρας nominari prædiximus) sed ab huiusmo
di etiam prædictis uasis testiculorū suspensio, retractioq; sursum, in seminis emissionem fieri cre
dendū sit. Sed testem inuoluentes tunicas rursū ex Celso, atq; unā deinceps ex Paulo (prout
in antedictis obseruauimus) contemplemur. Cum in ijs quoq; tunicis fieri sarcocelen prædixe
rimus. Inquit ergo à prænarratis Celsus f & Hæ autem (s. uena, & arteria, quæ ad testicu
los descendunt) tunica conteguntur tenui, neruosa, sine sanguine alba, quæ ἐρυθροειδὴς à Græ
cis nominatur: super eam ualentior tunica est, quæ interiori uehementer ima parte inhæret,
ἡ δὲ τὸν Græci uocant. Vbi Celsus internum inuolucrum erythroiden, externum uerò darton
appellat. Sic etiam Paulus, amboq; fortassis ab aliquo ex uetustioribus Græcis anatomicis ac
ceperunt. Quam ob rem & qui anatomes compendia composuerunt & Celso magis, ac Pau
lo, q; Galeno, et ueritati attendentes, eodem modo has tunicas disposuerunt: Galeno inq; de ute
ri dissectione loquenti, dum ait h & περιέχεται τὰ τῶν ἐντέρων ὑμῶν ἰδιος λεπτὸς, ὁῖος ἐστὶ
τῶν ἀρτηρίων, ὁ δὲ τὸς ἐρυθροειδὴς δὲ καὶ ὁ σκευὸς ὁ ἡλεος ὁ ῥεχας ἐκ ἐχουσι. hoc est
& contegit autem utrunq; testem propria membrana tenuis, qualis in maribus est, dartos. Ery
throiden uerò, & scrotum fæminei testes non habent. Si ergo mulieres erythroide uacant: In
dissectionibus autem, exteriore tunica uacare mulierum testiculos inspeximus: Igitur erythroi
des exterior tunica est. Interiorem uerò, quæ. s. testiculum absq; ullo medio contegit, ita in fæmi
nis, quemadmodum & in maribus quotidie cernimus: Illa ergo est, quæ dartos nominatur. In
troductorij quoq; author, quem prauè nonnulli intelligentes pro se allegant i idem ostendit. Cū
tenuiorem erythroiden, ualentio rem uero darton appellari scribat. Dissecantibus autem ex
ternum tenuius, internum uerò ualentius inuolucrum esse, tam uisu, q; tactu perspicuum est. Id
quod nomina quoq; ipsa illic præferūt. Quoniā δὲ τὸς dicitur ἀπὸ τοῦ δέρεος quod est,
& excorticari eo quod cutis instar excorticada, et uī quādā à testiculi substantia extirpanda est,
ἐρυθροειδὴς uerò dicitur, quasi rubea, quoniam ἐρυθρός rubeum significat. Est autem huiusmo
di tunica aliquatenus rubea (tamen si Celsus, atq; etiam Paulus k albam (simplicem fortassis
eius substantiā considerantes proferunt) tū & carnearum fibrarū ratione, quæ rubea sunt;
quarum

quarum occasione in musculum cremasterem dictum degenerat, tum etiam ob uenarum graci-
 lium, quæ id adeunt, frequentiam, quæq; huiusmodi externo inuolucro ruborem aliquem conciz-
 liant. Quamq; non me latet aliquos per. λ. & τ. scribentes, ἐλντροειδὲν. i. uaginalem interpre-
 tari. quoniam ἐλντρος uaginam significat. Quoniam uerò non adeò crassa interior in foeminis
 membrana, quemadmodum in masculis est: nec omni ex parte masculorum darto similis. Idcirco
 eò non absolute dartum Galenus protulit, sed talem in foeminis esse ait, qualis in masculis dartos
 est. Perinde ac Græcum stylum & articulum perpendiculari liquere potest: quum ait ὁ μὲν l lib. 6. cap. 62.
 ἱδνός λεπτός, ὁ δὲ ἐπὶ τῶν ἀρ' ἔ' ἐν ὧν ὁ δὲ τὸς. quod est & membrana propria, tenuis, qualis Cōtra Paulū.
 in masculis est dartos. Sed ne in his quidem solis Paulus defecit. uerum & in eo, quod postea
 de erythroide loquens, subdit, dicens Ἐρυθροειδὲς autem (corruptè. n. Græcæ legitur, ἐλικοει Pauli locus.
 δὲ π, pro, ἐρυθροειδὲς δὲ,) tunica secundum naturam neruosa est, in gibba quidem parte, an-
 teriori; à testiculo libera: in concaua autem, & posteriore illi adnata est, generationis origi-
 nem à membrana peritonæo uocata trahens. Haud enim in testium figura gibbum, & cons-
 cauum (quantum ad propriam substantiam attinet) inuenitur. In externa enim superficie nul-
 lum penitus sinum impressionem uel inæqualitatem obtinet. Ni supergeminalem perpen-
 damus. ratione cuius aliqua in posterioribus cavitatis apparet. Nec in posteriore testiculi parte il-
 li adhære scit: Verum inferiori duntaxat testis parti ualide applantatur. Sed ne testis quidem
 corpori, sed humillimæ, uasis semen à teste deferentis, portioni, quæ id fursum secundum testis
 humiliora reuoluitur. At enim uerò plura sunt, quæ uel in Paulo, uel eius interpretibus, aut in
 ipso etiam Celso, corrigenda uenirent. Quæ uisis anatomicis administrationibus, aut saltem ijs,
 quæ à Vesalio^m exquisitissime depicta sunt, suo statim Marte iudicare potest. Plus. n. lonz m lib. 5. cap. 13.
 gè, q; decreueramus, immorati sumus. Ad sarcocelam ergo reuertamur. quam unico & com- Carnhernia.
 posito nomine, carnherniam uocauimus, aut si mauis dicere carniramicè. Eiusdem penè rationis Carniramex.
 cū sarcocela est πωροκῆλη. q. d. tophiramex, siue tophernia. Pori. n. tophi uel tū in testiculo, tū in
 mēbrana erythroide occalescunt. renixuq; interim (uti Paulus ait) multo, duritie, & inæqua- c lib. 6. cap. 63.
 litate à sarcocela & hydrocela discreti. Verum sub sarcocela intellectam esse à Galeno πόρος in fine.
 celam uerosimile est. Ad quam & ab Introductorij authore^d positam σεατοκῆλην. q. d. sebher- d cap. 13. et. 14.
 niam reducere possumus. A quo nihilominus authore σεατοκῆλην, ob carnis & omen
 ti complicationem habemus: quasi diceremus carnomentherniam. Pluraq; pro uarietate contentæ
 substantiæ, nomina componere possumus. Quemadmodum posterius patefiet. Impresentiarum
 uerò herniam à ramice non distinguimus: Sed pro eodem utrunq; nomen confundere statuimus.
 Quamq; (ut uidetur) Celsus inter herniam, & ramicem differentiam insinuauerit. Ad eò ut
 Hernia tres uideatur propriè morbos comprehendere. s. enterocelam, epiplocelam, & hydroce-
 lam. De primis enim duabus loquens Celsus, ait Ἀπὸδ nos indecorum, sed commune his her-
 niæ nomen est. De tertia uerò deinceps post aliqua subiungens, ait ἡ ἡστροὶ hoc quoq; sub eodē
 nomine, quo priora habent. Ramex uerò eiusdem sententia sarcocelam, cirsocelam, porocelam,
 & bubonocelam quoq; sub se concipere nonnulli uolunt. Nos autem non id ex Celso collegi-
 mus: uerum q; cirsocelam Ramicis nomine simpliciter intellexerit: quæ uenarum conglomerata
 intorta; tumefactio, si in inguinibus fiat, Græcè βυβωνοκῆλη, at Latine inguinis ramex ab
 ipsomet nuncupatur. Ad eò ut Celsi sententia Ramex cirsocelā, & bubonocelam duntaxat cō-
 prehendere uerum sit. Plinius autem sæpenumero de ramice meminit, tanq; commune (ut
 mihi

Hernia.

Ramex.

n lib. 7. cap. 18.

& 22. & 24.

Nota.

o Vt lib. 20. ca.

13. circa finem et

cap. 22. in fine. et

lib. 22. c. 22. uer.

finem. & 23. cir

ca prin^a. & lib.

24. ca. 5. & lib.

30. cap. 14. circa

principia. Alterq;

Plinius li. 2. c. 4. a

p ut lib. 26. cap. 8. uersus finē.
 post principia. li. 27. cap. 11. ante medium lib. 20. cap. 4. post me^m. lib. 32. cap. 9. a lib. 24. cap. 5. circa principiu. b lib. p^o. cap. 37. q 20. 3^o. tr. 2. ca. 13. & 22^a. eius^{dem} tr. p^o. cap. 20. usq; ad. 8^m.
 r lib. Diuis. ca. 101. s 11. Contin. ca. 3. litera L. t 2^o. Theysir. tr. 3^o. 4. et 5. cap. u 9. theor. cap. 36. 37. et 9^o. pra. Etice. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Tumor 41. Hydrocele x de tum. praet. nat. cap. 13. y lib. 6. cap. 62..
 z lib. 7. cap. 18. circa medium
 mihi uidetur) nomen ad huiusmodi omnes species usurpans. Quamq; aliquandò p speciem Graeco nomine demonstrauit, enterocelam nominans. Iterdū uerò sub ramicis nomine enterocelā intellexisse uidetur. ut quū de Cupressi folijs loquitur, a Dioscoride b fortassis remediū trāscribēs. N O s autē ne circa nomina, nimis q; satis est, immorari uideamur: siue herniā, siue ramicem protulerimus: Commune genus ad omnes huiusmodi tumores intelligimus. Dictam uerò nonnulli herniam uolunt à duritie pellis, hoc est scroti, quā in huiusmodi quibuslibet tumoribus res peritur. Hernium enim durum, & asperum dicitur. Tractum à Sabinorum lingua, qui herniū, saxum uocant. Hæc igitur de sarcocela, communiterq; dicta hernia, uel ramice, usq; adeo iam satis determinata nunc sint. Cuius herniæ species omnes sub nomine rupturæ, generaliori quidem uocabulo, Arabum Princeps, uel eius, (ut rectius dixerim) interpretes intellexit. Sub quo nomine, in quauis, peritonæi parte ruptio fiat, illam comprehendit, speciatimq; eas quæ in testibus fiunt, omnes & herniæ & ramicis nomenclatura donauit: specialissimè demum adiunxit uel sedis affectæ, uel contentæ in scroto substantiæ nomine distinguens. Razes Herniam, & rupturam huiusmodi quoq; genus appellat: Nonnunq; uerò rupturam siphac. Abenzoar autem crepaturam nominat. Sub hernia, uel siphacis passionibus Hali Abbas comprehendit. Et reliqui demum sub aliquo prædictorum nominū huiusmodi effectus omnes intelligunt. Quos quidem exquisitiū intellexerimus: Sigillatim species Galeni etiam ordine declarantes. Quam ob rem ad primum & quadragesimum tumorem pertransire tempestiuum est. Is autem est, qui Græcè ὑδροκύλη dicitur, Latine autem dicere possumus Aquherniam, seu mauius aquosum ramicem, aut unico & nuper composito nomine aquiramicem appellare integrum fuerit. De quo qdē Galenus libro, quē interpretatur, x post sarcocelen adiunxit, dicēs. Quū in tunicis, quæ circa testes sunt, aquosus humor aceruatur, hydrocelen appellant. Paulus huiusmodi testium tunicas δὲ τῶν ἐν τοῖς ὀρχεσιν ὁμαλὰς. i. i. corpora implicatā scrotū nominat. Neq; (ut mihi uidetur) ineptē, Cū non testibus modò ipsum scrotum, exteriorem uel pellem connectant, alligentq;: sed etiam uerè sic eam cutim implicatam retineant, ut contractis, eleuatisq; sursum testibus, contractis quoq; cremasteribus, suspendiculis uel, aut si dixisse mauis, ipsa erythroide, exteriorem pellem corrugari, ac mirum in modum aliquandò contrahi cuius per spicuum sit. Quamq; perinde ac præscriptum iam est, earum tunicarum, & suspendiculorum fabricā Paulus minimè callet. Humidum uerò, quod in huiusmodi tunicis collectum hydrocelen constituit, Galenus ὑδατὸς, id est, aquosum uocat. Paulus autem aquosum sub humidi nomine intelligens, ἀργὸν ὑγρὸν, hoc est (ut aliqui interpretantur) ociosum, uel clariū, illaboratum, & inutile humidum appositè nuncupat. Quod tamen humidum (uti rectè etiam Celsus ait) inter tegris eiusmodi testium membranis colligi inter eas consueuit. Tamen si & ijs quoq; ruptis interdum aceruari impossibile nō est. Quemadmodum in ea Herniæ specie patet, quæ hydrentes rocela, & hydrenteroepiplocela (ut uidebimus) nominatur. Hydrocela autem species duæ sunt (subdit idem Celsus) Nam uel inter tunicas humor increscit, uel in membranis, quæ ibi circa uenas & arterias sunt, ubi hæc grauata occaluerunt. Hanc uerò secundam speciem Paulus non expressit. Quam tamen ut rarissimam admittimus. Primam uerò Galenus insinuasse uidetur, cæteri q; demum ut frequentissimam cognouerunt. Ac ne ei quidem humori (Celsus deinde ait) qui inter tunicas est, una sedes est. Nam modò inter summā & mediam, modò inter mediam & imam consistit. Græci cōmuni nomine quicquid est ὑδροκύλην appellant: Nostri, ut

ut. nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoque sub eodem nomine, quo priora habent. Erant autem priora ἐν πτερονήλῃ, et ἐν πτερονήλῃ, quorum nomen Hernia Latinis erat uelut idem prædixerat, his uerbis. Apud nos indecorum, sed commune his herniarum nomen est. Intelligit autem Celsus, per summam tunicam, ipsum scrotum, extimam uel pellē sub qua mediā posuit dartō, atque infimā denique erythroiden. Quo etiam pacto Paulus tunicas disponens, magna ex parte in tunica erythroide appellata, testiculū ambiente, in partē anteriore colligi ait: quā potissimum membrana illa à testiculo separatur. Nos sub darto primā hanc speciem fieri, cum Galeno diceremus. At de nomine duntaxat quæstio reliqua est. Dignoscitur autem hæc, quoniā tumor rotundus Paululum, & oui modo longiusculus apparet. His testiculus in conspectum non uenit: ut qui undique sit implicitus. Rarō autem extra membrā hanc erythroiden uitū (Paulo docente) contrahitur, sub dartis uidelicet genitus. tunc tamen propter paucitatem particularū promptius occurrit. Nos autē frequentius super darto, ut nos intelligimus, intima uidelicet tunica, & intus erythroiden à nobis uocatum, inspeximus. Sæpiculē autem peculiari quadā tunica humor cōprehenditur. Vocantque hunc affectum chirurgi ἐν ἐπυγνήτῃ, quod est in supergenita, q. d. uocat herniā in membrana, quæ prius nō erat, uerū supergenita iā est. Quā tertiā speciem, propter cōtractionē ex omni parte, ac rotunditatem promptissime dignoscimus: quoniā tumor alterius testiculi imaginem præsefert. Hanc superadnatā siue supergenitā tunicā, qui superficialius Pauli sententiā cōspicient, olfactientque potius, quā gustabunt, tertiā testiculū tunicā esse intelligent, ac super testibus adnatā, existimauerint. At secus quidē est, atque prima fronte apparet: supergenitam. n. hoc est, nuperrimē genitam membrā intelligit Paulus: quemadmodū in atheromate, steatomate, meliceride, strumis, & alijs quoque plurimis abscessibus quædā tunica humorem cōtinēs generatur. Sic ergo nonnunquam hydrocela gigni solet. Quoniā, s. peculiari, propria uel tumoris, & nūc genita membrana humor cōprehenditur. Quā ob rem ἐπυγνήτῃ, hoc est supergenitā (quasi præter alias, quæ testibus naturales sunt, nuperrimē genitā) Chirurgi uocarunt. Quā & Aetius^a ex Leonida manifestius insinuat: quū ait uel in propria pellicula, uelut uesica quadā cōtinetur, etc. Arabūque Princeps^b confirmat, dicens Et fertasē accidit ei panniculus proprius. Idcirco & tumor (uti Paulus ait) alterius testiculi imaginem præsefert. In foeminis autē circa pudendi alas cōfistere circocelā, Aetius^m ait. Quoniā uerō nō aquosus tantum humor, sed uel sanguineus: uel faeculentus in prædictis testiculorū tunicis congregari solet. ut si ex uitu (Paulo docente^c) huiusmodi tumor aduenerit: Idcirco tunc pro contentæ substantiæ ratione, tum Græcè, tum Latine nomen cōponemus, Dicatur ergo, cum sanguis cōprehensus est, ἁιμωκήλη, seu ἁιμοτομήλη; Latineque sanguinhernia; sin autē foex collecta sit τερυγικήλη, q. d. fœxhernia. Quæadmodū si flatus spiritus extiterit πνευμωκήλη et πνευματομήλη quasi diceremus spiritubernia; uel ab ipso Paulo^d nuncupata est, q. d. siue sanguis siue foex aceruetur, Aetius ex Leonida ad hydrocelæ speciem, cōmuniter s. sumpto uocabulo, reduxisse, e unā cum Paulo uidetur. Quod si & alijs quoque substantijs aquosus ille humor cōplicatus sit. Pro coniunctæ quidē substantiæ diuersitate, diuersa etiam nominis cōpositio fit. Veluti quū uaricoso ramici (de quo statim loquemur) connectitur, à Definitionū Medicarum Authore s. ὑγροκισσομήλη nuncupatur, q. d. Aquiramex; cum apud Celsum Ramex simpliciter uaricosum præseferat. Dicique adhuc expressius potest, Aquaricoramex; nuper effectis (uelut antea s. p. e. iā diximus) nominibus, sin uero carnis tumori aquosus etiā succus implicetur ὑδροσοκήλη, q. d. Agcarnhernia; dicetur. Quod si intestini quidem herniæ huiusmodi etiam aquosus ille humor colligatur ὑδρεντερονήλη, s. uerfus finē li.

242
 λη, Hoc est, Aquintestinhernia nominabitur. Perinde ac intestinali, atq; omēti quoq; insimul
 hernia si componitur, à Paulo tribus coniunctis nominibus nomināda docetur. ut sic (uerbi gra
 τὸ πρὸν περὶ τοῦ πλωκῆλν. q. d. Aquintestino mēthērnia. Itaq; in cæteris pluri
 τὸ πλωκῆλν. tis, nominum compositionem, iuxta contentarum substantiarū complicationem, fieri cuius inte
 Tumor. 42. grum fuerit. NOS autem ad secundum & quadragesimum tumorem pertranscētes, reli
 Epiplocele. quas insimul hernia species absoluemus. Est autem hic tumor, qui à Græcis dicitur ἐπὶ πλωκῆλν
 g lib 7. cap. 18. κῆλν. q. d. omenthērnia. Sub scroto igitur (Celsus & ait) plura uitia esse cōsueuerunt. Quæ
 post principia. Vi modò ruptis tunicis, modò his integris fiunt. Si quidem interdum uel ex morbo primum inflam
 de Paulū 6. 65. matur, deinde postea pondere abrumpitur: uel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica, quæ di
 3. 53. et Actium ducere ab inferioribus partibus intestina debuit: tum pondere eò deuoluitur aut omentum, aut
 14. 23. etiam intestinum. At ibi reperta uia paulatim ab inguinibus in inferiores quoq; partes demis
 sum, subinde neruosas tunicas, & ob id eius rei patientes diducit (Si quidem intestinum des
 scendit) ἐν περὶ κῆλν. q. d. intestinherniam: Sin uero omentum demittitur, ἐπὶ πλωκῆλν Græ
 Tumor. 43. ci uocant (q. d. omenthērniam.) Apud nos indecorum, sed commune his hernia nomen est. & Pa
 Enteroccele. tiuntur autem affectum epiplocele, siue omenthērniam, inter animalia, homines, & Simia:
 b 6. de Anat. ut quibus magnum ualde omentum (Galenus docente b) sit. Vnde qui huiusmodi patiuntur af
 administ. cap. 7. in prin. et uide. fectum, dicuntur ἐπὶ πλωκῆλν, quasi dicas omenti, gestores. Vocant enim sic herniam
 4. de usu partiū cap 9. (Galenus b subdit) cum omentum mea ui ad scrotum descendentem incidit. Quod si utrunq;
 Tumor. 44. insimul, omentum scilicet ac intestina descenderint: cōpositum quoq; nomen affectū significās,
 Enterocepiplo erit. hoc est ἐν περὶ κῆλν. q. d. intestino menthērnia: uel, quod idem est, ἐπὶ πλωκῆλν 20
 cele. q. d. omentointestinhernia. Sicq; si cū intestino aquosus humor admisceatur, & hydrēs
 i ubi supra de teroccele. q. d. Aquintestinhernia, & alia quoq; multa, pro cōtentæ substantiæ diuersitate, cō
 Anat. admin. 6. poni, atq; effingi nomina queunt. P R A E T E R hæc autem, integris tamen tunicis, ramex (uti
 Tumor. 45. Celsus b ait) innascentur, κερσοκῆλν Græci appellant, cum uenæ intumescunt. Hæ quoq; in
 Cirfocele. tortæ, conglomeratæq; ad superiorem partem, uel ipsum scrotum implent, uel mediam tun
 k lib. 7. cap. 18. nicam, uel imam, Interdum etiam sub ima tunica, circa ipsum testiculum, neruumq; eius
 uersus finem. l ibidē statim. crescunt. In quibus uerbis Celsus quatuor glomeratarum uenarum loca insinuat, sigillas
 m ca. 22. eiusdē timq; deinceps & notas, & in sequentibus^m curationes quadruplices, pro quatuor diuersis
 Cirfocele a2 locis, adiungit. Celsi ergo sententia, siue in exterioribus, siue in interioribus uasis glomeratio
 pud Celsū. fiat, cirfocele dicitur. Paulusⁿ autem distinctionem fecit. In exterioribus enim ac dartis uari
 n lib. 6. cap. 64. ces Græcè κερσοῦς, in testium uerò proprijs uasis, κερσοκῆλν uocari, ex priorum opinione,
 in principio. uoluit: sic dicens Vasa in scroto, aut dartis, dilatata, intumescētia ue, uarices simplici uocabulo
 Cirfocele a2 nominant: Alia uerò, quæ testiculū nutriunt, si eodem modo turgescant, intorqueanturq; cirfo
 pud Paulū. celen huiusmodi uitium nuncupāt. Quam ob rem et Medicarū Definitionū Author^o nō simpli
 o uersus finē li. citer omniū uasorū affectū esse, aut eorū quæ in scroto, et tunicis, sed quæ testiculos nutriūt, cir
 p de tum. præc. nat. cap. 18. in fi. socela definiuit, sic dicēs Cirfocela est dilatatio, et magnificatio quorūdā, aut omniū, quæ testē
 ne. Galeni locus alūt, uasorū. Quam fortē sententiā Galenus, q; q; satis ancipiti sermone, uoluit, Quum sic ait P
 obscurus eno: ὡς περὶ τῶν ἐρημένων ὀνομαζόντων ἐκείνων ἐν δέκνῃ τῷ μέρῳ τὸ νόσημα καὶ ὅν λέ
 datur. γεται ὅν τω καὶ ἡ κερσοκῆλν νεώτερον ὀνομα δηλοῖ τὸ πάθος ἐφ' ὃν λέλεκεται. quod est
 & quæadmodū aut unūquodq; dictorū nominū partis morbi indicat, de qua dicitur. Sic et cirfoce
 le recentius nomē passionē eius partis, de qua dictum est, ostendit. q. d. ueluti prædictorum no
 minum

minum unumquodq; dictæ partis, hoc est testiculi, morbum indicat: Ita & cirsocele eiusdem
 „ partis affectum significat. Præsertim cum postea subdat & Varices autem & omnes alias ue
 „ nas dilatatas antiqui nominarunt; quasi dicat, alias uenas, quæ præter substantiam testis sunt,
 quum dilatantur, ac extumescunt, ueteres appellarunt uarices, Græcè κισσός: Quas deinde
 Iuniores etiam, præscorum æmulatione, κισσός, hoc est, uarices appellant, et, elementum post
 „ ponentes, non sicuti Athenienses. Quoniam uero simpliciter dictæ uarices in cruribus magis
 „ contingere solent: Idcirco statim subdit & fiunt autem & in cruribus etiam uarices, ob imbe
 „ cillitatem uenarum, quæ ibi existunt: & tunc præsertim, quum sanguine crasso corpus res
 „ dundat. & An uero præscriptam Pauli distinctionem Galenus ijs uerbis insinuassee uoluerit,
 10 minime constat. Cum & alium quoq; ac uerbis conformiorem sensum elicere possimus. Ut. s. 2.
 „ relatiuū illud {δὲ} quum dicit {κισσὸς δὲ} et rursus {ἐν τῷ} (quod nos cum Augustino Ricco tra
 „ duximus {de qua} uidelicet parte) nō ad partē referatur, sed ad morbū. ut Horatius Limanus
 „ interpretatus est & de quo. Tūc n. sensus est. Quemadmodum quodlibet dictorum nominum
 „ partis morbum indicat, de quo scilicet morbo dicitur: sic & cirsocele recentius nomen affectū
 „ significat, de quo dictum est. quasi dicat. ueluti prædicta nomina herniam ostendunt (quoniam
 „ κισσὸς herniam significat.) ita & hoc nomen cirsocele eundem morbum, uel eiusdē morbi spe
 „ ciem refert. Hic enim morbus est, de quo dicitur, sermoq; fit, & statim antea dictum est. Sunt
 „ autem prædicta nomina, Sarcocoele, Hydrocele, Epiplocele, Enterocoele, & Enteroepiplocele.
 Tertia nihilominus expositio uerborum Galeni mihi semper magis arrisit: ut per hæc uerba 3.
 20 Galenus uoluerit, quod ueluti iam iam prædicta nomina simul & partem affectam, & mor
 „ bum significant, ita & nomen id cirsocele. Illa enim (si exquisitè singula perpenderis) et cau
 „ sam, & ipsum quoq; morbum exprimunt: Causam quidē, ipsam uidelicet aquam, aquosum ue
 „ humorem, epiploon omentum ue, intestina, et omenti atq; intestini complexum: Morbum uero,
 „ id est ipsam herniam, tumorem ue in scroto factum. Simul autem & cum causa, & morbo, affe
 „ ctam sedem (ut patet) insinuant: Ipsos uidelicet testes, atq; testium cooperimenta, membras
 „ nasq; & uasa. Quemadmodum ergo cætera iam dicta nomina determinatæ partis affectum
 „ indicant: quia scilicet testium: Ita & cirsocele iuniorum nomen eiusdem determinatæ partis
 „ morbum ostendit. Id quod non temerè quidem adiunxisse Galeno integrum fuit: quoniam κισ
 „ σός Græcè (ut statim subdit) alias quoq; uenas omnes, ubicunq; sint, dilatatas apud antiquos
 30 præseferbat. Quam ob rem & in cruribus existentes uenas, ob imbecillitatem, replentisq;
 „ sanguinis crassi abundantiam extensas, admodumq; dilatatas, κισσός, hoc est, uarices nuncupa
 „ re consueuerunt. Quin & in uentre etiā uarices aliquandō Celsus curat. Ne igitur quispiā
 „ opinetur κισσὸς ὅλην omnium uenarū, utcumq; cōtingit, et in quouis loco sint, dilatationē signifi
 „ care: præscriptam sententiam apposuit. Quemadmodum (dicens) prædicta nomina partis cu
 „ iusdam determinatæ affectum recentioribus (uti prædictum est) ostendunt: quia. s. ipforum te
 „ stium, scroti ue eorū operculi tumorem præseferunt, Ita & recentius id nomen cirsocele illius
 „ eiusdem, non cuiusuis uenæ morbum refert. Est igitur κισσὸς ὅλην Græcè, Latine autem, iux
 „ ta Celsi morem, simpliciter ramex, aut si mauis Græcos imitari nomine composito, ac nuper
 „ efficto, uaricoramex, propriè cum Paulo capiētibus, dilatatio quædā, glomeratioq; ac cōtortio ue
 40 narū, arteriarūq; testes nutriētū, & earū præcipuè, quæ per uocatum epididymida, mirabili
 „ quodā plexu circumuoluta, semen ad ultimam usq; perfectionem elaborant. Quamq; Celsus

q lib. 7. cap. 173
in fine & 31.

omnium uasorum (sive in testibus, sive in operculis, ad scrotum usque, sint) affectum esse ait. Hæc de masculorum circocela. In feminis autem in pudendi alis nascere Aetius testis aliquan-
do^o est. *κισσός* autem, hoc est, uarices (ut ad sextum & quadragesimum tumorem pertrans-
Tumor. 46. seamus, in cruribus præcipue uidemus: De quibus quidem uberius loqui iam tempus est. V A-
Varices. RIX ergo cõmunis generis, sive (quod idẽ est, diminutiue tamẽ) Varicula nil aliud est, q̃ intus
r 13. meth. cap. mefcens plus æquo uena. Etenim (uti Galenus^r definit, Paulusq̃^s deinceps, et Aetius, ac mox
ult^o. in fine. s lib. 6. cap. 82. reliqua Medicorum turba trãscripsit) *ὄνομαζενται κισσός ἡ ἀνεγερσμένη φλέψ.* } quod
t lib. 14. cap. 84. est Latine } Varix nominatur uena, quæ dilatata est. } Cuius quidem dilatationis causã celer
u lib. de Medico (Hippocrate^u Authore) sanguinis fluxus fit, & qui non facili sisti queat. Quæ igitur à Græ-
dicentiue ornatu cis medicis } *κισσός* } dicitur, Latine uarix à nostris dici cõsuevit, seu uaricula. Nec ulla nominis
circa medium. x ubi supra. 6^o. differentia cõsideratur, in qua uis corporis parte fiat (Aliquando enim, uti Paulus^x ait, in tem-
82. in prin^o. y 7^o. 18^o. i fine. poribus: Aliquando in ima uentris parte sub umbilico: nonnunq̃ etiam circa testiculos, et scro-
z lib. 7^o. ca. 84. tum, ipsaq̃; (Celfo^y teste) inguina: Et demum in ipsis, ut Aetius^z posuit, interdum palpebris: }
a lib. de Morbis. q̃tius post prin^a. Quin, uelut Hippocrates^a author est, aliquando in pulmone: Potissimum uerò in cruribus
b 4^o. meth. 2^o. in aduenire consueuerunt: Præsertimq̃; ulceratis. Quemadmodum de uaricibus ulcerum nõ Ga-
fine & c. 5. post lenus^b modò, sed Hippocrates^c etiam aliquando meminerunt.) Apud Græcos autem duo no-
prin^a. & lib. de mina inueniuntur diuersa, hoc est } *κισσός* } Quo nomine Hippocrates, Galenus, ceteriq̃; om-
ætra bile c. 4. cir- nes medici usi sunt. Alterum nomen est } *ἰξία* } Quo nomine tum Aristoteles^d, tum Plutar-
ca finem. chus^e huiusmodi affectum discipserunt. Quibus consideratis Marcellus Vergilius, f Cæ-
c lib. de uulner. & ulceribus post liusq̃; Rhodiginus, g Ille quidem ex propria opinione, Hic uerò ex aliorum sententia, differen-
principia & uer tus finem. tiam inter *κισσόν*, & } *ἰξίαν*, ponunt. } Credimus enim nos (inquit Marcellus) ex ijs, quæ ob-
d 3. de hist. aniz seruata in antiquis scriptoribus à nobis fuerunt, Medicorum uocem esse } *Κισσός* } qua totum
malu cap. 11. in hoc genus toto corpore dilatantium se uenarum complectuntur. } *Ἰξίας* } autem aliorum scripto-
fine & cap. 19. rum: qua in cruribus tantum factas easdem dilatationes indicant. Latinis certè nescio ego an
uersus finem. e In uita Caij alibi, q̃; in cruribus facti uarices inueniantur. } Hæc Marcellus. Cuius quidem ultima uerba:
Marij post prin^a Cõtra Mar- ni fortassis corrupta sint, falsam nobis proculdubio sententiam præseferunt. Etenim Celsus in-
cellu Verg^m. ter Latinos medicos non inuidia primus, antiquusq̃; Romanus & in uentre, & inguine uari-
f lib. 4. cap. 114. ces posuit. b Qua de causa & Plinius nõ simpliciter uarices, sed in cruribus (distinctionis gra-
g lib. 3. cap. 14. tia) protulit. Nisi uoluerit fortassis dicere Marcellus } Nescio an alibi, quam in cruribus fas-
in fine. ti, aliter, quàm uarices dicti inueniantur. } A Græco nomine } *κισσός* } ob doloris in uaricibus
h lib. 7. cap. 17^o existientis mitigationem, herba quædam nominis honorem inuenit, quæ *κισσός* dicta est. De
in fine. cap. 18. in qua Dioscoridesⁱ proprio capite locutus est. Non ergo (ut aliqui uolunt) ab huiusmodi her-
fine & cap. 31. Cõtra Otho- ba *κισσός*, hoc est, uarices curante, morbus ipse nomen assumpsit. Plinius uarices in cruribus
nẽ Brüselsiũ ait^k uiro tantum, mulieri raro. Caiũ Marium, qui septiẽs cõsul fuit, stantẽ sibi extrahi passum
in Onomastiz unum hominem Oppius Author est. } Vnũ inquit hominẽ, quia primus, tẽporeq̃; illo solus. Post
co medicinæ. eum uerò & alij quoq̃; stãtes, & absq̃; uinculis, passi idẽ (Cicerone^l teste) sunt. De tolerãdo
i lib. 4. cap. 114. n. dolore loquens Cicero, sic ait } At uerò Caius Marius Rusticanus uir, sed planẽ uir, quum
k lib. 11. ca. 45. post medium. seccaretur, ut supra dixi, principiò uetuit se alligari, Nec quisq̃; ante Marium solutus dicitur
l lib. 2^o. Questio esse sc̃ctus. Cur ergo postea alij? Valuit autoritas. Vides ne igitur esse opinionis, nõ Naturæ
nũ Tusculanarũ malum? Et tamen fuisse acrem morsum doloris, idem Marius ostendit. Crus enim alterũ non
uersus finem. præbuit. Ita & tulit dolorem ut uir. Et ut homo maiorem ferre, sine causa nenessaria, nõ
luit

„ luit. Totum igitur in eo est, ut tibi imperes. Temperantiam igitur, tolerantiamque fuisse in
 „ Mario asserunt (Plutarchus^m quoque ait) Exemplum est quod cum ex ambobus cruribus labo
 „ raret, & plena uaricibus haberet, ferretque ægro animo illarum deformitatem, medicum sibi
 „ ad alterum crus adhibuit. & inter medendum nec se mouit, nec suspiria emisit: Sed cum
 „ tacitus, fixisque oculis inspicendum se exhiberet, moras quasdam dolorum inter incidendum
 „ perferre non formidauit. At medico alterum crus curare uolenti, minimè assensum præ
 „ buit. Dicens nosco remedium istis doloribus indignum. & grauior enim medicina, peiorque
 „ ipso morbo erat. Fortassisque hic fuit: de quo quidem Senecaⁿ inquit, Ille qui dum uarices ex se
 „ candas præberet, legere librum perseuerauit. Sed hæc obiter. Ex humore fiunt (ut princ
 „ pale propositum exequamur) atrabilario, maxima ex parte: Quanquam & ex copioso, su
 „ perabundantique, haud interim atrabilario, nonnunquam generari queunt. Inquit enim Gale
 „ nus, de nigro, melancholico uel sanguine loquens. Atqui natura huiusmodi sanguinem sæ
 „ penumerò ad eas, quæ sunt in cruribus, uenas transmittit, à quo dislentæ, ac dilatatæ, ua
 „ rices redduntur, & cutis, quæ huiusmodi uenas attingit, tempore procedente nigrescit.
 „ In quibus autem copia tantum sanguinis influit, qui melancholicus non sit, incumbens quis
 „ dem in uenas, quæ inibi natura imbecilliores sunt, eas dilatat: nullo sanè tali contingente,
 „ quale accidit, Vbi melancholicus sanguis uarices procrearit. His namque periculum immi
 „ net, si quis uenas affectas excidere aggrediatur, ne melancholia corripiantur. hoc enim sæ
 „ pius fieri uisum est, non modò in uaricibus, uerum etiam in hæmorrhoidibus, quæ ex hu
 „ iusmodi humore consistunt. Id quod experimento confirmatum esse alibi quoque rursus
 „ confirmat. Quemadmodum ijs in insaniente superuenientibus, solutionem insanitæ fieri
 „ nonnunquam¹ asserit. Quum scilicet ex atrabili, atrabilario uel succo, & insania, & de
 „ inceps ipsæ uarices generentur. Ex præassumptis igitur Galeni uerbis apertissime elicitur
 „ uarices non ex crasso tantum, atrabilario uel sanguine originem ducere. Sed ex superfluo, ta
 „ met si fortassis bono: quem natura ad crura, ueluti superpondium quoddam, demittit etiam si
 „ (ut dictum est) atrabilarius minimè sit. Quam ob rem & de tumoribus quoque præter natu
 „ ram loquens, ait Fiunt autem et in cruribus uarices, ob imbecillitatē uenarū, quæ inibi existūt, et
 „ præsertim quoties crasso sanguine corpus redundat. Ob imbecillitatē ergo uenarum, quæ in
 „ cruribus sunt, ad ea loca sanguis defluit, quouis modò naturam stimulet. Dicens autem
 „ 30 { xxi μω Μορ } hoc est & præsertim innuit non semper, at plurimum crasso ex sanguine
 „ redundante huiusmodi affectum oriri. Ex quo quidem crasso, atrabilario uel sanguine uarices
 „ nigrae, ueluti & hæmorrhoides quoque, ac cicatrices nigrae (uel Galeno^r docente) fiunt.
 „ Quam etiam ob causam (quia. scilicet ex huiusmodi succo plurimum fieri consueuerunt) in cru
 „ ribus magis aduenire solent. Cum crassior, grauiorque sanguis promptius deorsum decum
 „ bat. Nec ante pubertatem fieri (ut Hippocrates^s quoque ait) ob eandem rationem, solent. Quis
 „ cunque autem calui sunt, hoc est, capillorum defluuium patientes, ijs magnæ uarices (eodem
 „ Hippocrate docente^t) non fiunt. scilicet in cruribus: ob uitiosorum succorum diuersionem, qui ad
 „ caput eleuantur: Quibus uerò caluis iam existentibus, decapillatis uel, magnæ uarices super
 „ ueniunt, ij rursus capillati fiunt. Verum enim uerò non ex melancholico solummodò sanguine
 „ 40 (tametsi ex hoc plurimum generantur) at ex ijs quoque uel uitiosis, uel superuacuis humo
 „ ribus generari uarices Arabum quoque Princeps^u testis est, Quum non ineptè quidem ait Est

m In uita Cas
 Marj. post prin
 cipia.

n lib. 11. Episto
 larum. Epist. 79
 post mediū.

o lib. de atrabili
 cap. 4. uersus finem.

p Ibidē cap. 7.
 q 6. aphor. 21.

s cap. 19.

r lib. de cibis bo
 ni & mali succi
 in fine. & 2^o. de
 elementis cap. p^o.
 uersus finem.
 s libro. de coactis
 prænotionibus
 uersus finem.
 t 6. aphor. 34.

u 22^a. fen. 3^a. c.
 p^o. c. 15. in prin^o.

dilatatio uenarum in crure & pede (de ijs partibus meminit, ut in quibus plurimū contingat) ,
 propter multitudinem eius , quod descendit ad eas ex sanguine. Et plurimū sanguinis est me-
 lancholicus. Et quandoq; est sanguis mundus non melancholicus. Et quandoq; est sanguis gros-
 sus phlegmaticus. Et quocunq; modo sit, est sanguis, in quo non est putrefactio. Et si nō (hoc est
 si adsit putrefactio) non saluabitur cum eis pes ab ulceratione, & apostematibus malignis. Et
 plurimū quidem accidunt cursoribus, & uiatoribus, & onera portantibus, & corā regib;
 x lib. Diuis. ca. bus astantibus (ut ante ipsum quoq; Principem Razes aliquando^x ait) Et nautis etiam (Ha-
 106. li Abbas^y addit) Et multoties accidunt propter ægitudines acutas, quoniam expellitur mate-
 y 8 theor. cap. ria illuc, in illis, qui ad eas sunt præparati. Crassiores uidelicet partes, quæ ad inferiora, ignobi-
 13. circa finem. liorāq; permutatæ, uel abscessum in cruribus, ne dū uarices (ut in pulmonia, Hippocrate au-
 10 thore)^z generare consueuerūt. Et quandoq; accidunt incipiendo : sicut accidunt dolores iun-
 15 2^o. lib. progn. cturarum incipiendo : & accidunt habentibus splenem (scilicet durum) ex prædictis (scilicet
 ex. 67. cet cursoribus, uiatoribus. etc.) multoties. Et istæ uarices non suscipiunt curationem, quoniam. s.
 splenis abundantia, quæ duritiem in illo efficiebat, nunc ad crura uelut ignobiliora permutatur.
 nisi ergo totum prius corpus, aut hepar, & splen rectificentur, sanari crurū uarices nequeūt,
 uel non sine maxima difficultate, atq; etiam corporis periculo. Adeo ut etiam si crura sanentur,
 a 6^o. aphor. cō. simpliciter acquisitam esse sanitatē proferre nequeamus. Ea nanq; dicetur (Galeni^a dogmate)
 26. in fine cōm. morbum aliquem soluere, quæcunq; omnino hominem liberant, non quæ alteram generant pas-
 sionem, quæ nihilo min⁹ sit prima periculosa. Verū de ipsarum prognostico, & cura deinceps,
 loco magis proprio, & speciali, uberior sermo fiet. Abenzoar^b similes esse uaricibus ar-
 20 borum ait : hoc est gyris, reuolutionibus^{ue}, quæ in quibusdam plantis, ut in hedera, & uitium
 capreolis reperiuntur. Quam ob rem nonnulli fortassis non uarices, sed uites (Raze^c Autho-
 re) nuncuparunt. Quoniam scilicet uiridiores fiunt, & uarijs (ut dictum est) orbibus impli-
 catæ uidentur, instar capreolorum uitis. VERVM enim uero quoniam ex atrilario, cras-
 siori^{ue} sanguine, uel interdū pituitosiore uarices, maxima ex parte, generationis originē sus-
 cipere præscriptum iam est : Hinc sequitur, ut si diutius perseuerent, nec ritē curētur, in Ara-
 bum elephantiam sæpenuerō permutentur. De qua quidem antea dū de Græcorum ele-
 28 et fo. 147. 28. phantia si loqueremur, d nonnihil in sermone de uaricibus attingendum promissimus. Diximus
 Elephantia enim tunc quid elephantiasis, uel elephantia, aut elephas tū Græcis, tū Latinis significaret.
 Arabum. Quoniam uidelicet morbum sancti Lazari illis præsefert, quam & Arabes lepram nuncupāt.
 30 Qui tamen (excepto Hali Abbate, qui Græcos æmulatus in hoc nomine fuit) omnes elephā-
 tiam, pedum quendam tumorem intelligunt, qui ex uaricibus originem duxit. Quāq; & Ha-
 35 li Abbas, siue (ut aliās iam prædiximus) eius interpres inter elephantiam, & elephanticum
 morbum aliquando uidetur differentiam supposuisse. ut qui elephantiam sancti Lazari dictum
 morbum uocarit, dicens^e : Elephantia est morbus omnia corporis membra desiccans, & sicci-
 40 tate corrumpens, & quasi cancer, qui in omni fit corpore. } Elephanticum uero morbum, præ-
 scriptum pedum tumorem appellarit, sic alibi dicens f : Elephanticus morbus est apostema
 melancholicum, quod in cruribus fit, & pedibus. Et eius signum est, q; pedis figura figuræ
 elephantis similis fit, æqualis & nō diuersa. } Lepræ autem nomine (uti iā præscripsimus. g)
 Hali Abbas^h eam uiriliginis speciem intellexit, quam Græci λευκάν, Arabes uero plurimi
 40 Albaras albam nuncuparūt. Interdū uero Hali Abbatis interpres elephantiam, ipsum pedum
 tumore

x lib. Diuis. ca.

106.

y 8 theor. cap.

13. circa finem.

15 2^o. lib. progn.

ex. 67.

a 6^o. aphor. cō.

26. in fine cōm.

b 2^o. Theysir.

w. 7. cap. 25. in

principio.

c 9^o. ad Mansos

re cap. 92. 93.

d supra fo 145.

28 et fo. 147. 28.

Elephantia

Arabum.

e 8^o. Theoricæcap. 15. in prin^o.& 4^o. practicæ

cap. 3.

f 9^o. Theor. c. 18

uersus finem.

g supra fo. 124

et sequentibus.

h 9^o. Theoricæcap. 16 et. 4^o. pra

cticæ cap. 4.

i ut lib Diuisio

nū 120 & lib. 5.

Almāforis ca. 35

humorem uocat. ut quum de pedum tumoribus loquens, ait { Elephantia uero est morbus melan-
 cholicus ad sanandum difficilis etc. } Vt uel hinc liqueat q; parum nominibus Arabum, Barbaro-
 rum uel interpretu fidendu sit. Razes autem aliquando seorsum de lepra, ut sancti Lazari mor-
 bo ab elephantia^k tanq; pedum tumore locutus est. Nonnunq; uero (ut sui, & ceterorum
 Arabum cuncta confundere, ac imperfecte determinare, moris est) Græcoru elephantiasim,
 & Arabum, ne diu alibi quoq; suam, elephantiam incompte admisit. Quanq; non elephan-
 tiam ibi uel ipse, uel eius interpres habet, sed sæpe uitiiu elephantis. Abenzoar etiam de lepra,
 uniuersali. s. cancro, seorsum ab elephantiaⁿ pedum uitio locutus est. Pariterq; Arabum Prin-
 cept, qui lepram in hoc ipso, quem præ manibus enucleandum assumpsimus, tractatu, pro Græ-
 10 corum (ut alibi diximus) elephantiasi assumens, Alibi^p tamen seorsum de elephantia, pedum
 uidelicet uitio determinauit: sic scribens. { Est additio in pedibus, secundum modum, qui acci-
 20 dit in uenis uaricum. Quare ingrossat pedem cum qualitate sua. } Sæpenumerò autem huiusmo-
 di pedum tumorem in ipsis pauperculis mendicantibus cõspeximus. qui multos sibi, talis uitij cau-
 sã, nummis quotidie lucrantur. nunc in hac, nunc in illa publica uia iacentes. Mirum uero ad-
 modum est quã turpiter, & minimo quidem, ac nullo interdum dolore pes intumescat. Adeo
 ut pluribus in locis cutis, ut quæ tantum extendi nequeat, discindatur, & crepet. Quam ob
 25 causam Arabibus elephantiam nominasse libuit. quoniam. s. (uelut Abenzoar^q ait) assimila-
 tur cruribus (addeq; tu magis, & pedibus) elephantis, in grossitudine. Quauis n. tibijs plu-
 rimum aduenire soleat huiusmodi, cū duritie quoq; multa, grossities: Manifestius tamen appa-
 30 ret, quum pedes, uel interdum solos inuasit. { Et causa est (subdit idem Abenzoar) extube-
 rantia humorum grossorum, qui sunt ultimi in grossitudine, qui descendunt illuc, propter pon-
 35 derositatem ipsoru. } Idcirco & Princeps quoq; causam tumoris distinctius adiungens, ait { Et
 quandoq; fit propter humorem melancholicum: et est illud, quod est plurimum. Et quandoq; fit
 propter humorem phlegmaticum grossum. Et quandoq; accidit ex causis, ex quibus accidunt
 40 uarices. Et ex sanguine bono, cum plurimum descendit, aut nutritur eo pes, nutrimento aliquo.
 Et est in primis rubeus, deinde niger } Deniq; causas adiunxit uniuersales, atq; omnibus, ex
 quauis materia fiant, cõmunes: sic dicens { Et causa eius est uehementia repletionis, & etiam
 debilitas membri, propter multitudinem caliditatis, & uehementiam attractionis eius, propter
 uehementiam caliditatis inflammatae ex motu. Et adiuuat ad illud dispositiones adiuuantes ad
 45 uarices. } Quauis ergo tam uarices, q; prædicta Arabum elephantia q; primum ab initio calis-
 di tumores sint, præsertimq; si ex sanguine fiant: Temporis tamen processu frigidos euade-
 re compertum est, tametsi aliquatulus, obstructionis ratione calor sæpiusculè sentitur. Ad fri-
 gidos ergo tumores utrunq; reducamus. Interdum nihilominus ad phlegmaticos, maxima ex
 parte ad melancholicos: etiam si ab initio sanguinei esse possint. Procedete enim tẽpore, discuf-
 sis tenuioribus partibus, terrestriores remanere, ac per hoc melancholicos fieri certu est. Quid
 si pro eo tempore, quo sanguis adhuc laudabilis est, sanguineos nominare, ac per hoc inter calis-
 dos numerare uolueris: Integrum tibi proculdubio fuerit. NOS uero interim ad septimum et
 quadragesimum tumorem pertranscamus, quem Græci uocant Βυβονοκλήν: Celsus^r in-
 guinis ramicem nũcupat: Quauis diuersus specie morbus sit Bubonocela Celsi, seu inguinis
 40 ramex, à bubonocela Galeni, Pauli, Aetij, ac reliquorum deniq; Galenum insequentium medi-
 corum. Etenim Celsus cum de sarcocela iam determinasset: sic deniq; subiunxit { Super hæc
 inguen

a 4^o. præf. c. 16
 k ut lib. Diuis.
 cap. 107. & 9^o.
 Almagor. c. 93.
 l ut in. 12. Con.
 cap. 2. littera. I.

m 2^o. Theysir tr.
 7. cap. 12.
 n ibidè cap. 26.
 o infra tr. 3. per
 totum.
 p 22^a. fen. 3. tr.
 p^o. cap. 16.

q 2^o. Theysir.
 tr. 7^o. cap. 26. in
 principio.

Varices, &
 Elephantia an
 calidi uel fri-
 gidi tumores
 sint.

Tumor 47.
 Bubonocela.
 r lib. 7. cap. 24.

s ibidè. cap. 18.
 in fine.

Bubonocèle inguen quoque nonnunquam uarices implent, *Βυβωνοκῆλην* appellant. Quibus quidem ex uerbis secundum Celsum bis, atque ex precedentibus, una cum sequentibus exquisitè perpensis liquet, quemadmodum quoties in cruribus, aut uentre existentes uenae, si dilatantur, uarices, Graecè *κίρσοι* nuncupantur. Sin uerò in testibus, aut scroto eadem sint, *κίρσοκῆλη*, apud eosdem, affectus nominatur. Ita si in inguinibus huiusmodi uenarum, arteriarumque dilatatio, extumescentiaque fiat, *Βυβωνοκῆλη*, Latine autem inguinis ramex, uel uno et nuper composito nomine, inguiniramex, aut (si masculis) inguinibernia uocabitur. Hocque sensu deinceps inguinis ramicem Celsus curat, uenarum nunc et sequaces scilicet quae in inguine sint (ut patet) extuberantiam intelligens. Galenus autem non uenarum, sed peritonaei, et obliquorum musculorum affectum circa inguina esse uoluit. Quem deinde de Paulus, et atque Aetius elucidarunt. Inquit enim Galenus Peritonæo autem uulnerato, aut rupto, posteaque non conglutinato, mollis tumor eam regionem occupat. Quod si in inguine fiat, *Βυβωνοκῆλην* uocant. Sin uerò in umbilico id eueniat, *ἑξομφᾶλους*, quod est exumbilicatos, eos, qui sic affecti sunt, medicorum nonnulli appellant. Peritonæi autem solius nulla harum affectionum existit. Sed oportet omnino ipsius quoque musculi ἀπὸ νεύρου, hoc est, nerueam propaginem, appendicem uel (ipsum uidelicet tendonem) affici. Quam in anatomicis administrationibus, qualis nam sit, ostendimus. Hi ergo affectus (quos scilicet exumbilicati patiuntur) transuersorum musculorum sunt. Qui uerò in inguine fiunt, ramices, obliquorum. uel rupta, uel dilatata, cum peritonæo tunica, illorum neruea propagine. Haec Galenus. In quibus quidem uerbis non uenarum, sed membranae interioris ipsius abdominis, et musculorum quoque, uel eorum tendonum affectum esse bubonocelam patet. Atque id ipsum Paulus confirmat: quoniam sic perbellè de bubonocela, et enterocela insimul loquens, ait: Utendum uerò est remedijs infra comprehensis: Id solum nobis antea supponentibus: quoniam solo loco affectus huiusmodi differunt. Quando namque intestinum etiamnum supra, in inguinibus iacet, *Βυβωνοκῆλη*. Cum uerò in scrotum iam infra delapsum est, *ἐν τεροκῆλην* nuncupatur. Rursusque alibi eandem sententiam comprobant: sic scribens: Facta ex relaxatione, extensione uel enterocelen, *Βυβωνοκῆλην*, quod est inguinis ramicosus, seu inguiniberniosus praecedit morbus. Etenim primum peritonæo nimis inteso, laxatum, intestinum interea quod in inguina abscedit, facitque bubonocelam. Haec Paulus, qui tamē haud de omni bubonocelae specie locutus est, nisi de ea tantum (ut patet) quae enterocelam praecedit. Quae de causa ipsius peritonaei extensionem, affectus occasionem extitisse ait, non uulnus, aut rupturam. Quae tamen Galenus in praesumptis uerbis iam supposuisse apertissimum est. Itemque Paulus duntaxat intestinum ad inguina descendere, ob eandem rationem, expressit. Cum tamen omentum, et omenti atque intestini complexum, et ipsam aliquando aquam, uel spiritum flatuosum, et demum quicquid à uentre in scrotum descendere consuevit, in ipsis prius inguinibus nonnunquam retineri, et pro aliquo temporis spatio colligi impossibile non sit. Tuncque uelut enterocelam ea bubonocelae species praecedit, in qua intestinum inguina obsidet: Ita et epiplocelam altera bubonocelae species praecedit, quae in se omentum occludit. Enteropiplocelam uerò altera bubonocelae species antecedere potest: in qua omenti et intestini complexus habetur. Sicque de alijs, pro diuersa materiae ratione, dici potest. Aetius intestinum duntaxat nominans, Paulo, nedum Leonidae subscripsisse uidetur. Hali Abbas autem intestinum, et omentum ad inguina descendere, inguinariamque herniam (ut ipse uocat) constituere protulit. Vnde tamen ab Aetio, et quidem minime floccipendendam distinctionem elegimus. Quoniam scilicet

licet non ex peritonæi tantum extensione, sed ruptura quoque, ac uulnere (ut ex Galeno prædis-
 etum iam est) bubonocela gigni solet. Propterea scire operæ pretium est: quod si plaga adeo uiolenta
 contigerit, ut simul & peritonæi membrana, & erythroides tunica rumpantur:
 Tunc intestina repente nudo testiculo occurrentia, ad scrotum præcipitantur. Quam ob rem
 in huiusmodi casu, absque præcedente bubonocela, repente enterocela genita est. Sin uero rupto
 iam, aut inciso peritonæo, erythroides interim membrana illa remanserit, illi quidem tunica
 rubicundæ intestinum, pro aliquo tempore, innititur, Adeo ut pro eodem tempore bubonocela
 fiat. At hæc tandem temporis mora oppressa, etiam ipsa inferius prolabitur. Sicque ex bubonocela
 enterocela resultabit. Vulnerato igitur, aut rupto, uel extenso nimium peritonæo: posteaque
 10 non glutinato, nec pristino modo in se contracto, & unito mollis tumor eam regionem occupat.
 Quod si in inguine fiat, bubonocelen uocant. Serapio duorum inguinum herniam appellat, ^a quum
 „ ad utrumque inguen descensus sit. & Generantur & mulieribus herniæ inguinis seu bubonocelæ
 „ (ait Aetius ^b) circa dextrum maxime pudendi sinum. Prominetque his tumor durus, immurmurans,
 „ rans, ac premens: præcipue ubi mulieres crura dilatauerint, aut supinæ decubuerint. & SIN
 „ uero in umbilico id eueniat (Galenus & ait) ἐξομφαλός. q. d. exumbilicatos eos, qui sic affecti
 „ sunt, medicorum nonnulli appellant. & Expedita igitur bubonocela: ad exumbilicarem, quadrag-
 gesimum octauum. s. ordine tumorem permigremus. quem Paulus nonnunquam; ^b ἡ πρόπτωσις ὀμφαλῶς
 „ quod est, & procidentiam umbilici. & aut. ἡ τῶν ὀμφαλῶν ἐξοχὴ ἢ ἡ ἐξοχὴ ἢ ἡ ἐξοχὴ ἢ ἡ ἐξοχὴ ἢ ἡ ἐξοχὴ
 „ exitum, siue eminentiam ^c; Nonnunquam; ^k uero ἡ τὸ ἐξομφαλον πᾶθος. quasi dicat. & exumbi-
 20 licarem affectum & nominat. Adeo ut nomen id Græcū ἐξομφαλός adiectiuum sit: Cui sub-
 stantium aliquod concordare, aut subintelligi debeat. Sic ergo huiusmodi uitium patientes
 ἡ ἐξομφαλοί & subintellige ἡ ἀνθρώποι; q. d. & exumbilicares, seu exumbilicati homines & uo-
 cati à Galeno (quod ex aliorum opinione) sunt. Sic etiam et Aetius interdum ^l ἡ τὰ ἐξομφαλα
 „ βρέφη; hoc est & exumbilicares infantulos & & rursus ^m ἡ τὰ ἐξομφαλα παῖδες; quod est
 & exumbilicatos pueros & protulit. Intelligere autem & nobis aliquando integrum esse potest.
 Cum dicitur ἡ ἐξομφαλοί; scilicet ἡ νόσος; quod est & exumbilicares morbi; uel ἡ ὄγκος; hoc
 „ est & tumores; q. d. & exumbilicares tumores; Sicque fortassis à Definitionū Medicarū Autho-
 re, in masculino genere definitur: subintellecta. s. dictione ἡ νόσος; id est & morbus; uel ἡ ὄγκος;
 „ id est & tumor; quum ita ab eo scribitur ⁿ ἡ ἐξομφαλός ἐστιν ὁ ὀμφαλὸς ὁ ἐκ τοῦ διαφύρου
 30 αἰτίας προεῖν; quod est & Exomphalos, exumbilicaris uel morbus, aut tumor est umbilici
 „ prominentia, diuersis de causis proueniens & Atque ita nos in catalogo tumorum à Galeno in li-
 bro de tumoribus præter naturam acervatorum & Exomphalos & diximus, ^o tumorem quadra-
 gesimum octauum proponentes: in masculino genere, subintellecta quidem dictione & tumor; Tu
 uero clarioris, ac distinctioris doctrinæ gratia uitium ipsum in neutro genere ἡ τὸ ἐξομφαλον; La-
 tineque & exumbilicationem; homines uero huiusmodi affectu correptos, in masculino genere
 ἡ τὸς ἐξομφαλός; q. d. & exumbilicatos, siue exumbilicares & nuncupare poteris. Quam ob
 causam fortasse Galenus ex aliorum opinione dixisse uoluit ^p ἡ Nonnulli medicorum ὀμφαλὸς
 „ ἐξομφαλός; quod est & uocant exumbilicatos; Verū Grammaticis hæc omittenda sunt. Rasis au-
 tem interpret aliquando ^q ἡ eminentiam umbilici, et rupturam circa ipsum; nonnunquam; uero ^r ἡ ἑγρε-
 40 sionē umbilici; Interdum autē ^s ἡ exitū umbilici; uocat. Obiter interim huiusmodi tumoris ma-
 terias, ut intestina, omentum, & carnem, exprimens. ^t Auicenna uero & umbilici Augmen-
 tum;

a s. Breu. ca. 15

b li. 16. cap. 101

Tumor. 48.

Exomphalos.

g li. de tu. præ.

nat. cap. 19.

h lib. 3. cap. 51.

in titulo.

i Ibidem circa

prim. capitis.

k Vt lib. 6. c. 51

l lib. 4. cap. 26.

m Ibidem post

aliqua.

n uersus finē li.

o supra fo. 77.

lin. 27.

p li. de tu. præ.

nat. cap. 19.

q Vt 11. Contin.

cap. 3. litera. M.

r Vt 9. Contin.

cap. 7. litera. FF.

s Vt lib. Diuis.

cap. 93.

t Vt 11. Contin.

cap. 3. litera. M.

tum; uel secundum aliam literam {umbilici eminentiam} nuncupans, uarias tumoris materias, contentas ue substantias^a (quas postea disquiremus) earumq; signa,^x & curatione^y distin-
 gte singulatimq; enarrat. Hali Abbas^z {umbilici acumen} appellat. Celsus {umbilicum pro-
 minentem} Latine uocat.⁴ & quidem (ut alias^b addit) indecore. Cuius porro uerba, cum
 inde tumoris contentam substantiam, materiam ue exquisitiùs intelligere queamus, in medium
 adduxisse non tæduit. Inquit enim^c {sunt etiã circa umbilicũ plura uitia: De quibus propter
 raritatem inter Authores parũ constat. Verisimile est autem id à quoq; prætermis-
 sum, quod ipse nõ cognouerat, à nullo id, quod non uiderat, fictum. Commune omnibus est umbilicum
 indecore prominere. Causæ requiruntur. Meges tres has posuit: 1. Modò intestinum eò irrum
 pere. 2. Modò omentum, 3. Modò humorem. Sostratus nihil de omento dixit. Quobus ysdem
 (scilicet intestino, et humori) adiecit⁴ carnem ibi interdũ incrementum: Eamq; modò integram
 esse, modò carcinomati similem. Gorgias ipse quoq; omenti mentionem omisit: sed eadem tria
 causatus (scilicet intestinum, humorem, et carnem)⁵ spiritum quoq; interdum eò dixit irrum
 pere. Hieron omnibus his quatuor positis (hoc est, intestino humore, carne, & spiritu)⁶ &
 omenti mentionem habuit, & eius, quod simul & omentum, & intestinũ habuerit. 3. Quinq;
 igitur, aut sex (si maius) diuersas huiusmodi tumoris materias, contentas ue substantias, quanq;
 ex diuersorum opinionibus, collegit. 1. Intestinum scilicet, 2. omentum, 3. humorem, 4. carnem,
 5. ac spiritum. Sex autem dicere potes, uidelicet carnis distinctione admissa: quoniam hanc mo-
 dò integrã, 6. modò carcinomati similem esse ait. Quin & septimam quoq; causam à Celso rela-
 tam, si uis, connumerare tuum fuerit: 7. eã scilicet, quæ ex intestini, & omenti complexu fit.
 At hæc, ueluti & aliæ quamplurimæ, quæ ex cõpositione fieri consueuerũt, sub præscriptis
 iam simplicibus intelligendæ ueniunt. Singularum uerò specierum Celsus & signa, & cura-
 tionem mox postea adiunxit. Paulus^d tamen easdem quoq; causas, contentasq; in tumore sub-
 stantias scribens, aliquãdò^e sanguinem irrumpentem posuit, propter uenæ scilicet, aut arteriæ
 rupturam: ut in Aneurismatis contingit. Pauloq; in hoc Princeps quoq; subscripsit.^f Quam
 profectò speciem à Celso sub ea, in qua humorẽ contineri ait, cõprehensam esse, dictũ promptis-
 simum est. Pro uaria nihilominus contentæ materiæ substantia, diuersa etiam nomina uel ab
 Authore Definitionum medicarum componi docentur. f. Quoties igitur omentum ad umbilicũ
 cũ prominuerit {επιπλοόμφαλον} quod nos Latine dicere, tametsi nouis uocabulis {Omen-
 tum} umbilicationem {possimus. Sin uerò inutilis illius, illaboratq; humoris coitio circa umbilicũ
 fit: ab eodem Authore {ὑδροόμφαλον} quasi dicat {Aquumbilicatio} nominatur. In qua
 (ut idem ait) sub tunica, s. peritonæo, interdum quoq; humor ille continetur. Quod si porus, tot
 Poromphalon fus ue quidam in umbilico concernitur {πρωόμφαλον} idest, {Tofumbilicatio} nuncupatur.
 Sarcomphalō. Ita etiã si carnis præter naturam incrementum ibidem fiat, siue mitis, siue maligna caro sit
 Pneumophalō {σαρκόμφαλον} quasi dicat {Carnumbilicatio} dicta est. Sin deniq; flatuosus spiritus sit, qui
 umbilicum dilatarit {πνευμόμφαλον} seu ex Cælio Rhodigino^g {πνευματόμφαλον} quasi dicat {Ventumbilicatio} nuncupatur. Qui etiam Cælius {ἐντεροόμφαλον} adiunxit
 quasi dicat {Intestinumbilicationem} ubi uidelicet intestinum in umbilico prominuerit. Nos
 autem & alia possumus tam Græcè, q; Latine, pro contentæ substantiæ diuersitate, nomina
 effingere. Quemadmodum si intestina quidem et omentum insimul eò procurrent {ἐντεροεπιπλοόμφαλον} quasi dicat {intestinomentumbilicatio} uocabitur. Ita etiam si quod in umbilico

a 12. fen. 3. 17. p. 10

cap. 9. cum 10.

x Ibid. cap. 10.

y Ibid. cap. 11.

z 9. Theoricæ.

cap. 36. et 9.

pract. cap. 42.

a lib. 6. cap. 17.

b lib. 7. cap. 14.

c Ibid. f. 7. 14.

d lib. 6. cap. 51.

e ubi supra. c. 9.

f uersus finem libri.

Epiploomphalon.

Hydromphalon.

Poromphalon.

Sarcomphalō.

Pneumophalō.

g lib. 15. Lectio-
nũ Antiquarum.
c. 21 post mediũ.

Enterophalon.

Enteroeiplo-
omphalon.

lico aceruatur, sanguis fuerit $\xi\alpha\iota\mu\omicron\mu\phi\alpha\lambda\omicron\nu$, seu $\alpha\iota\mu\alpha\tau\omicron\mu\phi\alpha\lambda\omicron\nu$. ξ quasi dicat ξ sanguinum. Aemomphalō.
 bilicatio ξ nominanda huiusmodi affectio uenit. Quoniā uerò non in scroto tantum, inguinēq;
 & umbilico huiusmodi uiscerum, procidentia fit: Verum & aliquandò etiam in Ilijs & si mi
 ne, alijsq; abdominis partibus (uti Princeps ^b etiā confessus est) Idcirco et ibidē quoq; factus uel ^{b 22^a. Fen. 3^o.}
 omēti, uel intestinorū, aut utrorūq; insimul descensus considerandus est. Quauis enim rariū ^{tr. p^o. ca. 2. uersus finem.}
 adueniat: quin absq; euidenti exteriori ue occasione (ut incidente, perforante ue peritonæū lan
 cea, seu gladio) rarissimē contingat: quam ob causam ueteres, et præsertim Græci distincta,
 nec non propria singulis partibus nomina imposuisse neglexerunt: Nihilominus tamen, cum
 aliquandò succedat, præscriptis nominibus distinctē significari non potest. Nam neq. in ingui
 10 ne, neq; in umbilico affectus est. Qua de re nullum nomen, quod ex bubone, inguine ue, aut um
 bilico iam compositum est, huiusmodi tumores appositē præseferre poterit. Quod si $\xi\kappa\acute{\alpha}\lambda\eta$ ξ
 communiter sumpta dictio (quemadmodum præscripsimus ⁱ) omnem, & in quauis parte obor
 tum tumorem significare potest: qua ratione etiam si non ad scrotum sed aliò uel intestina, uel
 omentum irrumpant: Nihilominus enterocelam, & epiplocelam, & si utrunq; procurrat, en
 teroepiplocelam nominari absurdum non est: Attamen magna, ob æquiocationem, confusio
 succederet. Cum $\xi\kappa\acute{\alpha}\lambda\eta$ propriē magis in testibus, aut scroto factā herniam, uel ramicē osten
 dat. Adēo ut communi omnium usu, iam iam præscripta nomina in scroto duntaxat abortiū tu
 morem determinatē demonstrent. Multi communi dictione in quauis abdominis regione contin
 gat, crepaturam, aut rupturam communi uocabulo nominant. ^k Quam ob rem & Princeps ^l
 20 ait ξ Quod autem est præter hoc (scilicet præter herniam in testibus) nominatur nomine com
 munitatis, Ruptura: Perforato enim, uel inciso nonnunq; penitus abdomine, ac deindē non con
 glutinato, nec exquisitē coalescente peritonæo, sed ipsis duntaxat musculis, & cute, ob nimium
 profectō pondus uel intestina, uel omentum, aut utrunq; usq; adēo prolabi consueuere, ut dissi
 patis atiam musculis, nedū peritonæo, ad cutim usq; peruenientia: eam deniq; ueluti cicatrice
 duriozem, & omninō robustiorem redditam diuidere non ualeant, sed tumorem sub illa neces
 sariō eleuent. Impossibile autem non est, & absq; ulla euidenti causa, non in Ilijs modō, & su
 mine, sed supra ipsum quoq; umbilicum aliquandò huiusmodi rupturam, contingere, q̄q; rariū
 in eminētiore partibus, absq; exteriori occasione, aduenit. Qua de causa Princeps ait ^m ξ Et
 „ illa quæ accidit supra umbilicum est parumper raro, secundum comparisonem ad alias. quoniā
 30 „ ille locus est sustentatus lacertis. etc. ξ De qua rursus, post aliqua ξ Et omne quod est ex ruptu
 „ ra supra umbilicum est maiorum accidentium: quauis sit paruæ additionis. Et non dolent in
 „ principio, quoniam expulsū in ea sunt intestina minuta. etc. ξ Nostrū uerò est quotiēs in Ilijs,
 aut hypochondrijs, uel in sumine, uel supra umbilicum crepatura sit, seu enterocelam, seu epi
 plocelam, aut enteroepiplocelam, pro contentē uidelicet, irrumpentisq; substantiæ diuersitate,
 nuncupare. Id quod idē absurdum non fuerit, quoniam $\kappa\acute{\alpha}\lambda\eta$ (quemadmodum non semel an
 teā iam ex Aetio, ^o & Medicarum Definitionum authore ^p assumpsimus) nō testium scroz
 ti ue modō, sed omnem, cuiuslibet partis sit, tumorem indicare potest. Sed ne indecens quidem ⁿ
 fuerit, clarioris doctrinæ studio, tam Græcē, q̄ Latine, pro regionum diuersitate, nonnulla no
 mina effingere. Priusq; commune, ac genericum nomen componere: Cum in epigastrio, abdo
 40 mine ue sit $\xi\epsilon\pi\alpha\gamma\sigma\tau\omicron\kappa\acute{\alpha}\lambda\eta$ ξ quasi dicat ξ Abdominoramicē uocando. Deinceps uerò ad spe
 ciale descendētes: quotiēs in hypochondrijs fiat $\xi\upsilon\pi\omicron\chi\omicron\nu\sigma\tau\omicron\kappa\acute{\alpha}\lambda\eta$ ξ hoc est ξ subcartilagio
 ramicē

i Suprà fo. 233.

k Vt Haliabbas
 9^o. Theor. ca. 36.
 l 22^a. Fen. 3^o. tr.
 p^o. c. 2. post prin
 cipia.

m Vbi suprà.
 uersus finem.

n In præsentī fo
 lio post prin^a. et
 suprà fo. 233.
 o lib. 15. cap. 6.
 in principio.
 p uersus finem.
 sui libri.

ramicem} nuncupare. Qua etiam imponendorum nominum methodo, si quidem in Iliis existat, $\{\lambda\alpha\gamma\omicron\nu\omicron\kappa\acute{\iota}\lambda\eta\}$ seu $\{\kappa\epsilon\nu\epsilon\omega\nu\omicron\kappa\acute{\iota}\lambda\eta\}$ aut si mauis $\{\lambda\alpha\pi\alpha\rho\omicron\kappa\acute{\iota}\lambda\eta\}$ à nostris uerò $\{\text{Ilioramex}\}$ nominabitur. Itaq; si fortassis in sumine, uidelicet sub umbilico, eiusmodi crepatura sit $\{\text{τερον}\}$ $\{\lambda\eta\}$ quod est $\{\text{suminiramex}\}$ appositè nuncupari potest. Quæ quidem iam iam præscripta nomina à sede affecta, quemadmodum $\{\text{Exomphalos}$, ac $\{\text{Bubonocela}$, imposita sunt. Sin autem à contenta in tumore substantia imponenda forent, rursus $\{\text{Enterocela}$, $\{\text{epiplocela}$, $\{\text{hydrocela}$, & reliqua id genus præscripta nomina commode, atq; opportunè usurpanda ueniunt: Veluti prædictum quoq; est, Quod si affectarum sedium nomina cum dictione $\{\text{hernia}\}$ apud nos cōposuisse magis tibi placuerit: Integrū etiā tibi pro arbitrio sit. Dicendo. s. $\{\text{Abdominherniā}$, $\{\text{subcartilagiherniā}$, $\{\text{Iliherniā}$, et $\{\text{suminherniā}$. Quemadmodū si specialius, ac distinctius nominare singula optaris, non modò $\{\text{Enterocelen}$, hoc est, $\{\text{intestinherniam}\}$ proferes: At si uerbi gratia $\{\text{ieiunum}\}$ sit, quod irruerit, $\{\text{νητονκῆλη}\}$. q. d. $\{\text{Ieiunherniam}$, uel quoniam Latinis $\{\text{Hila}\}$ & $\{\text{Hilla}$, & $\{\text{Hira}\}$ idem $\{\text{intestinum}\}$ significant) $\{\text{Hilherniā}$, seu $\{\text{Hillherniam}$, aut $\{\text{Hirherniam}\}$ dicere pos-

q 6^a. de Anat.
micis administ.
cap. 12. & 5^a. de
usu partiū. cap. 3.
& 6^a. de loc. aff.
cap. 2. post me^m.
r VI. 2^o. Metho
di. cap. 2.

sumus. Sin tenue illud $\{\text{intestinum}\}$ prorumpat, quod Græcè $\{\text{Galenus}$, $\{\text{communiori}\}$ teruiorum $\{\text{intestinatorum}\}$ nomine $\{\text{λεπτόν}\}$ hoc est $\{\text{gracile}\}$ appellat, Aliq; plures $\{\text{ἐλεον}\}$ siue cum $\{\text{simplici}$, $\{\text{ἰλεον}\}$ Latinè $\{\text{uoluulum}\}$ nominant (Quand; apud $\{\text{Galenum}\}$ $\{\text{ἐλεος}\}$ eiusmodi $\{\text{intestini}\}$ morbi potius ostendit. Qua de causa non à sede affecta, uerum à symptomate, ob reuolutionem. s. sumptum esse nomen alicubi determinat) Tunc $\{\text{λεπτοκῆλη}\}$ seu $\{\text{ἰλεοκῆλη}\}$ q. d. $\{\text{Gracilhernia}\}$ seu $\{\text{Ilehernia}\}$ uel fortassis $\{\text{uoluulhernia}\}$ nominari poterit. At si cæcum fortè fortuna solum decideret. Id quod tamen difficillimum in homine fuerit, ni minimum foras men, & in dextra tantum parte, in illius uidelicet regione factum sit: Cum non magnū, & aliterius uentriculi instar, (quemadmodum $\{\text{Galenus}\}$ à canibus & fribus decepti placitum fuit) in homine cæcum existat, uerum reliquis omnibus intestinis adeò tum longitudine, tum grossitie, seu amplitudine minus, breuiusq; sit: Ut processus quidam, appendix ue $\{\text{intestini}$, crassiori lumbrico tereti, in orbes tamen quadantenus conuoluti, similis existimandus ueniat. Impossibile tamen aliquandò non est uel solum huiusmodi appendicem, aut cum pauca uel tenuioris, uel coli $\{\text{intestini}\}$ portione prolabi. Tunc igitur $\{\text{τυφλοκῆλη}\}$ q. d. $\{\text{cæchernia}\}$ nō temerè appellari potest. Sin uerò colon $\{\text{intestinum}\}$ prolapsum fuerit (perinde ac $\{\text{ys}$, qui sub umbilico, aut inguine, uel in ipso etiam scroto patiuntur, aduenit) eo casu $\{\text{κωλοκῆλη}\}$ q. d. $\{\text{colhernia}\}$ dicetur. Eadem uerò methodo, cum $\{\text{enteromphalon}$, hoc est, $\{\text{intestinumbilicationem}\}$ generatim dixerimus: quoties uidelicet $\{\text{intestina}\}$ in umbilicum descenderint: Distinctioris quidem doctrinæ gratia, si uerbi gratia $\{\text{ieiunum}\}$ sit illud $\{\text{intestinum}\}$ $\{\text{νησόμεφalon}\}$ q. d. $\{\text{Ieiunumbilicatio}\}$ seu, quemadmodum prædictum de huiusce $\{\text{intestini}\}$ apud Latinos nomine $\{\text{Hilumbilicatio}\}$ uel $\{\text{Hirumbilicatio}\}$ nominabitur. Siq; tenue uocatum $\{\text{intestinum}\}$ sit, quod prorumpat $\{\text{λεπτόμεφalon}\}$ q. d. $\{\text{Gracilumbilicatio}\}$ seu $\{\text{ἰλεόμεφalon}\}$ q. d. $\{\text{uoluulumbilicatio}\}$ nuncupari potest. Quod si demū colon sit, crassius uidelicet $\{\text{intestinum}\}$, quod irruat, $\{\text{κωλόμεφalon}\}$ q. d. $\{\text{columbilicatio}\}$ uocabitur. Cæcum uerò $\{\text{intestinum}\}$ ad umbilicum descendere posse in homine non apparet: Quæ admodū neq; primum, atq; ultimum aliqūd prorumpere, tum ob sui breuitatem, tum etiam ob rectitudinem, & aliquam in lumbis colligantiam uerisimile est. Quomodo autem & ex harum specierum complicatione, diuersa rursus nomina effingi queant, ut per se manifestū omittimus.

Cōtra Gal^m.
s 4^a. de usu par
tiū. cap. 18.

AT Enimuero his iam expeditis, prius q; ad reliquorum tumorum enodationē descenderimus, quod

- quod primitus à nobis in horum catalogo intendebatur dimissum, et inelucidatum, in pluribus
 herniæ speciebus, atq; umbilici etiã uitijs remansit, An. s. calidi, an frigidi tumores sint. Itẽq; Herniæ spēs
 an ad septimam antea¹ propositam ex Principe distinctionẽ reducibiles fuerint. Quam ob rē an oēs tumor
 ab initio rursus exorsi, exquisitiũ singula percurramus. Eo nihilominus præassumpto, & in res calidi, uel
 memoriam reuocato, quod circa penẽ huiusce cõmeti primordia² insinuare uoluimus. Bisq; frigidi sint.
 riã uidelicet responderi posse. Primò. s. dicentibus nobis, quoniam & si largiũs capto apo- Respõsio. p.^a
 stematis nomine (ut ibi secũdo loco assumpsimus^x) oēs herniæ species, apostemata etiã nõ solũ t. supra. fol. 31.
 apud Arabes, sed apud Græcos quoq; nominari possent: Cũ partes, quæ unitæ priũs erant, n. fo. 76. uersus
 abinuicem postea abscedāt. Hisq; abscedentibus aliqua substantia uacui in locũ ingreditur; finẽ. et. 77. circa
 10 Nihilominus tamen de ijs duntaxat apostematibus locutus est Princeps, quæ qdem ex aliquo principia.
 defluẽte humore, liquida^u ue, et nõ solida à principio substantia generantur. Quãuis temporis x. fo. 77. post
 progressu in aliã, et quidẽ solidissimã aliquãdo substantiã humor ille permutetur. Perindẽ ac principium.
 in atheromatibus, steatomatibus, atq; in strumis magis, & glandulis, atq; huiusmodi tandem
 reliquis contingit: In quibus uel, ob succedentem putredinẽ, animalcula, uel tenuioribus parti-
 bus discussis, quædam pilos, aut ossa, lapides, testas, ligna, carbones, arenã, et huiusmodi q; plu-
 rimas substantias duras, ac solidas præseferẽtia gignuntur. Huiusmodi ergo herniæ species,
 quæ, uel intestina, uel omentũ, aut utrũq; cõtineret, de apostematibus magis propriẽ dictis lo-
 quentẽ Principem postergasse absurdũ non est. Quocircã neq; necessariũ est omnẽ tumorẽ,
 aut apostema simpliciter, generatimq; dictũ, ad aliquod sex generum in septima distinctione
 20 prædictorũ reduci. Nisi ea, quæ ex fluida, tenui^u ue, ac liquida substantia gignuntur, aut spi-
 ritu flatuoso. Hæc enim cuncta uel sanguinea sunt, uel cholerica, uel pituitosa, uel melanc-
 cholica, uel demũ aquosa, seu uentosa. Sicq; determinata proprijs limitibus ea distinctione.
 uerum inueniri facillimẽ poterit. Secundo adhuc respondere possumus, ex ijs etiam, quæ ibi 2.^a
 dem³ priũs tacta fuerunt. Quoniam scilicet etiam si multæ partes ab initio solidæ, ac natura- y. fo. 76. uersus
 les (ut intestina, & omentum) in ipso etiam principio: in cavitatem (abscedentibus à se inui- finem.
 cẽ, quæ prius se cõtinebāt, corporibus, facta) de scẽdāt: Nihilominus tamẽ uniuersalẽ distin-
 ctionẽ saluare hoc modo possumus. Quatenus uidelicet eorũ generatio prima ex aliqua sex
 prædictarum substantiarum sumpsit originem. Ita. n. Princeps^z ipse inferiũs, de nodis, &
 glandulis, eis. s. apostematibus loquens, in quibus aliqua res dura inuenitur, subdit & Non z. Trac. sequen
 30 longinquũ, qn necessariũ sit ipsam reperire esse de genere melancholiæ: Verũ nos posuimus ti. cap. 4. sex. 2.
 „ eã phlegmaticã, quoniã radix illius duri est phlegma: Cui accidit, ut desiccaretur grossum;
 Quẽadmodũ ergo si sepũ, aut puls, aut mel, quinimmo si lapis, aut cœnũ, ungues, lapides, to-
 phi, officula, lapilli, ligna, carbones, arenæ, cæteræq; id genus dure factæ, nec non permutatæ
 substantiæ sint, quæ in tumoribus, apostematibus^u ue cõtinetur, phlegmatica uocauit, ac in illorũ
 albo recẽsuit: Quoniã s. radix earũ substantiarũ, hoc est, primus humor, ex quo genitæ fuerũt,
 phlegma erat: qn ob acquisitã siccitatẽ, deindẽ melancholica esse insinuat, deq; genere esse me-
 lancholiæ affirmat, qũis humoris nulla prorsus forma remãserit: Ita etiã de his proferre haud
 absimile fuerit: nonnulla scilicet sanguinea dici posse, quoniam generationis prima radix
 fuit sanguis. Sicq; si alius quispiam humor primus in causa fuit. quotiẽs uidelicet nullius hu-
 40 moris forma in tumore contenta remanserit. Id quod, ut exquisitiũ perpendamus, singillat-
 tim in prædictis tumoribus percurramus: à sarcocela exordium sumentes. Itaq; sarcocela Sarcocela.

quauis ab initio uel sanguinem, uel melancholicum succum, aut ex ijs mistum scilicet sanguinem melancholicum, fortassisq; pituitosum, pro suae generationis origine, habuerit: Quam ob rem aliquando sanguineus tumor, interdum uero melancholicus, nonnunq; ex ijs, uel cum pituitoso admistus proferri, suae radice ratione, quæat: Nunc tamen, quo tempore, s. expletus tumor est, ad melancholicum proculdubio reducendus uenit. Cum ob adeptam siccitatē, ex scirrhorum genere sit. Quam etiam ob causam inter frigidos tumores collocanda sarcocela est.

Hydrocela. Hydrocelam autem aquosum esse tumorem, ac per hoc frigidum, adeo cui uis pernotum est, ut declaratione non indigeat. **Epiplocela.** Epiplocelam uero, & Enterocelam, & ex his compositā Enterocelam, roepiplocelā, Vel iuxta primam responsionem, ad septimam (quam intendimus) referre distinctionem minimè cogimur. Quoniam scilicet non ex humoris, liquidæ uel substantiæ defluxu, sed ex naturalis membri deprauato situ contingunt. Vel, penes secundum respondendi iā a ubiq; ferè habetur præsertim in libr. de fem. de form. fetus. 4. de usu partu. ca. 9. 17. 18. et. 6. de Anat. administr. b 2. de elem. circa prin. 4. p. de semine. c. 10. circa m. et p. de nat. hoīs. 26. post me. Etuide. 8. de dec. Hipp. Plat. c. 4. 5. **Exophali spēs** Idcirco aptius inter frigidos nunc tumores connumerandi uidentur. quāq; omenti adeps temperamento calidus sit. Idē uero & de exomphali speciebus determinandum est. Cumq; **Bubonocela.** bonocela medium quoddā transitus, & ueluti principium enterocelæ, uel epiplocelæ, aut ex ijs mistæ affectionis sit: Itidē quoq; de bubonocela, quod de ijs (iuxta Galeni dogmata) profectū est. Iuxta Galeni inq; dogmata: quoniam apud Celsum (quæadmodum prædiximus) a uaricibus, & cirsocela, quod ad causam, minimè bubonocela differt. Idcirco & eiusdem esse rationis cum illis dicendum. De quibus quidem uaricibus, & cirsocela prædictum iam uberiorius est, ex qua s. materia fiant, & cuiusmodi temperamenti magna ex parte sint. Hæc de prænumeratis in catalogo s. tumoribus, satis superq; forent. Porocelam uero (ut ea quoq; definierimus, quæ interim obiter exposita sunt) siue ab assiccata pituita, siue ab humore melancholico primam ceperit originem, ad frigidos tamen referendam esse tumores luce clarius est. Eademq; ratione poromphalon. Pneumocelam uero, siue pneumomphalon flatuosos esse, ac per hoc frigidos tumores, ambigere opinor neminem. Sic & Aematocelam, siue Pneumocela. Aematomphalon, sanguineos, calidosq;. Ni uel tenuioribus partibus discussis, crassiores, Pneumoph. frigidioreq;, ac melancholicæ remaneant: uel si putrefiat sanguis, longè calidius, & feruentius oclusus ille sanguis euaserit. Trygocelam deniq;, ac (si contigerit) Trygomphalon. q. d. fecumbilicationem, melancholicos potius, indeq; frigidos tumores esse compertū est. Trygocela. E prædictis autē & omniū aliarū iā prædictarū herniarū, atq; crepaturæ species, quod ad materiam, & temperamentum promptissimè considerantibus patebunt. Nos uero interim ad Tumor. 49. quadragesimum nonum tumorem conuertemur, ipsam uidelicet ascitem. Quam porro, cum hydropisicos, aquæ uel intercutis species sit, tunc exquisitiū intellexerimus, quum hydropisim ipsam,

sam, nec non eius species prælibarimus. ὕδρωψ, ergo, seu ὕδρωψις apud quosdam, seu ὕδρ- Hydrops.
 gos Græcè, Latine autem Aqua inter cutem, uel aqua intercus, uel simpliciter intercus, absq; Hyderos.
 ditione { aqua } ab accidenti (quemadmodum Cælius Aurelianus, & Plinioq; ascriptus
 liber h dixerunt) nomen sumpsit. Siquidem aquosus tumor hanc passionem comitatur. Nam
 Græci τὸ ὕδρωψ aquam uocauerunt. Quæ etiam ratione hyderos, et hydrops uteri, i et testiu
 atq; etiam pulmonis, l aceruata in utero, uel testibus, aut pulmone aqua, ab Hyppocrate nomi
 natur. Generatur autem ex accidentibus plurimis, atq; diuersis causis. Quam ob rem Græ
 ci (ueluti post pauca Cælius idem ait^m) uel aliarum sectarum Principes eius potestatem
 uel differentiam nominibus uariandam crediderunt. Vocant. n. hanc passionem etiam ὕδρωψ
 uel παρὰ τοῦτο, origini locorum specialia nomina tribuentes. Nam parecchysin appellant
 sensibilem, & manifestam liquoris superfusionem. Quæ fiet inter peritonæi membranam,
 & intestina: Hyderon autem dispersum, siue infusum per uiarum raritatem, atq; carnis spi
 ramenta liquorem. { E qua quidem imponendorum huiusmodi nominum ratione, atq; eorum
 ueterum sententia, sequitur hyposarca. { ὕδρωψ } Asciten uero utricularē ue, ac ipsam
 quoq; tympaniten { παρὰ τοῦτο } appellari posse. Atq; id ipsum fortassis ueteres illi intellex
 xisse uoluerunt. { Alij autem dicunt hyderon ex renibus generari: hydropem uero ex duri
 tate iecoris. } At hi fortasse asciten, & tympaniten { ὕδρωψ } Hyposarca uero { ὕδρωψ }
 nuncupassent. { Quod quidem nos (Idem subdit) iuxta sectæ regulam reprobamus. Etenim
 infusio, siue superfusio liquoris est passioni communis, & neq; antecedentes causæ passionis
 20 facere discretionem rectè creduntur. Siquidem etiam ex plurimis alijs patientibus partib;
 bus hydropes generantur. Quanquàm (ut post multa subdit) dissenserunt præterea uetere
 res etiam de patientibus partibus, quæ scilicet principaliter afficiantur. Erasistratus nanq; ie
 cur inquit pati. In apertionibus enim saxeum semper inueniri confirmat. Alij uero colum, sed
 consentire iecur. Alij splenem, ac iecur, & colum. Alij peritonæum. Alij renes quoq; et ma
 tricem principaliter pati dixerunt. { Hyppocrates autem duplicem differentiam posuit. } eā
 scilicet, quæ ex inani parte, ac lumbis, & eam, quæ ex hepate suæ generationis originē susci
 pit. Secundam fortasse, λευκὸν φλέγμα, Latine, albam pituitam: Primam uero, hydro
 pem siccam, Græcè ὕδρωψ ξηρὸν, nuncupare illi placuit. quā posteriores medici tympani
 30 niam appellarunt { Differunt enim hydropes, qui à iocinore oriuntur (Galenus i ait) ab ijs,
 qui ex inani parte, eò quòd pressi cauentur, pituitosam habentes naturam, nec in super spiritu
 flatuoso, quemadmodum illi (qui. s. ex inani parte) consistentes. { Quanuis autem à diuersis
 partibus exordiri posse Galenus inficias nō eat: Medio tamē iecore gigni omnē hydropis spe
 ciem determinat. Sic. n. de iocinoris duricie, scirrhus ue loquens, ait } { At uero processu tempo
 ris, quanuis magis increseat scirrhus tumor, difficilius tamen fuerit per tactum, ipsum co
 gnoscere, intercipientem scilicet iudicium aqua intercute: quæ illico scirrhum sequi consuevit.
 Quippè nisi hepar afficiatur, haudquaquàm fieri potest huiusmodi affectus. Non tamen
 semper ob primariam eius affectionem excitatur, quæ hoc sit q; frequentissimum, Etenim q
 ipsum eius facultatis, quæ sanguinem gignit instrumentum est: consequens est, ut uitiatu hoc
 uiscere, actio quoq; eius uitietur. Itaq; omnis hydropis (alibi^s quoq; Galenus ait) communis
 40 quædā causa est, frustrata sanguificatio. Etenim quemadmodum in uentriculo concoquitur
 esculenta, pari rōne in iecore, et uenis præcoctū in uentriculo alimentū. Quin etiā ut in uen

g. f. s. de locis
affect. c. 6. post
med. et uide. 6.
eiusdē. c. p^o.

cap. 27.

x ut 6. de locis
aff. cap. p^o.

y ut 6. aphor. 43.

z ut 7. aph. 5^o.

Contra Cæ-

liū Aurelianū

a lib. 3. chronion

c. 8. post prin^m.

b c. de humorib^{us}
post mediū.

c ibidē statim.

Heraclides

Tarentinus.

Demetrius.

triculo interdum minus bene fit concoctio, interdum bene, ita in iecore. Nonnunquam enim iecur
primò afficitur, ac per se, quemadmodum etiam uentriculus interdum per consensum aliarum
partium. Itaque partes omnes, quæ dum afficiuntur, consentiunt, uel quod uicinæ sint, quod in-
ter se per uasa, & neruos multum communicent, affici constat. In hunc modum iecur per ma-
gnas uenas copulatur & lieni, & uentriculo, & intestinis. Atque etiam situs eorum ita uici-
nus est: ut quædam contingant ipsum, quædam propemodum tangant. Lienis igitur nequaquam
mentionem fecit in prognosticis Hippocrates: siquidem de morbis acutis agebat. Etenim hoc
uiscus, cum per longos morbos in scirrhum induruerit, ad consensum trahit iecur, totique cor-
pori, per illud medium, aquam intercutem apparat. Accidit autem (ut in priori etiam sermo
ne subiunxit) quum aliàs aliam partem frigidam intemperiem afficit, ut hepar quoque refri-
geretur. Igitur si uel lienis causa, uel uentriculi, uel intestinorum uniuersorum, maximè iei-
uni mesentericæ uenæ habituali intemperie afficiantur, facile etiā unā refrigerare possunt
oēs simarum iecoris partiū uenas. Quò fit ut ad hepatis quoque corpus intemperies ipsa perue-
niat. Si uerò uel pulmonis, uel septi transuersi, uel renū occasione id accidit: In primis uenæ,
quæ in uisceris huius partibus gibbis consistunt: per consensum afficiuntur: deinde tractu
temporis hepar quoque eadem dispositione infestatur. Sic ergo et Quintum Serenum intel-
ligere oportet, quod scilicet uel primario iecoris uitio, uel splenis culpa, iecori tamen compatiens
tis, contingat: quum sic ait. Corrupti iecoris uitio, uel splenis acruo: Crescit hydrops, aut
quum siccata febre medullæ: Atque auidæ fauces gelidum traxere liquorem: Tum lymphæ
intercus uitio gliscente tumescit: Secernens miseram proprio de uiscere pellem. Hæcque ratio-
ne interdum è splene obortam esse aquam intercutem, uel à Galeno præscriptum est: ipsoque
ab Hippocrate prædictum: quin & ex furore nonnunquam genitam esse legitur. E prædi-
ctis uerò, Cælij Aureliani sententiam non satis rectam esse liquet: quum, scilicet, ait. Eius differe-
rentiam Hippocrates, & Diocles duplicem dixerint. Aliam enim hypofarcam uocauerunt:
Aliam ascitem. Etenim si germanas Hippocratis sententias contemplemur: Vel duas ex pro-
gnosticis colligemus. ubi tympanitè potius, quàm ascitem intellexisse uidetur: Quamquam Introducto-
rij libri Author sub tympanite ascitem intelligendam uel ab Hippocrate censet: cum eius-
dem esse speciei determinet. Vel tertiam quoque alijs ex locis elicere possumus. Nullibi tamen
uel hypofarcam, nisi album phlegma, uel ascitem ab Hippocrate prolatum inuenimus. De Dios-
cle autem (ut cuius opera præ manibus non extant.) nil dicere audemus. Sin spurium, Hip-
pocrati quoque, attributum opus considerabimus. Adhuc duas, omisso tamen ascite, species inuenie-
mus. Quarum alteram, hypofarcidion uocat: alteram uerò ex flatibus constare dicens,
tympanitem insinuat. quamquam huiusmodi nomine minimè designat. Ascitem interim sub
silentio præteriens. At hæc minimi quidem momenti sunt. Heraclides uerò Tarentinus (Cæ-
lio quoque Aureliano referente) secundo libro internarum passionum, totius corporis infla-
tionem, siue humoris infusi perforationem catasarcam uocat. Inter peritonæum uerò, & in-
testina, ascitem, uel tympanitè appellauit. Item Demetrius Herophili sectator undecimo li-
bro, de passionibus scribens, alium dixit hydropem constitui sine ulla humoris infusione, sed
sola inflatione turgente (ut est tympanites) alium ex humore diffuso. Et eum (qui scilicet
ex humore fit diffuso) nunc per totum corpus (ut est hypofarca) nunc inter peritonæum
& intestina (cuiusmodi quidē altera species est quæ ascites nūcupatur.) Cuius differentiam

nunc

„ nunc plurimo uento tradidit. (intelligo quoniam prior plurimo uento turget : hæc autem po
 „ strema, pauco) Et est uanum, atq; intellectu carens, sine ullo humore superfluo laborantē, hy
 dropem uocare. (Miscetur enim & uento aqua, in tympanite : quæadmodum aquæ uentus,
 „ in ascite) Item plurimi tres differentias tradiderunt. Aliam enim catasarcā, aliam asciten,
 „ aliam tympaniten uocauerunt (& iam si exquisitè perpenderit, in idem ueniunt, quod
 „ fortasse Demetrius intendebat.) Asclepiades autem alium celerem dixit : ut eum : qui rez **Asclepiades**
 „ pentē constituitur : Alium tardum, ut eum, qui tarda passione uexet. Et alium cum febris
 „ bus, alium sine febribus, Hoc quidem communiter etiam alijs specialibus passionibus ascrib- **Impugnatio.**
 „ bens, non aduertit quoniam proprio nomine celer dicitur passio, non sola quæ repentē confi
 „ citur : uerū etiam ea, quæ celeriter solui posse monstratur. Hydrops autem fit quisquā rez **Celer passio**
 „ pentē ex coaceruata bibendi transuoratione, uel falsi liquoris potu. Celerem autem passionis quæ?
 „ solutionem nullus ægrotantium meruit. Item Proculus Themisonis sectator secundum pluriz **Proculus.**
 „ mos, inquit hydropis differentias temporibus passionis ascribendas. Initium enim atq; augmen- **4^{or} Hydropis**
 „ tum esse leucophlegmatian. Cum adhuc secundum carnem fieri mutationem uiderimus. Sta- **tēpora.**
 „ tum uerò tympaniten, quū summa tensio secundum uentrem fuerit facta. Declinationem au-
 „ tem asciten. Cum quadam indulgentia fuerit inflatio relaxata. Non secutus ueri regulam, **Impugnatio**
 „ neq; aduertens quia omnis species passionis sua quæq; tempora percurrit. Deniq; etiam cata
 „ sarca usq; ad statum, uel declinationem perseuerat. At tympanites, & ascites ex initio facti
 „ in augmentum uenerint, & statu sumpto declinauerint. Item Apollonius Memphites alium **Apollonius**
 „ dixit fieri hydropem cum retentione, ut si quid biberit, sine dilatione, tanq; per fistulam **Mēphites.**
 „ transiens egeratur. Eius autem, quem cum retentione fieri dixit, secundum plurimos, tres
 „ esse differentias affirmat. Sed melius Demetrius Apameus ab hydrope discreuit eum, qui **Demetrius**
 „ sine dilatione potum liquorem per urinam egerit **diā. B' r' u' appellans** (Quam ob rem Gale **Apameus**
 „ nus^d ex quorundam opinione, **ὑδρωμα**, seu **ὑδρωμα** eis **ἀπιδω**, quod est hydropem, siue **d. 6. de locis aff.**
 „ intercutem ad matellam, nominat) Melius igitur (subdit ex propria opinione **Calius**) **ca. 3. circa med. et**
 „ quantum ad species hydropis, q̄q; non generaliter mutemus curationem, alium dicere in toto **lib. de sympr. dif**
 „ corpore constitutum, tanq; in papyro, uel spongia inter uiarum raritatem insertum, à liquo- **ferentijs ca. 7. an**
 „ re uocari leucophlegmatian : Quam Latino nomine etiam intercutem rectē dicemus : alium **te med. & p^o. de**
 „ in parte corporis, inter peritonæum & intestina, subiecto liquore solo, uel admisto uento plu- **crisi cap. 12. post**
 „ rimo, Vocari alterum, asciten (eum scilicet, qui ex liquore solo constituitur) alterum tympa- **principia.**
 „ niten (eum scilicet, qui admisto uento plurimo fit) E quibus quidē ultimò relatis **Calij** uer- **Ubi supra 3^o.**
 „ bis patet, secundum eius sententiam, duntaxat leucophlegmatian, uel intercutem, uel aquam **chronion. 8^o.**
 „ intercutem, propriè nominandam. Præsertim cum postea de eadē subdat : Aliquibus etiam al
 „ borum, atq; crassorum uomitus, uel per uentrem egestio. Vnde etiam nomen passio sumpsit
 „ se à Græca deriuatione uidetur. Leucon enim albidum, phlegma humorem crassum uocat **Leucophleg-**
 „ uerūt. Vel quoddā ægrotantis color albidioris imaginem ferat. Alij uerò, tanquam ex super- **matia unde di**
 „ fluo humore generata passione, penetrans humor singula quæq; spiramenta possede- **citur.**
 „ rit. Nos uerò intercutem nominamus. Sed nec rationi quidem absolum est intercutis no- **Nota.**
 „ menclaturam, leucophlegmatice uerius, atq; appositè magis congruere. Quoniā aliæ hydro- **Intercus pro-**
 „ pis spēs inter peritonæū, et omentū, intestinaq; siue aquam, siue flatuosum spiritum, aut insi- **priè dicta q̄?**
 „ mul utrunq; continent. Hæc uerò per uniuersum corpus dispersam pituitam, & quemadmo

dum prædictum iam est, tanq̃ in papyro, uel spongia, inter uiarum raritatem, quasi dicat, inter porulos insertam obtinuit. Quæ de causa eiusmodi humoris plurimum sub cute retinetur. unde & illius albedinem resultare prædictum est. Quæ quidem sub cuti retenta pituita, sæpenuerò per sensui occultum halitum, aut per sudorem fortassis discussa, & eiusdem cutis albedinem, & uniuersi corporis tumorem euestigio comminui liquet. At huius quidē leucophlegmatæ generationem, atq; aliorū nominum rationem deinceps, cū specialius de ipsa loquemur, uberiùs, ac distinctiùs ostendemus. Plurimas deniq; differentias addit Aurelianus, generationisq; causas, & signa tū cunctis speciebus communia, tū singulis propria, Quæ loco deinceps proprio, unā cum curatione declarabimus, Duplicem ergo Hippocrates Cæli sententia, posuit. Sed non eo tamen modo, quo Cælius credidit. Quemadmodum prædictum iam est. Rectiùs autem Plinio ascriptus liber ad bimembrem diuisionem redegit: sic dicens ^c & Quot uel quæ sunt species hydropidis? Duæ, totius corporis, & uentris. Prima leucophlegmatia, uel hypofarca appellatur. Secunda rursus in duas diuiditur species. Est autem humoris & spiritus commista materies (deprauatè enim legitur, humoris uel speciei:) Sed humore superante, Ascites: spiritu, Tympanites uocatur. 3. Celsus f distinctè quidem tres hydropis species, ex ueterum Græcorum sententia, protulit. Quam ob rem non Galenus modò, sed reliqui etiam posteriores omnes Græci: ut Definitionum Medicarum, & atq; Introductorij authores, ^a Alexander, ^b Paulus, ⁱ Aetiusq; ^k tres expresserūt. Idemq; Arabes Græcorum transcriptores confirmarunt. ut Razes, ^l Auicenna, ^m Serapion, ⁿ Hali Abbas, ^o Albucasis, ^p Constantinus Africanus, ^q atq; ipse etiam Abenzoar, ^r Cuius quidem interpres Arabica etiam nomina docere nos uoluit: sic scribens & Hydropisis cum suis tribus speciebus. Vna quarum dicitur carnosæ, in Arabico, Halahami, Secunda uerò, dicitur asclites (sic enim corruptè Barbari dicunt, ascites) uel utrosa, quæ Arabicè dicitur, cebli, Tertia autem nominatur tympanites, & Arabicè uocatur, zachi. 3. Vniuersa igitur & Græcorum, & Barbarorum, plurimq; Latinorum schola tres hydropiseos species depinxit. Ab Hippocrate autem (ueluti prædictum est) tres huiusmodi species prædictis usitatis nominibus uocatas legisse non recolimus. Quod si nonnunq; occurreret, deinceps loco magis proprio adiungemus. Ex eius tamen monumentis, cū phlegma album, φλέγμα λευκόν aliquando legerimus: Tūc uel leucophlegmatia à posterioribus uaca, uel interdum ipsam cachexiam, hoc est, uitiosum habitum, qui ad leucophlegmatiam perducit, intellexisse oportet. Quam speciem quarti uoluminis de ratione uictus acutorū Authorem ^u τὸ σπυγκτικόν, uel (ut alij, Gale no teste, scribunt) τὸ σπυγκτικόν appellat. Neq; tamen ἀνὰ σάγμα, neq; ὑπὸ σάγμα alicubi scriptum inueni (Galenus ait ^u) quanq; recentiores ita nominent. Quim uerò Hippocrates hydropem siccam profert: ^x eam speciem intelligemus (uel Galeni ^y testimonio) quam posteriores tympanitem nominarunt. Sæpenuerò autem simpliciter, absoluteq; hydropem, aut hyderon Hippocrates ^z protulit: aquosam (ut uidetur) speciem intelligens, quam posteriores deinde asciten appellarunt. Quod autem nonnulli ex fine quarti libri de morbis colligunt: Tres uidelicet iam prædictas species ab Hippocrate, uno, & eodem insimul loco, expressas: Ridiculum profectò est. Cū non eo modo tres ibi species enumeret, At penes partem, quæ primitus affecta est, & unde nam affectus primæ suæ generationis originē sumpsit, tres hydropis species narrare sibi placuerit. Quarum prima quidē à splene: Secunda uerò

- rò à uentriculo: Tertia autem ab utero exorsa sit. Tresq; iam dictæ ad asciten potius, q; ad aliquam ex reliquis duabus speciebus reducendæ ueniunt. Sed de hoc alias, & quidem uberiùs loquemur. Morbus proculdubio frigidus est, & humidus (Galeno^a etiam comprobante) ut id, quod præ cæteris in textu querebatur, exequamur. Quam ob rem inter longos morbos numeratur.^b & ulcera siccitatem ad sanitatis perfectionem exigentia difficulter (uel ipsomet Hippocrate^c docente) sanantur. Cuius morbi humiditas usq; adeò nonnunq; augetur, intenditurq; ut iam asperas occupans arterias tuissim producat, mortis quidem periculū pronuntiantem.^d Quòd si admodum siticulosi huiusmodi morbo affecti sint: Haudquaq; tamen ob id frigidum esse atq; humidum affectum prohibetur. Etenim ob salis nitrosæ uel pituitæ aliquantulam admistionem, præsertimq; in uentriculo id succedit. Gignitur autem huiusmodi pituita, ob plurimas ciborum corruptiones, ac naturalis pituitæ putredinem. Additurq; his mesentericarū uenarū obstructio: cuius occasione aliquantulus calor, uentriculo deindè cōmunicatus, accenditur. Vnde & sitis incrementum suscipit. Sed ne obstare quidè potest: quoniam frigidum & humidum esse morbum determinauimus: Hippocrates^e autem eius unam speciem (quam s. posteriores tympanian, & tympaniten uocarunt) hydropem siccam nuncupauit. Nanq; aliorū respectu sicca est, Ab aquea nihilominus, serosaq; humiditate nequaquā absoluitur. Cū & hic aqua flatui, quemadmodum & in ascite, flatus aquæ, misceatur: Ab eo tamen, quod in mistione præcellit, nomen suscipiat. In sicca igitur hydrope copiosior spiritus, minor humiditas est. Contrà uerò in ascite aquæ longè plus, q; spiritus in unum intus coaceruatur. Quòd si radicale uocatum humidum contemplemur, non hæc tantū species, at ipsa etiam ascites, & hypofarca siccæ sunt. Videmus enim ipsos etiā hypofarca uexatos uersum per corpus tumefactos. Veruntamen discussis ijs, quæ sub cuti, et per carnem dispersæ humiditates sunt, siccum, & tabidum eue stigio corpus apparet. Id quod non semel, & immensa quidem animi tristitia, in charissimo nepote, præter alios ferè innumeros, experti sumus. Verum enim uerò de his hoc loco ueluti per transfennam dictū sit. Vbi generatim de hydrope nonnihil prætangendum duximus. Ad species ergo permigremus, ab ascite, iuxta Geleni ordinem, & quidem non temerè, sed tanq; reliquis duabus speciebus difficiliore, exordientes. A cū^f ut^g is igitur (quam nos, Latine utricularē dicere possemus) sic dicta est & τῶν ἀσθῶν, id est, ab utre: quòd ἀσθὼν, hoc est, utris aqua non omninò pleni, modo, inanis locus, qui peritonæum: intestinaq; interstat, aquoso humore (hydrocelæ instar, uti Galenus f. 14. meth. c. 13. ait) impletus uideatur: utris quoq; siue aquam, siue quemuis alium liquorem cōtinentis, ritu, ad quancunq; partem moueatur, fluctuat, murmuratq;. Appositè igitur Cælius Aurelianus ait & Asciten deniq; sequitur uentris inflatio, uel extantia, & pro corporis motu, liquoris collisi sonitus, uel ad concussum palmæ resonus, tanq; semipleni utris, ex quo nomē sumpsit. Itaq; tumor aquosus est, quoniam aqueo seroso uel humore dominante oppletus est. q; q; à uento non absoluitur. Nec ad œdema (prout nonnulli uolunt) reducitur. Cū satis superq; differant. Ad quod porrò propriè dictum œdema reducenda potius hypofarca est: De qua nibi h. l. omniū post hanc et tympaniten sermo fiet. Princeps uerò non temerè ad phlegmaticos tumores, phlegmatica uel apostemata asciten reduxisse uidetur, tametsi generis nomine ipsam insinuat. Non temerè inq; quoniam omnis humor frigidus et humidus ad phlegmatis genus redducendus uenit. Perinde ac uberiùs commento sequenti, ex Galenoⁱ etiam demonstrabi-

de morb. muliebr.
circa mem. lib. de
affect. ante med.
& sæpè.

Hydropis tēs
peramentū.

Obiectionis
solutio.

a p. de tēpera.
3. uersus finem.
b p. Aph. cō. 12.
c 6. Aphor. 8.
d 6. Aphor. 35.
e 4. Aphor. 11.

Obiectionis
solutio.

Tumor 49.
Ascites.

f 14. meth. c. 13.

g lib. 3. ebronion.
cap. 2. ante mediū.

Cōtra Taga
ultium.

b tr. sequenti ca.
prim. tex. 2.
i 3. de locis aff.
5. uersus finē lib.
de morb. caus. ca.
6. et 2. de pot. nat.
ultimo et sæpè.

mus

h ubi supra. **mus.** Vocatur autem hic (scilicet ascites) hydropismus. ut Diocles, Cælio^k teste, etiam hēs[„]
Hydropismus patias, aut splenites, à patientibus partibus nomē ducēs, hoc est, iecore, uel liene. Verum[„] spes[„]
Hepatis. ciale nomen non est huic duntaxat speciei familiare. Aliæ nanq; duæ species generatim hy[„]
Splenites dropismi sicuti & hydropes nuncupari possunt. Ut benè perpendenti ea, in quibus hoc no[„]
mine Cælius utitur, liquere promptum est. Post pauca enim subdit. Est autem passio com[„]
muniter stricturæ omnis hydropismus. & in præcedentibus, tum in præfatione primi li[„]
l versus finem. bri, l[„] tum quando de iecorosis, lienosisq; loquebatur^m & hydropismi suffusio etc. & et rur[„]
m lib 3^o cap. 4. sūs de cachexiaⁿ Est autem ipsa quoq; passio sæpissimè hydropismi antecedens causa. etc. &
circum principia. At hæc de nomine quæstio q; minimi momenti est. Hæc igitur species, quem ascitem nomi[„]
n ibidē cap. 6. namus, reliquis duabus peior, & difficilioris curationis (quemadmodum prædiximus) est. 10
post principia. A maiori enim frigidityte aquosus hydrops generari (uel Galeno teste^o) uidetur, à minori
o 4^o Apho. cō. 11. autem tympanias, Itaq; omnium (ut proprio deinde loco uberrimè unā cum Apponensi P[„] de
p Cōciliatoris dif ferentia. 102. monstrabimus) periculosissimus ascites est. Quicquid nonnulli scripserint, qui hypofarca
Cōtra Musā. difficilioris esse curationis, periculosioremq; ex Authore quarti libri de ratione uitæ acuto[„]
Tumor. sc. rum colligentes, pronūtiarunt. SECUNDA uerò species hydropis Tympanites, siue tym[„]
Tympanites. panias est. Tumor sordine quinquagesimus, inter peritonæum, & omentum, intestinaq; fla[„]
q 4^o Apho. 11. tuosi spiritus copiam retinens. Ab Hippocrate^l hydrops sicca nominabatur. à medicis autem
Hippocrate posterioribus (Galeno^l referente) tympanias nuncupata est. Quoniam, si epis[„]
gastrion abdomen[„] ue percussum talem sonum ædit, qualem tympana. Nā & in illis (s. tym[„]
panis) per cutē extantem aer percutitur: quemadmodum & ille, qui in profundo locatur, in 20
tali morbi genere. A minori autem frigidityte, q; ascites fit. Neq; enim humida substantia in[„]
Not^m flatusosum aerem, sine calore aliquo, potest trāsmutari. Quoniam uerò tum aqua, tum uentus[„]
ad nutritionē inepta sunt, respuentibus quidem, pellentibusq; retrorsum potius, q; ad sese tras[„]
hentibus uenis, ac membris: Ad prædictam uentris cavitatem inter peritonæum, & omentū,
atq; intestina, tam ascitis aquosa humiditas, q; tympanitis uentus quasi ad cloacam quandam
uilem[„] locum reiecta coaceruantur. SECVS uerò in leucophlegmatia contingit. Quæ à
Tumor. st. multis Medicis {ἀνασάρκα} q. d. {per carnem} appellatur (ut unā primum et quinquagesi[„]
Anasarca mum tumorem absoluerimus.) Dicitur enim anasarca, absq; ulla declinatione, non ut barba[„]
ram insequentes doctrinam proferunt, & in Cælio Aureliano legitur, ob scriptorum fr[„]
tasē uitiū, anasarcam, & anasarca, cum duæ sint dictiones Græcæ: uidelicet {ana} præ 30
positio significans {per} & {sarca} accusatiuum Græcum significans carnem. Idem er[„]
go præfert nobis {anasarca} quod {per carnem} Quoniam scilicet dispersa, ueluti per
Catasarca spongiam, aut lanam per ipsam carnem pituita est. Quæ etiam ratione {ἀνασάρκα} quasi[„]
r 4^o de rōne u dicat {secundū carnē}, seu {per carnem} dicta est. Neq; tamen anasarca, & catasarca alicu[„]
Etus acu. cō. 111. bi scriptum (ab Hippocrate. s.) reperi (ait Galenus.)^r q; q; recentiores ita nominent. Nec
Hypofarca. alia quidem causa nonnunq; ὑποσάρκα, & ὑποσάρκιδιός, aut (quemadmodum nonnulli
Hypofarcis scribebant) ὑποσάρκιδιός, nuncupata huiusmodi species est. q. d. sub carne. Etenim quia non
dios. Nota. serosa, aquea[„] ue humiditas, aut flatusosus spiritus, materiæ quidem ad nutritionem ineptiss[„]
Episarcidios. ma, sed pituitosus (Galeno^l teste) humor in hoc hydropis genere inuenitur. Huiusmodi au[„]
s de tu. præ. na. tem succus non aded naturæ alienus, atq; aduena est. Cum non aliud, q; diminutè concoctus 40
20. 3^o de sympt. sanguis sit: qui exquisitiū sæpenuerò elaboratus, in sanguinē conuerti consueuit. Hanc
ceu 2^o ante med.
2^o de elemētis ca.
p^o uerfus finem.

- ob causam non eo modo, quo præsriptæ humiditates, tum à uenis, tum ab ipsis etiam membris respuitur. Quin ob melioris, exactiusq; cocti humoris penuriam, à uenis non recipitur modò, sed quadantenus attrahitur. Sperantibus interim illis talem pituitam exquisitiùs perficiendo, in sanguinem conuertere, ob uim quoq; sanguificam à iocinore sibi communicatam.
1. Verùm in huiusmodi sperato opere frustrantur, tum ob eiusmodi pituitæ copiam, tum quia
2. nec exactè pituita est naturalis, cum imbecille iecur sit quã ob rem & naturali adhuc pituita
3. crudior est. adeò ut nec facile concoqui, ac perfici queat. tum tertio quod magis obstat est, quoniam etiam si cocta magis, q; naturalis pituita foret, ut uix effatu digna elaboratione indigeret: quoniam pacto uenæ, quæ sanguificandi uim à iocinore, nec à propria essentia obtinuerunt, hanc facultatem retinere queunt? Corrupto iam principio ut sanguinem gignere non ualeat? Frustrantur igitur ab huiusmodi sanguinis generatione, post hepatis intemperie, tam uenæ, q; deinceps ipsa membra solida. Cumq; ad eorum nutritionem ineptus humor euaserit, uix trahitur, deficiente alteratione, cuius ratione ad se, magnetis ferrum trahentis (Galeno docente¹) instar, sanguinem, ac magis rorem attrahunt. Qua de re in uapores conuersa pituita, quemadmodum in altera œdematis specie, per carnem, & sub carne potius dispergitur, q; in eius substantiam attracta conuertatur. Pituitoso. n. excremento per uniuersum corpus disperso, hydrops (Galeno authore²) leucophlegmatias dictus succedit: in una uerò parte œdema. Interim uerò eius substantia, ob nutrimenti penuriam, liquefit, ita et pinguedinis. q; q; tumida conspiciantur. Radicalia autem, spermatica uel (ut uocant) membra omnia proculdubio, non secus, atq; in hecticis, ac phthisicis, contabescunt. Dicitur autem nomine à causa (uti Galenus³ ait) de sumpto, λευκοφλεγματίας siue λευκοφλεγμάτιος, & λευκὸν φλέγμα, Latine alba pituita, siue album phlegma. Quoniam albo phlegmate plenum uniuersum corpus, præsertimq; caro, & cutis, albidior, & omni rubore destitutum colorem præferunt. In tota. n. corporis mole (uti perbellè Paulus⁴ ait) frigidior, pituitosiorq; sanguis continentur: qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis, ueluti in aquam resoluta, emanat. Adeò ut corpus albedo, & pituitæ colore, emortui instar, appareat. Cur uerò hanc ultimam hydropis speciem duntaxat, intercutem, Cælius Aurelianus nuncuparit, dictum iam antea est. Hippocrates (quemadmodum prædictum quoq; est) λευκὸν φλέγμα, tam in Aphorismis, q; alibi non semel cachexiam, deprauatum uel habitum intellexisse uidetur. Quam ob rem in libello, περὶ παθῶν, hoc est, de affectionibus (siue Polybi. siue Hippocratis fuerit, ueluti dubitauit Galenus⁵) ita scriptum de alba pituita est
1. Morbus hic fit à pituita: Cum quis ex febribus diuturnis pituitosus existens, impurgatus remanserit, et pituita ad carnes ipsius conuersa fuerit. Quæ nihilominus pituita cãdidior, q; alia non est. uerum corporis color albidior apparet. Sanguis enim, ob pituitæ copiam, aquosior fit. Et non inest similiter in ipso bonus color. Quapropter languentes albidiores apparent. Vocatur hac de causa morbus hic. pituita alba, Siquidem igitur curatus fuerit inchoante morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropem transit morbus, & hominem corrumpit. Hæc intantum hoc loco ueluti per transennam de tribus hydropis speciebus dictum sit. Vberius. n. proprio deinceps capite, de ipsis loquemur. Nunc autem satis superq; fuerit sciuisse, quoniã
2. frigidi tumores sunt, atq; ascites aquosus, tympanites uentosus, Anasarca demum pituitosus tumor existit. QVIBVS expeditis ad quinquagesimum secundum tumorem pertranscamus

1. p^o de pot. natu-
ralibus cap. 14.
et. 3^o. 14. & 15.

u^o 3^o. de sympt.
cau. c. 2. an med.

x^o 2^o. de method.
cap. 2.

Leucophleg-
matia

Alba pituita.

m lib. 3. c. 48.
post prin^a.

y ut 7^o aphorif.
29. & 70.

z 6^o apho. cõ p^o
uersus finē.

Tumor. 52.
mus Epulis.

mus: ἐπιδὶς Græci uocant. Nos uerò ad Græcum nomen alludere si uolumus, supergingiuium, nuper efficto uocabulo, nominare possumus. Qui autem antiquos imitari Latinos conantur, carnis gingiuae incrementum appellabunt. Dicitur enim ab ἐπιδὶς Græca præpositione, quæ significat {super} & ἵλον {quod est, gingiua, sic porrò dicta à mollitie, & teneritate, ἵλον γὰρ ἀπαλον, hoc est, gingiua enim tenera est. Est autem Epulis (Paulo^a, atq; Aetio^b definientibus) carnis excrementa, ex inflammatione, in intimo molari dente: cui febris interdū, ac dolor adiungitur. Additq; Aetiū uehementem aliquādo dolorem inesse, ut neq; os ægro aperire liceat. Hali Abbas^c etiam præscriptam definitionem transcribens (q̄q̄ corruptè apud eum {abulis} pro {epulis} legitur) id addidit. quoniam. s. arbitratu patiens homo in molari aliquid esse ciborum, quod illi adhæserit. Celsus^d tam hūc, q̄ sequētem tumorem. s. parulida sub nomine, παροδὺν πδς. q. d. iuxta dentem, intellexisse apparet. Quāq; in quibusdam Celsi codicibus {παρόπς} pro {παροδὺν πς} corruptè legitur. aut fortasse {παρόπς} scriptū est, siue {παροδὺν πς} pro {παρῶν} quam potius speciem definiuisse mihi uidetur. EST autem Parulis (ut tertium & quinquagesimum unā tumorē explanarimus) inflammatio quædam alicuius partis gingiuarum (iisdem Paulo^c, Aetioq; f. testibus) Quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem conuertitur. Sæpenuerò autem ex parulide non exquisitiū (ut oportet) dissoluta, epulidos generatio succedit: præsertimq; si in extremo molari dente huiusmodi parulis, inflammatio ue oborta sit. in quo quidem loco epulis propriè fieri consuevit. quemadmodum ex eius definitione liquet. Quam ob rem & Hali Abbas^e ait. {Passio quæ aurulis uocatur. (Sic enim corruptissimè {aurulis} pro {parulis} quemadmodum {abulis} pro {epulis} apud eum legitur.) apostematis. s. calidi immutatio in saniem, & gingiuarum putrefactionem, acciditq; ab inde gingiuarum casus, & oris odoris malitia, & passio, quæ uocatur abulis, (hoc est ut diximus, epulis) caro. s. abūdans. etc.} Bifariam igitur epulis à parulide, penes Paulum, & Aetium, differt. Primò quoniam epulis non ipsa gingiuarum inflammatio, sed carnis excrementa iuxta gingiuas est, ex inflammatione, sæpius originem ducens. Parulis autem ipsa præcedens inflammatio est. Secundò adhuc differunt. quoniam Epulis non in qualibet gingiuarum parte, & circa quemlibet dentem fieri consuevit: uerū in intimo duxtaxat (quemadmodum prædictum iam est) molari dente, carnis incrementum est: parulis autem in quauis gingiuarum parte oborta inflammatio est. Iuxta gingiuium dici posset. Cum παρῶν dicatur à {παρῶ} quod est {iuxta} & ἵλον {quod est, ut supra diximus, {gingiua} Galenus. autem utrunq; tumorem, tam. s. epulida, q̄ parulida, sicuti & thymon, {σαρκώδη βλαστῆματα}, quod est {carnosa germina}, in libro de tumoribus præter naturam^b, appellasse uidetur. Nisi ad thymos duntaxat, ac epulidas, & non ad parulidas, uiolenter potius, q̄ germana interpretatione, quæ sequuntur uerba referre malueris. Qui ait {καὶ τ' ἄλλα, ὅσα τοιαῦτα σαρκώδη βλαστῆματα}. Hoc est {et alia id genus quæcūq; carnosa germina sunt.} Quod si utrunq; carnis germen esse intellexerimus, in hoc nihilominus differre dicetur. Quoniam epulides iuxta intimū (uti dictum est) molarem dentem. Parulides autem in alijs etiam gingiuarum partibus oriuntur. Sanguinis uerò expullulationes, calidq; tumores sunt siue phlegmonæ, siue carnis germina sint. calidiorem tamen phlegmonem, minùs autem calidam carnem esse cuius aperitissimum est. Verū enim uerò Paulus, circa duorum huiusmodi affectuum definitiones, inconstans

a lib. 3. cap. 26.

b lib. 8. cap. 25.

c 9. theoricæ. c.

17. uersus finē.

d lib. 6. cap. 13.

Parodontis.

Tumor. 53.

Parulis.

e lib. 3. cap. 26.

f lib. 8. cap. 24.

g 9. theoricæ c.

17. uersus finem.

Epulidis

parulidis dif-

ferentia 2^a.

b cap. 21.

Pauli cōtradiz-

etio.

constans

- constans est. Etenim (perinde atq; præscriptum iam est) Epulis ab eo sic, tertio uolumine, de i cap. 26.
 finitur. Quoniam, scilicet, carnis excreſcentia est, in intimo molari dente. In sexto autem uolumi-
 ne ^k generalius dicitur. { q est carnis incrementum, κατὰ τὴν αὐτὴν ὁδὸν τῶν, hoc est, iuxta ^k cap. 27.
 dentium aliquem, in gingiuis proueniens. } Per hæc igitur uerba Paulus insinuat indifferenter
 (modò carnis incrementum sit) prope quem uis dentem oriri epulidem posse. Nisi exponere Solutio p^o.
 uelis { iuxta aliquem dentium } hoc est { iuxta intimum } uti prædictum iam ex tertio libro
 est. Quoniam uerò & huiusmodi carnis excreſcentia non in ultimi tantum dentis gingiua, 2^a.
 sed in reliquis etiam gingiue partibus, penès alios dentes gigni potest: Cui quidem nominis
 ratio, non minùs, q̃ illi, quæ circa ultimum dentem orta est, congruit. Idcirco absurdum nō est,
 10 quin uidetur mihi satis condecens, eodem (epulidis inq;) nomine, in quauis gingiue regione
 aduenerit, nuncupare. Hoc nihilominus interim obseruato, quoniam epulis bifariam sumetur.
 Propriè, scilicet, sicq; carnis extuberantiam quandam, penès ultimum molarem, in gingiua obortā Epulis. 2^a.
 præſert. Quo quidem pacto in libro tertio sumpsisse credendum est. Cum in ea gingiua p^o.
 regione frequentius expullulare consueuerit. Secūdo autem communiter, in quauis gingiua 2^o.
 rum parte oriatur. Quemadmodū libro sexto Paulū intellexisse uerosimile est. Quo in loco
 manuū opere cūctos auellere tumores docebat. In parulidis quoq; definitione uariius esse, atq; Alia Pauli cō
 inconstans Paulus apparet. Libro. n. tertio ^l scripsit, q est { φλεγμονή } Latine { inflamma traditio.
 tio }. Libro autē sexto ^m ait, q est { ἀποστήματιον }, Latine { abscessulus } Quam uerò phleg l cap. 26.
 mone ab apostemate, seu inflammatio ab abscessulo dislet, uel ex præcedentibus ⁿ liquet. In ^m cap. 27.
 20 constas igitur esset, Nisi dixerimus, & (mea quidem sententia) rectè, quoniam inflāmatio est 21. 22.
 (quemadmodum ex libro tertio prædictum iam est) Quæ nisi per sensui occultum halitum Solutio.
 discussa fuerit: in suppurationem, ac per hoc, in abscessum conuertetur: Tuncq; iam inflam-
 mationis (tametsi largiùs assumptæ) species adhuc est. Quoniā uerò dūm propriè dicta pleg-
 mone adhuc erat, chirurgico opere non indigebat: nisi quum ad suppurationē conuersa iam
 fuerit. Idcirco sat sibi superq; fuit, in sexto libro, parulidem, ut abscessulum, et nō ut flegmo-
 nen definire: Cū ibi, quemadmodum patet, chirurgicum opus prosequatur. Hæc intantū
 pro Pauli cencordia dicta iam sint. Ab Auicenna ^o corruptè { Berules } pro { Parulis } dici- o 8^a fen. 3^a cap.
 tur. A quo deinde subditur { & quandoq; substantia eius peruenit ad creandum carnem no 2^o post medium.
 uam } per quæ quidem uerba, Epulis intelligitur. Quam rursus { carnem additam } nuncupa p ibide. cap. 10.
 30 ri ab eodem Authore legimus p. Sed de his hætenus. Ad alium ergo carneum tumorem con- Tumor. 54.
 uertamur: Qui ordine quartus & quinquagesimus propositus est. Thymos apud Galenū, q 14. meth. c. 13.
 Authoremq; Definitionum, ^r Paulum, ^s & Aetium, ^t genere quidē masculino, dicitur: Græc- & de tum. præ-
 cē, θυμός, cum accentu super { u } { acuto. (θυμός n. cum accentu super { o } { animum, et ira- naturā. 21.
 cūdiam, audaciam ue præſert.) Apud Celsū ^u uerò Thymion, in neutro genere, legitur. r post medium.
 Quod nihilominus nomen, apud ipsum quoq; æquiuocum est. Nam aliquandò ^x pessimū ul- s 3^a 59. sec. 3. et
 cus intelligit ex carcinomate factum: quod curationem non admittit. { Primum nanq; (ut ait) 6^a 58. & 71.
 id fit, quod à Græcis καρκίνος nominatur: (nos cancri principium intelligimus) Deindē ex t 14^a 4^o et. 13.
 eo id καρκίνωμα, quod sine ulcere est (nos cancrū nō ulceratum uocamus) Deindē ulcus u lib. 5. c. ult. sec.
 ex eo thymium } Nos quoq; cancrum ulceratum dicere solemus. Aliquandò ^y autem Celsus si Thymion.
 40 thymion uocat tumorem, quem præ manibus enarrandum assumpsimus. Sicq; ab eo definitur x ubi supra.
 { Thymion nominatur quod super corpus, quasi uerrucula, eminet, ad cutem tenuē, suprà la- sec. 2^a.
 tius, y ibide. sec. 17.

z lib. 14. cap. 4. in principio. **tius** (oblongum ait Aetius^z) subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum color rem floris thymi repræsentat: Vnde ei nomen est. Ibiq; finditur, & cruentatur: nonnunq; aliquantulum sanguinis fundit (cumq; inciditur, ait Aetius, "amplius, q; pro apparente magnitudine.) fereq; circa magnitudinem fabæ ægyptiæ est, raro maius, interdum perexiguū. Modò unū, modò aut plura nascuntur, uel in talis, uel in palmis, uel in inferioribus pedū partibus. Pessima tamē in obscænis sunt: Maximeq; ubi sanguinem fundunt. In sede igitur expressit Galenus, b additq; Aetius^c præter sedem, & circa pudenda, & media femora. declaratq; pudenda tam ipse d q; Paulus, e in masculis. s. nunc in glande, nunc in præputio, additq; Aetius, aut in cole. Aliquando uerò in omnibus relatis locis. In mulieribus autem expressius idem Aetius^a ait, uel in alis pudendi, uel in ipso pudendo, aut in uteri osculo, uel collo. Vbi post concubitum, aut deambulationes ruber, cruentusq; tumor fieri solet. Et sanè moro maturo (s. rubro) assimilatur, de quo Moro in fine quartidecimi libri secundum Montani translationem caput breuissimum additum est. Quam ob rem & post Aetium Razes s morum nūcupauit, qui quidem super lingua etiam cuiusdam mulieris morum albū applanatum. q. d. mollem, ad modum bombacis, nonnunq; à sese uisum esse ait. Eodem quoq; nomine Hali Abbas huiusmodi tumorem uocat. qui pluriēs & in facie morum describit. Quandoq; n. in facie thymum consistere Aetius^b quoq; protulit (q; q; Hali Abbas plurimum in facie contingere ait) Arabum uerò Princeps speciatim prius de moro loquitur, libro tertio in uirga, eiusq; partibus, i atq; etiam in matricis regione: k Deinceps uerò generatim, libro quarto, l ipsum definiens, ait: i Hoc est apostema molle, ex carne addita, quod accidit in carne rara. Et plurimū eius fit in ano, & uulua. Et quādoq; est saluum, & quandoq; malignū dolorosum. Sic. n. Paulus^m quoq; ac Aetiusⁿ dixerunt, alios uidelicet esse mites thymos: & quidē doloris expertes: alios uerò dolorificos, molignosq; ut uberiūs postea uidebimus. Nec in prædictis modò locis Princeps oriri morum ait, Verū & in palpebris aliquādō ipsum curauit. id quod tamen Græci σὺκοσι uocant, hoc est (ut ita dixerimus) ficositatem. Nonnunq; uerò eadem fructus similitudine hæmorrhoidarum quandam speciem, moralem nūcupauit. Perinde ac aliam uueam, aliam autem uerrucalem, ob diuersas similitudines, appellauit. p Nos uimus autem nos quendam Neapoli, qui magnum, & nucis iuglandis instar, quoddam morū in superiori palpebra obortū afferre potius (tamen si turpissimū et oculo molestissimū) q; in tyrānorū chirurgorū imperitis, ineptissimusq; manibus sese cōmittere decreuit. Quēadmodū et anno abhinc tertio, grandioris castaneæ magnitudine, morū uidimus, in talo exteriori dextrae tibie natum excellentissimi Iurisconsulti, nō minūs, q; integerrimi, iustissimiq; Regij consiliarij, Ioannis Andreæ à Curtis. quod quidem rotundum erat, angustum uerò circa cutim: ut pediculus quidam cuti affixus appareret, ficusq; potius, quàm mori figuram repræsentaret. Quod demū imperiti cuiusdam empirici medicamenti irritatum, incisione iuxta cutim à docto Chirurgo, nostroq; iam consilio admonito facta, siccantibusq; deinceps, & cicatricē inducentibus medicamentis, ad sanitatem facillimè reductum est. Nonnunq; uerò Princeps Arabum maioris, minorisq; ratione, differre morum à thymo insinuat. Adēo ut maius, morū, minor uerò, thymus, Arabicè autē hafce, siue alhasce nominetur. Veluti cū ita inquit i Quādoq; eueniunt in matrice hæmorrhoides, & accidit quandoq; in ea, sicut morum, sicut dictū est in masculis. Et quandoq; apparent super eam bothor diuersæ. quare quædam dicuntur

- „ tur albasce: quoniā sunt similes capitibus albasce. Et quādoq; sunt albæ. etc. 3 Quod aut, hasce, siue, cū articulo, albasce, apud Arabes thymū significet, unicuiq; pernotū esse reor. Fortēq; id intellexisse Hali Abas⁵ uoluit: cū à mori sermone, statim subdit 1 Aduersiones, quæ in
- „ facie sabasce similes sunt, rubæ, et liuidi ruboris (q; qdē color thymi est) plurimū ulcerosa. 3 18. uersus finem.
- Dicitur ergo fortē, sabasce, pro albasce. Corruptius aut aliquādō apud Auicēnam⁶ legitur 1. 7^a. 4^a. 17. 3. cap. 12. in fine.
- 1 Tussius 3 fortassis pro 3 Thymus 3 ubi inter uerrucas reponēdū id genus Arabū ille princeps recēsuit. 13 ab eis differat: quoniā finditur ob sanie quandā, quæ sub hoc genere cōsistit. Inz
- telligo per sanie, propriē sic dictā, uidelicet ichorē, uirulenū uē sanguinē (ut nonnulli uo-
- cāt) superius aut thymū effundere aliquādō sanguinē præsriptū iam est. Duplex aut est
- 10 se thymus, ex Paulo, 4 Aetio, 5 atq; ipso Arabum Principe 6 positus est. Quidam enim
- „ mites sunt, Alij uerō maligni 3 Mites igitur mansueti ue (ut Aetius⁷ uberius, q; ceteri,
- „ ostendit) carunculæ sunt, parue quidem, uerū inæquales, obscuris eminentijs exasper-
- „ rata, albicantis coloris, aut subrubræ, 3 doloris expertes 3 uel, uti Paulus ait, plurima
- ex parte sine dolore sunt. Vtrūq; enim uerum esse potest, 3 quod absolute indolorij sunt,
- medicē tamē loquendo, quoniam scilicet rarissimē secus contingit, 3 quod plurima ex parte
- sine dolore sint. ob eandem scilicet rationem: quia rarissimē dolent. Cumq; dolent, mi-
- nimum dolorem inducunt, eumq; ob aliquam euidentem causam, ut frictionem, concubitum,
- aut motum. Medicē inq; loquendo, etenim illud seruandum esse, in Hippocratis etiam cer-
- tissimis sententijs, Galenus⁸ edocuit, quod commune tam aphorismo, q; alijs ab Hippo-
- 20 crate scriptis esse uoluit. quoniam scilicet perpetuitatem quandam dicendi figura indicat:
- quamuis res ipsæ non semper eodem modo eueniant. sed raro aliquando aliter accidāt. Quē-
- admodum ex alijs quoq; Galeni⁹ locis comprobasse id ipsum per facile fuerit. Paulus autem,
- quim sic ait, de muliebrium locorum thymis loquens, mites tantum definiuisse apparet: 1
- cū rubentem, 3 albam tetigerit. quas esse mites ex Aetio⁶ præscripsimus. Quauis
- antē de colis thymo sermonem habens, duplicē esse confessus fuerit. 2 Etenim quia maligni,
- uel curationē penitus nō admittunt (presertim in ipsis, de qbus loquebatur, mulieribus) uel
- sanē difficile, et per affectū partis ablationē, prout eodē ex Aetio⁶ collegimus: Idcirco mites
- dūtaxat ī muliebribus locis curare intēdēs, eas, uti prædictū ē, definiuit, 3 Maligni uerō thy-
- „ mi (subdit Aetius⁶) duriores sunt, et asperiores, ac maiores, fæculenti, et liuidi coloris, do-
- 30 lorosiq; ac pūctoriū dolorē inducētes, et exacerbātur maximē ad manū cōtactū, et medica-
- „ mētōrū adhibitionē. 3 Celsus uerō minorē à thymio moueri dolorē, q; à myrmecijs ait, f mi-
- te quoq; (ut uidetur) magis intelligēs. Præsertim cū subdat, sæpē et per se finiri, et quō minus
- est: eō magis. Leuissimōq; medicamenti genere succurrat. An uerō colorem floris thymi rez
- præsentrare debeat, necessariū nō ē. Ob uarias. n. defluētū humorū permistiōes, uarios quoq;
- fieri colores, cōpertū uel cādidatis esse debet. Quāobrē Celsi dictū, magna ex parte, uerū eē
- fatebimur: Id quod nihilominus ad nominis impositionem satis superq; fuit. Sæpenuerō aut
- 3 si nō colorem thymi: corymborū tamen figuram huiusmodi tumor præsferre consueuit.
- Qua de re Paulus, Aetius, atq; etiam Princeps neq; coloris, neq; figuræ, similitudinem
- expresserūt. Sed corymbis cacuminibus ue thymi hærbæ similitē esse carneā hanc excrescētā
- 4 protulere. Dicitur aut hærbæ hanc et thymos, masculino genere, et thymō in neutro. Sed thy-
- mos in masculino genere, apud Galenū, nō mō hærbā, et huiusmodi tumorē significat: uerū

& quādam adenosam carnem, & quidem nobilissimam, pulmoniq; in superiori thoracis par
 te, communi etiam omnium uasculum ibi existentium distributioni substratam aliquando &
 præsefert. Latini cōmuni oīum uoce, glādiū appellant. Nec thymos tantum (ut patet) æquiuo
 cum nomen est, sed etiam thymion. Præter duos namq; à Celso^b collectos significatus, apud
 aliquos etiam (Pauloⁱ teste) smilacem arborem (quem Romani taxum uocant) representat.
 sed hæc nominum disquisitio ad grammaticos remittatur. Sanguineus hic tumor (ut prin-
 cipale propositum exequamur) uel ex melancholico & sanguineo compositus est. suæ inq;
 radicis, ex qua tumor genitus fuit, ratione: quemadmodū alibi^k prædiximus. Nonnunq; uerò
 sanguini atrabilis commista est, præsertimq; si malignus tumor sit. Subcalidus ergo sæpe
 thymus est: eoq; calidior, quò maiorem inducit dolorem. Non deest tamen quin interdum
 nonnihil pituitæ, præcipueq; in albis, admistum sanguini sit. tumq; ad frigidum uergit: pe-
 rinde ac ubi melancholicus humor dominās in carnis generatione fuerit. SED reliquos per-
 currere tumores tempestiuum iam est. Itaq; ad quintum & quinquagesimum ordine propo-
 situm tumorem accedamus. Græcè { σαρξίτις } dicitur, Latine autem { Vua } Pro cuius
 quidem tumoris exquisitiori notitia, aduertendum prius unā cum Galeno^l est, particulam
 quandam homini esse præcipuam, ac (Plinio^m teste) propriam, à Natura constitutam in fau-
 cibus, ut plectrum uocis foret. Quemadmodū palatum ipsum uelut ἡ χεῖρ quoddam, id est,
 uocis refractorium nuncupatur. Est autem huiusmodi particula, quæ proprio nomine σαρχίτις
 ἡ, Latine gurgulio à recentioribus Latinis uocatur. Præcipua (ut diximus) homini
 pars. Quauis enim & quibusdam auibus, quæ loqui etiam docentur, hæc sit: non usq;
 adeò tamen exquisita, nec non perfecta, ut hominibus necessariò locuturis, inest. Tri-
 plex uerò eius homini usus est, à Galenoⁿ etiam expositus, Primus quidem, quoniam
 ipsa uoci ad magnitudinem, atq; modulationem, elegantiam^{ue} confert. Vt sermonem factus
 ro animali mirum in modum opituletur, tam ingredientem, q̄ egredientem aerem incidens,
 eiusq; uiolentiam frangens. Argumento est turpissima, illorum, qui uel præcisam, uel Gal-
 lico, aut alio quouis ulcere derisam hanc partem habent, loquela. Secundus dein ex ijs se-
 quitur usus: ad aeris inquam attractionem. Ne scilicet nimium frigidus ad pulmonem fer-
 ratur. Quamobrem illi, quibus ad basim usq; amputatus gargareon sit, non modò deterius
 perspicuè sunt locuti: uerum etiam frigidiores senserunt respirationem. Adeò ut pulmo-
 ne, ac thorace, refrigeratis, nonnulli uitam cum morte commutarint. Tertius demum eius-
 modi particule usus homini est, ad aeris in pulmonem inspirando descendens expurgatio-
 nem. Cum pulueris plurimum sibi applicet, qui alioquin in laryngem guttur^{ue} in simul cum
 aere fuerat assumendus Cuius rei argumentum est maximum id, quod quotidie accidit, tum
 ijs, qui in puluere multo luctantur, tum ijs, qui iter eiusmodi permeant. Emungunt enim
 hi paulò post, atq; expuunt puluerem excreantes. qui scilicet in gargareone, ac palato resiste-
 rat. Hæc igitur, de qua loquimur, particula oblonga, fungosa, & carnea, à palati fine: ubi na-
 rium foramina ad os descendunt, in oris amplitudinem propendula superius qdē, ubi palato cō-
 tinuatur, latior: inferius uerò pyramidis instar acutior est, uenulas quasdā, ex uasis palati tu-
 nicā adeuntibus, in suis medio assumens. Quā ob rē ab Hippocrate,^o mox uerò ab Aristo-
 tele,^p ἡ τῆς φωνῆς, hoc est, uenosa nūcupatur. Quoniā ergo superius amplior, inferius angu-
 stior uisitur. Idcirco ex recentioribus nonnulli fundibulum uocarunt. A uetustioribus autem

g. VI. 6. de usu
 partū ca. 4. 101
 principia.
 b. Ex libro 5. c.
 ultimo. sec. 2. 13.
 i. lib. 5. cap. 49.
 k. supra fo. 152.
 in responsione 2.
 & fol. 153.
 l. supra fo. 152.
 in responsione 2.
 m. lib. 11. c. 37.
 n. supra fo. 152.
 in responsione 2.
 o. lib. 2. de mor-
 bis sec. 5.
 p. p. de hist. ani-
 malium. c. 11. i. fine.

Græcis,

Græcis, oblongam eam esse perpendentibus, κίων, id est, columna dicta est (quo interim nomine Hippocrates¹ morbum quendam in foeminarum pudendis natum aliquando significasse uoluit. De quo tamen posterius² loquemur) A nonnullis uerò posterioribus Græcis nō κίων, id est, columna sed distinctionis, & clarioris doctrinæ gratia, diminutiue, κίωνίς, hoc est, columella, ob columnæ quidem, oblonga sua figura, similitudinem, nominata est. Proprium uerò eius nomen est γαργαρεών³ & Latine (iuxta Plurium consuetudinem) gurgulio. Quauis id nomen uetustioribus Latinis guttur potius exterius, cum asperæ arteriæ, quæ ad iugulum usq; tangitur, conspiciturq; portione, interdum præferat: Nonnunq; uerò uermiculum quendam, qui in horreis nascens frumentum absomit. Sic porro dictus, quoniam nihil in eo penè aliud uidetur, q; guttur. Verum alij animalculum hoc, per c & curculionem, guttur uerò ipsum, per g & gurgulionem, distinctionis causa, nuncupant. Tutius ergo est Græca uoce uti, & cum Hippocrate, & Galeno, gargarionem appellare. Quamq; ne in hoc quidem Græco nomine æqui-uocatio deest. Cum Aristoteles⁴ gargarionis uoce laryngem potius, guttur uel intellexisse uideatur. quum ait & Et absq; naribus inspirare, uel exspirare impossibile est, δια τὸ ἐν στήθεσιν εἶναι τὴν ἀναπνοήν, καὶ ἐκπνοήν κατὰ τὸν γαργαρεῶνα, καὶ μὴ ἐκ τῆς κεφαλῆς πνίμειν & quod est, & Quoniam ex pectore tum inspiratio, tum exspiratio per gargarionem est, & non ex capitis parte aliqua. & Quauis enim de columella ipsa uerus fieri sermo queat. Ex eo nihilominus laryngem intellexisse confirmatur: Quonia deinceps⁵ de columella particula loquens, id esse parti nomen ait, Græcè κίων, hoc est, columna, sic uidelicet scribens. ἔστω δ' ἂν μοι μῦθον σαφλοφόρον κίων ἐπιφλεβος ὁ ἐν ἐξυγρὰνθῆς φλεγμένῃ, σαφυλὴ καλεῖται, καὶ πνίγεται. & quod est & Intus autem (scilicet in ore) alia particula est, uuigera, columna uenosa. Quæ si humectata inflammetur, uua nuncupatur, & strangulat. & Quia enim pars hæc uuam morbum pati, sufferreq; solita est. idcirco σαφλοφόρον, id est, uuigera nominatur. Quo tamen in loco nil de gargarionis uoce meminuit: necessarii tamen tæcturus, siquidem particulæ huius nomē esse reputasset. Proprium ergo partis nomen ab Aristotele unum dūtaxat expressum est, scilicet, κίων, quod est, columna, Alterum uerò adiectiuum est: quoniam affectum, uuam dictum pati nonnunq; soleat. Quos circa, σαφλοφόρον, id est, uuigera, seu uuifera dicta est. σαφυλὴ autem, hoc est, uua, tumoris inflammati nomē est. Galenus uerò duplex, quinimmo triplex particulæ nomen protulit. quum sic ait⁶ & carnosæ quædam particula in summo ore apparet depēdens, si quis apertius plurimum ore toto, linguam deprimat. Hæc ipsa caruncula duobus nominibus appellatur, à ueteribus Græcis, γαργαρεών τε, καὶ κίων, quod est, gargarion, siue (ut interpretes uertunt) gurgulio, & columna. Cæterum posteriores medici ferè omnes non ita, sed κιονίδα, id est, columellam uocant. Nam qui σαφυλὴν, hoc est, uuam ipsam appellant, eorū neq; meminisse præstat. Nos. n. non particulā ipsam, sed unā quandam eius affectionem, σαφυλὴν, id est, uuam, nominamus. & Est autem huiusmodi affectio: quum. scilicet. usq; adeo phlegmone increuit, ut gargarionis extremum inferius maius, ac rotundum, siue (ut alius habet codex) luidū apparet: suprema uerò ipsius pars attenuata est adeo ut uuæ acinum, fructum uel repræsentet. Rarò autem gargarionis inflammatio intantum augetur, q; q; sæpiusculè talis particula phlegmone tentetur. Quocirca idem Galenus subdit & Rarò autem hæc affectio circa columnam nam contingit. Verum sæpiissime inflammat. & Verū tamen quia nonnulli ex antiquioribus

q lib. de natura muliebri uersus finem.

a. fol. 273. post principium.

Gurgulio.

r Ut patet apud Varronem lib. 2. de re rustica. c. 3. post prin^m.

s Ut patet ex eodē Varrone. p^o. eiusdē. c. 63. et Columella lib. p^o. c. 6. circa medium. & Verg. primo Georgicorū. uersu. 186.

t 3^o progn. 21. u Ibidē. et. 6. de cōpō. med. secūdu loc. ca. 3. et sæpē. x p^o de Hist. animalū. c. 11. post medium.

y Ibidem in fine capitis.

z 6. de cōp. medi secūdu loca. ca. 3. in principio.

Vua quæ.

etiam Græcis absolute quam uis columellæ, gargareonis uel inflammationem, uiam appellari existimarunt. E quorum numero ipse etiam Aristoteles fuisse uidetur, atque etiam (uti Galenus ait) Archigenes. Idcirco et hanc sententiam, ut uulgarem, Galenus reprehendit, sic dicens ^a „
^z p^o. de hist. ani maliu. cap. 11. in fine. „ Ipse autem (scilicet Archigenes) non columna scripsit, sed uia laxata: cum uulgo existimans „
^a 6. de cōpo. me dicam. secundum loc. cap. 3. sec. 2^a. post principia. „ columnæ inflammationem uiam appellari. Quoniam uero et aliorum sententia fuit ipsam „
etiam particulam, columnam, scilicet columellam uel, aut gargareonem dictam, aliquando uiam nuncupari: propterea et hanc ut ignauiores magis deridet Galenus, quam primum subdens. Et quid mirum hoc putandum? quando etiam ex nostratibus quidam, ob atticissimum superciliosus, et iactabundus, uiam, ipsam particulam appellari existimauit? Maior enim huius, quam Archigenis ignorantia fuit. Quamquam tum ex alijs ueteribus huius appellationis usus parabilis sit, ¹⁰ „
^b 3^o. prognost. „ tum ex Hippocrate constet, ex his adeo, in Prognosticorum libro, uerbis. Gargareones cum periculo exciduntur, uruntur, et scarificantur, quandiu rubri fuerint, et magni. Nam et inflammatio ad hæc superuenit, ac sanguinis eruptio. Verum tales graciles reddere alijs artibus hoc tempore oportet. Quum uero totum fuerit separatum, quod sanè uiam nominant: extremumque gargareonis maius, et ²⁰ „
^c loc. prænotatis d lib. 6. c. 31. „ ^αλιον, quod est, liuidum, uel (ut plures Græci tam Hippocratis, quam Galeni, atque etiam Pauli codices habent) ^ωριφεις, hoc est, orbiculatum rotundum uel fuerit factum, superior uero pars tenuior: in hoc sanè tempore tutum est manus admolari, etc. Manifestius autem adhuc Diocles interpretatus est, qualis sit affectio uia appellata, et post eum Praxagoras, et Mantias, et quicumque ³⁰ „
^c lib. 3. c. 40. in principio. „ ^συμφεροντα, id est, concomitantia ipsos affectus, conscripserunt. Quidam uero (quos Aetius secutus est) etiam ob id affectionem uiam appellatam esse dixerunt, quod uia fructui extremum gargareonis simile apparet. Quorum nihilominus „
^f lib. de tu. præ. nat. c. 21. „ sententiam alibi Galenus comprobasse, uel ex Hippocratis intentione, uidetur. Dictum uero est gargareonis extremum rotundum fieri, secundum plures Hippocratis, Galenique, et Pauli codices, qui ⁴⁰ „
^g lib. 2. sec. 5^a. post prin^a. libri. „ ^ωριφεις habent. secundum aliam uero literam, ^αλιον legitur, hoc est, liuidum, siue nigrum. Vtrumque autem uerum est, et quod rotundum sit, et liuidum prius, deinde ad nigredinem tendit. Prout ex ipso met Hippocrate demonstrari potest, qui libro de morbis ait „
^b Ibidem. sec. 12. „ ^ι Vua fit, quum pituita de capite ad gargareonem descendit, gargareonem præceps dependet, ac fit rubicundus. temporis autem processu ⁵⁰ „
³⁰ „ ^{με}λαινετα. i. nigrescit. etc. Rursusque de eadem repetens, inquit „ si uia in faucibus sit, summa gargareonis pars aqua impletur, et ⁶⁰ „
³⁰ „ ^συγχομενος. i. rotunda fit, ac pellucida, et spirationem intercipit. etc. Vix igitur nigra, aut liuida, inprimisque rubea acino similis gargareon redditur. Vtrumque autem iuxta Hippocratis mentem, uerum esse, ipso etiam ex Celso, Hippocrate quidem (ut uocant) Latino, colligi potest. Quum de huius incisione loquens ait. „
^r lib. 7. cap. 12. sec. 2^a. „ Itemque si ima liuida, et crassa, summa tenuis est, scilicet præcidi debet. etc. Semper uero crassitiem, rotunditatemque adipiscitur, quæ uia dicitur: non semper tamen liuida, aut nigra est. cum in principio rubeat. Sed in præassumptis quidem uerbis Galenus (ut liquet) eos reprehendit, qui simpliciter gargareonis inflammationem, uiam nominari credebant. Quorum porro culpa ipsum quoque reprehensionis authorem Galenum redarguere uidetur. Cum suimet aliquando sermonis oblitus, non aliud uiam esse definierit, quam gargareonis inflammationem. Sibimet ipsi ergo aduersaretur: Nisi dixerimus uerum proculdubio esse, non aliud dici uiam, quam gargareonis, columnæ uel plegmonen, apud uulgum quidem, uulgaresque Medicos, omnem: apud Hippocratem uero, cuius uestigia Galenus ⁴⁰ „
insequi

insequi conabatur, non omnem phlegmonem columellæ, sed eā duntaxat, in qua (uti prædictū est) uuæ acinum repræsentat. quoniam, si inferius rotunda, liuida, & grossa, superius autem gracilior effecta est. Quocirca statim sui Hippocratis, quam opinatur meliorem, sententiam subdit: sic dicens & Hippocrates autem uidetur non omnem columnæ inflammationem, uuam nominare: sed unam tantum speciem, in qua gargareonis extremum uuæ acino simile redditur. Nulla igitur in Galeni dictis repugnantia remanet. Fortassis uerò quod libro de tumoribus præter naturam^k anceps adhuc, agnoscere tamen, iuxta Hippocratis mentem, inceptus^k processu deinde temporis, librum scribens de medicamentorum compositione secundum loca, certior redditus, præfenti magis animo, uel alijs ex interpretibus confirmat. Quod autē postea Galenus acerbius increpuit, ipsam uidelicet particulam uuæ nomine à quibusdam significatam esse, Authori eius libri, qui & ἐπεὶ πρὸς τὸν in scribitur, id est, & de affectionibus (siue Hippocrates, siue Polybus fuerit) aduersari uidetur. Hic enim particulam ipsam uuæ nomine designauit, quam à quibusdam gargareonem uocari dixit, his uerbis & si autē uua^l dependerit, & suffocarit, quidam hoc gargareonem nuncupant, statim gargarisimis utendū est. etc. quod igitur ex aliorum sententia gargareonem uocat, id ipsum, ex propria, uuā nominat. Gargareonem uerò cunctos particulam appellasse uidetur. At ne id quidem præscripti uoluminis Authori uel minimum contradicit. Etenim si exquisitè perpenderit, uuā nomenclatura, non particulam incolumem, sed prænotatum iam affectum intelligit. Sic enim grossius redditum, rotundumq; gargareonis extremum, à superiori parte graciliori iam effecta, uuæ instar dependet, strangulareq; solet, nisi præcidatur, aut medicamentis extenuetur. Quidam uerò usq; adeo rudes fuerunt, ut hoc. s. uuam pendere, ac suffocare. (in neutro. n. genere & τὸ Græcè scribitur.) gargareonem (obsonitum fortasse) uocarent. Verum enim uerò particulam ipsam uuæ nomine donari, usq; adeo in Priscorum consuetudinē peruenit. Ut uniuerſa ferè ueterum illorum Romanorum medicorum Græcos ubiq; sectantium academia ipsam particulam Latine uuam nuncuparit. Id quod in primis apud Plinium perpendisse promptissimum est. Quum sic ait^m & Tonsillæ in homine, in sue glandulæ. Quod inter eas uuæ nomine ultimo dependet palato, homini tantū est & Id ipsum tamē uerū est, quod nonnunq;ⁿ pro ipsa particula, nonnunq;^o uerò pro eiusmodi particulæ affectu sumpsisse Plinius offenditur. Quemadmodum et in tonsillarum nomine obseruasse facillimum fuerit. De quibus tamen tonsillis post hæc statim sermo fiet. Ita etiam & Plinio ascriptus liber^p tam de parte, q; de affectu pronuntiasse uidetur. Ante Plinium uerò Celsus uuam de particula intellexisse apparet. quum ad uuam inflammata pāstillos Andronis componere docuit. Vel de uuæ morbo, & curatione loquitur. Et ubi demum siue cum inflammatione, siue citra illam uua sit, præcidenda nū sit, pertractat. Nec aliter Quintus Serenus^t uuam sumpsit: pro parte scilicet quum ait & Aegrescunt teneræ fauces, cum frigoris atri: Vis subiit, uel cum uentis agitabilis aer: Vertitur, atq; ipsas flatus grauis inficit uuas. etc. Quamquā alij codices habeant & undas & Alij uerò & undis & Ea tamen litera uetustior est, & magis probatur, ut & uuas & legerimus. Rursus tamen ait & Si uerò afflicta languor deiecerit uuam sic autem et Aemilius Macer^u uuæ nomē usurpat. Marcellusq; Romanus, Scribonius Lar^x gus, Soranus Ephesius, atq; ipse demū Trotula, qui diminutiue uuulā nuncupat, de usu uuulæ loquens. Quam ob rem & mirū non est, si Arabum quoq; interpretes aut uuam (ut

Alia cōtradictio.

l post prin^m. lib.

Solutio.

m lib. 11. ca. 37. post mediū.

n Vt lib. 20. c. 9. post me^m. 23. 7^o post mediū &

uersus finē. et. c. 8. et sæpē.

o ut. 20. 17^o. 28 post prin^m. et 22.

post p^ricipiū. 22. 13. 23. 27. 23. 6.

24. 4. 7. 13. 14. et. 32. 6. 34. 12.

35. 15. & sæpē.

p lib. p^o. c. 43. et 4. 8. 27. et. 29. i fine.

q lib. 5^o. cap. 20. sec. 5.

r lib. 6. c. 14. s libro. 7^o. ca. 12.

sec. 2^a. t cap. 15.

Quinti Sereni

locus.

u cap. 4. de urtica, et. cap. 36 de caule. et ca. 38. de origano.

x De Medicam. cap. 14. sæpē, &

c. 20. uersus finē.

y cap. 64.

z c. 18. post p^ria. a de passionibus

Y iij apud mulierū. c. 53.

b 9^a. fen. 3^a. ca. apud Auicennam, b & Hali Abbatem c & Mesuem inuenimus) aut diminutiue uuulam
 p^o. 12. et seq. (ut apud Razem d & Serapionem e offendimus) conuertere consueuerint, ipsam uidelicet
 e 9. theor. c. 17 circa finē. et. 6^a. particulam intelligentes. In quorum nihilominus Barbarorum lectione (ut nil intactum, quod
 pract. cap p^o. speculatione dignum est, remanserit) Aduertendum est, Hali Abbatis interpretem gurgu-
 d 3. Cōtin. ca. 6. lionis uoce, fauces potius, non columellam intellexisse. f Serapion uero de uuula, & eius
 et. 7. litera. hbb. curatione loquens, i uuula (inquit) diuersæ accidunt ægritudines. Nam quando extenuas
 & 9. Almanforis. 47. et lib. Di tur, nominatur eius ægritudo inmemis; quod nomē corruptissimum est, ex Græco i μω's
 uisionū. c. 49. siue diminutiue i μωντιον Latinè Lorum, siue corrigiola, de quo affectu Aetius & quoq;
 e 2. Breu. c. 17. meminit: sic dicens i μωντα, hoc est, lorum uero uocant aliam quandam eius affectionem,
 f ut p3. 9. theor. quū ex suffitu nimium ignitus gargareon gracile scit, & loro similis euadit. } Propterea 10
 cap. 13. Serapion, uel eius fortasse interpres subdit i & est eius intentio chorda ex corijs. Et quan-
 g lib. 8. cap. 4. in principio. do in ea est apostema calidū, tunc secūdu diuersitatem locorum, in quibus est illud apostema,
 Serapionis multa loca. nominatur nominibus diuersis. Quod est, quia si apostematur tota, tunc ægritudo in ea nomi-
 natur fermis. } Corruptū quoq; id nomen est, ex Græco i κωι's } hoc est columella, siue
 i lib 2^o. c. 37. in principio. i κων } id est i colūna } Idcirco &, mox subditur i & intentio eius est perpendicularis par-
 ua } sic etiam Albucasis l uocat, scilicet perpendicularem. In aliquibus autem codicibus lege-
 batur i ramus } quemadmodum prior species legebatur i cicinonis } .q.d. i κωι's } .i. co-
 lumella. Addit uero Serapion i Et si apostematur caput eius subtile tantū (hoc est eius infe-
 rior extremitas) tunc uocatur, sataculi, uel (ut alia habet litera) sacatuli. } Quod etiam no-
 men deprauatum est, ex Græco i σαφλν } quod est i uua } Qua de re (in alia etiam lite- 20
 ra dicitur i & est eius intentio, Vua. Et si apostemetur caput uuæ (intelligo supremum) uo-
 catur, catamis. } corruptam quoq; dictionem opinor, ex Græco i καδι μω's } quasi dicat καδι
 i μω's, hoc est secundum ipsam corrigiam. quoniam .f. per reliquam gargareonis substantiā
 extenuatio (ob nutriti penuriam) fit, ut lorū inferius representet. Quam ob rem subiun-
 xit i quando resoluitur materia illa ad reliquam uuam } hoc est, in reliquis uuæ partibus res-
 soluitur: apostematur autem in superiobus } Et fortasse peruenit catamis ad sataculi, quando
 aggregatur tota materia ad caput uuulæ } .f. inferius: quoniam à superioribus ad inferiora
 permutetur humor i & completur figura sataculi (.i. uuæ.) Sed deterior hac est, quæ nomi-
 natur catamis. } Cum in radice morbus sit. nec manuum auxilio præcidi queat. Fortassis auz-
 tr. p^o. c. 4. i prin^o tem, catamis, uel (ut in alia litera legitur, quā Nicolaus Florentinus b refert) cataurus, aposte- 30
 ma Serapioni significabat, in extrema, infimaq; columellæ parte obortum. quod interim cæ-
 teris membri partibus communicabatur, nec ad unam figuram in extremo coaceruabatur, ut
 in sataculi, siue uua. ex quo nec securè præcidi, quemadmodū & uua, poterit. Qua de re dete-
 riorē esse catamis, q; sataculi subiunxit. Sed omisissis Arabibus, eorumq; confusionibus,
 ad propositum reuertamur. Non Arabum ergo tantummodò interpretes uuam, & uuulam,
 i Ut 3^o. de facile parandis med. in prim^o et sec. 47. pro particula capiunt, sed qui Barbaram potius sectati sunt medicinam, & in ea nutriti,
 secundū traduct. in quibusdam Galeno ascriptis libris, uel uuam, i uel uuulā, k pro particula usurpant. etiam
 Pauli crassi. si Græcè i σαφλν } pro morbo, & non pro particula pronuntiata dictio sit. Id quod ta-
 k Ut lib. de Dis namidijs. sec. 101 met si penēs Romanos, Barbarolatinosq; medicos absurdum, indecensq; non est. Nihilominus
 et circa. finē lib. tamen Græcos interpretari, & illorū propriā enucleare mētem uolēbus maximā obscuris 40
 rū. 8. et de uirtute tatis confusionem inducet. In quam porro (quod peius est) ē recentioribus uel famosissimi
 cētauræ. sec. 9. traductores

traductores præcipitant. ut Linacer, ¹ qui $\chi\alpha\epsilon\chi\alpha\epsilon\omega\upsilon\alpha$, columellā non semel traducit. Quā-
 uis. n. ad eiusdem rei significationem Galenus utroq; nomine usus fuerit: Græco tamen re-
 spondens uocabulum, columella, non est. Cuius occasione plurimæ contingunt æquiucatio-
 nes. Præsertimq; apud eos, qui Paulo innixi, inter gargareonem, partis nomen, & columel-
 lam affectum, differentiam (ut uidebimus) intelligunt. Longè autem penius aberrant, qui $\chi\alpha\epsilon$
 $\chi\alpha\epsilon\omega\upsilon\alpha$, uuam, nobis interpretantur. Vt in libris de partiū usu, ^m tametsi recognitis, offen-
 ditur. Sic apud Pauli interpretes, Albanum, & Andernacum inuenies. Qui Andernacus ui-
 tium, quod Paulus Græcè $\chi\iota\omega\alpha$ uocari ait, à Latinis uuam nominari declarauit. ⁿ Adeò ut
 eorū, quos interpretantur, nobisq; Latinos reddere conantur, intentiones minimè curantes, cū
 10 maxima cādidatorū cōfusione, Romanos potius antiquos, Barbarolatinosq; scētetur interpre-
 tes. Inficias tamē interea non ibimus, quod si (prout libet) Latini Latinis particulā exprime-
 re nos uelimus: Vuam nominare, & quidem rectissimè, poterimus. Cū omnium ferè uetere-
 rum Romanorum (ueluti præostendimus) consuetudo fuerit, sic eam nuncupare. Ob id au-
 tem Hippocrates à Galeno. ⁿ mirum in modum commendatur, Quoniam usitatissimis, quò ad
 fieri licuit, semper utebatur nominibus. In quorum usu claritas quasi meta elucescit, p. perfer-
 elio, quidem maxima dictionis existens, ¹ prout eodem ex Galeno didicimus. Ea nanq; lex,
 quam Græcis omnibus communem extitisse, idem testis est: ^r cur Latinis etiam non inesse
 debeat, nil me hercule excogitari potest. Videlicet ut quarum rerum nomina apud uetustio-
 res usurpata inuenerimus, his utamur. Qua de causa & Aristoteles ¹ nominibus utendum
 20 fore, ut plures, docuit. Præsertim quia (ut Auerrhoes ¹ ait) transumptio nominis usitati
 apud uulgus facilius est, q̄ fingere aliud nomen. Quarum uerò rerum nomina nō habemus,
 (ex eadē à Galeno ⁴ relata Græcorum lege) uel ab aliquo eorum, quæ nobis sunt, transfer-
 re licet. uel ipsi, iuxta rerum quandam similitudinem, ad ea, quæ denominata iam sunt, singa-
 mus. uel de alijs dictis abutamur. Verū enim uerò secus obseruandum est, ubi alterius inten-
 tionē, ex proprijs eius uocibus, et obseruatis ab eo Authore differentijs enarrare intendimus.
 Seruanda enim semper, quem interpretari nos intendimus, authoris sententia est, q̄q; fuerit
 falsa. Quemadmodum ab initio statim nostræ præfationis, ipsomet ex Galeno ^x præassum-
 psimus. ² Atq; id ipsum est, in quo plurimos Græcorum interpretes condēnamus. Quæ igitur
 30 tur, circa huiusmodi nominum usum, præcipueq; secundum Hippocratem, Galenus uoluerit,
 præscriptum iam est. Paulus autem non uuam modo, Græcè $\sigma\alpha\phi\upsilon\lambda\eta\nu$, sed columnam quoq;
 Græcè $\chi\iota\omega\alpha$, morbi nomina esse definiuit. $\nu\omega\upsilon\iota\sigma\alpha$ uerò, id est, columnellam, ueluti et $\chi\alpha\epsilon$
 $\chi\alpha\epsilon\omega\upsilon\alpha$, particulam significare insinuat. Sic scribens. ² & Gargareon tanq; aliquod uocis
³ plectrum sæpenuerò de stillationem à capite recipit. Idemq; præter naturā auctus, si oblon-
⁴ gior, tenuiusq; fiat, $\chi\iota\omega\alpha$ $\pi\rho\sigma\sigma\alpha\gamma\omega\epsilon\upsilon\epsilon\tau\alpha\iota$, hoc est, columna nūcupatur, Sin uerò crassior ab
⁵ ima parte, et rotundus, $\sigma\alpha\phi\upsilon\lambda\eta$, quod est, uua nominatur. Ex ijs ergo manifestissimū fit co-
 lūnā affectionis, nō particulæ nomē apud Paulū esse. Id quod, ni Galeno aduersaretur, dispo-
 nū quidē minimè foret. Quocircā nec increpandus uenit: Cū in eo loco nō Galeni, uel Hip-
 pocratis interpretem se esse fateatur. Talem uerò nominādi consuetudinem sua tempestate
 floruisse possibile est. Quin et ante ipsum. Eò quod ab Alexandro etiam, in quæstionibus de
 40 Natura, idē traditum esse Rhodiginus Cælius testis est. ^a $\nu\omega\upsilon\iota\sigma$ uerò, Latine columella, seu
 columella, penes eundem Paulum, particulæ potius nomen esse uidetur. Ita enim uolumine

tertio

l. Vt 14. meth.
 c. 13. ate mem. et
 6. de tuenda uas-
 let. cap. 12. post.
 medium.

Cōtra Lina-
 crū, Anderna-
 cū. Torinum,
 Cornariū, &
 alios multos in-
 terpretes.

m Vt. 11. de usu
 partiū. c. 11. sepe:
 n lib. 3.º. cap. 26
 uersus finem.

o 6. meth. ca. 5.
 post principium.
 p 2. meth. c. p.º.
 circa finem.

q p. de pot. na-
 tural. cap. p.º.

r lib. de particu-
 laribus morborū
 tēporibus. ca. 4.

circa principia.
 s 2. topicorū. c. 6.

t 2. de aīa. cō. 62
 u libro. de part.
 morb. tēp. cap. 4.
 circa principia.

x p.º prog. cō. 4.
 y supra fol. 13.

z lib. 6. cap. 31.
 in principio.

Cōtra Paulū.
 Excusa.º. Pau-
 li.

a lib. 4. Lectio-
 nū Antiquariū. c.
 13. post prin.º.

lib. cap. 26. sec. pe
nultima.

Cōtra Ander
nacum.

Pauli cōtradi-
ctio.

ca. 31. i. primo
d. ca. 26. circa fi
nem.

Solutio. p.^a

lib. 8. cap. 40.
et 41.

f. lib. 6. cap. 31.
post principia.

g. Ibidē statim.
h. lib. 7. cap. 12.
sec. 2.^a

tertio^b ab eo scriptum legimus $\xi \kappa\omicron\nu\iota' \delta\omicron\varsigma \phi\lambda\omicron\gamma\mu\epsilon\nu\sigma\omicron\varsigma, \gamma\alpha\epsilon\gamma\alpha\rho\iota\sigma \mu\epsilon\tau\alpha\iota \chi\rho\eta\sigma\iota\omicron\nu.$ quod¹¹
est, columnella inflammata, gargarismis utendum. etc. ξ Vbi constat columellam pro particula¹²
la desumptam. Deinceps autem quodd, $\kappa\iota\omega\nu$, Latine columna pro morbo capitur (perinde atq;
ex uolumine sexto prædocuimus) apertissime demonstrat. Sic uidelicet subdens. $\xi \iota\sigma\omicron\pi\alpha\zeta$
 $\chi\omicron\upsilon\varsigma \delta\epsilon \acute{\alpha}\nu\tau\iota\varsigma \delta' \omicron\nu\alpha\iota\zeta \delta' \delta\eta \kappa\iota\omega\nu \alpha \kappa\epsilon\lambda\omicron\nu\sigma\iota$ hoc est, ξ Aequaliter autem crassa hac reddi¹³
ta. ξ hac. sc. columella, quam antea iam nominauerat, q; q; interpretis uiam conuertit, ξ quam iam
columnam uocant: gargarisationibus fidendum. etc. ξ Columna igitur, et columella, penes¹⁴
Pauli monumenta, differunt. Apud quem quidem gargareon, ξ columella partis nomina
sunt: columna uero, et uua, morbi diuersam figuram representantis. Sed in prænarratis iam
Pauli uerbis quædam, ξ non paruipendenda contradictio conspicitur. Etenim libro sexto¹⁵
inquit ξ Si oblongior, tenuisq; fuerit, $\kappa\iota\omega\nu$, hoc est, columna nuncupatur ξ libro autem quar-
to, d. huius oppositum præscripserat, dicens ξ Aequaliter autem crassa, hac reddita, $\kappa\iota\omega\nu$. i.
columnam uocant: si ergo æquæ crassior effecta est, non tenuis est. At id nihil in Pauli uer-
bis repugnantie representat. Nam omnino supponendum est gargareonem, ob humoris de-
fluxum, crassiorem iam, tumidioreq; q; secundum naturam extiterit, redditum esse. Si enim te-
nuior euaserit, q; sit secundum naturam, tunc lorum esset, Græcè, $\iota \mu\omicron\lambda\omicron\varsigma$, dictum, ξ $\iota \mu\omicron\lambda\omicron\nu\varsigma$
 $\pi\omicron\nu$. de quo quidem Aetius¹⁶ meminit, quum scilicet ex suffitu nimium ignitus gracile scit, ac
secundum omnes dimensiones comminuitur. Quauis autem aliquando tumeat, crassiorq; in
omnibus etiam dimensionibus, reddatur: Trifariam nihilominus augeri præter naturam con-
suevit. Vel enim contracta rotundior, grossiorq; fit, tumq; speciali nomine donata non est, Vel¹⁷
uua fructus instar supra quidem tenuis, infra uero crassior, ac rotundior est. Vel demum secu-
dum longitudinem magis aucta, æqualiter interim à superioribus ad ima usq; tumet. æqualiter¹⁸
inq; hoc est, seruata particulæ proportionē. Tumq; $\kappa\iota\omega\nu$, id est, columna uocabitur.
Quæ tamen uua longè quidem in ima parte crassioris comparatione, tenuis dicitur. Oblon-
ga etiam est, non ut ea, quæ contracta est: rotundaq; quam ne attingi quidem scalpello de-
bere Paulus f. idem præcepit. Columna igitur oblonga est, ξ uua, atq; alterius (contractæ
scilicet) respectu gracilis est, æqualiter tamen crassior reddita. Aequaliter dixi seruata par-
ticulæ proportionē. Etenim gargareonis particulæ figura naturalis est, ut superius quidem
latis, crassiorq; existens in angustum ad extremum usq; descendat. Ita igitur ξ in mor-
bo, columna (secundum Paulum) nuncupato, particula quadantenus crassior in superioribus¹⁹
bus remanens, in extrema tandem portione gracilior apparebit. ut muris caudæ pendentis fig-
guram, apud ipsum quoq; Paulum, ξ representet. De hac uero Celsus²⁰ quoq; intellexisse
autumo, quum ait ξ si uero inflammatio quidem nulla est. Nihilominus autem ea ultra iustum²¹
modum à pituita diducta est, ξ est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. ξ Quod si nonnisi ius-
ta longitudinem duntaxat augeri conspiciatur, secundum crassitiem uero, uel in eodem per-
manere, uel comminui. tum proculdubio ξ oblonga, ξ gracilior euasit, q; pro naturæ mor-
do fuerit. Quomodo igitur æqualiter crassa est? Respondendum rursus est, quemadmodum
 $\mu\epsilon\gamma\epsilon\theta\omicron\varsigma$, hoc est, magnitudo sæpissime pro genere. sc. tam pro aucta, q; pro diminuta quantita-
tate, apud Galenum, pluresq; alios authores, legimus: ita ξ de crassitie dici potest. $\iota\sigma\omicron\pi\alpha\zeta$
 $\chi\omicron\upsilon\varsigma$ ergo, quod est, Latine, æquæ crassus, non maiorem naturali crassitie importat, sed eius,²²
sue auctæ, siue diminutæ æqualitatem refert. Oblonga igitur columna est, ut ad propositum
reuertat

- reuertamur, quæ de re nõ cõtracta, sed extẽsa, præterea æqualis (seruata interim, ut diximus, proportionẽ) quò ad crassitiem est, nõ etiã uuæ instar, in superioribus tenuior, inferius autem grossior, ac rotunda. Verùm enim uerò non in his tantummodò significatis æquiocatio consistit. Vt. $\kappa\iota\omega\nu$, Latine, columna, apud Galenum, particulam ipsam, quam & gargareonem nuncupauimus, significet: Apud Paulum uerò eiusmodi particulæ quandam affectionẽ. Sed tertio penes Hippocratem, i quendam in muliebri pudendo natum tumorem præsefert. Quĩ lib. de Natura Muliebri uersus finem.
- „ scilicet ait: Si in pudendis graueolentia fuerit, & $\kappa\iota\omega\nu \epsilon\gamma\gamma\epsilon\nu\eta\tau\alpha\epsilon$, quod est, columna innaſcatur, & dolor affligat. Dolorem quidem sedabit apud semen ieiunæ in uino datum: „ Graueolentiam uerò anisum eodem modo datum: $\tau\omicron\nu \delta\epsilon \kappa\iota\omega\nu\alpha \chi\epsilon\iota \alpha\pi\omicron\tau\epsilon\mu\epsilon\nu$, quod est, 10 columnam uerò abscindere oportet. Intellegimus autem quendam carneum tumorem muliebri pudendo innaſcentem, et in exteriora, caudæ instar, prominentem: qui à caudæ similitudine, $\kappa\epsilon\rho\kappa\omega\sigma\iota\varsigma$, à Græcis nominatur. De qua rursus, in alterius tumorũ catalogi enarratione, uberiùs loquemur. Nunc ergo tempestiuum est receptui canere, quò possimus ad alios tumores accedere. Vna igitur affectus, tumor ue, quem hic enarrandum assumpsimus, sanguineus magna ex parte est: Cumq; ueluti prædiximus, inflammationis quædam species sit, calidus dubio procul omni tumor existit. Quòd si nonnunq; ex pituita de capite ad gargareonem descendente uuam fieri, uel ab Hippocrate scriptum est: Nil tamen obſtare uidetur. cum et ex pituita, et ex humore etiã melancholico pleuritim fieri posse scribatur. Quæ iã phlegmones quædã species est. Haud. n. ex ijs suã frigiditatem conseruantibus, at putrefactis, caloremq; 20 uel immodicum adeptis, huiusmodi morbus, et reliquis in partibus phlegmonæ gigni queunt. sæpiſſimè autem, quanuis uel pituita, uel melancholicus humor dominetur: sanguinis tamen quippiam sibi admistum afferet. Quam ob rem Hippocrates non inflammatum modò gargareonem, uel ex destillante à capite pituita, in huiusmodi affectu, posuit: Verùm & prius rubicundum fieri, temporis autem progressu nigrescere protulit. Id quod sanguinis, aut bilis etiam flauæ nonnihil coniunctũ esse necessariò præsefert. SED alia contemplerur. Ad tumores igitur, ordine quinquagesimum sextum, & quinquagesimum septimum accedamus. Parislhmia s. atq; Antiadas. De quibus quidem insimul, facilioris doctrinæ gratia, loquendum est. A parislhmij tamen exordium sumendo. $\pi\alpha\rho\iota\varsigma \theta\mu\alpha$ igitur, & $\alpha\upsilon\tau\iota\alpha\delta\epsilon\varsigma$, duo Græca nomina sunt: quæ aliter apud Galenum: aliter uerò apud Paulum, aliterq; penes Aetium 30 usurpantur. Inde q; apud recentiores innumeræ confusiones insurgunt. Eoq; magis, quòd his Græcis nominibus respondendentia Latina, uel exquisita desiderant, uel (ut lubet) mixta confusione perturbant. Galenus ergo Antiadas, et parislhmia nil aliud, q; inflammationes esse, diuersarum tamen partium definiuit, Antiadas enim, $\tau\omicron\nu \epsilon\nu \alpha\rho\chi\epsilon \tau\eta\varsigma \phi\acute{\alpha}\rho\upsilon\gamma\gamma\omicron\varsigma \epsilon\nu \alpha\tau\epsilon\rho\omega\theta\epsilon\nu \alpha\nu\pi\kappa\epsilon\mu\epsilon\nu\omega\nu \alpha\lambda\lambda\eta\lambda\omicron\iota\varsigma \alpha\delta\epsilon\nu\omega\nu$, quod est, adenum glandularum ue earum, quæ inuicem inter se se opponuntur, utrinq; in ipso faucium initio: uel (ut alibi ait.) $\epsilon\nu \tau\omicron\iota \omega\tau\epsilon\rho\alpha\pi\iota \tau\omicron\varsigma \sigma\omicron\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$, quod est, in intimo ipsius oris termino. Idem nanq; est intimus oris terminus, siue absolute, ut in Græco habetur, terminus, & faucium initium. Harũ igitur glandularum phlegmonas esse antiadas ait. quas tam Horatius Limanus, q; Augustinus Riccus Tonsillas Latine appellarunt. Parislhmia uerò itidem inflammationes esse uoluit, non tamen 40 prædictarum glandularum: Sed earum partium, quæ $\epsilon\iota\varsigma \tau\alpha \tau\omicron\nu \tau\omega\nu \epsilon\chi\omicron\mu\epsilon\nu\alpha$, hoc est, ijs glandulis adiacent, proximaq; sunt. Vel ut alibi scripsit (& in idem uenit) $\tau\omicron\nu \nu\alpha\tau\iota \alpha\upsilon\tau\eta\nu$

i lib. de Natura
Muliebri uersus
finem.

lib. de Natura
Muliebri uersus
finem.

lib. de Natura
Muliebri uersus
finem.

Obiectionis
solutio.

k lib. 2º. de mor
bis. sec. 5ª.

l 6º aphor. 3. 2º
prog. 47. de cõst.
art. med. cap. 15.
circa finem. 2º. de
crisi. c. 10. 2º. de
differentijs febrũ
ultº. et sepe.

Tumor. 56.

Parislhmia.

Tumor. 57.

Antiades.

m li de tu præ
nat. c. 21. et. 3º. de
sympt. cau. c. 4.
circa principia.

Antias qd?

n de tum. præ.
nat. 21.

o 3. de sympto.
causis 4.

Parislhmia

qua?

p 3º. de sympto.
causis. 4.

q de tum. præ.
nat. 21.

r 3. aphor. com.
26. post prin^m.

Pariſthmion ut
de dicitur.

s Vbi supra. in
com aphor.

Isthmos quid:

e Ibidem. f. 3.
aphor. 26.

u 4. de usu par
tiū. c. p^o.

x Ibidem. cap. 4.

y Ibidem. cap. 15.

Contra Mu-
sam.

x Vi patet etiam
lib. 5. salubrium
c. 4. uersus finē
et. 6. eiusdem c.
12. post medium.

ἀντὶ τῶν φάρυγγα σωματίων, id est, eorum corporum, quæ in faucibus sunt. Vel (pro-
ut aliàs^r nominis uim, rationemq; ueſtigans, ait.) τῶν κατὰ τὸν ἰσθμὸν χωρίων, hoc est,
locorum in isthmo existentium. siue ad isthmum attinentium. Huiusmodi autem loca ad isth-
mum attinentia scire nequimus, nisi quid per isthmum in animali, homine^{ue} intelligendum,
ueniat, prædeterminatum sit. Dicitur enim ἰσθμίου à præpositione ἰσθμίου quod
est, Latine ἰuxta ἰσθμίου quod angustum quendam, ut uidebimus, locū. siue me-
um significat. q. d. ἰuxta isthmū. Nominatur ergo pariſthmion, διὰ τὸ παρακείσθαι τῷ
ἰσθμῷ, id est. quoniam isthmo adiacet. Per isthmum autem nūc (subdit Galenus) in-
telligere oportet τὸ μετὰ τὸ σωματὸς τε, καὶ τὸ σωμαχοῦ μέρει, hoc est totū illud, quod
oris, stomachi, gulæ^{ue} intermedium est. per metaphoram quandam ita nominatum, ab
ijs, qui propriè dicuntur isthmi. sunt autem angusti quidam terræ transitus inter duo maria
sitæ. Quemadmodum adeò cuius, uel humanarum literarū candidato apertissimum est, ut
isthmum aut Achaicum, Corynthiacum^{ue}, aut Thracium declarare, pedagogi potius, q;
Medici munus esset. Quoniam igitur isthmorum terræ instar, angustus quidam meatus est,
locus^{ue}, per quem cibus transit, propterea totus ab ore exordiens, ad stomachi gulæ^{ue} prin-
cipium usq; isthmus à Galeno nuncupatus est. Ut scilicet utrinq; ueluti profundum pelagus
imaginemur: hinc quidem extra os, inde uerò in uentriculi fundum deorsum descendentes.
Itaq; hoc pacto cum sumpserit Galenus isthmion: partes ad isthmū attinentes, et iuxta isthmū
positas eas intellexit, quæ huic spatio, meatuiq; superiacent, atq; circumpositæ etiā sunt. Qua
de re seipsum elucidare cupiens Galenus, has partes ad isthmum attinētes, in quibus pariſth-
mia fiunt, ostendit: sic subdens. Hæc autem pariſthmia sunt nonnūq; scilicet tunicæ com-
munis uentri, ac gulæ, stomachi, totiq; ori, inflammationes, nonnūq; uerò subiectorum
ipsi musculorum tuncq; uelut anginae principium dici potest. de qua deinceps sermo pro-
prius habendus est. Quoties igitur aperto alicuius ore, fauces, palatumq; ac demum quicquid
meatui quidem adiacet, inflammata esse apparent: hunc hominem pariſthmia pati, proferens
dum, ex Galeni monumentis, est. Quamq; non me latet, isthmo etiam à Galeno, præpositum
omni uentri angustum collum, assimilari. quod nihilominus generico nomine stomachum nun-
cupari ait, Quomodo meatus ad expurgandam tūm flauam, tūm atram bilem commodos
appellauit. Quod uerò nonnulli aiunt, isthmi scilicet nomine, uel fauces, uel ipsum gargareos
nem intelligentes, tametsi uerum esse ad cuiusuis placitum queat. A Galeni tamen mente (ut
patet) remotissimum est. Huius enim sententia ex præcedentibus manifesta, fuit, pariſthmia
tunicæ communis uentri, gulæ, faucibus, atq; ori, nonnūq; uerò musculorum huic tunicæ
subiectorum inflammationes esse: neutiq; porro glandularum, prout quidam ex Galeno in-
terpretari conantur. Harum namq; inflammationes, quemadmodum prædiximus, antiadas
nuncupari Galenus idem uoluit. ἀντὶ τῶν ἀντικείσθαι ἀμύλοις, hoc est, ab eo q; sibi inuicē
oppositæ sunt. Qua de re Galenus etiam pariſthmia, antiadas alibi non semel tanq; dis-
uersos affectus enarrauit. Interpretes uerò nonnulli pariſthmia tonsillas uertūt, antiadas Græ-
co nomine uocantes. Nonnulli autem contrā, has quidem, tonsillas, illa uerò, Græca uoce, pa-
riſthmia nobis interpretantur. Atq; alij demum tam pariſthmia, q; antiadas nomine tonsillarū
in Galeni traductionibus appellant. Adeò ut miram legentibus obscuritatis confusionem in-
ducant. Verum enim uerò quanuis hæc duo nomina in præassumptis, atq; alijs q; plurimis Ga-
leni

leni locis, diuersarum iā prædictarū partiū affectus, inflāmationes ue, non ipsas particulas, particulari ue integrari substantiā præferant. Nōnunq̃ tamen ab eo etiam, paristhmia particulā ipsam, et nō morbū ostēdere, facillimē elicere possumus. Quēadmodū ubi de glandulis
 „ pro alimētōrū usu loquebatur. Sic enim ab ipso scriptū legimus^a } Sunt autē et circa larynz
 „ ga, et pharynga huiusmodi quādam glādula sicut & in mesenterio uerūm hæc quidē sunt
 „ exiles, eoq̃ uulgus ipsum latēt. Quæ autē, καὶ τὰ τὰ παρ' ὁσμᾶ, καὶ τὸν λάρυγγα hoc est,
 „ secundū paristhmia, & laryngem, magnæ quidem sunt, ac conspicuæ, etc. } in quibus Gale
 ni uerbis, paristhmia pro loco, & non pro morbo sumi, apertissimum est. Perindē ac Heræ
 stomaticum ex besasa referens, etiam Galenus idem ait^b } Στοματικὴ ποιεῖται πρὸς
 10 συνάγχας, καὶ φλεγμονὰς παρ' ὁσµῶν; quod est, } Stomatica (compositio scilicet) fa-
 ciens ad anginas, & inflāmationes paristhmiorum, etc. } Vbi pro loco, & non pro morbo
 paristhmia sumpta fuisse perspicuum est. Quāq̃ pluriēs, uel in eodem libro, pro morbo
 capium nomen legimus. Quēadmodum igitur paristhmia pro loco etiam, particulā ue iuz
 xta isthmum existente, nonnunq̃ in Galeni quoq̃ monumentis leguntur. Sic & antiadas pro
 glandulis ipsis contra se inuicem oppositis aliquandō capi absurdum non est: Quāq̃ Gale
 ni locus impræsentiarum non occurrit, Vbi pro parte antiadas, perindē ac de paristhmijs
 præscriptum est, usurparit. Verisimile tamen est apud eū inueniri, uel saltem id minimē ne
 gari. Cū & nominis ratio prius congruat, nullamq̃ repugnantiam occludat: deinceps ue
 rō & suus Hippocrates usus fuerit, ac post eos, ab Aetio comprobetur. Hippocrates enim

20 sic aliquandō scribit^d } Αντιάδες δὲ καὶ ὑπογλωσσίδες, καὶ ἑλᾶ, καὶ γλωσσοί, καὶ ὅσα
 „ τοιαῦτα τὰν τῆ πεφνηνῆ, τὰν τῶν νοσέει ἀπὸ τοῦ φλεγµατος } quod est } An
 „ tiades (inconstans interpres tonsillas uertit) & partes sub lingua, et gingiuæ, et lingua, et
 „ quæcūq̃ huiusmodi hoc loco consistunt, hæc omnia ex pituita ægrotant. } Quo in loco antiadas
 pro loco, & non pro morbo sumpsisse Hippocratem liquet: Quāq̃ nonnulli minū rectē cō
 siderantes, pro morbo, ex Hippocratis intentione, intellexerint. Pro quo nihilominus morbo
 „ deinceps sermōnem rursus habens, intellexisse apparet. Quū sic ait^e } ἢν ἀντιάδες γένων
 „ ται, συνοιδέει ὑπὸ τῆν γνάθον ἐνθεν, καὶ ἐνθεν, καὶ φανόμενον σκληρόν ἐστὶν ἐξω
 „ θεν, καὶ ὁ χερσὶ ἐὼν φλεγµαίνει } quod est } si Antiades (tonsillas inconsultē idem in
 „ terpres uertit) fiant generentur ue, intumescunt sub maxillis ab utraq̃ parte: & ad cons
 rium.

30 tactum foris durum utrobq̃ sentitur, & Gargareon inflāmatu est. } Nulli profectō du
 bium esse debet in his uerbis Hippocratem antiadas pro morbo accepisse. Sicut autem antia
 des pro particulis interdū glandulis ue, interdū uerō pro morbo sumptæ apud Hippos
 cratem leguntur: Ita etiam paristhmia. Quāuis enim hic in aphorismo, f de affectu intelle
 xerit. In libro tamen de dentitione sæpenuerō pro parte loco ue morbi paristhmia pronun
 tiasse compertum est. Quo tamen in loco, ueluti & in aphorismo, & alijs fortasē pluribus
 locis, non aliam partem hoc nomine intellexisse, uerosimilius est, q̃ ipsas utrinq̃ positas glan
 dulas, quas ab eodem Antiadas alibi nuncupatas esse præostendimus Etenim libro de glan
 „ dulis & ita scriptum offendimus } collum ab utraq̃ sui parte hinc & inde adenas, glanduz
 „ las ue habet: καὶ παρ' ὁσμᾶ καλέονται αἱ ἀδένες αὐταὶ, hoc est, & paristhmia uocan
 tur hæc glandulæ. } tonsillas idem interpres Latine conuertit, qui et Antiadas alibi tonsillas

40 uocauerat. In Aetij tamē (ut uidebimus) translationibus, paristhmia tonsillas, b antiadas uerō
 glandulas

a lib. 3. de alimē
 torū faculi. ca. 6.
 ante mediū.

b lib. 6. de cōpō.
 med. secūdu loca.
 cap. p^o. uersus fis
 nem. sec. in Latis
 nis. 15.

c Vt i eodē capi
 te. sec. 6. & 7. et
 lib. 7. cap. p^o. sec.
 ult^a. post mediū.
 & sæpē.

d lib. 2^o de moro
 bis, sec. 6.

e In eodē lib. sec.
 13 secūdu tradue.
 Cornarij

f 3. aphor. apbo
 rismo. 26.

g Ante mediū
 libri.

h lib. 8. cap. 4. s^o
 46. 49.

i. ibi dē cap 48. glandulasⁱ interpretatus ē, tonsillas à glandulis differre opinatus. Præsertim cum in an-
 k. super cap p^o notationibus in sextum Galeni librum de compositio. med. secundum loca, k Galeni sen-
 uersus finem. tentiam^l de paristhmiorum nomine transcribat. Quam ob causam antea inconstantem,
 l. 3. apho. cō. 26. Cōtra Galen. & inconsultum nominauimus. Iam iam ergo prædictus Hippocratis locus Galeni com-
 m. ut libro de mentum destruit. quum paristhmia affectum, in alia parte, q̄ in huiusmodi glandulis
 glandibus. & de obortum, uel si pro loco morbi nonnunq̄; sumpsit, alias corporis particulas, & ab
 dentitione. uer- hisce glandulis diuersas, uel ad Hippocratis intentionem, huiusmodi nomenclatura in
 fus finem. n. ut. 3. lib. apho- tellexit. Hippocrates enim (ut ex eius uerbis ostendimus) uel glandulas utrinq̄; in
 ris morum. 26. o. ut. 2. libro de faucibus existentes, m uel in ipsis iisdem glandulis affectum, phlegmone'ueⁿ uoluisse ap-
 morbis sec. 6. paret. Quemadmodum & antiadas nonnunq̄; easdem (alia licet ratione) glandulas: non
 p. ut ibidem. nunq̄; p uero scirrhosam phlegmonem, durum'ue in eisdem adenibus genitum affectum no-
 sec. 13. minasse compertum est. Cuius intentionem exquisitiū inter Latinos Celsus, inter Græ-
 q. libri. 4. cap. p^o. post prin^m. cos aut Paulus, q̄ Galenus concepisse apparent. Celsus enim quas, communi interdum^q no-
 r 2. p^o. uersus mine, glandulas uocat: Inde q̄; eodem partis nomine, Hippocratis more, in eius aphorismi
 finem. t. 6. x^o. in prin relatione, r glandulas etiam nuncupat. specialius tamen interdum^t ipsas, quæ afficiuntur par-
 cipio & 7. 12. tes, glandulas'ue, Tonsillas (diminutiue à tolle, seu tole tumorem quēdam significante)
 sec. p^a. uersus finem. nominat. Quo etiam nomine tum eloquentiæ parens Cicero, x tum aliquando Plinius, ac
 u. lib. 2. de nā reliqui deinceps ad earundem partium significationem usi sunt. ut Marcellus Romanus y
 Deorū uersus finem. alyq̄; demum ad nostram usq̄; aetatem. Nonnunq̄; uero Celsus eodem partis nomine affe-
 x. lib. 11. ca. 37. ctum intelligit. z Quo etiam pacto sæpenumero Plinius, ac illi quoq̄; ascriptus liber, b usi
 post mem. & 20 sunt. Affectum dicimus cum Celso phlegmonem, prius tamen, q̄ induruerit. Tonsillæ,
 cap. 20. post prin autem, quæ post inflammationes induruerunt (idem Celsus c ait) ἀντιάδες à Græcis
 cipiu, & sæpē. appellantur. Celsus ergo antiadas induratas esse phlegmonem tonsillarum, hoc est glandu-
 y. lib. p^o. de me dicamētis cap. 11 larum ceruicis (uti diximus) intelligit. Atq̄; idipsum ex Hippocratis d iam monumentis ele-
 & 15. gimus. quemadmodum & hasce glandulas, tonsillas'ue ab Hippocrate paristhmia nonnunq̄;
 z. ut p^l. lib. 5^o. uocatas esse ostēdimus. Paulus quoq̄; ab huiusmodi sententia deriuasse nō uidetur. Qui qdē
 a libri. 20. 9^o. libro tertio f paristhmia pro partibus affectis sumēs, deq̄; paristhmiorum inflammatione lo-
 . 14. 17. = 22. quens, non alias partes intellexisse apparet, q̄; toties repetitas glandulas: Antiadas interim
 17^o. 25. = 23. 6. earundem partium induratas esse phlegmonem definiens, his uerbis ξ ἐστὶ δὲ ἀντίας ὄγκος
 7. = 24. 7. 14. οὗτος ὁ ὄγκος τῶν παρισθημίων; quod est ξ Antias autem est tumor durus paristhmiz
 16. = 28. 4. 12. orum; Quod autem Paulus paristhmiorum nomine prædictas intellexerit glandulas, ex
 & sæpissime. b. p^o de re med. libro sexto & clariū liquere potest. ubi etiam modum generationis antiadum elegimus. c
 cap. 45. & 4. Quum sic ait ξ Quemadmodum indurescentes glandulæ, choerades strumæ'ue appellantur: d
 eiusdem 40. Ita ēt paristhmia inflāmata, et supra naturalem modū aucta, et ueluti desiccata, deglutitioni e
 c. 7. ca. 12. sec spirituiq̄; difficultatē exhibentia, ξ ἐναντίας ἀλλήλων πεταγμένα, ἀντιὰδες ἐκλήθησαν f
 p^a. circa finem. d. ex. 2^o. lib. de hoc est, ē regione utrinq̄; sibi inuicem opposita, antiades. q. d. contrapposita uocatur ξ In idem
 morbis. sec. 13. f. cap. 26. uer- ergo tam Celsus, q̄; Paulus tendere uidetur. Cumq̄; nec Paulus Græcus Celsum Latinum
 e. lib. de glandi- fus finem. g. cap. 30. legerit, neq̄; Celsus longē uel Galeno, nedum Paulo uetustior hunc uidisse potuerit: utrūz
 bus ante mediū. Obiectionis. q̄; ab Hippocrate, uel alio fortassis Græcorum prisco authore collegisse uerisimile est. Sed
 f. cap. 26. uer- Solutio. ne obstat quidem, quod Paulus paristhmia à glandulis, quibus interim comparat, in præas-
 fus finem. sumptis uerbis distinxisse uidetur. ut hinc fortasse quispiam eligat, paristhmia glandulas
 g. cap. 30. non esse

- non esse, apud Paulum. Etenim triplex cum sit glandularum genus in ceruice consistentium: Triplex glā-
- 1^m.** Quod quidem alterutra ex parte ad laryngis radicem adnatum est, magnum, fungosum, dularū genus carnisq; propemodum colore, sed magis interea nigricans, & uenis satis conspicuis obdu- in collo.
ctum, ut humore meatum asperæ arteriæ imbuat, eoq; uiscido, & pingui, ad uocis per-
fectionem à sapientissima natura constitutum, intus latet: proptereaq; siue inflammetur, si-
ue quouis alio modo intumescat, nullum speciale morbi nomen sortitum est. Reliqua igitur
cōsiderans Paulus, id ipsum præterisse uisus est. Cum duo autem sint: alterum nomine pro-
prio, paristhmia, uel ex Hippocratis ^b sententia, nuncupans: alterum quod in exteriori- ^{b lib. de glandu}
bus magis consistit, generis nomine, proprium desiderans, appellauit. Sunt autem alte- ^{lis. ante mediū.}
- 2^m.** rius generis glandulæ, quæ paristhmia nuncupant, elatius quàm primum genus antea
declaratum, ipsi laryngi appositæ. Quippè in spatio, quod nobis hiantibus medium in-
ter narium foramina, & laryngis apparet, utrinq; in lateribus una reponitur glandula,
utrunq; insignis, & glandi forma perquam similis. Oblonga enim est hæc glandula, &
secundum longitudinem sursum, ac deorsum exporrigitur. Cuius figuram rotundioribus
amigdalas quidam assimilantes, præsertimq; dum præter naturam tument, quas Græco-
rum plurimi, uel paristhmia, uel antiadas nuncuparunt, Latiniq; tonsillas, hi nihilomi-
nūs amigdalas nominarunt. Est autem huiusmodi glandularum (Galeno ⁱ docente) usus, ^{i 7^o de usu par-}
ut saluam procreantes asperam arteriam, atq; unā stomachum quoq; cum tota oris am- ^{tum. 13. circa fi-}
plitudine, humectent, non ad uocis modum, respirationisq; sed ad deuorationis etiā facilitatē, ^{nē. 27. 11. eius-}
ac sermonis elegantia cōmodissimæ. Alterum uerò glandium genus, quod deniq; tertium est, ^{dē cap. 10. uersus}
eorū, quæ intus in ceruice cōsistunt, aliqñ inguinū, & axillarū glādibus, tū natura substā- ^{medium.}
tia ue, tū officio, respōdens, cavitates omnes exacte implet, uasorūq; diductibus, distributioni-
bus ue præficitur. Quocirca numerosum est, sub auriū radicibus, et uniuerso spatio inferiori
maxilla cōscripto continetur. Nullo tamen (ueluti prædictū est) peculiari donatū est nomine.
de quibus quidē oībus alibi uberiūs, atq; opportuniūs sermo fiet. Nūc. n. sat superq; dictū sit,
quatenus ad propositum spectat. Quā ob rē Paulus (ut ad principale reuertamur) generis no-
mine usus, in ijs choeradas, strumas ue, in alijs uerò (quæ paristhmia speciatim nūcupauit) an-
tiadas, ob adeptam præternaturalē duritiem, generari protulit. Quod autem magis (mea qui-
dem sententia) obesse legentibus poterit, præsertimq; tyronibus, & ijs, qui Græcarum lite-
rarum expertes sunt, interpretum confusio est. Etenim Andernacus in eodem capite, tā pa- ^{Cōtra Ander-}
risthmia, q; antiadas Græcè à Paulo prolatas, Latine tonsillas, absq; ulla considerandi distin- ^{nacum.}
ctione, conuertit. In titulo enim capitis, in libro sexto, ^k ubi Græcè habetur {αντιαδων} ^{k cap. 30.}
ille traduxit {De tōsillis} Mox uerò deinde, quū Græcè Paulus ait {το παρισθημα φλεγ-
μενον} ille conuertit {tonsillæ inflammationē expertæ} aded ut tam antiada morbi nomen,
quàm paristhmia, glandularum uocem, tonsillas Latine appellarit. Quod autem magis pau-
perculos legentes confundat, rursus contra se inuicem positas inflammationes duras, antiadas
à Paulo uocatas, non solum tonsillas nūcupat, sed proprio interim Marte, absq; ulla penitus cō-
sideratione, addit illa uerba {eodē partis uocabulo tonsillæ, Græcè antiades uocantur} Græ-
cè autem duabus dictionibus id totum Paulus expleuerat, dicens {αντιαδες εν ληθιστον} ³⁰
quod est. {antiades uocantur.} Cum ergo iam antea partem, tonsillas, nominauerit, dum ait ⁴⁰
{tonsillæ inflammationem expertæ} deincepsq; dicat {eodem partis uocabulo, tonsillæ uo-
cantur}

cantur, Græcè antiades; de partium affectibus tunc temporis loquens, Quis est, siue Latinus, siue etiam Græcus (modò Græcum Paulum desideret) qui partem etiam ipsam antiadas nominari non eligat? Eodem partis uocabulo, tonsillas. s. Græcè, antiadas, uocare Paulum intelligens. Nullum n. signum est, quo non Pauli, sed traductoris uerba esse illa; eodem partis uocabulo; cognouerit. Sed ne Albanus quidem ille Torinus ab eiusmodi confusione excusari, uel in reuusa, recognitaq; traductione, potest. Quauis enim libro sexto¹ Pauli enarrans, antiadas duntaxat, tonsillas Latine uocarit, parisstomia, interim Græcum nomen usurpans. Volumine tamen tertio^m id minimè obseruarat, ubi parisstomia Latine tonsillas uertit, antiadas uerò Græcam uocem accipit. Quam porrò inconstantiam in omnibus ferè Græcorum interpretationibus inuenies. Quauis enim Cornarius æquiocationem effugere non nunq; cupiens: Aetium uidelicet enarrans, parisstomia, Latine, tonsillas, antiadas uerò, Latine glandulas^o nuncuparit, ad Aetij mentē aliquatenus se dirigens: Nihilominus tamen Hippocratem alibi ad Latinum conuertens, tam parisstomia, q; antiadas, Latine tonsillas traxit glandula uocē reticens. et si utraq; dictio, apud Hippocratem, et glandulas, et glādularū affectus præseferre solita est. Tutius ergo est, ut cuiusq; Græci Authoris intentionem, rerum differentias præscribere queamus, ipsis met Græcorum nominibus uti, q; uel miseros legentes in tot, tantasq; æquiocationes præcipitare. uel homines aliquandò glandularum uoce in suam transmutare. Admonente uidelicet Plinio, in homine tonsillas, in sue uerò glandulas nuncupari. Sed ne Brasauolo^b quidem confidas, Alexandri testimonium adducenti, antiadas scilicet, atq; parisstomia locū præseferre. Nam Alexander nullibi ne per somnium quidem ea uerba scripsit. uerum meræ nugæ Albani Torini sunt, plurima in Alexandri uersione: quemadmodū & in ea Pauli Aeginetæ, quam primitus in lucem ædedit, ex suamet ipsius phantasia ineptissime, ut omnis fidei interpretibus necessaria iam expers, adiunxit. Id quod ex Græco, & noua Andernaci uersione liquet. Verum enim uerò dimissis interpretū confusionibus, ad germanas Græcorum intentiones conuertamur. Suisq; ipsorum proprijs ex uerbis, nominum, ac deinde rerum differentias adnotemus. Galenus ergo (ueluti præscriptum iam est) parisstomia locorum ad isthmum attinentium, antiadas uerò adenum hinc et inde contrapositorum phlegmonas esse definuit. q; pro ipsis etiam partibus nonnunq; capi posse inficias non iuit. Quæ Galeni parisstomia à ueteribus illis Romanis sub faucium dictione comprehensa esse opinor. Id quod à Marcello etiam confirmatur. dum sic scribit^a ad faucium tumorem, & dolorem, qui Græce dicitur parisstomia. etc. & faucium ergo tumorem cū dolore à Græcis parisstomia nuncupari ait. Paulus autem parisstomia eiusmodi adenum partium nomen esse, antiadas uerò in ipsis factā ex inflammatione duritiem insinuat. Paulus à Galeno discrepantia duplex. loq; tam Hippocratem, q; Celsum astipulari demonstrauimus. Cui tamen baud assentiret Galenus, qui parisstomia, etiam si particulam significare nonnunq; admitteret, diuersam tamen hanc esse à prædictis glandulis contenderet. Nec antiadas scirrhum affectum, at simpliciter earum glandularum phlegmonem definierit. Aetius autem fidelior hac in re Galeni æmulus, quàm Paulus est, quanquàm & is à Galeno quadantenus recedere uidetur. In eo siquidem Galeno conformis est. quoniam diuersas particulas, parisstomiorum, atq; antiadum uocibus intelligit. Parisstomia enim partes prope antiadas, glandulas uel, consistentes uoluit. Haud tamen uniuersam faucium tunicam, uel huic subiectos musculos, cum Galeno

^a De medic. c. 35
in medio.

Pauli à Gale
no discrepan
tia duplex.

^p^a.

²^a.

Galeno intellexisse apparet. Quam ob rem diuersa capita scripsit, de paristhmiorum inflam-
 mationibus, pestilentibusq; & crustosis eorundem ulceribus, atq; affixis in paristhmijs
 spinis, à capite de antiadibus. Quo nomine præstensas glandulas intellexit, sic dicēs
 nibus hominibus carunculae quædam exiguae, secundum naturam, iuxta utrunq; paristhmio-
 rum existunt; quod autem subditur & antiades Græcis, Latinis glandulae appellatae. & non
 Aetij, sed Interpretis uerba sunt. Sequitur uerò Aetius & Hæ, s. carunculae dum naturalem
 seruant mensuram, nil molesti inferunt. Verum ubi iuxta affectionis proprietatem augecāt,
 modi q; maioris, q; secundum naturam suam, fiant: tunc sanè & transglutionis, & spiraz
 tionis difficilis causæ existunt. In quibus uerbis etiam si huiusmodi caruncularum nomen
 minime prouulerit: id ipsum nihilominus deinde insinuat: ita q; primum subiungens: Diducto
 itaq; ore, manifestè apparent τὸν ἀντιὰδον ὅ γινεται, quod est, antiadum, siue (ut interpres
 uertit) glandularum tumores. Itaq; non semel in eodem capite repetitum est. Vbi continuò
 Cornarius, antiadas, Latine glandulas nominauit. Id ergo, penes Aetium, particularum à pa-
 risthmijs diuersarum nomen expressum est. Qua in re conformis aliquantulum Galeno est.
 A quo tamen recessit, antiadas, & paristhmia partium potius, q; morbi uoce exprimens. Mi-
 nimus uerò hic lapsus est. Cū ueluti Galenus antiadas pro partibus admitteret, ac nulla pror-
 sus calūnia tali nomine huiusmodi carunculas donaret. Quin de paristhmijs nonnunq; ab eo ser-
 uatum præstendimus. Ita etiam contra Aetium q; libentissimè, ut Galeno complaceret, affe-
 ctus quoq; ipsdem partium nominibus uocasset. Quod autem longè maioris momenti est, &
 in quo magis à Galeno differre uidetur id ipsum est. Quoniam, s. Galenus antiadas nō aliud, Obiectio.
 q; eiusmodi adenosarum carniū inflammationes esse ait, Aetius uerò, quanq; aliquandò in-
 flammationem pati antiadas admisit: Maxima tamen ex parte (sic. n. ibi capio, & ἐπιπλεον) Solutio.
 absq; inflammatione paulatim increfcere declarauit. Sed enim uerò hanc sedare discoliam, fa-
 cillimum reputo. Siquidem exquisitè aduerterimus, Aetium non morbi nomen, sed (quem ad
 modum prædictum est) caruncularum supponens, Antiadas interdum inflammari, sæpius
 autem absq; ulla inflammatione, præter naturam intumescere determinauit. Galenus uerò nō
 partē affectā, sed eius duntaxat inflammationem antiadis nomenclaturā intellexit. Adeo ut
 in nomine potius quàm in rebus ipsis differentia sit. Verum ne Arabes obliuiscamur, horum
 Princeps, galsamac, siue cum articulo, algalsamac, & galsamati, Arabicis dictio-
 nibus, Galeni paristhmia, eam scilicet partem, quæ ab antiadibus diuersa, iuxta Galeni
 sententiam, intelligitur, significasse uidetur: Antiadas uerò, duas amigdalas, interim nomi-
 nat² utrobq; particulas magis, q; affectus huiusmodi nominibus intelligens. Sic igitur prius
 utrinq; positas glandulas definiuit. & Duæ uerò amygdalæ sunt duæ carnes natæ in radi-
 ce linguæ, tendentes ad superiora, ac si ipsæ sint ei auriculæ paruæ. Et sunt carnosæ, neruo-
 sæ, sicut duæ glandulae: ut sint fortiores, etc. Deinceps autem paristhmia, uel saltem eorū
 potiorē partē, galsamati nomine definiuit: dicens & Algalsamac uerò est caro panniculosa an-
 nexa palato, sub uua pendēs, cooperiens caput cannae, sicut arca, etc. Hali Abbas itidē antia-
 das, amygdalas nūcupat: sic etiam Mesuas, & Ac reliqua deinceps Barbarolatinorum om-
 nium Medicorum grex appellat. Paristhmia uerò sub gurgulionis uoce, & operimēti, quod
 gurgulionē guttur, & pulmonē uestit, Hali Abbas intellexisse apparet. Calidū uerò tumo-
 re esse utrunq; paristhmia, s. antiadasq; (iuxta Galeni dogmata) ex prænarratis cōpertissimū
 est.

lib. 2. cap. 4. s.
 1. Ibid. cap. 4. 6.
 2. Ibid. cap. 50.
 3. Ibid. cap. 48.

9. 9^a. fen. 3^a. cap.
 p^o. & 10.

2. Ibid. & cap.
 12. 19. & 17.

a. Ibid. cap. p^o. i
 medio.

b. Ibid. uersus
 finem.

c. 9^a. Theor. c. 18.
 circa prin^a et 9^a.

praef. cap. 36.

d. De ægri-
 tudinis part. 2^a.

sect. primæ. sum.
 p^a. cap. 4.

est. Quoniam nil aliud, q̄ phlegmonas esse definitum ab eo est. Etiam si non semper ex sanguine, sed nonnunq̄ ex putri iam, inflammataq̄ pituita generatione susceperint. Penes Paulum uerò, atq; ipsum quoq; Aetium, nec non Celsum, Antiades nonnunq̄ cessante penitus inflammatione perdurantes, ad scirrhosum, ac per hoc, frigidum tumorem, tunc temporis reduci, & quidem appositè, poterunt. NOS uerò interim ad polypum accedemus, tumorem

Tumor. 58.

Polypus.

e 2^o meth. c. 2^o.

f 3. de cōp. med.

secūdu loc. ca. 3.

Polypi simili-

tudines. 4^o.

g lib. 6. c. 90.

h uersus finem libri.

i lib. 6. cap. 3. in fine.

k cap. 24. post principia.

l ca. 25. i prin^o.

m. 9. Theor. c. 15.

n 6^o. 8. et. 7^o. x^o.

o de Medic. ca.

10. 11. 20.

p cap. 51.

q lib. p^o. ca. 25.

r cap. 54. De co-

lubrina.

b p^o. lib. ad Ti-

motheu cap. 11.

Pauli et Ha-

li Abb. locus.

s 2. li. Breu. c. 13.

t 9. Theor. c. 15.

u 5. Praef. 29. et

9^o. eiusdem. 32.

x. sec p^a summa

p^a. cap. 6.

y lib. Diuis. cap.

42 in titulo, et 3.

Cōtin cap. 2. litz-

ra. N. sēpē.

z ut. 9. ad Man-

forem. cap. 29.

a 5^a. fen. 3^o. tr. 2

cap. 11.

b In interpret.

Arab. nominū. lis

era. A.

uidelicet ordine propositum quinquagesimum octauum. Is enim in interna parte nasi abortus tumor est, à Græcis πολυπύς quoq; dictus, à similitudine (Galeno^o etiam docente) quam cū polypis marinis animalibus præsefert. Ita enim ab eo f. definitur: Quod. f. Tumor est præter naturam, in naribus genitus, polypi carni assimilis, secundum substantiæ proprietatem. Quæ autem sit huiusmodi substantiæ proprietas, à Galeno minime exprimitur: ab Aetio^o autem enucleatur, dum hanc Galeni definitionem exscripsit. In colore. f. ac ουσΑΟΕΙ, hoc est, p^a. consistentia, seu compage. Adeo ut huiusmodi carneus tumor, intus nares abortus, albidus, uel interdum subflauus, aut fortè subrubeus, mollisq̄, ac aliquo modo fluidus, & nonnunq̄ extensionem, nonnunq̄ uerò quandam contractionem recipiens, marinorum polyporum carnis substantiam, tum colore, tum consistentia repræsentet. Hinc ergo, iuxta Galeni sententiam, ab Aetio (ut uidetur) declaratam, similitudinis ratio desumpta est. Definitionum uerò Medicarum Author^h duas alias similitudinum rationes, præter carnis substantiam, adiunxit. uidelicet quoniam sicut maritimi polypi multos habent ramos, propagines ue, aut (si mauis dicere) pedes, unde à Græcis πολυπόδες, quasi dicat multipedes nominantur, Ita et hic tumor usquædè nonnunq̄ per subiectos naso anfractus, cuniculosq̄, in ipso etiā cribroso osse protenditur, ut ad fauces usq̄, sæpenuerò descendat: ac ueluti nouus ibi garareo appareat, hominemq̄ (uti ex Celso^o postea uidebimus) aliquando strangulet. Quam ob rem & plurimas germinationes, ramosq̄ adeptus, multiples (polyporū instar) apparet. Aliamq̄ similitudinem prædictus Definitionum Author adiunxit. Quoniam. f. illorum animalium ritu, hic tumor, suis cum propaginibus, ac ueluti quibusdam cruribus augetur. Paulus demum, etsi libro tertio^k nil aliud, q̄ Galeni definitionem refert: libro tamen sexto, ultra substantiæ proprietatem, aliam quoq; similitudinem considerauit. Quam hic ut quartam adiungere possumus. Est autem illa & quoniam ueluti maritimus polypus proprijs cirrhis piscatores ulciscitur, manus ipsorum comprehendens (deprauatè enim legitur in Andernaci uersione, atq; in Hali Abbate^m Paulū transcribente, nares, loco, manus.) Ita & huiusmodi affectus ægro tantum nares obstruit, difficultatem inde tum respirandi, tum etiā loquendi exhibens. Quæ tuor ergo prædictis de causis, nomine à similitudine desumpto, hic tumor polypus. q. d. multipes dictus est: non à Græcis modo, sed à Latinis etiam omnibus. Sic. n. & Celsus, ⁿ Marcellus, ^o Scribonius Largus P, Plinio ascriptus liber, ⁴ Aemilius Macer, ⁷ Theodorus Priscianus^b alyq̄; deinceps hunc tumorem nuncuparunt. Sic etiam apud multos Arabes inuenimus: ut Serapionem, ⁵ Hali Abbatem^c (quanq̄ is aliquando, ^u generali contentus nomine, carnem in naso superfluam nuncupat) Mesuem, ^x atq; ipsum quoq; Razem: ⁷ tametsi nonnunq̄^z et hunc & hæmorrhoides^z nominasse inuenimus. sub quo nomine Arabum quoq; nostrum Principem^a intellexisse huiusmodi affectum liquet. Qui tamen aliā speciem huic similem posuit, quam uocat Arabicè & alarbian^z; corruptè in ueteri traductione & alarnabet^z; siue & alcarnabet^z; Est autem alarbian, ut scribunt (Bellunensis^b relatione) Arabes, sicut Ebenefis, & alij,

„ alij, animal aquaticum declinans ad colorem citrinum. Et dicitur etiam q̄ est species *stincor-*
 „ rum. Et dicitur etiam de carne molli addita in naso, quæ cōuenit cū hæmorrhoidibus. *Quanz-*
 „ uis Princeps non definiat, in quo ab hæmorrhoidibus differat, uel cum ijs conueniat. Ex eius
 „ tamen uerbis, in eo quod maius est, ac minus, differre collegimus. Quoniam dicens de hæ-
 „ morrhoidibus ea, quæ iam polypo insunt: v3. q̄ i quandoq; elongantur, & fiunt hæmorrhoi-
 „ des pēdētes: & quandoq; elongantur, adeo q̄ ex naso agrediuntur, & palato. } statim duos
 „ rum affectuum congruentiam subdit: dicens { Et omnes medicinae, quæ conferunt alarbian,
 „ conferunt hæmorrhoidibus } differentiam uerò insinuat, quū adiungit { Et quandoq; ne-
 „ cessarium est, ut frangatur earum uirtus. } per hæc me Hercle uerba, ualidioribus indige-
 „ re medicamentis alarbian insinuans, q̄ hæmorrhoides. Cū in hæmorrhoidum curatione
 „ interdum oporteat medicamentorum uires imbecilliores reddere. Quicquid uerò sit, ad Pauli
 „ sarcoma redducendum fore alarbian arbitramur. De quo quidem post hæc loquemur. Ab
 „ Arabibus uidelicet expediti. Albucasis^c ergo scorpionum multorum pedum, quem uestigaz^c lib. 2. cap. 24.
 „ mus, tumorem assimilauit. Fortassis autem, cū dicat multorum pedum, non scorpionem,
 „ sed polypum, suo idiomate uolebat. Quod si scorpionem intellexit: quò ad pedū multitudinē,
 „ uerus fieri eius sermo potest. Quāq; id à uetustioribus tam Græcis, q̄ Arabibus, ac Lat-
 „ nis alienum est. At omissa nominum disquisitione: ad ea, quæ maioris momenti sunt, peruenia-
 „ mus. Etenim Galenus, Alexāder,^d Definitionū Medicarū Authōr, Paulus, Aetius, cæteri q̄;
 „ demū & Græci, & Latini, atq; etiam Arabes, in plures distinguere species polypū mi-
 „ nimè curarunt: Nisi fortassis horum aliqui^e dislinxerint quò ad mores. quendam scilicet
 „ mitem, quendam uerò malignum, aut cancerosum quendam, curationiq; rebellem, alium ue-
 „ rò canceris omnis, ac scæuitatis expertem, declarantes. Hippocrates autem, & si in eo libro,
 „ quem { τριπλὸν } inscripsit, f. simpliciter, & tanq; sub una forma existentem polypum
 „ definiuit: libro tamen de morbis 8 in quinq; species dislinxit: singulis interim curationes ac-
 „ comodans. Sic. n. primā speciem exorditur { Si polypus fiat in naso, ex medio cartilaginis de-
 „ pendet, ueluti gargareon: et ubi expirationē facit, progreditur forās, & est mollis: ubi uerò
 „ inspirationem facit, retrocedit: et loquitur obscure, et quū dormit, stertit. } Hæc igitur pri-
 „ ma polypi forma est. Qua deinceps curata, Secundam ijs uerbis describit { Alius polypus.
 „ Impletur nasus carnibus, & ad cōtactū caro dura apparet, et per nasum spirare nō potest. }
 „ Cuius secundi polypi etiam curatione adiuncta, Mox tertium definiuit, dicens. { Alius poly-
 „ pus. Intrinsecus ex cartilagine caro rotunda prominet: quæ ad contactum mollis est. } Sed ne
 „ huius quidem speciei curam reticuit. Aqua statim ad quartam peruenit, subdens. { Alius po-
 „ lypus. Intus iuxta cartilaginē, alicundē durum quid nascitur, & uidetur quidē caro esse. Si
 „ uerò ipsum attigeris, strepitum ædit, ueluti lapis. } Hoc demum sanato, ad quintum polypum
 „ deuenit, sic eum definiens { Alius. Nascuntur ex obliquo cartilaginis, in summo. οἷον νε-
 „ γρίνια, quod est, ueluti cancelli. sc. cancri parui. } Celsus autem sub unica definitione cun-
 „ ctas huiusmodi species comprehendisse apparet. Quū ita polypum definiuit. h { τὸ πολὺν
 „ πᾶς uerò est caruncula modò alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhæret. & modò ad
 „ labra pendens, narem implet: modò retrò, per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces
 „ descendit, adeo increscit, uti post uiam conspici possit: strangulatq; hominem: Maxime
 „ Austro, aut Euro flante: Fereq; mollis est, raro dura: Eaq; magis spiritum impedit,
 „ Z iij & nares

c lib. 2. cap. 24.

d lib. 3. cap. 11.

e Ut Paulus. & Razes. Aui. Has li Abbas. & Alij multi.

f Post principia g lib. 2. sect. 16.

Quinq; Poly portū spēs.

p^a.2^a.3^a.4^a.5^a.

h lib. 6. c. 8. cir- ca finem.

& nares dilatat: quæ ferè *νεκρωδης* est, itaq; attingi non debet. etc. In qua quidè Celsus, si definitione, sub molli primam, & tertiam ex prædictis ab Hippocrate speciebus: sub dura uerò secundam, & quartam: ueluti sub carcinode, cancerosa ue quintam intelligere possu-
 Celsi et Hip mus. Quamq; Hippocrates, uel ex medio cartilaginū, uel simpliciter ex cartilagine: aut iu-
 pocratis cōtra xta cartilaginem, aut demū ex obliquo cartilaginis, originem sumere plures ait. Celsus au-
 dictio. tem narium ossi inhaerere, atq; aliàs¹ ab ossē resoluendum esse polypum docet. Qua de re
 i libro. 7. ca. 12. ab ossē oriri significans, Hippocrati contradixisse uidetur. At ita non est. à cartilaginibus
 Solutio. enim oriri potest: ossibus tamen interea pertinacius inhaerere. Quemadmodum contra, & ab
 ossibus principium generationis recipere, cartilaginibus uerò interim coalescere. Vtrunq;
 igitur contingere impossibile non est. Sed ne Hippocrates quidem à cartilagine semper enas-
 sci protulit: uerū aliquandò iuxta cartilaginem, aliquandò autem ex obliquo cartilaginis,
 nonnunq; absq; ulla penitus cartilaginis mentione, impleri nasum carnis definiuit. In-
 k. 6. 8. u. r. su- terdum uerò etiam in naribus (ait idem Celsus^k) carunculæ quædam similes muliebribus
 finem. mammis nascuntur: Hæq; imis partibus, quæ carnosissimæ sunt, inhaerent. Non determi-
 nat autem Celsus an intus, an extra huiusmodi carunculæ nascantur. Quod si exterius quis
 dem sint: Ea fuerint, quæ Albucasis^l & thelul in naso uocat, uerrucalē substantiam hoc nomi-
 1 lib. 2. cap. 25. ne intelligens (prout ex alijs etiam eiusdem authoris locis^m colligi potest) q; q; Alexander,
 m ut lib. p. ca. Paulus, & Aetius Græcè, θηλας, hoc est, papillas, in capite affectus nominant: prout in præ-
 37. et 2. 8. et ex expositione an- Paulus, & Aetius Græcè, θηλας, hoc est, papillas, in capite affectus nominant: prout in præ-
 tiqua Arabicorū cedentibusⁿ ostendisse memini. Sin uerò intrinsicis huiusmodi carunculas in naribus Cel-
 nominū Auicen sus uoluerit: ad Pauli, Definitionūq; authoris sarcoma reducendæ ueniunt. Sub quo fortassis
 na Tululie. seu nomine prædicti authores omnem carnis intus nares incrementis speciem intellexerunt: quæ
 Thelulie. polypi exquisitam repræsentare formam nequirēt: neq; polyporum instar, usq; adeo pertina-
 n Supra fo. 173. citer inhaereant. Quas tamē (ut uidimus) Hippocrates sub polypi largius desumpta nomen
 linea. 12. 13. etc. clatura comprehendere uoluit. Est autem *σαρκωδης*. q. d. Latine carnositas, eiusdem sub-
 stantia (Paulus^o ait) cum Polypo: carnis uidelicet in naribus præter naturam auctio, quem
 o lib. 3. cap. 24. admodum Definitionum Medicarum author definiuit. Plinius^p narium carnes huiusmodi
 p lib. 34. in fine omnes affectus uocasse apparet. Primā uerò generationis originē sumūt polypi, aut phleg-
 q li. de tu. præ. mone, aut phymate (Galenus^q inquit) aut aliquo germine, uel utcunq; nominare quispiam
 nat. 21. uelit, in naribus constituto. Carneus ergo tumor uterq; est, tam scilicet polypus, q; sarcoma,
 r 3. de cōp. me. carnositas ue. Quia tamen (uti Galenus^r etiam, eiusq; sectator Aetius^s aiunt) ex crassis, ui-
 secundū loc. c. 3. scidisq; humoribus fiunt, Idcirco inter pituitosos, ac per hoc, frigidos, & humidos tumores cō-
 s lib. 6. c. 90. et numerandi ueniunt: præsertimq; de quo impræsentiarum loquimur, polypus. Nisi quoties ad
 92. lapideam duritiem peruenerint. Tunc enim ad melancholicos referendi sunt: frigidiq; ac
 sicci proferendi. quemadmodum ubi usq; adeo irritentur, adustioneq; tententur, ut cancerosi
 t Vi lib. de tum. fiant, ad calidum uergere occipient. Nec obstat quoniam phlegmonodes polypos aliquandò
 præ. nat. c. 21. Galenus nuncuparit. Etenim φλεγμωνώδης intelligo, id est inflammationi paratos, atq; ad-
 modum expositos: ut benè Riccus interpretatus est. Haud uerò q; sint secundū propriā affe-
 ctus essentiam inflammati. Sunt enim ad inflammationem parati, & τὸ χροῖον, hoc est pro-
 pter locum, uidelicet tum ob loci angustiam, tum quia per foramen faucibus respondēs c pul-
 mone perpetim, in quauis expiratione, calor in eam partem emicare consueuit. Sed hæc intan-
 tum, hoc loco, de Polypo, & sarcomate dicta sint. Ad encanthida ergo conuertamur, nonū-

Tumor 59.
 Encanthis.

& quinquagesimum ordine propositum tumorem. Quem sic Galenus¹ definiuit & Encan-
 10 this autem & ipsa, tumor quidam præter naturam existens, in magnis oculorum cāthis angu-
 lis ue fit. & Græcè enim ὤθρι, Latine anguli oculorum dicuntur. Sed hæc quidem Galeni
 definitio tumore esse præter naturam dicit. Minimè tamen exprimit, cuius nam partis in ma-
 iori angulo existentis tumor sit. Subintelligenda igitur hæc pars est: uidelicet caruncula la-
 chrymalis à recentioribus medicis nūcupata. Cuius quidē carunculæ tumor, incrementum ue
 dicta encāthis est. Verum enimuero, pro exquisitori huiusmodi particulæ notione, aduerten-
 dum prius est, duos esse in oculis angulos (Græci ὠθρὶς, uti prædictum iā est, Latini an-
 gulos oculorum, aliquando hircuos per, c, &, q. Et Arabes Almekani nominant) inquit
 20 enim Aristoteles² & Pars cōis superioris, inferiorisq; palpebræ, cāthis angulus ue est. Quem
 duplicem uterq; oculus habet. Alterum iuxta nasum. Alterum iuxta tempora & Priorē uerò,
 canthum, angulum ue maiorem. Secundum autem, minorem, uniuerſa diffecantium, atq; me-
 dicorum academia nūcupat. In magno igitur angulo cantho ue, qui circa nasum est, carneū
 corpus à natura fabricatum est, tanq; operimentum foraminis inde in nares descendens, per
 quod foramē præcipuè tum ab oculo, tum à cerebro humiditates in nasum descendere consue-
 uerunt. Quam ob causam, ne per angulos huiusmodi maiores, in genas turpiter excrementa
 defluant, quæ quidem eò peruenire solent: ne ue assidue, præter intentionem, lachrymemus
 30 (Galenus³ ait) prædicto (in alterutro, s. oculo) meatui corpora hæc carnosā fuerunt ap-
 posita, quæ prohiberent quidem ne oculorum (addēq; etiam cerebri) excrementa per angu-
 40 los uacuentur. Ad proprios autem meatus impellerent. Demonstratio uerò eius, quod dicimus,
 fuerit maxima, errores, in quos sæpenuerò incidunt ij, qui medicos oculos seipsos nomi-
 nant. Nonnulli enim eorum pterygia, & magnas asperitates, ficationes, & callos palpebra-
 rum, pharvacis acerbis colliquant, simul & carunculam neruofam, quæ est ad maiorem
 angulum, imprudenter colliquantur. Alij uerò, in encanthidum curatione chirurgica, plus
 æquo de caruncula rescindentes, effluxum excrementis ea parte aperuerunt: quem affectū
 50 ὀϊσθὶς quidem appellarunt, q. d. defluxum. Plures uerò per ὠθρὶν, q. d. riuulū (pro-
 ferunt. unde πῶδος, siue πῶδιν, ὠθρὶν, uel ὠθρὶν etiam dicitur. deprauatus enim Græ-
 cus codex est, in quō & ὠθρὶν legitur) Nec morbum tantummodò, in quo carnis incre-
 mentum sit, encanthis præsefert. Verum & canthorum utrorunq; radices, encanthidas, &
 60 epicanthidas interdum apud Græcos nominari, Cælius Rhodiginus testis est. Quemad-
 modum qui prope nasum adiacent, magni, s. ὠθρὶδες, nūcupantur (ab humoris inſperſio-
 ne, ἀπὸ τῆς ὠθρὶς, quod est aspergo) aut πηγῆς, hoc est, Latine, fontes. Cum ueluti
 lachrymarum fontes quidam sint. Canthos domesticos medicorum plurimi uocant. Caruncu-
 læ igitur in huiusmodi maiori angulo existentis, quem præ manibus interpretandum assū-
 simus, tumor est. At ne omnis quidem eius partis tumor, encanthis à Medicis dicitur. Etenim
 Anchylops, & Aegylops (de quibus deinde sermo fiet) abscessus quidam existentes inter
 maiorem oculi angulum, & nares. (Ille quidem prius, q; in ulcus erumpat abscessus est. hic
 uerò postquam eruptus, moxq; neglectus, ad os usq; in fistulam dehiſcit) nonnihil inflamma-
 tionis, tumorisq; carunculæ communicare interdum solent. Id quod in ophthalmia quoq; atq;
 70 alijs non paucis oculorum affectibus contingere absurdum non est. Haudquaquam tamen ob id,
 encanthida pati hominem proferemus. Ni prædictæ carnis incrementum fiat. Encanthis er-

1 li. de tu. præ-
 nat. cap. 21.

Caruncula la-
 chrymalis.

u. Vi uerg. Eglo
 ga 3^a uersu. 9.

x. p^o. de hysto^a.
 alium cap. 9.

Oculorū can-
 thi siue angus-
 li duo.

y. 10. de usu
 partiū ca. 11.

Galeni locus.

z. lib. 12. Lectio
 nū antiquarū ca.
 3. uersus finē.

lib. de morbo-
 u differentijs. c.
 9. in fine. et. 14.
 meth. c. 13.
 b 10.º. de usu
 partiu. 11. et 14.
 meth. c. 16. uer-
 sus fines amboru
 c li. de tu. præ-
 nat. cap. 21.
 d uersus finem
 libri.
 e lib. 3. cap. 22.
 f lib. 7. cap. 61.
 g lib. 7. cap. 7.
 sect. 5.
 h Ibidem. c. 62.
 i 2º. Cont. c. pº.
 littera R.
 k 3º. fen. 3.
 l 2. cap. 16.
 l VI. 9. Theor.
 c. 13. uersus finem.
 m 5º. Præf. c. 59
 n 9º. eiusd. 24
 et. 5. 57º.
 o pº. Theysir.
 tr 8. cap. 11.
 p lib. 2. cap. 17.
 q 3º. fen. 3. tr.
 pº. c. 6. ante med.
 et rursus. c. 12.
 Tumor. 6º.
 Pterygion.
 õvvξ.
 Unguis
 r post mediũ.
 s lib. 7. c. 28.
 go non abscessus, neq; ulcus est. Qua de causa Galenus " inter morbos, qui in aucta magnitu-
 dine fiunt, eam connumerat. Cui proprie opponi rheada uoluit. b Quam etiam ob causam,
 ab encanthidos præscripta definitione, statim subdit. c Est autem non ex toto genere præ-
 ter naturam. d Sed sola (ut interpres Riccus addit) magnitudine. Atq; idipsum ex Autho-
 re deinceps Medicarum definitionum, e Pauloq; f et Aetio f comprobari potest. Ipsaq;
 etiam Introductorio libro, qui tamen addit ex ulcere huiusmodi tumorem aduenire. Celsus
 autem quanuis alijs quoq; de causis oriri posse insinuet. g Interdum tamẽ ungue, hoc est, pter-
 rygion parum exciso, generari encanthida protulit. Quemadmodũ eodem superflue abscisso,
 rheas oriri consuevit. Patiuntur autem huiusmodi uitium præcipue õi θαλασσοεργοι, quod
 est, in mari laborantes, uersantesq; (ut nautæ sunt, et piscatores) eodem Introductorij Auc- 10
 thore, atq; Aetio quoq; declarantibus. Quinimmo in canibus maxime contingere Aetius ad-
 iunxit. Duplicem interea definiens encanthida, Benignam, scilicet mitemq; altera, quæ doloris ex-
 pers, tenera, et laxa est. Atq; hanc defficientibus medicamentis curat. Alteram uero maios-
 rem, malignamq; ac sæuam, quæ dura est, inæqualis, doloresq; punctorios inducens, atq; hæc
 manutigio præcidendam edocet. h Nec aliter Barbari malum hoc definiunt, q; carnis uides
 licet incrementum. Quanq; narijs apparent id nominibus significare. Nam Razes i glandu-
 lam uocat. Auicenna k additionem carnis lachrymalium. Hali Abbas uero nonnunq; l Gada:
 Nonnunq; m autem glandulam: et aliquando n glande nuncupat, Abenzoar o carnem addis-
 tam in angulo lachrymali. Albucasisq; p tandem carnem additam in oculo, et alguardenici,
 Arabicè nominat, siue alguardenigi, uel absq; articulo, guardenici. Quanuis id Arabicum 20
 nomen, apud Auicennam, qalium significet affectum: eum scilicet, qui à Græcis χύμωσις, uel
 (ut alij scribunt) χύμωσις, dicitur De qua quidem chemosi, uel chymosi uberius infra ser-
 mo fiet. Varijs autem modis hanc dictionem in Auicennæ codicibus scriptam inuenimus. Ete-
 nim alguardenisi, et aluardinegi, et aluardengi, atq; etiam sine articulo, uardenigi, legis-
 mus. Quoniã uero in chymosi, seu chemosi, proprieq; dicta uardinegi, siue dixisse malueris,
 alguardenigi, ob phlegmone magnitudinem, palpebrarum inuersio fit: In huiusmodi autem
 affectu, quem præ manibus habemus, ob carnis incrementum, aliqua etiam fieri palpebrarum
 euersio solet: Hac fortassis de causa, ab effectu, symptomate uel nomine desumpto, Albucasis
 alguardenigi, seu guardenigi uocauit. Sanguineus proculdubio tumor, saltem primæ radice
 ratione, dicendus est. Ad calidum quoq; ac humidum reducendus. AT alium oculi quoq; af- 30
 fectum percurramus, tumorem uidelicet numero sexagesimum. Græci πτερύγιον uocant. Cel-
 sus uero unguem. tametsi Græco nomini minime respondeat dicere apud Latinos, unguis.
 Etenim πτερύγιον diminutiũ nomen est, quasi dicat, parua ala, seu pennula, à dictione πτε-
 ρόν quod est, ala, seu penna. Quod autem Græcè, õviξ, dicitur, Latinis unguem proprie
 representans, diuersum quid à pterygio, in ipso etiam oculo, præ se fert. quod, communi adhuc
 nomine, ab Authore Definitionũ Medicarum, πύωσις quasi dicat Latine, purulentia nũci-
 patur. Sic. n. inquit i πύωσις, ñ õvvξ ἐστὶ συλλογὴ πύς, καὶ τὸ πὸ μέλαν, μετὰ φλεγμονῆς, ,,
 πύωσις τῆς ἱρίδος, παρὰ τὴν αἰσὶν ὀνυχί. 3 quod est. i purulentia, siue unguis est puris collez ,,
 etio, in nigro, cum phlegmone, secundum iridẽ, ungui consimilis. 3 Atq; idipsum distinctius ,,
 Aetius ostendit. dũ i πύωσιν commune nomen supponens, in duas species distinxit: uideli- 40
 cet unguem, siue unguiculum, et hypopyon: sic porro scribens i Quæ sunt in ulceribus
 πύωσις

- „ πῶς: hoc est, purulentiae diuersas obtinuerunt appellationes. Etenim ὀνυχία, hoc est,
 „ unguiculi dicuntur, quum à profundiore ulcere pus defluens, & inter tunicas illapsum, &
 „ in circulo iridis figuratum, similem ungui. resecto imaginem praefert. Ampliore autem
 „ pure collecto, & dimidium nigri occupante, aut per totam corneam tunicam pellucente, ὀνὺς
 „ πῶν ἔναι λέγομεν τὸν ὀφθαλμὸν, hoc est, suppuratum esse oculum dicimus. } Quo au-
 „ tem pacto { ὀνὺς πῶν, } per, ο, in secunda syllaba, &, υ, in tertia, ab { ὀνὺς πῶν } per, ω, in se-
 „ cunda syllaba, &, ι, in tertia. de quo alibi¹ seorsum Aetius etiam loquitur, praetactum iam ali-
 „ bi² fuit. } Fiunt autem haec (subdit Aetius, intelligeq; haec. s. unguiculus, & suppuratio.)
 „ etiā citra exulcerationem, dolore capitis, aut lippitudine praegressa. Contingunt etiam in-
 „ 10 flammatione praecedente: propter ampliores humorum repletionem, diruptis quibusdam uas-
 „ sis, & sanguine ex ipsis profuso, suppurato. } Praetactam uero ex Aetio differentiam, inter
 „ unguem, & hypopyon, siue suppurationem, à Paulo neglectam esse apparet: sic scribente³
 „ { ὀνὺς πῶν ὁ καὶ τοῦ οὐλοῦς, } quod est, suppurata cornea membrana, interdum euadit: aliquando
 „ quidem profundius, aliquando autem in superficie, Ita ut pus unguis figuram representet.
 „ qua de causa passionem hanc ὀνυχία πρὸς αὐτοῦς, hoc est, unguem appellant. } Ni ad pro-
 „ pinquius, unguem: ad remotius uero, suppurationem referre uolueris. Vt. s. quum profun-
 „ dius purulentia consistat, hypopyon: quum uero in superficie, unguis nuncupetur. At haec nō
 „ eadem cum Aetij differentia est. Arabum porro interpretes diuersis hunc affectum nominis-
 „ bus circumscribunt. Etenim apud Principem⁴ legimus, in uetustiore litera { de sanie in si-
 „ 20 phac } in recentiore autem à Bellunensi correctā { De sanie sub siphac corneae. } Hali Abbas
 „ uero nonnunq;⁵ uocat, sanie post corneam. Vbi Aetij distinctionem celebrat: sic dicens { sa-
 „ nies post corneam fit, aut ex ulcere, aut ex cephaea, aut ex ophthalmia. Et quaedam quidem
 „ locum occupat paucum corneae, & in figura ungulae similis est. quaedam autem locum plu-
 „ 30 rimum. quae & prima peior est. } Nonnunq;⁶ uero sanie in cornea, & aliquando, b sanie
 „ quae est sub cornea, ipse, uel eius potius interpres (ut alibi saepenumero admonuimus) appel-
 „ lat: Albucasisq;⁷ demum proprio idiomate { alcomnati } uocat. Medici ocularij à Galeno d
 „ prius, Pauloq;⁸ deinceps relata curatione obseruans. At haec obiter de proprie dicto, apud
 „ Graecos etiam, ungue oculorum dicta sint. Ad eorum ergo pterygion reuertamur: quod hic
 „ intendebamus, quodq; Celsus in æquiocationem (ut patet) elapsus, unguem Latine appel-
 „ 30 lat. s. quum. s. in oculis est. In digitorum enim extremitatibus, eorumq; unguibus, Graeco
 „ duntaxat nomine contentus est, πτερυγιον, illorum more, nūcupans. } Tutius ergo est, unā
 „ cum Plinio, Graeca semper dictione uti: ac distinctionis gratia, uel { digitorū } aut { unguium }
 „ uel { oculorum } dictiones adiungere. Plinius enim aduertens fortasse unguem nō esse pro-
 „ prium nomen, idem Latinis, quod Graecis pterygion representans: priscam Graecorum res-
 „ seruasse nomenclaturam uoluit. Semper igitur πτερυγιον, Graecorum ritu, nominat, siue in
 „ oculis, siue in digitis, aut alia quauis parte fuerit: Ad remouendam tamē æquiocationis con-
 „ fusionem { pterygia digitorum } saepenumero⁹ profert, uel { quae in digitis nascuntur ptery-
 „ gia¹⁰ } uel { unguium pterygia¹¹ } Quanq; aliquando simpliciter absq; ulla additione. pte-
 „ 40 rygia proferens, eadem intelligere uidetur. Praesertim quoties unguium, aut digitorum af-
 „ fectionibus alijs connumerat. ^m Vt secundum subiectam (ut dicitur) materiam uerba intelli-
 „ gantur. Quemadmodum aliquando alicui ex oculorum passionibus adiungens, eam, quae in
 „ oculis

¹ lib. 8. cap. 2.² supra fo. 111.³ lib. 3. cap. 22.

sec. 24.

⁴ y 3^a. fen. 3^a. tr.⁵ 2^o. cap. 10.⁶ z 9. Theor. c. 13

ante mediū.

⁷ a Vi. 5. Praef.

cap. 43.

⁸ b ut. 9^o. eiusdē

cap. 27.

⁹ c lib. 2^o. cap. 22.¹⁰ d 14. meth. cap.

ultimo.

¹¹ e lib. 6. cap. 20.¹² f libro. 7^o. ca. 7.

sec. 4.

¹³ g lib. 6. c. ult^o.¹⁴ h Vi lib. 23. ca.¹⁵ p^o. = 34¹. 15. = 28¹¹⁶ 12. = 30¹. 12. = 24¹

ultimo. = et saepe.

¹⁷ i ut lib. 30. c. 12.¹⁸ k ut lib. 24. c. 19¹⁹ l ut lib. 20. c. 22.

de Marrubio.

²⁰ m Vi. 23¹. 9^o. =et. 24¹. 4. ubi cū

paronychijs. &

²¹ 24¹. 12. = et. 35¹.²² 15. circa finē. ubi

cum per nionibus

adnumerat.

²³ n Vi lib. 23. c. 6.²⁴ & 32¹. 7. post

principia.

6 lib. 31. cap. 9.
post prim^m.

oculis gignitur, pinnulam insinuassee apparet. Fieri autem & in oculis etiam, nedum in digi-
tis, unguibus ue, quiminus in toto corpore pterygia Plinius idem alicubi significat, sic dices.
Item oculorū remedijs: & ad excrecentes ibi carnes, totiusq; corporis pterygia: sed in ocu-
lis peculiariter, etc. Ex quibus quidem uerbis, & in alijs etiam corporis partibus, ab oculis
& digitis, fieri pterygion insinuat. Manuum namq; ac pedum digiti, una cum oculis, totum
dici corpus nequeunt. Fortassis autem (quod potius reputo) totius corporis pterygia protu-
lit, hoc est, in quauis corporis parte fiant, intelligens: ubi nihilominus huiusmodi affectus ge-
nerari, ac pterygia proprie à ueteribus nominari consueuerunt. Itaq; pterygion æquiouocum
nomen est, oculi, atq; digitorum affectus præseferens. Celsus autem nominis æquiocatione
adauxit. Cum Latine unguem nominarit, unguis uerò alterum in oculis iam iam declaratum
affectum referat. Quòd si uel ipse, uel quisquis ante ipsum huiusmodi nominis impositor fue-
rit, unguem eiusmodi (ut uidebimus) nerueam in oculo carneam ue excrecentiam idcirco no-
minarit: quoniam schumani unguis instar, à propria radice, digiti extremum uersus in latum
procedentis, hæc uel ab angulis, uel à superiore, inferiore ue adnatæ regione, uersus
iridem, ipsamq; pupillam dilatando progreditur: Qua etiam similitudine, rosarum unguis,
earum infimas, albasq; partes nominare ueteres consueuerunt: Nihilominus tamen diuersa
similitudinis ratione, sub cornea existens purulentia nonnunq; (ueluti prædictum est) un-
guis nuncupata est: uidelicet quoniam dissecto unguis nigro, non toti ungui assimilatur. Por-
rò Celsum æmulati sunt omnes ferè Barbarorum interpretes. Quamq; hi non unguem, sed
ungulam uocarunt, unguem ab ungula distinguere negligentes. Quemadmodum apud Se- 20

p 2. Breu cap. 3. rapionem, Razem, Auicennam, Hali Abbatem, Mesuem, & Albucasim quoq; pte
q 2. Cont. c. p. et re potest. SED omissa nominis disquisitione, rem ipsam ex propria definitione uel ligemus.
20. litera. E. 29. Inquit enim Galenus de oculorum pterygio loquens, in libro, quem nunc obiter enarrandū
ad Mansorem, 21. assumpsimus: de tumoribus inq; præter naturā τὰ δὲ πτερυγία βλαστήματα ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῷ
et lib. Diuif. c. 25. φνέτος ἐξ ὧθεν ὑμεῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὅς ἐστι τὸ περὶ οὐσίαν καὶ περιόμενος, ἐπὶ τὴν
r 3. 3. tr. 2. c. 22. πεφάνη ἀφικνέται; quod est & pterygia uerò germina sunt membranae exterius oculis
s 9. Theor. c. 13. adnatæ, quæ à membrana periosio. q. d. circumfossi dicta pericranio ue delata, ad coronam
s 5. Pract. 40. et. 9. peruenit. Nonnulli enim coronam, Alij uerò Irin uocant (Galeno teste) locum ubi commit-
Pract. 25. tuntur inter se tunicae uniuersæ. unde oculi nigrū apparet. Galenus ergo βλαστήματα, hoc
t 5. et lib. 3. sum. s. est, germina, siue excrecentias esse ait. An uerò neruea, uel carnea huiusmodi germina sint, 30
cap. 9. uel lib. 2. cap. 16. minimè determinat. quamq; huius esse generis alibi iam insinuat, non esse substantiæ ratio-
x De tum. præ. ne, quemadmodum atheromata, & meliceris, naturæ alienū pterygion definiens. Secus quis
nat cap. 21. dem ac ὑπόπυον, quod, ueluti et χαλὰζιον, toto genere alienum pronuntiauit. Definitionū
y 14. meth. cap. Author imperfectissimam huius morbi definitionem assignauit. In qua nil de adnata mem-
ultimo & 10. de brana, nec de principio, aut fine, uel etiam causa meminit. dicens & pterygion pinnula ue (sic
usu partiū. cap. 2. n. interpres uertit) corporis excrecentia est, corneæ adhærescens. & Introductorius uerò Me-
circa finem. dicorum liber b membranulam esse tenuem hanc progerminationem exprimit, eius causam
z 14. meth. cap. declarans, ulcus uidelicet ipsum. Præter hæc demum, et principium, & finem expullulatio-
ultimo. nis manifestat: ab angulo, atq; oculi albo exordiri quousq; ad nigrum, uerticemq; oculi per-
a Post medium. uenerit, ostendens, his uerbis & pterygion autem (unguem interpres uertit) appellant, ubi 40
b cap. 15. ante plurimum exulcerato, carneq; oppleto ipsius oculi albo, membrana tenuis, & nervosa oculi
med^m et uide lib. la oculorum.
facile acquisibili-
bus ad Solonem i
parte, quæ Græ-
cè non inuenitur
sec. 11. ubi etiā de
ungue, siue ungu-
la oculorum.

lum

- lum percurreret, ab aliquo angulorum exorsa, quousq; nigrum, uerticemq; tetigerit}. Celsus quoq; ^c ac Paulus ^d eandem comprobant definitionem: distinctius interim originis, atq; ultimi termini locum declarantes. Quoniam scilicet sæpius à narium parte, maiori ue angulo. interdum uerò, ac rarius à temporum parte, minori ue angulo nascitur. nec solum ad pupillam aliquando peruenit, eiq; officit (ueluti Celsus ait) uerum clariùs adhuc Paulus addit: quod ultra modum adaucta, progrediensq; totam pupillam contegit. ut omnimoda inde uisus priuatio fiat. Nec uisionis modò nocumentum inducere: uerum etiam oculi motum, bulbi cōtractione, impedire Paulus adiunxit. ^e Intelligere autem bulbi nomine totum oculum (perinde ac in dissectionibus uniuersum à cranio, ad publicam ostensionem, abscindere consueuimus) cuius patere arbitror. Cum alibi ^f etiam hoc nomine usus fuerit. Quoniā scilicet terrenis bulbis omnino persimilis est. Aetius ^g autem non membraneam tantummodò, nerueamq; excrecentiam esse pterygion definiuit, sed carneam quoq; nonnunq; esse: atq; alias etiam, præter ulcus ab Introductorio expressum, generationis causas exprimit, scabrā scilicet lippitudinem, aut assiduas fluxiones. ^h non ab angulis modò: sed supernè etiam, atq; infernè: quousq; rarissimè, posse tamè aliquando, admittit. Dixit enim (ut ex ipso met cuncta colligamus)
- „ pterygion dicitur, quum albu in oculo amplius augefcit, aut carne superexcrefcit, ex scabra quadam lippitudine, aut assidujs fluxionibus. Incipit autem eius augmentum sæpius quidem ab angulo magno appellato iuxta nasum. Rarius autem à paruo. Et adhuc rarius generatur à superna, uel inferna palpebra. Extenditurq; usq; ad nigrum. Quum uerò maius factū fuerit, etiam pupillam contingit, ⁱ uisum impedit. Itaq; cum non solū neruea, albaq; sed etiā carnea, nec non rubea huiusmodi progerminatio fieri, ^j ab omni parte oriri queat. Propterea fortassis Galenus ^k excrecentiā germen ue simpliciter, et absq; ulla de angulis mentione, pronuntiauit. Qua etiā de causa ^l παμφότερον, hoc est, ambigua esse specie, forma ue, non secus ac nimium extantes cicatrices, idem aliquando ait. ^m Plures pterygiorum differentias Aetius ⁿ insinuat. Serapionq; ^o ac Razes, ^p et demum ipse Princeps ^q expresserūt. Quas quidem ubi opportunum fuerit, uberiùs enucleabimus. Albucasis tandem uidetur aliam, pro chirurgo quidem opere, differentiam considerasse. Sic enim inquit ^r Scias quod ungula est secundum duos modos, aut est neruosa, ^s et est similis siphac duro subtili: aut est non neruosa similis humiditati congelatæ albæ etc. ^t non intelligo per secundum genus, carneam: sed eandem: quæ mollis adhuc, ^u et in principio existens, facillimè frangitur. Temporis autem progressu persiccata membranæ formam lucrat, durefcensq; neruea iam apparet. Haudquaquam tamen uerum esse fatebimur, quod subdit: utranq; scilicet speciem nō nisi à lachrymali, angulo ue maiore incipere. Ni iuxta Medicorum consuetudinem intellexerimus: hoc est, maxima ex parte sic accidere determinantes. Frigidum ^v et siccum, nec non melancholicum esse huiusmodi tumorem, præcipueq; nerueum dicimus. Carneus enim ad sanguineum potius admixta tamen, uel pituita, uel atrabilario succo, uel utroq; ac inde ad calidum uergere pronuntiandus est. Quemadmodum ^w οὐγὴ, id est, unguis iam iam declaratus ^x et sanguineus, ^y et calidus, putredinali etiam calore, determinandus uenit. QVONIAM uerò pterygion æquiuiocum esse nomē prædiximus, ^z et ultra præscriptum oculi affectum, in digitorū extremitatibus, unguibus ue, alium quoq; tumorem significare: Idcirco ^{aa} et hunc etiam tumorem obiter, ac paucis, quoad fieri poterit, enucleare operæpretiū fore diximus. ^{ab} Est ergo (Paulo definiente

c lib. 7. c. 7. sec.

4. in principio.

d lib. 3. c. 22. sec.

27. = 2. 6. 18.

e lib. 6. cap. 18.

Bulbus oculi

quid.

f Ibid. c. 8. = 2.

3. 22. sec. 16. ubi

de strabismo lo-

quitur.

g lib. 7. cap. 58.

h de tum. præti.

cap. 21.

a 14 meth. cap.

13. post medium.

i lib. 7. cap. 18.

k 2 Brev. cap. 3.

l 2. Cont. cap. pº.

et. 2. litera. E.

m 3ª. fen. 3. tr. 2.

cap. 22.

n lib. 2. cap. 16.

Cōtra Albu-

casim.

Pterygion di-

gitorum.

lib. 3. cap. 81.
2. 6. 85.

Pterygion un-
guum. 2^x.

p. fo. 119.

Pauli locus.

q. 2. pract. c. 66.

Tafete.

Dahafa.

desiniente^o) pterygion carnis incrementum, aliquam unguis partem operiens, ex reduuia, „
aut alia huiusmodi causa proueniens. Fit autem in pedis, manusq; potissimum pollicibus. At „
in pedibus quidem, magna ex parte ex offensione. In manibus autem, ex neglecta reduuia, „
inflammata, & in pus mutata. } Hæc pterygij digitorum definitio à Paulo posita est. Qui „
quidem, si exquisitiùs intelligatur, duplex id esse insinuat. Alterum quidem, quod mite est: „
carnisq; incrementum in unguis angulo natum, quod ipsius deinceps unguis, à quo cum in- „
flammatione, ac dolore pungitur, aliquam portionem cooperit: ex suppurante nihilominus pa- „
ronychia generationem recipiens. Atq; id ipsum definitum iam est. Alterum uero pterygion „
esse innuit Paulus malignum, quod est, secundum genus, *πομπή*, hoc est, depascens, serpensq; „
putredo (prout antea^p dictionem hanc me declarasse recolo) neq; subsidens, nisi comburatur. 10
tur, Quin si negligatur, digitum corrumpens. Etenim pus ex neglecta reduuia, retentum, „
quum inueterauerit, unguis radicem exedit, ipsumq; corrumpit, ac totum subinde abolet. Ma- „
gnaq; ex parte mediam eius portionem plurimum consumit: Iuxta unguis autem radices ip- „
sas, nonnihil putredinis expers relinquit (legendum nanq; *ἀδύσπτον*, cuius peregrina mente „
perpendenti liquet) Quandoq; totam radicem à rosione immunem omittit. Est quum & os „
corrumpat, odor & datur grauis, digitus per summa dilatetur, magisq; liuidus appareat. } Hæc „
ad uerbum ex Paulo transumpta sunt. Vbi dictionem *ἀδύσπτον* quod est putridum }
correximus *ἀδύσπτον* } hoc est } non putridum, seu putredinis expers } Res enim ipsa
ostendit. Quoniam scilicet pus in reduuia retentum, uel totum unguem corrumpit, aboletq; „
ipsius radice penitus exesa, putridaq; prius reddita, uel mediam eius partem (id quod magna 20
ex parte contingit) plurimum consumit: Iuxta radices autem nonnihil imputridum, ac per
hoc minimè corrosum relinquit (putredo enim corrosione præcedit) quasi dicat, tametsi ra-
dicem putredo attingat: Nihilominus tamen haud totam, uelut in prædicta, radicem putrefa-
cit, exeditq; sed aliquam partem eius intactam, imputridamq; relinquit. Quinimodò, ut tertio
deinceps loco subiunxit) totam aliquando radicem à rosione immunem omittit. Quartoq; de-
mum addit, interdum os corrumpere, ut odor & datur grauis. etc. Atq; id ipsum antiquus Pau-
li codex, quem Hali Abbas legisse uidetur, confirmare potest. Sic enim Hali Abbas, Pauli (ut
liquet) uerba transcribens, de tafete, hoc est, ut interpretes uertit, ungue super unguem exis-
stente, ait *ἡ* } Sanies autem, cum diuturnior perstiterit, unguis corrodit radicem, & corrumpit. „
Et nonnunq; unguem totum, sæpiusq; unguis mediū corrumpit, plurima corruptione (id. n. est 30
quod Græcè dicitur *πᾶν* } nosq; traduximus } plurimum) } & in radicibus pars remanet „
quædam non putrida. } uides igitur quomodo negatiuè Hali Abbas protulit. Nec obstat si
tertium diuisionis membrum postergans, ad quartum pertransiuit. dicens } Nonnunq; autem
similiter & os corrumpitur, & odor exhalat putridus. etc. } Quoniam ibi quæ manus opi-
ficio indigent, prosequi intendens: quæ peiora sunt, chirurgiq; indigent, enarrare aggressus
est. Vocat autem Arabicè, tafete, quod est (ut opinor) corruptum Græcum nomen } ptery-
gion. } Unguis uerò ab interprete, siue fortassis ab ipsomet Hali Abbate dictus est super un-
gue, non quia nouus unguis super ungue renatus sit (q; aliquando nouus sub ungue emer-
git) uerum quia noua caro, uel unguis, uel alæ seu pênulæ figuram representans super anti-
quo ungue gignitur. Ex dahafa fieri huiusmodi morbum Author idem Arabs ait, hoc est, ex 40
alio affectu, qui à Græcis *παγοῦν* } dicitur, à Latinis autem } Reduuias, & à quibusdam

busdam reduuia à nonnullis (uti Hermolaus, ex Festo ait ^a) reluium: cum circa unguis cutis
 resoluatur. quia reluere est resoluerè. à Barbarolatinis uerò (corrupta Græca dictione pa-
 ronychchia,) pannaritium nominatur, abscessu quidem ad radices unguium (uti Paulus ^r etiã
 definiuit) coeunte. Sic enim ^{et} alibi ^s quoq; Hali Abbas ^{et} dabasa ^{et} definiuit. Princeps uerò Ara-
 bum, ^s sub pãnaritij nomine non ipsam tatummodò paronychiam, reduuiam ^{ue}, sed pterygion
 quoq; pinnulam ^{ue} unguium comprehendisse uidetur. Ita etiam Albucasis. ^a Abenzoar ^{et} au-
 tem quanuis in eodem capite de utroq; morbo, reduuia. ^s. ac pterygio loquatur: Reduiam ta-
 men proprio idiomate ^{et} doggam ^{et} interpretat; pannaritium nuncupat: prædictum uerò ptery-
 gion ^{et} ægritudinem spinæ ^{et} appellat. Plinius digitorum, aut unguium pterygium sæpè nomi-
 nasse inuentus est. ^z quemadmodum à nobis prædictum iam est. Eiusmodi uerò affectus ori-
 ginem aliquandò, ^z Græcorum nomine, paronychiam: aliquandò ^a autem Latine reduuiam
 idem Author nuncupauit. Marcellus autem Romanus, ^b Theodorusq; Priscianus ^c Græco
 nomine usi sunt, paronychiam uocantes. Sicq; deinceps alij, uel paronychiam, uel reduuiam,
 aut utroq; nomine, diuersis in locis, usi nominarunt. De hoc igitur in unguium radice factò
 abscessu intelligebat eloquentiæ parens Cicero: quum ait ^d ^{et} intelligo me ante tempus ludi-
 ces hæc scrutari, ^{et} propemodum errare. Qui cum capiti sexti Roscij mederi debeam, rez-
 duuiam curem. ^z Quamq; Placidus quidam Grammaticus reduuias etiam pro serpentiũ exu-
 uis intelligit. Græci (uti prædictũ est) ^{παραonychία} uocant, nõ modò præscriptũ abscessum:
 at herbam quoq; huiusmodi affectui proficiam ab effectu sic nominatam (Galenus ^e etiam ex
 Dioscoride ^f sententia) intelligentes. Aetius ^g tam pterygia, q; paronychias tanq; perse-
 nota, absq; ulla definitione, curat. Celsus ^h autẽ obscuro quodam modo pterygiũ definit, nul-
 la interim facta de paronychijs reduuijs ^{ue} mentione. Sic. n. dicit ^{et} In iisdem. ^s. ueteribus di-
 gitorũ ulceribus) recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consueuit. ^{παραonychία}
 Græci appellant. ^z In quibus quidem Celsi uerbis aduertendum est, definitionem hanc non
 esse à Celso intentam: Quod. ^s. pterygion sit caruncula ab ungue recedens. Haud. n. recedit
 huiusmodi caruncula: sed ipsius unguis particulam cooperit. Nĩ recedere ab ungue, hoc est
 ab unguium terminis ac meta intellexerimus. Celsus igitur (mea sententia) pterygiũ defi-
 nitionem ut uulgo etiam notam præsupponẽs, (quoniã uidelicet carnis incrementũ ex suppu-
 rata, nec non ulcerata reduuia proueniens, unguemq; cooperiens pterygion est) eius remo-
 tionem docere intendit. Vbi non quemadmodum alia ^{et} quidem uetera digitorum ulcera cõ-
 modissimè curari lycio, uel myrrha cõcta, adiecto utrilibet uino, prædixerat: Sic etiam ubi car-
 runcula circa unguem generatio facta sit, quod Græci pterygion uocant, recedere ab un-
 gue carunculam posse opinatus est. Haud. n. commodè recedere, segregariq; aut absumi,
 sed cũ magno dolore consueuit. siue medicamẽtis eam consumere intenderimus, siue tandem
 ferro excidere agrediamur. In inflãmatorũ, ac maxima ex parte sanguineorum tumorũ cata-
 logo reponendas esse paronychias, succedentiãq; pterygia, luce clarius est. Sed hæc obiter ac
 per transennã de paronychijs, digitorumq; pterygijs intantũ dicta nũc sint. Ad oculorũ ergo
 pterygion pinnulam ^{ue}, à Celso unguem, à Barbarolatinis unguã nominatam reuertamur. Sebel.
 ET ENIM Arabes aliũ quẽdã in oculo affectũ pterygio proximũ, ac natura persimilẽ de-
 clarat, scorsũq; curant. Quẽ proprio idiomate scbel, siue schebel, aut scebel, et zebel, et sibila, Scebel.
 nũcupat. Quẽ qdẽ nisi ad pterygiũ reduxerimus, à Græcis ignotũ esse determinadũ. At ip-
 sum Sibila.

AA sum Sibila.

^a In cast. Plinij
 lib. 22. cap. 9. in
 fine.

Paronychchia
 quid.

r lib. 3. cap. 21. i
 principio.

s. 8. Theo c. 18. i
 fine et. 4. Pract.

cap. 17. i
 Doggam.

Acgritudo
 spinæ.

7. a. fen. 4. i. tr.
 4. o. c. 8. et. 9.

u lib. 2. cap. 91.

x 2. Theysir
 tr. 7. cap. ult. o.

y Locis ubi sue
 prafo. 285.

z Vt lib. 21. cap.
 10. s. 22. 25. in

prelogo. 23. s. et
 cap. 4. et. 9. eius

de. 24. 4. et. 19.
 28. 8. et. 34. 15.

et sæpe.

a Vi. 29. 2. s.
 30. 12. et alibi.

b de Med ca. 13.

c lib. p. o. ad Tiz
 moibeũ cap. 30.

d Oratione. 2. a.
 pro sexto Roscio

Amerino uersus
 finem

e 8. Simplicium
 Medic. cap. 39.

f lib. 4. cap. 52.

g libro. 14. cap.
 74. 75.

h lib. 6. ca. ult. o.

3^a. fen. 3^a. 3^o *sum ex Arabū definitionibus cognoscere aggrediamur. Inquit ergo Princepsⁱ (cuius de hoc
 cap. 19. *uberius loquentis definitioni plurimum quoque Arabum siue Priorū, siue Posteriorū sententia
 k 2^o. Cont. ca. *cōgruit. Ut Razis, et eorū, qui ab ipso citantur. Itēque Hali Abbatis, Mesuā, atque etiā
 2. litera. DD. *Albucaſisⁱⁱ) sebel est panniculus accidens oculo, ex inflatione uenarū eius apparentium in su
 9^a. ad Mansō. *perficie coniunctiue, & corneæ: & texitur quiddam in eo, quod est inter eas, sicut fumus.
 cap. 18. *Et eius quidem causa est repletio illarum uenarum. 3^o huiusmodi uerò causam duntaxat ex-
 Diuis. cap. 23. *pressisse, ac satis quidem diminutē, Serapioni^o placuit & aut à materijs currentibus ad eum
 l 9. Theophr. 13 *per uiam panniculi exterioris, aut per uiam panniculi intrinseci, propter repletionem capis
 Et. 3^a. Præfice *tis, & debilitatem oculi. 3^o Panniculum Princeps uocat. quia scilicet similitudo quædam
 cap. 33. *panniculi (ut Razisⁱⁱ ait) existit. Aded ut ipse met uel panniculum nigrum apparentem si-
 m De ægritud. *cut fumum, uel ex Haddela Authore: filio ychiæ, sicut pelliculā fumi nominet. 1^o Arabibus
 oculorum cap. 7. *enim sebel tunicam, seu panniculum significare nonnulli aiunt. Nonnunquam uerò tam Raz-
 n lib. 2. cap. 18. *zes, quam Mesuas, telæ araneæ assimilant: præsertimque (ut Mesuas ait) ubi diutur-
 o 2. Breu. c. 19. *na, & crassior ob temporis longitudinem reddita est. tunc autem omnino uisionem probi-
 p 9^a. ad Mansō. *bet: siquidem super tota pupilla facta sit. uel usque aded saltem illi officit, quousque partem
 19. Et. 2^o. Cont. *pupillæ operuerit. Subdit uerò Princepsⁱ & Quandoque accidunt ex sebel pruritus, & laz-
 cap. 2. DD. *chrymæ, & panniculus 3^o secundum plurimū (ait Serapioⁱⁱ) pruritus, & materia, hoc est,
 q Ibi d. s. 2. Cōt. *lachrymæ cum eo sunt. Idemque sentire uidetur ex propria prius, ac deinceps ex Ioannicij sen-
 r lib. Diuis. 23. *tentia Razis. 2^o Qui rubedinem in proximis uenulis adiungens, cum hæc adsunt, perguz-
 s Vbi supra. *lam uocari uoluit. & Et nocumentum accidit (subdit Princepsⁱ) ex lumine solis, & lumiz-
 t Vbi supra sta *ne candelæ. 3^o ut non tantum solis, ac lucernæ lumen, sed quælibet etiam res in lumine pos-
 tim. *sitas uidere abhorreant. quemadmodum ab ipso etiam Raze præscriptum iam est. 2^o & Quan-
 u Vbi supra. *doque autem accidit (Principe docente)ⁱⁱ oculo patienti sebel, ut fiat minor, & minoretur
 x 2^o. Cont. cap. *corpus pupillæ eius. Et sebel quidem est ex ægritudinibus, quæ hæreditantur, & permu-
 2^o. DD. *tatur de uno ad alium. 3^o Quam sententiam Iudei prius fuisse Razisⁱⁱ testis est. sic dicens
 y Vbi supra. *& Dixit Iudeus sebel accidit in regionibus humidis facientibus multam ophthalmiam: &
 Pergula. *reuertitur, & est hæreditaria. 3^o Verum enim uerò è prædictorum Arabum sententijs, uen-
 z 2. Cont. cap. *narum in adnata, & cornea, tunicis existentium immodicam esse repletionem huiusmodi af-
 2. DD. *fectum elicitur. E qua uenarum plenitudine refudans aliqua glutinosioris sanguinis portio,
 a Vbi supra. *atque in exterioribus tunica partibus tenaciter in hærescens uenam uenæ contextit. Aded ut
 b 2^o. Cont. *alterius nouæ membranulæ formam repræsentet. Quocirca in hoc ab ophthalmia, nec non
 Quomodo Se *perturbatione (quam Græci τῆς αἱμῆς uocant) huiusmodi affectus differt. Quoniam in il-
 bel ab ophthal *lis quidem morbis nil intermedium uenulas contextens, contingensque, uelut in hoc, apparet.
 mia & taraxi *Verum enim uerò et hic ambiguitas minimè profecto negligenda occurrit. An. s. uenæ, quæ in
 differt, *præscripto morbo tumētes apparēt, naturales uenæ, atque arteriæ sint, præter modum cras-
 Dubium. *sioſe sanguine repletæ. (quemadmodum præallegati Authores insinuarūt:) An potius nouæ
 sint, et præternaturaliter genitæ. Perinde ac Abenzoar, eiusque sectator Auerrhoes, definiunt?
 c p^o. Theysir. *Ingt. n. Abenzoar. 6^o Et etiā hæc ægritudo in coniunctiua euenire reperitur multoties. Et est
 8. cap. 28. *quædam contextura rubea, facta in superficie coniunctiue, seu albedinis oculorum. Et
 Venæ althez *nominātur in Arabico uenæ altheben. Et non sunt uenæ procedentes ab hepate, nec arteriæ
 ben. *à corde uenientes: sed uenis assimilantur, quæ inuolutæ sunt, & contextæ supra albe-
 dinem**

- dinem. Et aliquando intantum extenduntur, quod nigrum cooperire reperiuntur. Abenzoaris ^{d 2^a parte can-}
 uero sententiam comprobasse Auerrhoes uidetur: Cum inquit. ^{ticoru.com. 87.} Sebel est quedam textura
 uenarum innaturalium, super coniunctiuam oculi facta. Sic igitur diffformes hi docto-
 res a praecedentibus apparent. Nos autem inter eos concilium id dari posse asserimus. Quo- ^{Solutio.}
 niam scilicet tam uenae, quam arteriae naturales ibi existentes mirum in modum crassiori sanguine
 replentur. Dein uero ex resudante paulatim uasis glutinoso sanguine in primis iuxta illas
 uenas, & arterias quaedam exterius lineae: ac tanquam nouae uenae, & arteriae depinguntur. non
 quidem quod uerae uenae, aut arteriae sint: sed cum rubrae lineae supra uenas iam arteriasque
 exterius emineant, illarum penitus uel gyros, uel rectitudinem conseruantes, earum quoque effi-
 10 giem minus exquisitè intuentibus repraesentant. Quoniam uero huiusmodi lineae praeter na-
 turam genitae in exterioribus tunicarum partibus, resudante interim omni ex parte priori
 succo, extendi utrinque ac intantum dilatari consueuerunt: donec inuicem omnes coniungan-
 tur, ac uelut quandam telam contexant: Idcirco uerum iam est quod priores dixerunt. ex ue-
 narum scilicet, ac arteriarum naturalium immodica plenitudine huiusmodi affectum genera-
 ri. Verum quoque iam esse liquet, quod posterius adducti protulerunt. uidelicet exteriores ue-
 nas, ex quarum textura talis tunica, pammiculus uel sebel nuncupatus gignitur, naturales non
 esse, at nuper ex morbo in exterioribus tunicarum partibus expullulantes. Quibus tandem
 omnibus exacte perpensis, ad alium tumorem à Graecis definitum reduci posse non uidetur, Sebel ad ptery-
 quam ad pterygion. A quo non nisi minoris ratione differre apparet. Ultra quod pte- ^{gion reducens}
 20 rygion ab angulis, praesertimque maiori frequentius emergit. Sebel autem ab extremis, si-
 ue angulis, siue superioribus inferioribusue regionibus expullulare determinasse inue-
 nimus neminem: quasi circa medium indifferenter expullet. Nos igitur eiusdem esse ge-
 neris cum pterygio sebel determinantes, maioris tantum, minorisque ratione distantia: sub
 pterygij definitione, ac tum medicamentis, tum chirurgia facta curatione à Graecis intel-
 lecta esse decernimus. Idipsum interea pernotantes. quoniam ab angulis emergens unguis-
 la, à superioribus uero, inferioribusque, sebel à Barbaris nuncupabitur. Plus enim humoris
 ab angulis, praesertimque maiore suscipiens fortior, duriorque tunica fieri solet. Supernè autem
 uel infernè minus nutrita, imbecillior, graciliorque, & mollior fuerit. Inter calidos ab initio,
 sanguineosque, quique pituita nonnihil admixtum est, tumores connumerandus huiusmodi affectus,
 30 sebel dictus uenit. Cum uero genita iam tunica est, assiccatis iam extra effluetibus humidi-
 tatibus: ad frigidos, melancholicosque cum pterygio reducendus est. SED ultimum con- ^{Tumor. 61.}
 templari tumorem, occasio praecipua accelerat. Cum omnium sanctorum commune festum propè ^{Staphyloma.}
 iam sit. A quo statim ordinariè, publiceque aphorismos interpretari, uel stimulatibus discipulis
 cogimur. Est ergo hic tumor, quod à Graecis σταφύλωμα nuncupatur, Latine à recentioribus
 uuatio dici solet. Quod etiam nomen (Galeno teste) à similitudine sumptum est: Cum e 2. meth. cap. 2.
 uua acino quippiam simile extra corneam tunicam promineat. Pro cuius quidem exquisitiore
 notitia, corneae prius ulcera, ptyctenasque declarabimus. Quibus intellectis, longè facilius et
 staphylomata, & reliquos eiusdem cum staphylomate generis affectus enucleabimus. Idip-
 sum nihilominus praeter ceteris adnotantes. Quoniam ex tunicis oculorum propriis, ea sola uni-
 40 uersum undique, absque ulla intercapedine, oculi orbem circuit: quae à cornu, quod Graeci κέρα
 uocant, apud eosdem κέρα τῆς οὐχίς, Latine autem cornea nuncupatur. Cuius quidem cum cornu
 AA ij similitudo.

f 10^o. de usu par
cium cap. 3^o.

g 14. meth. cap.
ult^o. et 10^o de usu
partiū. c. 2. i fin^o.

h 7^o. lib. cap. 29.
i 3^a. fen. 3^o. tr. p^o.
cap. p^o. et tr. 2^o.
cap. p^o. et 6.

similitudo non in luciditate modo, qua illud etiam superat, uerum & substantia quoque (est enim cornu instar dura) ac demum in eiusdem substantiæ structura consistit. Etenim uelut cornu in laminas diuidi, ac desquamari (Galeno docete) f potest. Ita etiam hæc tunica, non secus radi, disiungi; ualet, q; si ex laminis aliquot, seu squamis inuicem compactis constitueretur. In his ergo tribus similitudinis ratio, (unde nominis impositio facta est) consideratur. Nō tamē quod ad uniuersum tunicæ orbē huiusmodi cū cornu similitudines sunt: uerū in anteriori dūtaxat sede, qua scilicet oculi nigrum siue iris consistit. Alij enim irim, aliqui uerò *σεφάων* hoc est, coronam (Galeni testimonio) & nominant. In alijs uerò partibus crassa quidem, & dura est, qua de re à nonnullis Græcè *σκληρότης*, quasi dicat Latine durities, siue dura nuncupatur, & è Barbarolatinis omnibus sclerotica tunica. Haud tamen ea substantiæ duritie, si-
gura ue, aut forma cornu substantiam repræsentante. Sed neq; pellucida: uerum, duræ cerebri membranæ instar, opaca, & quæ tandem in squamas appositæ deradi non potest. Siue autem unam eandemq; membranam esse, quæ antèruius quidem tenuior, at densior, & pellucida, nec non desquamabilis est, posterius uerò grossior, minusq; densa, & interim opaca, & in squamas minimè diuisibilis est: siue pro duabus, unà cum Barbarolatinis, accepisse malueris: nihili profectò faciemus. præsertim quod ad præsens institutum refert. Quod autem longè maioris momenti, & præsentis quidem intentioni proficuum fore cognouimus, est. Quoniam scilicet mēbrana hæc (Aetio, b atq; Arabum Principe i docentibus) in quatuor tunicas, lamina sue, seu squamas secerni, deradiq; potest. in medio quarum phlyctænas generari declarabimus. Postq; scilicet uueam nominatam, Græcè *εὐνοειδής* tunicam contemplati fuerimus. Ex cuius quidem extra corneam procidentia, staphyloma nonnunq; uel alios eiusdem generis affectus generari demonstrabimus. Velut enim à crassa cerebri membrana, quam Barbari duram matrem appellant, dura, crassiorq; oculorum tunica, ad iridis usq; circulum, indeq; cornea uocata originem sumpsit. Ita & à tenuiori eiusdem cerebri menynge, quam Barbari quoq; piam matrem nuncupant, alia membranarum oculi principium sumpsit. Quæ ad iridis etiam coronæ ue circulum usq; *χοροειδής* (eiusdem cerebri membranæ, à qua orta est, nomine) uocatur. Non ea tantum de causa, quoniam ex illa sic nuncupata hæc originē cepit: sed quoniam uelut *χορίον*, siue (ut alij scribunt) *χορίον*, Latine secunda, & secundæ, uel secundina, seu loculi, nuncupatum fœtus inuolucrum, uasorum omnium, quibus embrio nutritur, fulcrum quoddam, ac delatorium est. Ita quidem tenuior cerebri menynx in uarios etiam eius anfractus descendens, uasa pro illius nutritione deducit: suffulcitq; Nec secus huiusmodi oculorum, è prædicta cerebri membrana deducta tunica uenarum, artieriarumq; omnium oculi suffulcimentum, atq; deductorium est. *εὐνοειδής* uerò, quod est, uuea deinceps, uel (ut sic dixerimus) aciniformis tunica nuncupatur: ob pupillæ foramen. Cum uuæ fructus corio rotundo, perforatoq; in loco, unde pedunculus enascebatur, expressa interrim carnea, medullosaq; uuæ substantia, similis sit. E qua rursus choriiformi tunica, in coronæ, iridis ue circulo, alia quæ crystallinū antèruius obtegit, *ἀραχνοειδής*, hoc est, aranearum telæ persimilis tunicula dicta oboritur, siue igitur has (ut Barbarolatinorum plurimi obseruāt) pro tribus oculi tunicis, siue (quod rectius est) pro una, eademq; uarijs tamen, iuxta diuersas partes nōibus appellata sumpsisse malueris: id ipsum quoq; floccifacimus. Modò rerū differē-
tias ritè, atq; exquisitissimè pernouerimus. Quicunq; n. has, tres esse crediderūt, durā uerò, et corneā

et corneam, duas, additis deinde reliquis duabus intima, scilicet quæ ἀμφὶ βλῆντος ἐστὶν: Latine retiformis, corrupteque à Barbaris retina dicitur, & omnium extrema, quæ ἐπιπυκνωσὶς, id est, adnata nominatur: septem esse oculorum tunicas retulerunt. Contra uero, qui has in unum k lib. 10. de usu partium cap. 2. Cōtra Carop. lū Stephanū Septem Iridis circuli.

ueluti & præcedentes coniungunt, quatuor duntaxat posuerunt. Sed ne sub silentio quidē pertranscūdum est: quoniam aliqui sunt, ex Galeni k etiam uerbis, septem oculi tunicas colligentes, uiri me hercle tanquā perdeliri omnino deridēdi. minimē aduertentes Galenū haud septē oculorū tunicas: At Iridis coronæ uel septē circulos disgregere: qui, scilicet Iridi colligantur, inseruntur uel. Quorum primus quidē (si aduissim singula perlibraris, crystallini maximus circulus est: Secundus uero uitrei supremus, atque extremus circulus est: quorum uterque ad 10 iridem, communi quadam insertione, atque plexu, cōmuniq; per arachnoidem facta ligatione, connectitur. Tertius extremus retiformis tunica circulus. Quartusq; ipsius choriformis. Et quintus ipsius duræ membranæ. Quibus accedit sextus quidam circulus, ex alia membrana insertus, quæ quidem ex musculorum eneruationibus, tendonibus uel originem habuit. breuis tamen existens: quatenus eiusmodi tendones inuicem coniunguntur, atque ad iridis circulū inseruntur. Sextam uero tunicam nominasse Galenus inuenitur, ex ijs, scilicet quæ ad eiusmodi circulum inseruntur. Quinq; enim dicere tunicas possumus: quoniam arachnoidem ab ipsa choroide secernimus. Haudquaquā tamen ob id inter oculorum proprias numeranda tunicas uenit. Cum potius musculorum, eorumq; tendonum sit. Septimusq; demum circulus, qui ad iridem 7. inseritur ipsius est adnata: quam Græci etiam περιόστεον uocant. quoniam à membrana 20 na os capitis ambiente generationem suscepit. Qua de causa etiam à nonnullis, περιγεῖναι uocatur, appellatur. Hi ergo septem Iridis, hoc est Iridi iam inserti circuli sunt. Nec (ut quidā imperitè opinantur) septem uarij oculorum colores existunt. E quorum deinde l quinto circulo Galenus corneam appositè obortam esse declarauit. Sed enim uero in prædictorum enarratione, iam obiter duos tetigimus oculorum humores: tametsi crassiores, ac lentius magis sunt, quā ut humores dici mereantur. Quorum præcipuus, & uerè primum uisionis instrumentum, crystallinus, glacialis uel est, alter uero illius nutritioni ac tutelæ destinatus, uitreus est, quē Cōtra Celsū. m lib. 7. cap. 7. sec. 13. Cōtra Celsū.

potius, quā crystallinum glutinoso oui albo Celsus m comparasse debuerat. Quemadmodum contra, ex illius uaria luce, & non ex uitrei coloribus, pupillæ colores apparere determinandam erat. Tertius tandē aqueus humor, ὑδατοειδής: à Græcis nuncupatus, inuenitur, quoniā 30 uerè humor hic est, à Celfo tamen (ut uidetur) ignotus. ut qui ea parte, qua pupilla est, locū esse uacuum protulit. Sed hæc usque aded, de oculorū tunicis, ueluti per trāsennā, hoc loco dictū sit. Donec affectus distinctē possumus intelligere. In membrana igitur cornea (præter eas, quæ n Supra fo. 183. & 184. o lib. 5. cap. 23. sec. 14. Cōtra multos Græcorū in-terpres.

in albo, et in palpebris fiunt), φλυκταίναι, et φλυκτίνες: Græcè dictæ affectiones adnasci solent: Latine (quemadmodū aliās n prædixisse recolo) bullæ, aut ampullæ, ac uesiculæ dici possunt. Quāq; nonnulli uidentes à Celfo o sub pustularū genere positas phlyctænas: generationis etiam nomine, phlyctænas, Latine pustulas passim interpretantur. Nec sine cōfusione occisione: præsertimq; in alijs corporis partibus. Cum pustulæ nomenclatura penes eos p libro. 6. cap. 6. sec. 11. q 3. fen. 3. tr. 20. cap. 10. r 9. Theor. cap. 13. & 5. præf. cap. 42.

Latinos, quæ Celsum in seq conatur, psyraciac etiam, et exanthemata, nec nō epinyctidas intelligi posse liqueat. In oculis autē, et si genericū adhuc nomē est: Determinatū tamē à Celfo p uide- 40 tur, pro phlyctænis. Qua de re minus malū est in oculis, cū Celfo, pustulas nūcupare. Auicē nā autē interpres (fortassisq; itidē Arabicus textus resonat) uesicas nōiat. I. Hali Abbas uerō

3 p^o. They fir. tr. atq; etiam Abenzoar, ³ pustulas habent. At Razes bothor nuncupat: ⁴ pustulæq; nonnunq; ^u
 8. cap. 15. nomine intellexisse uidetur. Hanc Paulus in oculorum affectibus omisit. Celsus definitionē
 1 2^o. Cōtin. c. p^o. reticuit, per se notam supponens. Qua, supposita, sat illi fuit ad curationem deuenire. ^x Defini
 littera. I. tionum uerò Author ^y communissimè, ac satis imperfectè definit, sic dicens { Phlyctis (sic ^u
 u 9^o. ad Māforē cap. 16. enim Græcè ab eo dicitur, φλυκίς) est abscessio in oculi nigro, humiditatem cum inflam- ^u
 x libro 6. cap. 6. matione, ac defluxu continens } Introductorius autem Liber eodem prius ^z nomine usus est ^u
 sec. 11. scilicet { φλυκίς } deinceps uerò ^a definire uolens, phlyctenam appellat, sic uberius, &
 y Post me^m. lib. quidem clariùs dicens { phlyctenam uocant, ubi per exulcerationem, uel etiam sine hac, exte- ^u
 z cap. 15. circa principia. rior corneæ tunicæ membrana tenuissima, & sublimis elata, intra se humiditatem colleges ^u
 a post medium. rit. aut sub tunicæ spacio, crassior humiditas currens phlyctenam pariat. } Exactius ergo ¹⁰
 Cōtra Defini- Introductorius, q̄ Definitionum Author definiuit: præcipueq; sub corneæ membrana phly-
 tionū Authorē ctēnam fieri scribens. Nihilominus tamen adhuc diminutus est, sub prima tantū corneæ mem-
 Cōtra Intro- brana genitam esse proferens. Etenim (perindè ac Aetius, ^b Hali Abbas, ^c Auicēna, ^d et ipse
 ductorium. etiam Abenzoar ^e dixerunt) sub alijs etiam squamis, corticibus uel fieri phlyctenam contin-
 b lib 7^o. cap. 29. git. Quarum omnium inditia sigillatim: ueluti & alias quoq; multas harum differētias enu-
 c 9 Theor. c. 13. merant. Quæ quidem, loco mox deindè proprio, cuncta, & uberrimè declarabimus. Nūc igi-
 d vbi suprā. tur ad reliqua pertransēamus. Itaq; sub silētiō præteritis huiuscemodi phlyctēnis. Paulus f
 e vbi suprā. quatuor ulcerum differentias, proprijs nominibus insignitas definiuit. sic dicens { ulcerum in ^u
 f libro 3. cap. 22. oculis genus quidem unum est: differentię uerò speciales plurimæ. Etenim in cornea cauū, ^u
 sec. 22. ra 4^{or}. p^m. angustum, & purum ulcus, Βόθριον appellatur; hoc est, Latine fossula. Βόθρος enim foueā: ²⁰
 Βόθριον. Βόθριον uerò diminutiue fossulam, seu foueolam Latinis repræsentat. Serapio & corruptè bi-
 g 2^o. Breu. c. 11. trion, corruptiusq; in quibusdam codicibus, bucion. Auicenna ^h aulunū, corrupteq; anulū,
 h 3^a. sen. 3. tr. 2. siue analum, siue analalium. Serapionis interpres addit { & eius intentio est grana } expo-
 cap. 3. nunt nonnulli, quia scilicet in eius profundo est sicut granum album. Secundam uerò speciem
 2^m. subdit Paulus, dicens { quod autem latius bothrio, fossula uel est, sed minùs altum, κελωμα ^u
 κελωμα. nuncupatur. } Latine concauum, siue cōcauitas dici potest. Serapio, cucume, nominat, corrupto
 proculdubio Græco apud Arabes nomine { Et eius intentio est (ut subdit) profundum } Res-
 etius dixisset, cauum, Auicenna, luluma, quasi dicat corruptè, cœloma, corruptiusq; lilimie uo-
 3^m. cat. Tertiā deindè speciem Paulus adiunxit { ἄργεμον autem in iridis circulo nascens, cir- ^u
 ἄργεμον. cunstancia comprehendit. Adeo ut, extra iridis circulum, rubicundum: intra circulum uel ³⁰
 rō, album appareat. } Quo in loco Andernacus bis non rectè pupillā uertit, pro iride. Nosq; ^u
 Cōtra Ander in quibusdam (præter consuetudinem) sententiam magis, q̄ uerba traduximus. Intelligere
 nacum. autem non pupillam, neq; extra, uel intra pupillæ circulum, sed iridis ambitum, intusq; illum,
 & sic oculi nigrum: extra uerò eiusdem iridis circuli, ipsum oculi candidū: ultra quod Græ-
 ca dictio { ἰρις } non pupillam, sed coronam referēs demonstrat: Aetius etiā perpulchrè
 ostendit dicens { ἄργεμον est ulcusculum, circa iridis circulum, factum: partem albi, & ^u
 i lib. 7. cap. 26. partem nigri occupans. } Ecce quomodo non extra pupillam, uel intra eius circulum fieri Ae- ^u
 tius intelligit: uerū in nigro, quod est, intra iridis circulum, & in albo, quod est etiam extra
 eiusdem iridis coronæ uel ambitum, circulum uel. Quāuis autem in albo rubicundum (Pau-
 lo docente) appareat: Aetius tamen quod ex eo maius, ac principalius est, tetigisse uoluit, ⁴⁰
 partem scilicet quæ in nigro corneam erodit, intra iridis circulum. Qua de re subdit { Al-
 bum

- bum apparens.} Vnde nomen sumptum est: ut argemon diceretur. Etenim Græcis ἀργε-
μων idem, quod nobis album, candidūq; præsefert. Serapio corruptè, achimon, habet. Et fit (ut
„ subdit) super coronam nigredinis (qua de re Princeps quoq; coronalem uocat) Et non ac-
„ cipit de albedine, hoc est, adnata nisi locum paruum. Et sunt ei duo colores. quod est, quia il-
„ lud, quod ex utrisq; est extra coronam, est rubeum: & illud, quod est intra coronam, est al-
„ bum. Quod est, quoniam quod ex ulceribus est inter coronam, est in corona, & quod est ex-
„ trà, est in coniunctiua: & omnia ulcera quæ in coniunctiua sunt, rubea sunt: sicut illa, quæ
„ sunt in cornea, sunt omnia decliua ad albedinem.} Hac Serapion. Equibus quidem uerbis
apertissimè huiusmodi ulceris forma ostèditur. Transcripsitq; fere ad uerbum Hali Abbas.
10 nec aliud Razes, atq; etiam Princeps uoluerunt. Quartam deniq; speciem Paulus adiunxit, 4^m.
„ sic eam definiens {ἐπίκρυμα est sordidum, impurumq;, & crustosum ulcus: quo repurga- ἐπίκρυμα.
„ to, sæpe oculi humores defluunt.} Latine dici potest, combustio, siue, adustio, Quam ob
rem Princeps habet corruptè {alficume} quasi dicat, epicauma, exponiturq; ibi {scilicet
adustium} Serapion {akifume} corruptiusq; in quibusdam codicibus {aufume} Aetius uerò
(quem potius, q; Paulum, in pluribus ex ijs, & quæ dicendæ sunt, speciebus, transcripsisse
prædictos Arabes liquet) quartam hanc speciem Encaumatis nomine definiuit: aliud interim Encauma.
epicaumatis nomine intelligēs. Adeò ut Aetij Epicauma, à Pauli epicaumate differat. Illiusq; Aetij epicaum-
encauma, distinctius multò declaratum, huius epicauma sit. Illius autem epicauma à Paulo ma-
definitum non sit. Atq; id ipsum ut manifestius pateat, Aetij quoq; ἐπίκρυμα consideremus
20 dum inquit {Epicauma uerò dicitur, quum oculi nigrum in superficie exasperatum, inu- k lib. 7. cap. 25.
„ stumq; fuerit, & colorem cinereum præsetulerit} Serapion {abafe} nūcupat. subditurq; ibi
„ {& eius intentio est disruptio} quemadmodum & in encaumate eadem interpretatio sub-
iungebatur, quod ipse (ut uidimus) akifume nominabat. Auicenna similiter, adustiuam, nun-
cupat, et lanosam, quia (inquit Serapio) est similis lanositati. Existit enim (declarat Prin-
ceps) in eo, quod apparet de pupilla, ac si lana pauca esset super ipsam} Sed æquiuocatio no-
minis hic intercidit, ut pro cinere, lanam Arabes habuerint, & pro nigro, pupillam Princeps
legerit. Deprauateq; magis apud Razem, & Hali Abbatem legitur. Cum hic furculæ, Ille
autem radici, propriam uocem uel ipsi, uel eorum potius interpretes ignorantes, assimilarint.
Præter has autem quinq; ulcerum corneæ species, Aetius duas alias, & quidem superfi-
30 ciales adiunxit, Quarū prima dicitur ἀχλὺς Latine uerò, caligo, sicq; ab eodem definitur ἀχλὺς.
„ {caligo est ulcus superficiale in oculi nigro factum. cōsimile caliginoso aeri, colore cæruleo:
„ quod multum locū nigri occupat. Quum uerò in pupilla factū fuerit, nō facile ægri uident.}
Serapion corruptè {adus} pro {achlys} habet. & eius intentio (ut subdit) est athomi. Expo-
nunt nonnulli, quia sentit in oculis, qui huiusmodi ulcus patitur, ac si esset puluis subtilissi-
mus: quem athomi nomine significat. Sed tunc Græcum nomen esset. & absq; aspiratione
{atomi} scribendum ueniret. Melius uerò, in huiusmodi etiam significatione, foret, Ideo ato-
mos, siue atomum nominandum, quia aeri atomis, hoc est, tenuissimis corpusculis pleno, ac per
hoc turbulento simile in oculo apparet. Quocirca etiam fumo tam ipse, q; Princeps, atq; etiā
Razes, & Hali Abbas assimilarunt. Princeps uerò corruptè alchasi, pro {achlys} habet:
40 corruptiusq; in antiqua litera legebatur {adhasue} & fortasè nominatur, ut subdit {chate-
man} siue {chatemen} Altera dein species, quam Aetius adiunxit, est, quæ Græcè nuncu-
patur

νεφέλιον. patur νεφέλιον, Latine autem nubecula. (Quam sic Aetius definit & Nubecula autem uos
 datur profundius, ac minus caligine ulcus in nigro. Et est colore albus. & Serapion corrupte
 diafilion; habet & est eius intentio (subditur ibi) caligo; Intellexit autem interpres, per
 caliginem, ipsam, quam nos diximus, nubeculam. Princeps ergo clarius protulit & Et nomina-
 tur nubes. & subditq; statim & Et fortasse nominatur chateman; siue, ut in antiquo codice
 Septē ulcerū habebatur. & chatemen; ueluti & præcedentem quoq; speciem nominari posse prædix-
 spēs, secundū rat. Septem igitur ulcerum species Aetius in cornea proprijs nominibus descripsit. Quorum
 Aetium. quidem quatuor superficiales esse ait. uidelicet caliginem, nubeculam, epicauma, & en-
 l lib 7. cap 25. cauma. Tres uero reliquas quasi ex opposito subiungens, neq; in superficialiū catalogo cō-
 m cap 26. 27. numerans, profundiores esse insinuat. Quæ sunt, argemon, bothryon, & cæloma. Quas ob
 n uidelicet c 25. res minimè increpandus ueniebat à Manardo Princeps, ac reliqui Arabes. quatenus uideli-
 Cōtra Manar- cet septem species enumerarūt. Ut quorum non Serapio primus. Author: uerū Aetius, for-
 dum. tassiq; alius quispian Græcus exstitit. Nec si Galenum Princeps allegarit, excusatione pe-
 Auicennæ ex- nitus destitui concludemus. Cum in libro de oculis Galeno iam attributo, has omnes eodē,
 cusatio. quo Arabes scripserunt, ordine cunctas prædictas esse legerimus. Quāq; deprauatus ille
 o Particula. 4^a. codex sit. ut qui superficiales quatuor, intrinsecas, contra uero quas profundiores dicere Au-
 cap 10. thor intendebat, superficiales, & exteriores, habeat. Quod si Galeni spurium esse librum
 Libri de ocu- dixeris, Id ipsum minimè negabimus. Sat tamē superq; Principi fuisse dicemus, q; in aliquo
 lis locus. passim nuncupato Galeni libro, huiusmodi sententiam legerit. Quocirca uerū dixisse Prin-
 In quibus dis- cipem ex Galeno, haud promissimus: at excusatione penitus non destitui. Cum nō ex insom-
 fert Aetius ab- nio, sed ex aliquo Galeni libro sumpserit. In eo tamen prædicti Arabes, cum Authore libri
 Arabibus. de oculis ab Aetio dissentiant (Quāq; omnes quatuor superficiales, ac tres profundiores
 expresserunt) Quoniam illi argemum inter superficiales, & tertio quidem ordine cōnume-
 rant. Aetius uero extra superficialium catalogum adnumerans, inter profundiores in-
 tellexisse apparet. Et ne superficialium numerus quaternarium excedat: profundiorum uero
 alia ex parte numerus ad ternarium perueniat, quasi cambium illi facientes, à superficialiū
 albo encauma deduxerunt: Et ad profundiorum seriem tertio loco reducere. Fortassisq; nō
 temerè. Cum ob uehementem exustionem, erodentemq; sorditiem, altius descendere soleat.
 quod ab Aetio quoq; negari non posset. qui profundius huiusmodi ulcus petere insinuat, q;
 argemon: quod ulcusculū esse protulit (quāq; id extra superficialia: illud uero inter superfi-
 cialia connumerat) Quas ob res, si ad amissim singula perlibrarimus, potius laudandi, q; in-
 crepatione digni hac in re Arabes, præcipueq; Princeps, ueniunt: ut qui rem exactius ipso
 Cōtra Aetiū. etiam Aetio intellexisse uideantur. Haud ergo librum de symptomatum causis^p adduxisse
 p libro. p^o. cap. 3. se Princeps uoluit. quēadmodū Manardus uir alioq; doctissimus opinatus est, sed ueluti præ-
 circa finem. diximus, librum de oculis. q; iam inter ulcera, seu uulnera cōputauit. Nec eum solūmodo librum
 uidisse Princeps potuit: sed Introductorium quoq; ac Definitionū Medicarum uolumē, Ga-
 leno etiam ascriptos libros. Vnde suam confirmasse sententiā uerisimile est. Introductorius
 q c. 15. post me^m. ergo liber, I oculorum ulcera enarrans, & nubeculā, et caliginē inter illa Definit. nepheliō
 primā, achlys uero secūda, Græcis nōibus reseruatis, ab interprete legūtur. Nec alias idē au-
 thor species omisit. qui cælomata, argemū, bothryon, et epicauma sigillatim definiuit. Sub quo
 et encauma inclusisse uidetur. Cum nō in superficie modò, sed profundius quoq; nōnunq; con-
 sistere

sistere definierit. Definitionum quoque liber, tametsi diminutus est, celomata, & encaumata omittens: Nepheliō tamen inter oculorum ulcera reponit. Qui demceps in eius definitione deficit, quoniam caliginē admiscuit. Adeo ut nubecula genus caliginē esse determinarit. Sic dicēs: *νεφέλιον ἐστὶν ἄχλυσ, ἢ ἑλκός*. hoc est nubecula est caligo, uel ulcus etc. Quod si Paulum accusare quispiam uoluerit, illum ex eo diminutum asserens, quia ē prædictis ulcerum speciebus, tres intactas omiserit, nubeculam scilicet, caliginemque, ac encauma, siue inuersionem: Ab huiusmodi quidem calumnia facillimè hominem liberabimus: pro ea, quæ ipse met Paulus quod primum subdit: Dicēs: iam uerò plures ulcerum sunt differentiae. De quibus dicemus cōmuniū. Haud igitur negat alias esse oculorum exulcerationes Paulus: Verum tamen sibi placuit, quatuor duntaxat explicitis, reliquas sub communi ulceris nomine subintelligere. Cum eadem curadi methodus existat. Pluresque alias etiam ulcerum species cōmuni deinceps nomine, uel ulceris, uel anthracoſeos, atque carcinomatum, hoc est, carbunculi, & cancri, profecutus est. Vnum uerò considerandum restat, nephelion, nubeculam uel Paulolobum (quod ex aliorum opinione) cicatrices per oculorum summa factas indicasse. Adeo ut Pauli nubecula ab Aetij, prædictorumque omnium authorum nubecula differat. De quibus quidē cicatricibus infra uberior sermo fiet. Hactenus de phlyctenis, ulceribusque corneæ, dictū sit. Non modò, quia semper ulceri tumor aliquis, ob materiæ iam exulcerantis defluxum, annexatur. Præsertimque ubi uehementior adfuerit dolor: Verum quia staphylomatis hoc in loco primum uestigati, tam phlyctenæ, quæ ulcera causæ extiterunt. Est enim staphyloma, penes Paulum, proptoseos species: *πρόπρωσις*: autem (eodem authore) rhagoidis tunicae procidentia est, ex erosione, aut ruptura corneæ genita: Dixi proptosis, penes Paulum. Quia Celſo, nec non Aetio quinimodò ipsi etiam Galeno, Introductorioque libro, & Definitionum authori, ac demum (ut uidebimus) Scribonio Largo proptosis alium ab hoc diuersum affectum præſeſert. qui aliàs à Paulo *ἐκπρωσις* nūcupatur, totius uidelicet oculi prolapsus, extra propriam ossis cavitatem, ut exertus emineat. Auicenna oculi exitum, & egressionem nominat. Celsus ergo sic ait: nonnunquam autem ingens inflammatiō tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat, *πρόπρωσις* id (quoniam oculi procidunt) Græci appellant. Quæ uerba legentes Pauli interpretes, *πρόπρωσις*, apud ipsum, quæ non aliud, quæ uuea rhagoidis uel exertio, siue malueris dicere, procidentia est, inconsultè & oculi procidentiam: Latine conuertunt. Etenim dum Celsum æmulari opinantur, minimè aduertunt diuersum à Pauli intentione, affectum Latinis ostendere. Scribonius uerò Largus, quem Græcè Asclepiades, referente Galeno, legit ad *πρόπρωσις*, aliosque plurimos oculorum affectus, percommodam compositionem scripsit: Latine autem sic dicit: ad uasum tumorem, quem quia à loco interdum uidetur propellere oculum, *πρόπρωσις* uocant etc. Cornarius & prolapsus oculi: haud ineptè uertit. Albanus uerò, in priori quam ædiderat Pauli uersione, non Pauli modò, sed propriam suipsius (ut uidetur) sententiam ignorans, Scribonij uerba transcripsit, sic in titulo conuertens. ubi Paulus habebat Græcè *πρόπρωσις*: ille & De proptosi uasulo tumore, qui oculum propellere uidetur. Quæ tamen uerba nunc, tanquam Andernaci simia corrigens, remouit. Haud tamen rei medullam adhuc percepit. Cum nunc iam Pauli proptosis oculi procidentiam traducat, ubi dicendum fuerat, uuea procidentiam. Epiſemon uerò, Latinum ei referre nomen ignorans, sic Græcum omisit. Sed hæc de nomine satis. Nos autem

r post me^m. libri

Cōtra Paulū.

Obiectio.

Solutio.

s libro. 3. cap. 22.

sec. 22.

b Ibidē sec. 25. a

principio

Pauli nephe-

lion siue nube

cula.

t Ibidē sec. 23.

πρόπρωσις

secūdū Paulū

qd.?

u lib. 6. ca. 6. sec.

8. in fine.

x lib. 7. cap. 24.

ἐκπρωσις.

πρόπρωσις

apud Celsum

& Aetium.

y 3^a. fen. 3^a. tr. 2.

cap. 30. 31. 32.

Cōtra Ander

naci, et Alba-

nū Torinum.

z cap. 27.

a 4. de cōp. med.

secūdū loc cap. 7.

post medium.

b In traduſione

libri de cōp. med.

secūdū loc. et Ae.

tij ubi supra.

Cōtra Albanū

Torinum.

tem

tem Celsi, Aetij, ac Largi, quinimodò Galeni, Introductorij, & Definitionū Authoris proptofin alibi pertransibimus. Nunc temporis Pauli proptofin consideremus, cuius quidem species est, quod inquirimus staphyloma, siue uuatio. Namq; plures aliæ procidentis uueæ species sunt, in eo quod magis, ac minus est, duntaxat à se inuicem dissidentes. Siquidem ubi ad duc paruus est tunicæ prolapsus (inquit Paulus) ut muscæ capiti similis fiat, *μυοκίφαλον*, quasi dicat, nuper efflato nomine, Muscicaput nominatur. Nec paruitatis tantum ratione, sed figuræ etiam similitudo ad muscæ caput refertur. Perinde ac ex Aetio^c didicimus. Razes^d uocat { Musaragi } & aliquando^e { caput formicæ } Hali Abbas totum genus, quod à Paulo proptofis nūcupabatur, acumen corneæ, siue acumen oculi, & nominat. Primam uerò hanc speciem formicæ capiti etiam assimilât, & mouseregum uocat. Auicenna^h genus etiam corneæ rupturam dicens: Primā quoq; speciem formicalem, & almusaragi, et aldebabi, seu aldebani, id est, muscalem appellat. quauis in antiquiori traductione { granatilis } legatur. Quoniam uerò phlyctænis aliquantulum similis est. adeò ut nonnulli pustulam reputent (ait Hali Abbas) Idcirco tam ipse, q̃; Auicenna, exactiusq; ambobus Aetius inditia, quibus ab inuicem distinguantur, exposuerunt. Quum ergo nondum creuit rhagoidis exertio, huiusmodi species fit. Quum uerò amplius (subdit Paulus) & eousq; succreuerit, ut uueæ acinosis similis euadat, staphyloma nominatur. à præscriptis Barbaris authoribus uuea dicitur. At ubi plurimus uueæ tunicæ prolapsus factus est, ut palpebras transfiliat, Græcè *μῆλον* Paulus nuncupat. Latine malum, siue pomum dicere possumus. Razes interpres uocat { subtilis } Auicenna quia fortassis inflatæ uesicæ similis sit, uesicæ nūcupat. Aetius hanc speciem nō expressit. Hali Abbas de ea meminit, sed proprium nomen nullum retulit. Demum si iam iam prædicta occalluerit (subdit Paulus) *ῥῆλος*, Latine, clauus, appellatur. Hali Abbas quoq; clauum: Auicenna claualem appellat. Quamq; easdem quatuor species repetens in eodem capite Princeps tertiam & uesicalem, & claualem nominari: Quartam deniq; orbicularem uocans. quam non amplius clauo, clauiq; capiti, sed fuso, huiusq; capiti, quod armillam nō nulli è Latinis etiam nuncupant, ob eius magnitudinē, assimilât. Definitionum uerò Medicarum author ex ijs tantum duas species definiuit: Myocephalon scilicet, ac staphyloma. Introductorius autem liber has duas, & tertio clauum quoq; declarauit. Verum uterq; in staphylomatis definitione defecit. dum in pupillæ regione staphylomatis fieri tumorem, & non (ut in myocephalo) secundum oculi nigrum, Iridis uel circulum, determinarunt. Etenim si ex rhagoidis exertione, prolapsuq; staphyloma factū sit, eiusdem generis cum ipso myocephalo existens, à quo maioris duntaxat ratione (quemadmodum prædiximus) differt. In pupillæ regione fieri non potest. Cum ibi rhagoidis tunicæ foramen sit. quamobrem non eius procidentia, sed aquosi humoris euacuatio fieret. unde uisus omnimoda priuatio resultat. In oculi ergo nigra parte, media scilicet inter pupillam, & Iridis circulum, regione, fieri myocephalon, ac reliquas procidentis uueæ species, compertissimū est. { Diuulsa est autem contractaq; omnino (inquit Aetiusⁱ) in rhagoidis prolapsu pupilla ipsa, ut prorsus non appareat, aut & situ, & figura immutata uideatur. } Sic inq; accidit si ex rhagoidis (uti prædictum est) exertione, prolapsuq; staphyloma fiat. Cuiusmodi speciem duntaxat expressisse Paulus libro tertio^k uidetur. Verum enim uerò alter quoq; staphylomatis modus est: quem perbellè Aetius^l enucleat, his uerbis { Appellatur autem staphyloma, quum corniformis tunica fuerit eleuata

^c lib. 7. cap. 33.

^d 2. Contin. cap.

^e 1. litera. H. an-

te mediū capitis.

^f Ibidē litera. H.

uersus finē cap.

^g 9. Theorice. c.

13. ante mediū et

^h 1. Pract. 44.

ⁱ 9. pract. 26.

^k 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^l 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^m 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

ⁿ 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^o 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^p 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^q 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^r 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^s 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^t 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^u 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^v 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^w 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^x 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^y 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^z 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^{aa} 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^{ab} 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

^{ac} 3. fen. 3. tr. 2

cap. 6.

„ uata, & eminentiam acino uuae similem fecerit. Fit autem aliquando humoribus sub ali-
 „ quam corniformis tunicae membranulam, squamulam uel collectis: à quibus humoribus uel coacta
 „ corniforme tunicam abscedere, sustinerique contingit, ac eleuari, & incuruari, facereque sta-
 „ phyloma, citra ruptionem. Fit hoc etiā ex phlyctæna bulla uel quadam inter squamulas, mem-
 „ branulas uel corniformis tunicae, satis profunde consistente. Quae tunicam eleuauit, non tamen
 „ rupit. Huiusque causā nos antea de phlyctænis determinasse uoluimus. quemadmodum pro
 „ alterius staphylomatis notitia, de corneae quoque ulceribus plurima praetigisse decreuimus.
 „ Quam profecto distinctionem à Principe^m olfactam esse liquet. Quauis igitur alter sta-
 „ phylomatis modus, qui scilicet absque corneae ruptura gignitur, in pupillae etiam regione fie-
 „ ri queat: cum intro minimè penetret: In hoc tamen defecisse etiam Definitionum, atque In-
 „ troductorij Authores determinandum. Quoniam in definitione pupillam consurgere simpli-
 „ citer protulerunt. Etenim non in pupillae tantum regione, sed extra illam quoque, per totum ni-
 „ grum, intus Iridis circulum, huiusmodi staphyloma fieri contingit. Quemadmodum quod
 „ ex rhagoidis procidentia generatur, extra pupillam, in reliquis nigri partibus aduenit. Du-
 „ plicem uero praedictum staphylomatis modum Celsusⁿ minimè ignorasse uidetur: sic scri-
 „ bens: In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica: siue ruptis intus membranis
 „ aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit. Vnde id $\sigma\alpha\phi\upsilon\lambda\omicron\mu\alpha$ Graeci uocant. & Dis-
 „ cens igitur siue ruptis, siue laxatis membranis, duplicem aperte iam iam praescriptam spe-
 „ ciem insinuat. Sed neque Paulū huiusmodi staphylomatum differentia latuit. Quauis enim
 „ libro tertio^o rhagoidis procidentias enarrās, alteram duntaxat speciem, uelut suo tunc pro-
 „ posito conducentem declararit: uidelicet eam, quae, rupta cornea prolabenteque foras rha-
 „ goide tunica, fit: Nihilominus tamen libro sexto^o utranque nobis indigitare speciem uoluit. sic
 „ euestigio generatim scribens: Staphyloma quidem est ceratoidis tunicae eleuatio, incurua-
 „ tio uel una cum rhagoidis tunica debilitata, nonnunquam defluxionis, nonnunquam uero exulcera-
 „ tionis occasione. Quā quidē et à Galeno^o significatā quoque intelligimus: quū ait: Quae autē
 „ staphylomata nūcupantur, alia quodē solo positu, alia uero dispositione affectu uel praeter natu-
 „ rā existūt: Solo. n. positu praeter naturā esse intelligimus, quaecumque absque corneae ulcere facta
 „ sunt. Cū à relaxate duntaxat humore in gibbū cornea tunica, fortassisque etiā uuea unā cū illa
 „ (uti Paulus innuit) eleuatur. Nā & si praeter naturam humor etiā ille est: Causa tamen mor-
 „ bi, non affectus est. Nec si uel bulla, uel aliqua continui solutio intus sit, ea manifestus mor-
 „ bus est. Quae autem ex corneae penetrante ulcere adueniunt, à causa, quae alias etiam affe-
 „ ctus praeter naturam omnibus euidentissimus est, generationem suscipiunt. Cuius adhuc ul-
 „ ceris causa, non morbus existens, erodens quispiam humor, uel exterius fortasse uulnerans
 „ aliquid esse potest. Differt autem hoc staphylomatis genus, ab altero (inquit Aetius^o) quo-
 „ niam in hoc, ruptura quoque corneae facta est: & quod prolapsum est, caruleum, aut nigrū
 „ apparet. In illo autem eleuatio sola, incuruatio uel tunicae corniformis est. Vnde etiam tota mo-
 „ les albidior apparet. Quam solummodo speciem considerasse Introductorius Author uide-
 „ tur. quū in definitione, album colore esse quod acino comparatur, exposuit. Qua de causa
 „ nec non & alia iam praetacta diminutum esse declarauimus. Qui etiam in clauī definitione, à
 „ Paulo, & Aetio discors est. Etenim hi rhagoidis esse procidentiam usque adeo magnam uo-
 „ lunt: ut palpebras transiliat, callumque praeterea non uuea modo, quae prolapsa est, dure fa-
 „ ctum.

m 3^a fen. 3^a tr.
 2. cap. 6. uersus
 mediū capitis

n lib. 7. cap. 7.
 sec. 11.

o cap. 22. sec. 23

p cap. 19.

q li. de tu. praet.
 nat. cap. 21.

r lib. 7. cap. 35.

Clauus apud
 Paulū, et Aes-
 cia tum.

lib. 3. cap. 22. *Et duxerit (ueluti Paulus¹ ostenderat) Verum & ipsa quoque corniformis tunica circūcirca, ubi perforata est, callosa iam (prout ex Aetio¹ colligi potest) euaserit, talemque affectionem cōstringit. Quoniam per omnia clauī capiti similis existit. Introductorius uero Author carnosum esse nigri excessum, solidum, cum leui, albūque uelut cicatrice, callum definiuit. Ex quo*

Clauus apud Introductorij clauū, à Pauli, Aetijque clauo, in oculis differre palam fit. Subdit uero deinceps

Introductorij Introductorius & frequenter etiam in albo, ubi nigrum oculi tangit, cohaeretque, confurgens

lib. 7. cap. 7. *Quam clauī secundam speciem locumque duntaxat cognouisse Celsus² ostendit: sic illum definiens & clauī autem uocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figurae similitudine est. & Vnde Celsi clauum, introductorij clauo conuenire (quodque specialior eo est,) ac per hoc ab Aetij, Paulique, ac Arabum ijs adhaerentium clauo differre iam liquet. At id, cuius gratia singulos hic percurrere tumores aggressi sumus, contemblemur: ipsum uidelicet staphylomatis temperamētū, atque humorē qui oēm uueae procidentia comitatur. Incerti quidē igitur temperamenti staphyloma fuerit. Quauis enim ab initio calidum sit quod ex uueae procidentia gignitur: siue ab exteriori quauis perforante occasione, siue ex interaneo ulcere prouenerit: quoniam illi ex templo phlegmone, ac dolor annectitur: Huic autem erodentis humoris incendium, dolorque ratione, phlegmone etiam adiungitur. Quā rursus ob causam & phlyctenae, & septem praenarratae ulcerum oculi species circa initia calidae dubio procul omni existunt: Temporis taamen progressu, quum obcallescere inceperint, ad frigidum uergerē cognoscuntur. melancholicaque affectiones ex sanguineis, biliosis uel, aut pituitosis salis, aut mistis euadēt. praecipueque clauī tales sunt. Sin ex relaxante nonnunquam humore staphyloma contigerit, citra rupturam: pituitosum tunc, ac per hoc frigidum esse uel ab initio tumorem liquet. Quod si (uelut in pluribus herniae speciebus obseruauimus) ipsam exeuntis rhagoidis substantiam per penderimus: primae radice ratione, sanguineum esse spermatis cum uel tumorem proferre quodque remotissime poterimus. At rursus quidem singula proprijs locis per librare certum est, & me hercle uberrime: usque adeo ut nil desiderandum remaneat. Nunc uero ad clauī definitionem usque penes uaria multorum decreta, sermonem nostrum uel inuiti protelauimus. Tempestiuum ergo est tumoribus à Galeno in proprio uolumine relatis ultimum clauum, ac sigillum imponere: Qui iam numero unus & sexaginta propositi fuerunt. Quibus demum cunctis expeditis ipse met Galenus ait³ & nulla adhuc superest species tumorum praeter naturam, quae à nobis commemorata non fuerit. }*

Supra fo. 77.
y libro de tum.
praet. nat. in fine

Obiectio contra Galenū.



VERVM enim uero quoniam tumores oēs percurrere nullo (quo ad uires suffecerint) praetermisso certū est: Ardua, nō minū, quā longa hic dubitatio aduersus ultima Galeni uerba insurgit. Nāque Galenus inquit, nullū esse tumore, quē in eo uolumine ita cōtū dimiserit. Nos autē ualde plures praeter naturā tumores inuenimus, quā hi sint, quos hucusque unā cū ipso ex eo libello percurrimus. Atque id ipsum exquisitiū procul dubio nouerimus: postquam alterū, et quidem nouum catalogum cōtexuerimus. Eorū scilicet tumorum, quos omnino Galenus in eo uolumine, sub silentio praeteriuit. Quorum plures alibi ab ipsomet praetactos inuenimus: plurimos uero penitus ab eodem incognitos, nullibi que comprehensos fuisse cōpertum habemus. Ipsum igitur nouum catalogū exquisitiū legito, legensque adamussim, ac mente peregrina perpendito.

Primus.

PRIMVS Verò hic, non, quemadmodū in priori Catalogo, Polysarcia, toti corpori uniuersalis est, sed capiti proprius. A quo deinceps & alios, uel ipsi parti etiam proprios, uel maxima saltem ex parte contingentes, ordinate, ad pedes usq; cunctos perscrutari conabimur. siue internariū siue externarū, aut ambarum partiū affectus sint. Mox uerò deinde reliquos uel uniuerso insimul corpori cōmunes, uel absq; certa partis electione, modò hanc, modò illā inuadere solitos disquiremus. Quemadmodū igitur Galenus achorē, cerion, et psydracē siue psydracion, capiti (uel ipsomet² auctore) familiares tumores recensuit, quos iam antea declarauimus: ordine. si uigesimali nonū, ^a trigesimum, ^b & trigesimūtertium: ^c Cur tot eidem capiti proprios, uel plurimum aduenientes alios omisit? Quorum.

z p^o. de cōp. me
dic. secundū loc.
cap. 10. & 11.
a supra fol. 166
b fol. 167. et
inde simul uide
de utrisq;
c fol. 183.

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 10 P ² . Eczeſma. (pilla. | 6. Hydrocephalos. | 12. Catalepsis, seu | 18. Sekakilos. |
| 2. Eleydriō, siue pas | 7. Siriasis | (catocha. | 19. Tesludo. |
| 3. Syco. i. ficus, seu fi | 8. Phrenitis. | 13. Caros. | 20. Talpa. |
| cosum Exathema. | 9. Lethargos. | 14. Apoplexia. | 21. Topinaria. |
| 4. Exanthema. i. ulce | 10. Typhomania, seu | 15. Rhia alsabiā. | 22. Lactumen |
| rosa efflorescētia. | (agrypnon coma. | 16. Sibare. | 23. Cornu. |
| 5. Gagliō. Celsi. | 11. Catochos Pauli | 17. Fatra. | |

Hos porrò affectus nemo sanæ mentis in tumorū albo numerādos fore inficias ibit. siue Græcos, Romanos uel siue Arabes, aut ipsos demū Barbarolatinos recentiores consulamus. Sunt uerò hi quoq; tumores, illorū instar, qui à Galeno præacti iam sunt, proprijs quibusdā impositis noībus appellati. Missos interim facimus innumeros ferè particulares tumores, tā in capite, q̄ in quouis alio membro erumpentes: quos pro sedis diuersitate ad diuersa morborū capita reducere possemus. Ut uerbi gratia cerebri phlegmonen, uel gangrænam, aut sphacelon: Itemq; cerebri erysipelas: atq; huiusmodi q̄ plurimos, ut qui Galenū sectātes, proprijs (uti dictum est) nomenclaturis determinatos præostensis annexere decreuimus. Sed ne à præternaturalium tumorum albo quinq; alios affectus absoluerem, qui sequuntur.

- | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 24. Alopecia. | 25. Ophiasis. | 26. Pityriasis. | 27. Phthyriasis. |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|

d ut Fuchsius i
copēdio medicis
noē cap. 41.

In his. n. aliquē inesse tumorē circa cutim exquisitiū perpendentibus liquebit. Decentiusq; hi, q̄ albos uterq; ac leuce in tumorū catalogo reponendi sunt. Illos tñ quidā d in eodē numero descripserūt. Haudquaq; uerò perpetim deest præternaturalis tumor in Cephalæa, hemicrania, paraphrenitide, epilepsia, cataphora siue comate, fatuitate, memoriæ iactura, uertigie, aut alijs fortasse symptomatibus, quorū causa tumor nonnunq; esse solet. Quoniā autē plurimū absq; ullo tumore huiusmodi symptomata contingunt, uel sola inq; intemperie, uel continui nōnunq; solutione, aut uenenosa qualitate: Idcirco quatenus tumoribus interdū ut causis adnecti consueuerint, singulos huiusmodi affectus, extra nihilominus catalogū, i alio tomo declarabimus, ne hic ad odiosam, nimisq; excedentem magnitudinē increſcat. Ad nos autē reuerſi plures in capite, præter tres à Galeno præactas tumorū spēs inuenimus: Quæ (ni fallor) ad septimū et uigesimū numerū rediguntur. Cur ergo nullā esse, in fine adiunxit, quæ quidē à se in eo libro cōmemorata non fuerit? Tāq; igitur diminutus, i perfectusq; insimul, ac mēdax increpandus ueniret Medicorū proculdubio, post Hipp. Coryphæus. Nisi ad eorū aliquē, q per uniuersū uolumē, prænarrati iā fuerāt, uelim², nolimus, reduci queāt. Ut nō temerē oēs spēs i mō spālissimas sub suis gñibus cōprehēſas per capita declarasse proferēdū sit. Præsertim cū oēs ad 7^{am}. nobis propositā distinctionē hoc i loco enucleādā referātur. u3. quoniā oēs uel sanguinei, uel pituitosi,

Obiectiōis cō
tra Galenum
propositæ scz
lutto.
e supra fol. 76

pituitosi, uel biliosi, aut melancholici, seu aquosi, aut flatuosi sint. Indeque aut phlegmones, aut erysipelatis, aut scirrhi, uel oedematis, uel alterius demum cuiusvis in priori catalogo declarati tumores quaedam species sint. Quas ob res tandem ad propositam quoque in textu bimembre diuisionem reducamus: omnem scilicet tumorem esse calidum, uel non calidum. Ut autem quae dicimus exactissime liqueat, sigillatim quos modo proposuimus capitis tumores enucleare aggrediamur. Sic non longe facilius, clariusque doctrina emerget: cuiusque uidelicet membri tumores seorsum propositos singulatim emedullare, quod uniuerso prius catalogo expleto, a capite rursus exordiri.

p^o. Tumor.

Eczeſma.

f supra fol. 173.

26. et fol. 176 et

11. et. 177. 26.

g p^o. de comp.

med. secundum loc.

cap. 10. et. 11.

b lib. 6. ca. 68.

circa finem.

i lib. 4. cap. 10.

περιέειμι,

seu περιέειμι

μα.

k fol. 137. 138.

Cōtra Corna

riū, et Ander-

nacum.

ἐν βρασμῇ.

l ubi supra: f.

4^o 10.

Cōtra Cor-

narium.

m ut Cornarius

in annot. p^l. de

cōp. med. super

cap. 8.

n fol. 191. 192.

ὕψω.

PRIMVS Ergo erat Græcè notatum ἐνέειμι. de quo alias meminisse recolo. Vbi. f. achoras, atque una Cerion, fauū ue enarrare. f. Cornarius Galenū, & atque Aetiū interpretatus, feruentē, siue feruidā papulā Latine appellat. Nonnulli uerò feruorem traduxerūt. Nec temerè hi secundū uerbo. n. Græco nomē deductū est ἐνέειμι quod est Latine ferueo, seu cōburo; unde ἐνέειμι; deriuatur, hoc est, feruor; & ἐνέειμι; i. feruidus, seu feruefactus; Indeque etiā dicitur ἐνέειμι; quod est calidū. Qua de re Paulus hanc & περιέειμι; uel forte τασε & περιέειμι; nūcupauit. Andernacus ē Pauli interpres feruētes papulas Latine cōuertit. Nos autē antea id quid Celsus, quid uel Plinio papula significet, exquisitè narrauimus. F. quibus quidem uberrimè discussis, Celsi dogmate, papulas minime nuncupari posse huiusmodi tumores liquet. Cum illi papula Græcorum lichenas, à nobis uerò passim, uel una cum Plinio, impetigines appellatas præseferat. Quand; Plinij placitis, Græcorū calida exanthemata papularū nomine intelligentis, generali uocabulo, huiusmodi quoque affectus papulas nominare queamus. Ob quam Herclē ambiguitatē euitandā, aptius feruidam, feruentē ue eruptionem Latine conuerterem. Maximeque Græci nominis compositionē, etymologiam ue contemplatus: cum ex præpositione ἐν & quod est extra & nomine ἐνέειμι; id est feruor componatur. q. d. extra erumpens feruor. Paulus uerò non ἐν & sed περιέειμι; adiunxit. quæ præpositio Græcis in compositione, quemadmodum & Latinis per & significationē adauget, intenditque. ueluti nomina perdoctus, pertrepidus; plurimaque huiusmodi præstō sunt. Dixit ergo Paulus, perizemata, quasi dicat uehementer feruentia. Quauis autem ἐνέειμι; βρασμῇ quantum ad nominis uim spectat, non aliud, quod ἐνέειμι; præseferant. Cum similiter à præpositione ἐν & deriuentur, & uerbali nomine βρασμῇ quod nomen feruorem significat, à Græco pariter uerbo βράω, seu βράσω quod est ferueo, scateo, seu ebullio; unde maris quoque bullitio βρασμός nuncupatur. Quauis inquit ex ui nominis idem esse appareant: Nihilominus tamen aliud Paulus ebraismatis dictione (quic quid nonnulli dixerint) quod perizematis intellexisse apparet: sic scribens ἐνέειμι; βρασμῇ, & περιέειμι; ὑψω. etc. quod est, & ad calidas eruptiones (generaliter intelligēdo ad quaslibet) & feruentes, siue acruatim, uniuersimque scatentes, & achoras. etc. Dixi nunc perizemata, acruatim, uniuersimque scatentes eruptiones, alia ratione & zezema consideras. Etenim ἐνέειμι; significat etiā idē, quod scateo; quēadmodū apud Lucianum legitur σκαλὴν ἐνέειμι; quod est uermibus scatens; Idem uerò eczeſmata nobis inferre, quod ὑψω. i. sudamina, seu sudorū papulæ, prius iam à nobis declaratæ præseferunt, coniecto: uel quod minimū ab illis dissidentia. Tuncque Celsi exanthemata erunt, quæ pustulis ex sudore factis assimilantur. quæ siue papulas siue eruptiones, siue quomodolibet aliter appellasse libeat: dum biliosi cuiusdā ichoris feruore, idē extra erupunt, plurimæ insimul emergere

- gere consueuerant. ut feruientes quoque sciant. Haud igitur capitis ita proprius huiusmodi affectus est, quin reliquis etiam partibus aduenire queat. Idcirco quauis Galenus, ^o Aetiusque, ^p o lib. p^o de comp. med. secundum loc. cap. 10. & 11. ipsum insequens inter capitis morbos adnumeret: Paulus ¹ tamen iter communes corpori affectus recenset: Idemque Aetius alibi, ^r Vbi eius definitionem cum priuata magis curatione adiungit. Toto enim in corpore fieri ait, dolorem inducentem, citra saniei collectionem. Tempestiuum uero est ad secundum Tumorem transgredi. Plus enim quam decreueramus, immorati, circa primi declarationem sumus. Cum ocyus hic, & currenti ferè calamo nouum percurrere catalogum certum nobis sit. Quoniam uero de hydrois sudaminibus ue iamiam meminimus: Id ipsum obiter adiungere non grauabor (siue eczematibus eundem, siue ab his diuersum affectum intellexeris) ipsa uidelicet hydroa à Celso ³ non exanthemata (prout nonnulli crediderunt) uocari, sed pustulas (generali dictione). Pro speciali autem generis determinatione addi: & quæ ex sudore fiunt. & quibus quidem pustulis ex sudore factis, & iuxta Hippocratis dogma potius in æstate prorumpentibus, in uere, ut supposuit, euenientia exanthemata comparauit. Eczemata uero Abenxoarem sub {sahaphati} nomine comprehendisse. Auicennam autem dictione {Balkiati} seu {balkie}, ^x & prædictum iam est. Pōt. n. cū scuit, maligniorque tumor euadit, saniei quidpiam defluere, quæ ab initio non colligi, ex Aetio prædictum iam est.
- SECVNDVS** Tumor, Elcydrion est, Latine ulcusculum dicemus. Sic enim à Galeno ^y Tumor simpliciter nominatum offendimus, absque ulla uidelicet peculiari tumoris descriptione. Quam tamen deinceps ab Alexandro, ^z Pauloque, ^a & Aetio ^b expressam inuenimus: perinde ac
- ²⁰ alias ^c iam prædixisse recolo. Papillis enim similia esse huiusmodi ulcuscula dixerunt, densaque & rubra, e quibus sanies, ichores ue eliquantur, defluunt ue. Non modò igitur ulcus est: uerum & tumor, mammarum, uti dictum est, papillæ similis. Hunc tumorem ab Auicenna sub {sahafati} nomenclatura, ^d specialiusque sub nomine {sirengi} ^e ab Hali Abbate aut quartam positam esse tinea speciem: s. ueluti & à Theodoro Prisciano anchorarum, cerionumque (ut uocat) genus & papillæ quæ nomine dictum fuisse prædiximus. Græcè θηλῶς, hoc est, papillas, quoniam s. papillis mammillarum similes sint, nuncupare possumus. Quas ob res idem esse Galeni elcydria, Alexandrique, Pauli, & Aetij papillas, intelligentes, in catalogo proposuimus secundum tumorem esse, Elcydrion, siue papillam. Celsus ^b huiusmodi affectum, Græco nomine respondente Latina dictione, ulcuscula nuncupauit, pustulæ interim spem esse supponens.
- ³⁰ Idem namque {ulcuscula} nobis, quod {ἐλκυστρία} Græcis ostendit. Sic ergo Celsus ait, {Ex pustulis uero nonnunquam etiam ulcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora} Græci authores prædicti absolute humiditas supponere uidentur. Absurdum uero non est illos magna ex parte intellexisse. & modò tantum cum prurigne, modò etiam cum inflammatione, aut dolore Græci absolute rubras proferentes, semper cum inflammatione aliquâ esse supponunt. Aequè autem & sic esse maxima ex parte intelligendum. {Exitque aut pus, aut sanies, aut utrunque} Illi simpliciter ichorem, saniem ue protulerunt. Eadem igitur & hic glossa utendum. s. ut plurimum.
- „ cum omnia contingant {Maximeque id euenit in ætate puerili: rarò in medio corpore, sæpè in eminentibus partibus.} E quibus quidem Celsi uerbis exactè perpensis non aliud per huiusmodi pustularum speciem {ulcuscula} nuncupatam, quam elcydria uoluisse liquet (quæque latius
- ⁴⁰ hos tumores, pustulas ue: quæ nostri Græci, definiret.) Non ut aliqui uolunt ⁱ eam, quam antea descripserat, et ἐλκὼδες Græcè nominari prædixerat. Quæ ob causam pustularum à Celso

supra fol. 184
34. & 193. circa
principiū.

Pustularū spe
cies septē, apud
Celsum.

1 supra fol. 191.
192.

Tumor. 3^o.

Ficus.

Ficosa efflore
scentia.

Ficosa eruptio

Pro hoc notē ui
de supra fol. 139.
lin. 12.

m lib. 3. cap. 3.

n lib. 8 cap. 14.

o quinto de cōp.
med. secūdu loc.
cap. 3. & uide su
pra fol. 208. 35.

p in declaratione
tumoris. 26.

q ubi supra de cō
ponēdis med. c. 3.

r lib. 8. cap. 14.

s lib. 3. cap. 3.

t ibidem.

u lib. 6. cap. 3.

x supra fol. 175
21.

y ibidem. f. fol.

17 s. littera, r, &

5. in margine.

z cap. 20.

a cap. 69.

definitarum species, exquisitiū multo q̄ antea^k fecerimus, numerare futile non fuerit. Septem enim (ni fallor) sunt Prima pustulæ sunt, quæ ex sudore, uel urtica. Nos hydroa, quæ scilicet ex sudore fiunt, & sudamina, & sudorum papulas nuncupauimus. Secunda ijs similes septē, apud Græcis exanthemata uocantur. Tertiæ speciei sunt, quæ similes uariis oriuntur. Vnde fortassis & nos uariolas nominare consueuimus. Quarta species est, quæ (ut ait) elcodes Græcè nominatur. Quinta psyracion appellata. Sexta, quam nunc præmanibus habemus, earum, quæ iam elcydria, Latine ulcuscula uocantur. Septima demum epinyctis nuncupata succedit. Quas omnes proprijs descriptionibus, ex ipsius met Celsi uerbis, de terminare promptissimum fuerit. SED reliqua contemlemur eo quidem prius absoluto: Quoniam scilicet ex humorum, præcipueq; bilis, insimul ac sanguinis, uel biliosi quidem san- 10 guinis ichoribus genitus hic tumor est.

TERTIVS Verò tumor est, quem Græcè σῦκον, Latine ficum, & σῦκωσις Latine dicemus ficositatem, & σῦκωσις ἐξ ἀνθρακῶς, quod est, ficosam efflorescentiam, et σῦκωσις ἐκ πύκνωσης, hoc est ficosam eruptionem appellare consueuerunt. nonnunq; uerò & σῦκωσις μᾶλλον ἐκ λυκῶς, quod est, ulcus carnosum nuncupant. Sed ne id quidem adeo capiti propriū est, ut toto etiam corpori commune non sit. Capiti nihilominus frequenter, quemadmodum & faciei palpebris, atq; ano sæpiculè aduenire solitum est. Verum enim uerò de reliquis partibus postea loquemur. Nunc autem capitis ficum, siue ficosum exanthema cum Oribasio, eumq; exscribentibus, Paulo,^m & Aetio,ⁿ definiamus. Ficos appellant germina ulcerosa, rotunda, subdura, rubicūda, quæ consequitur et dolor. Nascuntur aut ut plurimū in capite, q̄q; 20

et in reliquo et corpore nascuntur. & absq; ulla morbi definitione Galenus^o in mento morbu hunc curabat, causam duntaxat præscribens. quoniam scilicet non solum crassus sit, qui hos tumores efficiat humor, sed & serosa participet tenuitate, ob quam etiam citò exulcerantur, si non, ut debent, curentur; quid uerò sit & λεωτόπις ἢ χροειδής; hoc est & tenuitas serosa;

post deinde sermo fiet: ubi scilicet pityriaseos causas disquiremus. Nūc autem sat superq; sit, mistum ex calidis, frigidisq; insimul humoribus, ichoribusq; affectum, dominio tamen excessuq; calidum esse, ut non secus ac iamiam præscripti tumores, in calidorum albo numerandus sit. Cum uerò menti ficum Galenus,ⁱ eiusq; æmulus Aetius^r curare intenderit, Paulus^s autem capitis, Oribasio inhærens, quem Aetius^t quoq; transcripsit: Ex Celso^u (quem admodum & antea tetigimus) x qui ante hos scripsit, duas esse species determinandum. Al- 30

terum. n. (ut ait) ulcus durū, & rotundū est, alterū humidū. Ex duro exiguū quiddā, et glutinosum exit. Ex humido plus, & mali odoris. Fit uerò utrunq; in his partibus, quæ pilis cōteguntur. Sed id quidem, quod callosum, & rotundum est, maximè in barba: Id uerò quod humidum præcipue est, in capillo. & Oribasius uerò, ueluti præscriptum est, subrotunda esse, ac dura omnia definiuit: posseq; totum corpus occupare. Cuius interea locum in margine, ob id minimè notatum inuenies, quoniam permissum nobis non est, ad hodiernam usq; horam, Oribasij uolumina uidisse. Nisi quædam compendiola, innumeris quidem mendis deprauata. quorum aliquando loca in marginibus descripta uidebis. Quemadmodum ergo alibi^y prænotauimus, Curationum inscripto quodā Oribasij cōpendiolo, inter capitis affectus prius, z Dein uerò & inter faciei affectus^a huiusmodi tumorē, absq; ulla tamen definitione, 40 curatum offendimus. Generale quidē non huiusmodi tantum affectus spēbus, sed alijs quoq; pluribus

pluribus tumoribus est. quoniam scilicet (uti Celsus ait) caro excrescit. Idcirco nonnulli (ut dictum est) carnosum ulcus uocant. Suis uero duntaxat speciebus commune, atque huiusmodi tumori proprium est, in quauis corporis parte erumpat, quoniam fimo fructui assimilatur. ut à similitudine sumptum (uel Galeno, ^b post Celsum, erudiente) nomen fuerit. Plurimum non hunc tantum, sed praescriptos iam tumores, eczematata scilicet, & elecydria, pluresque alios, sub capitis ulceribus generatim comprehendisse apparet: ueluti nos alibi ^c quoque notauimus. Quemadmodum etiam quod Arabes sub sabaphati comprehenderunt, cum scilicet in capite nati sint, Hali Abbas uero secundam tineae speciem esse posuit, praedictum ^d iam à nobis est. Praeter ea uero, quae praedeterminata iam sunt, adde Auicennam aliquando huius morbum & albir ^e appellasse. Vti quum de calidis exituris locutus, in calce tandem ait, ^e & Et de exituris est species, quae nominatur, albir, & est exitura ulcerosa, rotunda, & rubea: quam qui habet secundum plurimum non expoliatur à febre. Et eius euentus secundum plurimum est in capite & quandoque accidit in alijs locis. Quam profecto definitionem aliam non esse, nisi eam, quae ab Oribasio sicorum praeposita est, nullus (ni amens sit) inficias ibit: Cum eadem ferè uerba utrobique sint. Nisi quod doloris tumorem, ulcusque insequentis uice, febrem Auicenna deprauatè (pro ut frequens mos Arabum est) transcripsit. Nisi ob doloris uehementiam excitari aliquando febrem intellexerimus.

QUARTVS Tumor propositus est, quod Graecè ἐξάνθημα Latinè efflorescentiam nuncupabimus. Quod nomen tametsi generalissimum est, multiformes efflorescentias, tumoresque sub se continens. perinde atque nos uberrimè prius enucleauimus: sed Galeno tamen erudiente & quidam usurpant de affectionibus, uidelicet ulcerosis, & asperis, in mento sua sponte prouenientibus: Quemadmodum etiam Archigenes facit & his ergo, & quidem in facie, duntaxat tumoribus dedicatum ab Archigene, & Galeno exanthematis nomen est. Paulus uero eandem quoque significatione uoluisse uidetur: Nisi quod in capite huiusmodi affectum considerat. Id quod nihilominus minimi momenti est, cum utrique parti communis esse queat. Rubram uero esse hanc exulcerationem, non Paulus modò, sed Aetius etiam refert. forteque particula haec & rubra & seu & rubris in Galeni codice, scriptorum, uel impressorum uicio cecidit. E qua rubedine, calidum esse tumorem, sanguinique, aut bili, uel utrique ascribendum decernimus. Adduque interim Paulus ἐπιτολίας, hoc est, in superficie. quod in capitis cute sit tas esse ulcerationes. Quoniam uero exanthema hic non amplissimo suo significato assumitur, sed, ueluti definitum iam est, pro superficialibus, ulcerosisque, ac rubeis affectionibus. Idcirco nos in catalogo diximus, quartum tumorem esse exanthema: expositionemque adiunximus & id est, ulcerosam efflorescentiam.

QVINTVS Tumor est γαγγλίον Graecè dictum: quod etiam Latinè Ganglium uocatur. Hermolaus ^k gangilion quoque legit, & gangilium. Durus tumor est. uidelicet pituitosus, uel atrabilarius, in neruo saepissimè, aut neruosa parte incidens, & in capite, aut fronte. Nos uero hic, quicquid pluribus corporis partibus communis huiusmodi affectus esse Pauli, Aetijque dogmate potest, nihilominus tamen inter capitis affectus, Celsi placito, numerauimus. Qui meliceridas quoque, & atheromata capiti dedicauit, in eodem pariter albo steatoma describens, tametsi & in ceruice, & in alis, et in lateribus oriri solent. Verum de tribus alijs iam nominatis tumoribus, in prioris catalogi declaratione, nihil seorsum tetigimus, Septimū,

b 2^o. metib. c. 20

c fol. 171. s.

d supra fol. 175
lin. 15.

Albir

e 3^a. 4^a. tr. p. c.

21. in fine secundum

dum impressam di-

finitionem. c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

c. 20.

Octauū, Nonumq; tumorem exponentes. Nunc uerò Ganglium in examen uenit, quod obijciendi gratia contra Galenum, Celsi dogmate, inter capitis tumores præscripsimus. Idcirco cum additione diximus { ganglion Celsi. } Quoniam autem in eius sermonē incidimus. Pauli quoq; ac Aetij, hosq; sectantium Arabum ganglia enarrabimus, in neruis potius, præsertimq; in iuncturarum partibus aduenire solita. Authoris Definitionum Medicarum prius descriptionem adducentes: quum ait ^o { γαγγλίον ἐστὶν νεῦρον παρὰ φύσιν συσσωσμένον } „
 μακροτέρω ἢ μὲν } quod est { Ganglium est nerui præter naturam concretio, quæ in unum „
 Gāglion quid. corpus coaluit; q. d. ita frigidi, terre stresq; succi in nerui substantiā conuersi, atq; (ut ita dixerim) incorporati sunt, ut grossior ibi, densiorq; factus neruus concretus, conglobatusq; appareat. συσσωσμένον ergo hic non reuolutionem: aut contortionem (pro ut nonnulli uoluerunt) significat, sed ipsam nerui concretionem, densationemq; & cum humore factam incorporatorem: ut participio { συσσωσμένον } postea confirmat. Ex ictu, aut labore, lassitudinis ue obortam: tum Paulus, P tū etiam (ex Philagriū monumentis) Aetius ¹ ait: Raroq; (ut hic subdit, sponte sua prouenientem. In pluribus quidem corporis partibus, præcipue uerò in ijs, quæ mouentur, nempe manibus summis, ac pedibus (inquit quarto libro Paulus) qui deinceps tamen libro sexto ⁵ magis determinat: in qua scilicet extrema manus, pedisq; parte gigni soleat. dicens { νεῦρον νεκρὸν, καὶ σπυγὰ } quod est { in carpo (quod Latini brachias le uocant: quā. s. extrema manus cum brachio committitur) & talo. } Additq; rursus { & in his, quæ mouentur secundum articulum corporibus } caput uerò, ac frontem postea adiunxit. In quibus, ueluti & in cubito rariū aduenire, Aetius ¹ perbellè determinauit. Qui etiam in exterioribus palpebrarum regionibus fieri nonnunq; simul & altheromata, steatomata, et melicerides declarauit. ² Auicenna uariū ualdè, ac repetendo fastidium inducens est. Interdum ^x enim nerui nodum, seu nodositatem appellat, ab alfelha, uocatis (quos antiquus interpres nodos Latine interpretatus est) atq; etiam glandulis, & his similibus duris apostematibus multi faridam differre adiungens: quas differentias ab ipso intelligere poteris: Vbi speciatim glandulas, ab alfelha, & neruorum nodis, differentes esse intellexit: pro durissimis uidelicet, purisq; nodis accipiens glandulas, in alijs partibus, q; in neruo cōtingentibus. Eruntq; fortissis aliarum partium, ut pote frontis, aut capitis ganglia. q; ante ³ glandularum genus ut commune ad alfelha, & scrofulas usurpauit. Interdum ^z uerò glandulæ nomenclaturā, nec generatim ampliū utitur, ut uidelicet communi ad alfelha nodos ue, et scrophulas, nec speciatim, eo. s. modo, quo diuersum tumorem ab alfelha, & neruorum nodositate significet. Sed aliter speciatim, pro ipsamet uidelicet neruorum nodositate, quam uerè tū Græci, tū Latini ganglion appellant. Idcirco ait similes esse ipsis alfelha, & sunt species nodi (generatim scilicet nunc capiēdo nodum) Quod porro ganglium, glandulā ue clariū ante ^a descripserat, dicens { Et quandoq; accidit ut nodetur neruus, & assimilatur alfelha, et non fit de alfelha, & differt ab alfelha etc. } ubi pro alfelha interpres habet nodos. Cumq; non signa modò, sed curationem quoq; ex Pauli, Aetijq; (ut patet) monumentis exscripta posuerit, inconsultè rursus de ijsdem glandulis, ganglijs ue repetit, ^b ac rursus ^m deniq; de pustulis glandosis loquitur, quasi ad fastidium, nausēamq; uel inuitos excitans. Ni uelimus cū hac uia quadantenus excusare, quod quum sexto rursus capite de glandulis repetit: non ampliū de ganglijs, neruorumq; concretione, uel (ut ipse dicebat) nodositate intelligat: sed de glandulosis

uerfus finē li.

Gāglion quid.

p ubi supra f. 4.

16. & 6. 39.

q li. 15. cap. 9.

r cap. 16.

s cap. 39

t s. 2.

u li. 7. cap. 83.

x 2. p. 1. Dec. p. 4.

ca. 5. post mediū

et uide in margi

ne annotationes

Bellunensis.

y circa medium

z 3. 4. 1. 2. 0.

cap. 5. in fine.

a ibidem ca. 4.

in fine.

b ibidē cap. 6.

Contra Aui-

cēnam.

m ibidē cap. 7.

losis

losis quibusdam nodis, extra neruorum affectus obortis. de quibus iam Razes, atq; ipse etiā
 Hali Abbas d eo modo locuti sunt: Quāq; ne huiusmodi quidem excusatio, & superflui-
 tatis, & defectus immunem Principem reddit. Superfluitatis quidem, quoniam priori capite,
 atq; etiam quarto, de ijs locutus iam fuerat: Defectus autem: quia si repetendum erat, alius
 quid noui ijsdem ex Arabibus authoribus assumere debuisset. uidelicet nodos siue alselba, si-
 ue nodosas glandulas aliquando à ciceris q̄titate exordientes, ad melonis magnitudinem per-
 uenisse. Puslulas tamen glandosas intelligere debemus bothorales. s. paruas, minimasq; ad
 ciceris duntaxat magnitudinem incrementas. Sed nos ad Ganglia reuertamur, quæ (ut dixis-
 mus) uel nerui nodos, aut nodositatem, uel glandulas (uti dictum iam est) nuncupat. Inter-
 10 dum si uerò de ijsdem repetens & neruorum duritiem, & eorum tortionem & appellat. Gan-
 glium. n. neruorumq; nodositatem potius intellexisse uidetur, q̄ Pauli ancyas, siue ancyloses,
 quemadmodum aliquibus placet. Cum Pauli, atq; Aetij uerba transcripsisse de ganglio lo-
 20 quentū liqueat: sic exordiendo & hoc multoties accidit à uerberatione, aut casu: & quando
 30 premitur, sentitur cum eo stupor. etc. & Est autem Pauli, & ἀγκύλη, siue ἀγκύλωσις (ut
 obiter hic etiam illum affectum enuclearimus) articulorum κατὰ, hoc est, detentio, δια-
 40 σπύωσις, id est, propter densitatem, cuneationem uel, aut neruorum aliquam tentionem cōtin-
 gens. Quoniam uerò & σπύωσις & cuneationem quandam, infarturamq; ac densitatem si-
 gnificat, quæ infartos humores supponit: propterea & ex humoribus infartus & exposuit An-
 dernacus. Quem affectum Auicenna, non eo capite intellexit, ubi de neruorum duritie, &
 20 eorum tortione locutus est, (q̄q; illi posita curatio, ancylosi etiam percomoda est) uerum ali-
 bi magis ex proposito, quum. s. de iuncturarum duritie sermonem fecit, h inter frigidos tumo-
 res annumerans. Antea uerò & alachad & & alzemena & uocauit, quæ nomina (uti Bellu-
 nensis^k exposuit) significant eum, qui sedet, & non potest stare. Etenim ob illam articu-
 lorum detentionem, aliqua fieri iuncturæ crurium contractio solet, ut rectus stare nequeat pa-
 tiens, nisi sedendo quiescat. Definitionum Medicarum Author^l sic huiusmodi affectum defi-
 30 niuit & Ancyle passio est tendonum circa collum, uel articulos, qua functio impeditur & Dicere
 solemus uulgò nos inchoardaturam. Pauli definitio partim à Galeno præacta uidetur, quum ait
 40 & καὶ τὰς τῶν ἀρθρῶν κατὰ, & ἀγκύλας καὶ δὲ, & quod est. & ad articulorum
 detentiones, quas ancyas uocamus. & Interpres ligationes articulorum s̄ap̄e uertit. nonnunq;
 30 obstrictos articulos, aliquando^p articulorum impeditiones Latine interpretatur. Interdum
 Græcam dictionem seruauit, absq; aliqua interpretatione. Atq; in omnibus his sufferri po-
 test. Ineptè autem in titulo ante præscripta uerba: ubi Græcè habetur & πρὸς ἀγκύλας & in-
 terpretatus est, ut Celso aliud intelligenti^r obsequeretur & Ad articulos recenti cicatrice cō-
 tractos, quas ancyas nominant & Celsi. n. ancyla (ut patet) artuum contractio specialier est
 quum. s. ex recenti cicatrice orta sit. Sed nostrum propositum prosequamur. Frigidus huius-
 modi affectus est, ueluti & ganglium, ut pote à frigidis, crassisq; ac uiscidis, & aliquando
 flatuosis humoribus originem sumens: Albucasis^s Ganglion & apostema quod accidit ex
 torsione neruorum & scripsit. Quoniam uerò nodos & alselba & uocari Arabicè præactū est:
 differre interim ab alselbah & ipsomet ex Auicenna intelligas. dum medicaminis alselaha cōpo-
 40 sitionem docuit. quæ ex hircorum urina fit. SEXTVS tumor est omnibus manifestus, uis-
 delicet hydrocephalus dictus, adiectiue, quemadmodū apud Græcos legitur & ὑδροκέφαλον
 πύθος

c 7^o. ad Māforē
 cap. 15. & libro
 Diuis. cap. 130.

d 8. Theor. cap.
 11. 3^o. præc. cap.
 ult. & 9. prælit.
 cæ cap. 10.

e ex eodē Raze
 7^o. ad Mansorē
 cap. 14. Hali Ab-
 bate 8. Theoricæ,
 cap. 11.

f 4^a. 4^l. tr. 4^o.
 cap. 7^o.

Cōtra Manar
 dum.

g lib. 4. cap. 55
 Ancyla.

Ancylosis.

Cōtra Manar.

h 3^a. 4^l. tr. 2^o.
 cap. 13.

i 2^a. 3^l. tr. 2^o.
 cap. 22.

k ibi in margine
 & in expositio-
 ne Arabicorū no-
 minum.

l uersus finē lib.
 m lib. 7^o. de cōp.

med per genera
 sec 3. in nostra im-

pressione ubi poni-
 tur Lucij præces-
 ptoris malagma.

n ut ibidem, &
 paulò ante, & nō
 multo post.

o ut ibidē paulò
 ante.

p ut ibidem post
 mediū. cū ponitur

Amitbaonis reme-
 dium.

q ut in fine. 7ⁱ.
 r li. 5. c. 18. sec. 25

s lib. 2^o. cap. 50:
 t infra tr. 3. cap.

6. & 8.

Sextus tumor.

hydrocephalus

πῶτος; hoc est, hydrocephala passio, seu hydrocephalus affectus, hydrocephalon uerbum. Ma-
 nifestissimū quidē obstetricibus, cum infantibus sæpiusculē contingat, quū primum in lus-
 cem æduntur (uti Paulus^a ait) capite ab ipsis obstetricibus parū dextrē pressō, uel ex cau-
 sa latente. Triplicem posuit speciem Paulus, penēs affectam sedem. Vel enim inter cutem &
 6. lib. cap. 3. exteriorem membranā, quam Græci pericranion uocant, humor consistit: uel inter peris-
 1. lib. 6. cap. p^o. cranion & os, uel tertio inter os & cerebri membranas. Quibus porro Aetius^f quartam ad-
 iunxit, dicens; Maiores autē nostri dicunt etiam inter cerebri membranā, & ipsum cerebrum,
 colligi, id quod perniciosum existit. Triplicem quoq; speciem ex parte causarum idem Aet-
 tius posuit; plerūq; igitur (inquit) aquosus humor colligitur, aliquando autē fœculentus, aut
 sanguinolentus. Propterea & Arabum Princeps de huiusmodi affectu loquens, sub nomi-
 ne aquæ intra cranium^u & aquæ extra craniū,^x inquit; Et quandoq; sunt humores alij ab
 humiditatibus aquosis. Medicarum uerō Definitionum Author^y duas uidetur causas assig-
 gnasse, uidelicet aquam, aut fœculentum sanguinem. Nos uerō & sanguinem, & fœculen-
 tum humorem, siue quid fœci simile, atq; sanguinem ipsum fœculentum sæpius, q̄ aquosam
 substantiam, pluribus dissectis hydrocephalis, inspeximus. Razes aliquādo^z aquam aggrega-
 tam in capite uocat. Interdum uerō de puerorum affectibus loquens, "sub capitis magnitudine
 huiusmodi tumorem comprehendit. Hali Abbas uerō nonnunq;^a & apostema sub cute capitis;
 uocat: nonnunq; autem^b & apostema super cranium, & sub cute; dicit. Interdum uerō^d clari-
 riūs aquam in capite nuncupat. Albucasis quoq; de aqua loquens, quæ aggregatur in capitis
 3. 1. cōtin. cap. 3. litera. M.
 a de morbis pue-
 8. Theoricæ.
 4. 1. 8. pōi mem.
 c 4. 0. pract. cap.
 1. 4. in fine.
 d 9. pract. c. 1. 6.
 e lib. 2. 0. ca p^o.
 20. puerorum, omnes mortuos esse uidit: eapropter operationem in ea dimittere sibi uisum
 est: q̄q; curandi modum edocet. Subditq; Et ego uidi ex eis puerum, cuius caput impletum
 erat aqua, & caput magnificabatur omni die, donec non poterat sedere super ipsum, propter
 magnitudinem capitis sui. Et humiditas augmentata fuit, donec mortuus est. Similemq; casum
 Razes ante Albucasis retulit, dicens f Et ego uidi puerum, cuius caput adeo augmentaba-
 tur in longitudine & latitudine, quod corpus eius sufferre nō poterat: et nō cessauit augmen-
 tari, quousq; mortuus est puer. Nos autē & infantes ferē omnes mortuos uidimus, præser-
 tim quibus intra cranium communicata est aqua, & quendam adhuc bimulum puerulum Pa-
 normi inspeximus: cuius & coronalis, & recta suturæ intantum dilatatae sunt, ut digiti spa-
 cium interfuerit: minus uerō lambdoides diuarcata erat. huncq; longo tempore (aliquibus. n.
 mensibus) eo modo uidimus, ut Celsi & sententiā ueram esse expiremur: posse uidelicet hūc
 30. affectum longum esse. an uerō demū ille obierit, ignoramus, quia Panhormo recessimus.
 Quod autē admirabilius erat considerauius, per earum enim usq; adeo apertarum futurarū
 spatium diaphanum quoddam conspiciebatur, non aliam substantiam. q̄ purissimam aquā res-
 præsentans. Si ergo aqua continetur, uel pura fœx strigmetum^{ue}, frigidus tumor erit. Calis-
 dus autem, ubi sanguis, etiam si fœci admisceatur, qui suppurari sæpenuerō consueuit.
 Tumor 7^o. PRAETER hūc uerō, alius quoq; infantibus familiaris affectus aduenire solet Qui græcè
 Siriasis. σιρῖσις, à Paulo, b atq; Aetioⁱ nūcupatur. hicq; septimus ordine præpositus tumor erat. In
 b lib. p^o. cap. 13.
 i lib. 4. cap. 13.
 flāmatio est (ut aiunt) partiū cerebri, & membranarū. Adeo ut syncipitis (Σειψίτις. Græci
 dicunt) & oculorū cavitates consequatur, cum febre ardente, & pallore. & corporis siccitas
 te, ac prostrato (ut Aetius addit) appetitu. Siriasis autem appellata est à syncipitis cavitare:
 40. Siros. n. apud Græcos dicitur fossa, & corpus cauum, in quo frumentum, & alia semina ser-
 uantur

uantur, ut in Etymologico etiam perlegimus. Arabū Princeps de hoc meminit, quū de cere
 „ bri erysipelate loquebatur, sic dicens { Et pueris quidem quādoq; accidit erysipela in cere- k p^a. 3ⁱ. tr. 3. ca.
 „ bro, & profundantur cum ipsa synciput, & oculi, & minoratur oculus, & desiccatur totū s. circa finem.
 corpus } ubi non aliud, q̄; prædictā sīriasm intellexisse liquet: præsertim quia Pauli quoq; et
 Aetij curationem, præsidiaq; transcribit. Vbi uerò de infantium morbis oībus sigillatim per-
 tractauit: nomine proprio { Athas } siue cum aspiratione { bathas } Arabicè nuncupauit, di- l 3^a. pⁱ. doc. p^a.
 „ cens! { Et est cum in cerebro infantis sit apostema calidum, & uocatur bathas. etc. } quo in lo cap. 3. uersus me-
 co eādē curandi rationem tetigit. Quemadmodū rursus huius morbi meminit eo capite, quo dium.
 de hydrocephalo, seu aqua extra craneum pertractabat. ^m Quam ob causā Gentilis, pluresq;
 10 alij expositores apostema extra craneum esse crediderunt: ubi corrupte { atasiū } in antiqua
 litera pro { bathas } legebatur. Quorum expositorum erroris causa fuit, quia ubi ex primo li-
 bro ⁿ paulò ante legebamus, apostema calidū fieri in cerebro puerorū, uocariq; { bathas } hanc
 Arabicam dictionem non habebant, sed loco eius { sitibundum } sed non hoc Arabicum nomē
 „ præsefert, ut ait Bellunēsis: P̄ quū sic nobis scriptū reliquit { Hathas est apostema calidū acci-
 „ dens cerebro, secūdū Sīrasm, & Ebencof. non connotando sitim, neq; sternutationem aliquā,
 11 sicut dicunt Latini. Sed hoc nomen impositum est tali apostemati à primis impositoribus sic. }
 Anteaq; ^q eandē dictionem absq; aspiratione scriptam exponens, idem proposuerat: Aui-
 cennæ loca in medium adducens, ubi non solum Latinos, sed Arabes quoq; expositores multū
 diuersificari ait: quare. s. prædictū apostema dicatur, { Athas } Verū enim uerò undecunq; im-
 20 positum nomen sit, non curamus. Sat. n. superq; nobis est, sīriasm Pauli, atq; Aetij, tali nomi-
 ne significari. Galenus autem nullibi quod uiderim de huiusmodi morbo meminit. Nec her-
 clē (ut mihi uidetur) temerè sub silentio præterijt. Etenim si cerebri mēbranarūq; phleg-
 mone est, quid aliud, q̄; phrenitis est? Cuicunq; n. definitio cōgruit: illi & definiti nomen cōpe-
 tere: Phæbo clarius est. Qua de re de puerorum phrenitide sermo fieri poterat. Exquisitiū
 autem ipsius rei naturam perlibrantibus, neq; in cerebro, ac membranis phlegmone præscrip-
 tis symptomatibus significari potest. Cum ex phlegmone, oculi potius rubicundi, atq; exerti
 euadant, q̄; concaui, & pallidi. Quodq; maioris momenti est, tumefieri potius, ac dissipari, et
 in altum eleuari bregma synciput ue, q̄; cauum fieri contingeret. tumefactis uidelicet cere-
 bro, ac membranis, in quibus inflāmatio nata est. Itaq; uehementissimā potius febrē symptomat-
 30 tum causā esse, q̄; phlegmonen determinarē. Vsq; adeò uidelicet intensum causum, ut exic-
 cata cerebri substantia, & membranis, ut potē ob teneritatē, uaporabilitatēq; ad resolutionem
 promptissimis, quædam earum partium cōtractio fiat. Cumq; bregmatis infantium substantia
 mollis adhuc sit: cui quidē crassior cerebri mēbrana per suturas alligata est: facillimē ad cere-
 bri, mēbranarūq; contractionē, ac siccitatē bregma, & siccari, & intus retrahi, ac per hoc
 cauum fieri potest. Id quod natu maioribus, ob ossium factā duritiem, ac firmitudinē, con-
 tingere nequit. Quas ob causas nullo uacuationis præsidio, sed alterantibus duntaxat, uideli-
 cet frigidis, atq; humidis super bregmate remedijs tam Paulus, q̄; Aetius, eorūq; transcrip- b p^o contin. ca. 6
 tor Auicenna tam fero morbo succurrunt. Quo iuxta nostram sententiam supposito affectum & 8. litera. 2.
 hūc à tumorum catalogo delebimus. Nec alium esse morbum opinamur, q̄; eū, quē Razēs b ab q̄; libro de mor-
 40 epilepsia distinctum in libro Continentis { matrē puerorū } nominari ait. Quāq; uerò in pue- bis puerorū ca. 8.
 ris curationem recipere supponunt: omnes tamen obijisse uidimus, quibus concauum synciput aliū uidetur mor-
 unā rum. bum significare.

n fen. 3^a. doe.
 prima cap. 3
 p In expositio-
 ne Arab. noīum
 dictione { Hathas }
 cū aspirōne præ-
 posita litera. H.
 q ibidē litera A.
 dictione { Athas }

Nota de sī-
 riāsi.
 Cōtra Paulū,
 Aetiū, et Aui.

unà cum ardente febre, assiduisq; conuulsionibus apparuit. Absurdum uerò non est contrarium nonnunq; cerebro, atq; ipsum consequentibus membranarum, ad expellendum aliquid saui in uentriculis, aut substantia cerebri contentum, unà synciput ad inferiora decubuisse.

8^o. Tumor.

Phreniti.

2^o. de sympt.
cau. uli^o.

OCTAVVS Tumor Phrenitis est: quam Cerebri, & membranarum eius inflammatio-

nem esse Galenus, ac uniuerſa deinceps medicorum caterua pro compertissimo supponunt.

An uerò semper unà cum membranarum phlegmonen cõpatiat in phrenitide: an ali-

quando inflammatis membranarum, extraneam participare caliditatem, satis sit, alibi discutienda quæstio est. Nunc autem sat superq; sit magis, uehementiusq; inflammari membranas, q;

cerebrum. Cum plures illis, maioresq; tum uenarum, tum arteriarum insint, substantiaq; densior ue-

hementiorem recipere, continereq; inflammationem queat. Quod si cerebri substantia non-

nunq; inflammatio magna superueniret: cum frigida, atq; humida naturæ sit, molleq; ac pau-

cioribus, ijsq; minimis, & uix apparentibus uenulis, & arteriis munitum: non nisi à ma-

xima causa contigisse potest. tuncq; in gangrænam, & demum in mentis, ac uitæ corruptio-

nem potius, q; phrenitim homo perducetur. Dixi cerebrum paucioribus, ijsq; minimis, & uix

evidentibus uenulis, arteriisq; munitum. Præter eas intellige, quæ in tenui membranula sunt,

in cerebri anfractibus dispersæ, cerebrumq; inde nutrietes. Exquisitissime. n. ac apertis oculis

diffecantibus, per totam cerebri substantiam uenulæ apparebunt: quibus cerebri substantia, ad

uentriculos usq; atq; sub ipsis etiam uentriculis, nutritur. Quas ne Galenus quidē ipse medi-

corum lucerna, nec nostro æuo solertissimus Anatomicus Vesalius aduerterunt. De quibus

porrò aliàs uberior sermo erit. Arabes qdē, cõmuni uocabulo, sirsen, proprio autem nomine,

karabitum appellant. Apud multos, uerò Latinos in usum uenit ut phrenesis media producta

dicatur: uti apud Iuuenalem, Martialē, similiter Macrum, licet Q. Serenus media le-

gerit correpta apud Pliniū quoq; et Victruuiū phrenesis legitur. Quois autē mō proferatur,

ab Hermolao f. castigatur, & non phrenesis, at phrenitis, ueluti neq; pleuresis, aut arthre-

sis, uel nephresis. at pleuritis, arthritidis, & nephritis, omnino legēdū præcipitur. Sed hæc ad

Grammaticos. Calidissimus proculdubio tumor, siue à sanguine, siue à bili, uel ex ijs mista

materia: siue etiam ex superassata, & in atram conuersa bile generationis originem susce-

Cerebri ue-

nulæ.

Galenus et Ve-

salij de defectus.

a Satyra. 14.

b lib. 4.

c cap. 23. de sa-

tureia.

d cap. 7.

e lib. 24. ca. 9.

f in glossem. in

Plinium.

g lib. curonū. ca.

h 10. 11.

i lib. 3. cap. 7. 8.

k lib. 6. cap. 25.

l 26.

m p. 3. tr. 3.

n cap. 4. & 5.

o 9. Theor. ca.

p 4. & 5. pract.

q cap. 14.

r p. 0. Theysir.

s tr. 3. cap. 6.

t a ibidem.

u b 4. colliget ca.

v 46. uersus finē.

w Cõtra Oriba-

x siū, Paulū. Ae-

y tiū, Auic. Ha-

z li Habbatē, et

aa Abēzoarē &

ab Auerroem.

c 4. de præfag.

d ex pulsibus cap.

e 9. in principio.

10

20

30

40

potest

poteſt, quin cerebro communicetur. Cū durior, craſſiorq; meninx receptum à torculari ſanguinem tenuiori prius, ac deinceps ſtatim cerebro diſtribuat. Quòd ſi cerebrum uſq; adeò inflammatum, ſanguineq; infartum eſt, ut præ nimio tumore, cranei ſuturas diſtendat, ſegregariq; faciat, caputq; uniuerſum inturgeſcat, & oculi uelut emiſſiij promineant. quemadmodum prædicti authores tam Græci, q; eorum æmuli Arabes teſtati ſunt: quinimò (ut Oribasius ait) intumeſcit quoq; facies, & collum, & thorax: quibuſdam aut & dorſum, ita ut ex ipſo tumore crepet cutis: uel ſi non crepet, bullæ tamen ijs ſimiles, quæ ab igne excitantur, in ipſa cute ſiant. Si inq; hæc omnia ſint: Cui dubium eſt, præter cerebrum, membranas quoq; mirumimmodum phlegmone tentatas eſſe? Præſertim quando (ut idem Oribasius ait) ipſe etiam membranæ, cutis inſtar exterius crepent, findanturq; Quòd ſi compatiēte dūtaxat calorem cerebro, ubi membranarum phlegmone eſt, phrenitis iam eſt, mensq; ægrotat: Quonam igitur pacto, ubi tam ingens phlegmone in ipſa cerebri ſubſtantia ſit, dolorem ſentire poteſt? ac ſi mens ipſa minimè ægrotet. quod doloris ſignum ab omnibus, qui hunc morbum deſcripſerunt, poſitum eſt. Sin uerò dolorem ſentiri contingat, cū acutiſſimus hic morbus ſit, triduo, uel quod ultimum (Oribasio docēte) eſt, ſeptē diebus, uel pernecans, uel ad ſalutem reductus: Quonam modo diuturnus eſſe huiusmodi dolor poteſt? perinde ut ineptiſſimè Andernacus, et Albanus Pauli interpretes expoſuerūt: ubi Græcè dicit & διαγνῶς quod nomen hic non & diuturnus ſed & perſeuerans interpretandum erat. Quòd ſi eſt ſecundū plurimū pernecans in tertio: ſi autem ipſum pertransierit, fiducia habetur (uti Princeps ait) cur non uehementer prauam eſſe idem Princeps uſq; adeò inconſultè ſubiunxit? Aptius ergo, ac uero ſimilius, quoniam id mihi compertiſſimum eſt, huiusmodi aliquando uſum tumorem, ut ſuturas diſtendat. etc. non ad cerebri phlegmonem referre, ſed ad flatuoſum potiùs quendā ſpiritum, eumq; magis in membranæ craſſioris, & cranei interſtitio aceruatum, quanq; & ex aquoſitate fieri nonnulli aiūt. Verofiſimilius tamen mihi uidetur ab extendēte flatuoſo ſpiritu huiusmodi prauiſſimum tumorem fieri: quem aliquando & Rhia alſabian uocari Bellunēſis ait: ſic ſcribens & Rhia alſabian. i. uentoſitas puerorum. Quidā per Rhia alſabian intelligunt uentoſitatem groſſam, intra caput, quæ ipſum replet, ita ut commiſſuræ capitis aperiantur. Et qdā alij exponunt in libro Canonis, quod eſt magnitudo capitis, cauſata ex apertione commiſſuræ, propter uentoſitatem, & humiditatem in eo aggregatam? Has expoſitiones, quæ in idē ferè ueniūt, nos ueras eſſe opinamur. Antiquus uerò interpres uentris inflationem expoſuit: ſed non recte. Subdit. n. Princeps & cuius medicationem iam nominauimus, in capitulo de ægritudinibus capitis ſi non ergo uentris ſed capitis inflationē intelligebat. Nec temerè inter infantium morbos Auicēna computauit: Cū talis, tantaq; capitis inflatio, ut ſuturæ diſparentur, in pueris, ob oſſiū teneritatem, molliciēq; cōtingere queat. Atq; ego uel in meipſo huiusmodi tumorem, prope quartum ætatis meæ annū expertus ſum. A quo ſtatim euidentīſſimo Redemptoris noſtri miraculo (deſperantibus me medicis) liberatus ſum, Intercedētib; interim Diui Vincentij precibus, cui Mater mea collachrymans uouit, expeditaq; miſſa, domū reuerſa, me incolumem reperit. Cuius quidem caſus (Ita Deus Opt. Max. perpetuò me adiuuet) ac ſi heri, aut nudius tertius ſucceſſerit, certiſſimam habeo memoriā (Quicquid diabolici huius ſce temporis Hæretici ſomnient) De hoc autem tumore RaZes etiam ante Auicennam meminit & authoritate Aaron, & Alkindi, ſic dicens & De inflatione capitis. Dixit Aaron, infla-

Cōtra Ander
naciū, et Alba
nū Torinū.

Cōtra Auic.

Rhia alſabian.
d in expōne Ara
bū noī. m. R. di
ctione Rhia. etc.
e intellige. 3^a.
pⁱ doc. 4^a ca. 3.
circa finem.

f colligitur. p^a.
3ⁱ. tr. 2 cap. 19.
ubi uentoſitatem
groſſam intrinſe
cam curauit.

Hiſtoria.

g p^o Cont. c. 10.
litera. nu.

tur

tur caput, uel magnificatur ex uentositate grossæ humiditatis, existentis in eodē loco: Et eius cura est cura spasmi; Deinceps uerò infantis morbum esse indigitat. quū Alkindi remedia subdit, dicens; Dixit Alkindus in libro de electionibus. Sternuamentum expertum probatum, laudabile, et bonum ad intromittendum naribus infantis, cuius caput est inflatū. etc.;

lib. de morbis puerorū cap. 3. Alibiq; h rursus inter puerorum morbos connumerauit. Sic post naturalem, natamq; ab initio, capitis magnitudinem, scribens; Magnitudo autem capitis aut erit ex uentositate generata in ossibus capitis, aut ex aggregatione aquæ inclusæ in eo, quæ non inuenit uiam exitus. Nos autem quæ ab aquæ aggregatione facta sit, ad hydrocephalon, eam uerò, quæ ex uentositate, ad præsentem affectum reducemus. qui (ueluti prædictum iam est) Rhia alsabian, uocatur, & ordine quintusdecimus tumor positus est. Sed ne reticuit quidem huiusmodi tumorem Hali Abbas, qui capitis magnitudinē (ut traductus est) appellans, ad uentositatem duntaxat retulit. Forteq; hunc Introductorij libri Author intellexit, quū exteriores capitis affectus enumerans; διατομή & φάρμακον hoc est; distentionem futurarū ante hydrocephalon posuit. Ad nostrum ergo propositum cōuersi, dicamus phlegmonem cerebri non esse, quæ suturas disgregat, tantæq; tumefactionis causa est. Prius. n. moriretur animal, q̄ ad talem, tantamq; cum intemperie calidissima, intumescētiā peruenire queat. Galeno, præter experimentum, comprobante, uel ob sciam intemperiem, & maxime calidam, multoq; magis ubi unā cū intemperie, animalis quoq; spiritus corrumpitur, mortem necessariò aduenire. Causa igitur est flatuosus spiritus. Qua de re ad frigidos potius, q̄ ad calidos hūc tumorem referre debemus. cum quo nihilominus stare potest, circa huiusmodi tumoris exordia, cōstringētium, frigidorumq; moderatorum usum quadantenus conferre. Remota uidelicet causa calida, quæ talem flatum ad superiora eleuat. Sed ne magnum inconueniens est (uti prima statim fronte apparet) tot tantisq; insimul uiris contradicere. Vbi. n. Galenus de re aliqua non meminit: Tis tubare omnes, qui post eum sunt, sæpiissime inuenimus. Quemadmodum quoties uel Galenus uel quispian antiquorum aliquid falsò excogitarit, Paulum, Aetiumq; nēdum Oribasium, ac postmodum cunctos Barbaros, Arabes uē, balitantum more, præsaltantem hircum insequentes, in eandem cecidisse foueam quotidie offendes. Cuius etiam ueritatis inditum est: quoniā neq; Oribasius in eo opusculo, quod nobis uidere permissum est, neq; Paulus, aut Aetius de huiusmodi flatuoso capitis tumore seorsum locuti sunt. Quemadmodū neq; inter Arabes Razes ullibi, quod uiderim, de illa cerebri phlegmone intātum dilatata locutus est, sed illam ueluti Serapion quoq; ac post eū Mesuas, Galeno, ac ueritati cōformiores sub phrenitide cōprehenderunt. Risu uerò magis dignum est quod Abenzoar, eiusq; simia Auerrhoes de retis uocati mirabilis apostemate scripserunt. Cum usq; adeò tenue huiusmodi rete sit: ut multis uel solertissimis anatomes professoribus non esse cōpertum sit. Quibus uerò illud uidere, ut nobis quoq; permissum est, ita tenuissimis quibusdam arteriolis contextum apparuit: ut meritò mirabile nuncupandum ueniat. Quæ igitur inditia potes certa habere?, quæ uel pulsatio artetriarum sentiri potest? Ultra, quòd obstructis, inflāmatissq; huiusmodi arteriolis, animaliq; spiritu corrupto, q̄ primum animal ipsum (uel Galeno^o erudiēte) mortem obiret. Sed de hoc alibi fusius. Nunc uerò quod proposuimus exequamur. Ex ijs igitur, quæ præostensa iam sunt, mirū nō esse liquet, si doctissimus Manardus, ad annum usq; uitæ suæ sesagesimum quartū, nunq; uidisse refert ingentem cerebri phlegmonem, ut tume factis capite, & facie, atq; oculis

lis futuræ dehiscant. se parenturq; Sed nec medicū, uel alium quēpiam hominem audiuit, qui uiderit. Rem nanq; impossibilem nemini uidisse permissum est. Nec tamen se multoties uidisse uel Paulus, uel Aetius aiunt (uti Manardus refert) sed multoties intumescere cerebrum inflammatum dicunt: ut capitis futuræ distendantur. Etenim dictio {oi dē} idem est, quod La Cōtra Manar tinē {tumet} seu {intumescit} Quod si legamus {ōi dē} idem erit hic, quod {scio} seu {nouit} nō dum. quod proprijs se uidisse oculis testentur. Quoties igitur cerebrum phlegmone tentetur, consentiente (ueluti præsriptū est) statim ipsa tenui membrana, phrenitis fit. Haud. n. phrenitidis ratio in membranæ, uel membranarū inflammatione, sed in cerebri calida, et fixa intemperie consistit. Nam animæ sedes cerebri, non membrana est. Quāq; definitio per causam data magis membranarum phlegmonem exprimit. Vt in quo, ueluti præsriptum iam est, ob uenarum copiam, promptius phlegmone gigni solet. Adde q; si magna cerebrum phlegmone prehenderit, ratio non deprauatur modò (pro ut in phrenitide contingit) Sed penitus interdum aboletur. Cū ex inflammatione Gangræna, demūq; sphacelos cōsequatur. de quibus uetustissimus Hippocrates in Aphorismo scripsit. Quibus cerebrū sphacelatū est hoc est, uti Galenus exposuit, gangræna correptū est in tribus diebus pereunt confirmato uidelicet sphacelo {sin uerò tridū euaferint.} quoniam. s. sola gangræna tentatum sit {hi sani fiunt} HVNC autem affectū corrupto (ut patet) uocabulo {sphacelos} uocat Razes {sekakilos.} Auicenna {scaculos} quidam habent {sachafilus} (ueluti gangrænam, ganaga, nūcupant) aliqui legunt {sacculos} Est autē hic tumor ordine duodeuigesimus antea positus, quē ad phlegmones magnitudinē, deincepsq; gangrænā, & deniq; sphacelon referemus. Hæc intantū de cerebri phlegmone hoc loci per trāsennam dictū iam sit. Erysipelas aut, non secus ac de phlegmone prædictū iam est, ad phrenitidē referendum est. Cuius quidem phrenitidis adhuc species alia est: quæ. s. ex bile fit: adeo ut in nigram degenerauerit: quando etiā grauissima phrenitis nascitur, inq; Paulus. Clariusq; Galenus ait {phrenitis nonūq; mitior est, quā uidelicet à pallida bile ortū cōtraxit} ut cui serosa humiditas admista siccitatē pariter, atq; caliditatē refrænât. Ad hanc primā spēm, eā quæ ex sāguine uel puro, uel bilioso, aut bili sanguinea fit. reducemus. Interdū uehementior, cū flaua bilis eā peperit, Atq; insuper alia nonnūq; dementia occurrit ferina, & melancholica, flaua bile præassata {Hæc tertia, est, quæ ferina phrenitis dicitur. Princeps hanc à Karabito (sic. n. uocat phrenitidē) seorsum pertractat, noīe {sibare} uocans {gienun mefrat} quod Latine sonat {demonium superflut} Multa potes apud Bellunensem, in expositione dictionis {Gienun} legere. Ad phrenitidē ergo hūc tumorem, qui {sibare} dicitur, nos referemus: quē i catalogo prius sextūdecimū ordine collocauimus. Quoniā uerò de mēbranarū cerebri phlegmone locuti sumus: Absurdū herclē minimē fuerit, hic quoq; aliud ab Auicenna dictū apostlema, super crassiore cerebri mēbrana obortū declarare. Quē ipse proprio idiomate {fater} et {fatera} Latine uerò fungū appellat. Nosq; i catalogo. 17^m. ordine cōputauimus. Inq; n. Princeps {Et qñ frāgitur craneū, et egreditur uelamiē, et fit apostlema, quod noīatur fatera, tūc tibi inest in eo, quod diximus. etc.} Huiusmodi fungū, ueluti pertrāsēnā à Galano² prætactū offendimus. quū sic ait {iā uerò ex his ēt, q̄ adnascūtur rebus, affectæ sedis notæ petūtur. Quippe res adherētes cēntiæ proprietatē obanēt. quemadmodū fungi (μυκῆ τας Græci uocāt) si fracto capite menix fuerit affecta. Fieri aut solet fungus hic nō secus, ac in lucernis, hyemali præsertim tēpore, fungus in elych-

q 7^a aphor. 50
et uide. 2^o et 3^o.
de morbis de cerebri sphacelo.
r p^o. lib. Cōtin.
cap. 9. li. hb.
Sekakilos.

Scaculos.
s p^a 3ⁱ. tr. 3. ca.
2. circa finē.

lib. 3. cap. 6.
u 3^o. de loc. aff.
5^o. in fine.

x p^a. 3ⁱ. tr. 3.
cap. 6.
Sibare.

Fater.

Fatera.

Fungus.

y 5^a. fen. 4ⁱ. tr.
3. cap. p^o. uersus
medium.

z p^o. de loc. aff.
circa prim^a.

μυκῆ τας.

a p^o. Geor. uer. nij uertice oboriri solet, futuraq; pluuiæ uel mulierculis præfagiū. quæadmodū Poeta, et Plinius quoq; testatur. Etenim cū aer humidus eē ceperit, fauilla, quæ cū fumo solet egredi, prohibita ob aeris crassitate in lucernis residet, & quasdā uelut fungorū imitatur imagines. Ita igitur in discooperta reuelataq; cerebri mēbrana, quædā prius substātia gossipinæ lanuginis imaginē repñtat. Deī uerò per halitū discussi uapores, fumiq; ob aeris frigiditate ī ea substātia cōglobati paulatī ab īteriori calore deurūtur, siccāturq; donec fungo quoq; similis substātia appareat, alteratā eē ab aere mēbrana significās. Id quod aliqui nō sine maximo ægrotātū periculo cōspeximus. Quā ob rē negligenda fortassis non est antiquior Auic. litera, quæ loco uerbi ē egreditur; ut Bellū. corrigit īnfrigidatur; habet. sic uidelicet dicēs. Et qñ frāgitur craneū, & infrigidatur uelamen, & fit apostema. etc. Tumor quidā præter naturā dici pōt: ex eorū tñ albo, quæ cū prius oīdō nō fuerint, postmodū sunt orta. Quæ de re exquisitissime rerū naturas perpēdetib, nō propriē apostema dicēdū uenit; futuratiz ēt Arabicē legitur, siue cū articulo; alfuratiz; et iterdū; fururati, & et; frutatē. Sz idē, quod; fater; seu; faterā; hoc est fungū præseferūt. Sed hucusq; cōsequētiæ necessitate ducti, peruenire coacti sumus. Ad phrenitidē ergo reuersi, dicamus ipsam quoq; in libro de tumoribus præter naturā aliquo mō cōmemoratā. ubi. s. de erysipelate, ac phlegmone, itēmq; cōposito ex ijs tumore mētio facta est. ad quæ phrenitis, ut spēs ad genus suū necessariō refertur. Inuenitur autē aliqui in Arabicorū libris; Alumbetis tractū. & hoc est phrenitici. Vt antiquus Arabicorū nōum interpret ait. d

PRENITIDI Contrarius (licet in eadem nihilominus sede obortus) affectus est, qui qdē Græcē λῦθαργος, dicitur, Latine autē Recentiorū nōnulli ueternū uocarunt. Vt sæpe Græcorū Medicorū interpretes, ubi Græcē λῦθαργον legūt, nobis ueternū interpretati sint. Sed minū recte. Cū ueternus non huiusmodi morbū certa quadā, speciali; significatione, sed ignauiam, segnitieq; aut torporē, & otium, nec non somnolētiā, aut grauē aliquādo somnū, Ciceroni f meritō (ut Plinius & ait) Luci doctrinarū alteri, Itēmq; Vergilio, Marco Cælio, i Columellæ, k Plauto, l Terētio, m Ausonio, n ipsiq; demū Plinio^o præsefert. Quāq; nō desunt, quibus ob eandē ignauā, segnitieq; Hydopen referat. Cōmune igitur qdpiā cas ro, comati, cataphoræ, torpori, atq; etiā fatuitati, nedū lethargo, ueterni nomen significat. Cur ergo uni duntaxat affectui, uel inuitis (quos æmulari necessum fuerat) Romanis, nomē dedicarūt? Vñ non parua Græcarū literarū expertibus cōfusio, æquiocationis rōne, offertur. Cū nōnulli nō lethargū, sed caron. Alij uerò, quod Græci coma nuncupant, seu cataphoram, Latine ueternū interpretentur. quod nomen Græcis dictionibus λῦθαργον, & et λῦθαργος. & ap posite apud nos respondet. Quas ob causas Romanorū Medicorū coryphæus Celsus, i atq; ipse itidē Plinius, & qui Plinio ascriptus est liber, s Aemilius Macer, Quintus Serenus, ac Theodorus quoq; Priscianus x Græco nomine (ob Latini penuriā) usi sunt, lethargicum morbū, & lethargon, seu lethargū, et quandoq; lethargiā, ipsum affectū: lethargicos uerò q eū patiuntur, nuncupantes. Nec secūs ab Arabibus: ut Raze^o Auicēna^z Hali Abbate^l Serapione^a atq; ipso demū Costantino Africano^b obseruatū offendimus. Ab Albucasi autē obliuionē uocari legimus. Dicitur enim λῦθαργος à nomine λῦθη; quod est obliuio. Vnde et lethe, ac lethusa (Apuleio Madaurensi d teste) slyestre papauer nuncupatur, quoniam. s. degustatū obliuionem inferre solet. quæadmodum & de fluuiio apud inferos Poeta fabulantur. ut ipsa deniq; mors, lethū propter omniū rerū obliuionem appelletur. A nomine igitur lethe

- lethe, quod est, obliuio, & ἄγνος quod est ignauus, ociosus, desidiosus, inutilis, & similia, a p^o. Brev. cap. 17.
- dicitur lethargus, sicuti ab ἄργος quod est, ignauia, ocium desidia. etc. dici etiam potest lethargia, significabit ergo lethargos, siue lethargia uel obliuio sam desidia, uel desidiosam obliuione. utruq; autem obliuio inq; & desidia, cum uehementi ad somnum delatione, huiusmodi morbum sequitur. Vnde morbum quoq; pigrum Aemilius Macer d^o nominauit, Dicens b lib p^o. de morborū cūrōne & agn. cap. 14.
- „ Est quidam morbus lethargus nomine dictus: Oppositum medici quem dicunt esse phrenes c ca. 9. libri p^o. d cap. 53. libri de uirtutibus herbarum.
- „ si: Quod uetat hęc somnum, somno grauat hic nimis ægrum. Hoc tam lethali somno depressus aceto: Thymbram commiscens, foueat caput inde frequenter. Sic uitium pigri cap. de satueria.
- „ poterit depellere morbi. etc. Quod si à nomine ἄργος quod est Latine captura deducatur f lib. 3. cap. 9.
- 10 Etum nomen uolueris: obliuione captum, siue obliuio sum, lethargum interpretaberis. Lethargum igitur, cū ratiocinatricis animæ noxa sit, locum eundem, quem phrenitis nempè cerebrum occupare: materiam uerò mali cōtrariam esse Alexander, & Paulus f Galeni & dogmatibus innixi scripserunt. Cerebrum tamen hic nō ipsas cerebri membranas, uelut in phrenitide, cum Introdudorij Authore, b intelligas difficillimè nanq; in membranas pituita inseritur: 21. 4^o. de caus. Puls. 14. 15. lib. q. animi mores corp. tēperaturā in seq. cap. 3. & 3^o. Aphor. cō. 30
- quam ob rem eos, qui acidum eructant, ut pituita refertos, non admodum laterali morbo corripri, Antiquus senexⁱ ait. Ipsam ergo cerebri substantiam pituita deprehendi, atq; occupari in dūctorij Authorem.
- „ lethargo, ex Galeno quoq; intelligas, sic aliàs k scribente: Neq; hic quidem causas illorū, quæ b cap. 14.
- „ diximus, inuenire magni laboris fuerit: si scias generari à bilioso humore phrenitum, ut lethargū à pituitoso. Si itē hoc teneas, lethargū ex ipso magis cerebro, phrenitum uerò gigni maxime ex tenui menynge, & ex septo transuerso: 3. quāq; & ex septo transuerso fieri posse i 6^o. Aphor. 338
- lethargum, ex Archigene, & Possidonio Aetius refert. Quoties igitur eandē partem in al- k 4. de pulsū causis. cap. 15.
- terutro morbo teneri scriptū est, nempè cerebrū: nō pro similari, simpliciq; substantia cerebrū b lib. 6. cap. 3.
- capere oportet, uerū, ex ipsius quoq; Galeni dogmate, pro organico mēbro. Aliquādo. n. lⁱ in l ut lib. de cōst. art. med. cap. 11.
- ter organica, cōpositaq; membra cerebrū connumerat Galenus. ubi uidelicet totū, quicquid in- et de morb. dif. cap. 3.
- tus craneū cōprehēditur, cerebri nomine intelligit, q; q; et alias m inter simplicia numerare cō- m ut p^o. de elez mētis. ca. 10. &
- sueuit. qum. s. ipsam cerebri medullarē substantiam concipiebat. Eadem igitur affecta pars in 13. q; q; dicit ibi
- utroq; morbo est, quia cerebri organum, etiā si phrenitis à mēbrana, lethargus uerò ab ipsa μὲν λόγος. i. medulla. sed uide p^o
- cerebri substantia magis, frequentiusq; exordii sumpserint. Haud. n. inficias interea nos ibi de pot. naturas libus cap. 6.
- mus, phrenitidem aliquando à cerebri substantia (id quod antea nⁱ iam supposuimus) atq; le- n in sermone de siriasi et phrenitide. f. tum. 7^o.
- 30 thargū quādoq; à mēbranis primā suæ generationis originē suscipere. Quauis Auic.^o in ce- & 8.
- rebri meatibus gigni lethargū frequentius, q; in ipsa etiā substantia, & uentriculis uoluerit. o p^o. 3^o. tr. 3^o.
- Quicquid tamen sit quamplurima de huiusmodi tumoribus disputanda, & quidē uberrimè cap. 7. in prin^o.
- ad propria cuiusq; capita referuauimus. Hunc uerò sat superq; est, in tumorū catalogo non mi- p circa mediū.
- nus, q; phrenitum collocandū esse lethargum, in quo propter humoris putredinem, non calidi- q 6^o. Aphorif. 33. lib. de const.
- tas modò, sed febricula etiā necessariò excitatur, ut q; q; inter frigidos ab initio tumores nume- art. med. ca. 15.
- rands, et inter œdemata locandus, nihilominus tamen ad calidos tandē, putredinis ratione, re- et. 5^o. de loc. af. ca. 2. post prin^o.
- ducatur, atq; in phlegmonarum catalogo reponendus ueniat. Fit. n. & à pituita, ueluti & ab 2^o. de crisi cap. 10. et. 2^o. de dif-
- atrabilario succo cōmuniter dicta phlegmone. Quemadmodū de pleuritide à Galeno p^o præ- ferētis febriū. cap. ultimo.
- scriptū est. putrefactis inq; hisce humoribus, & calorem nactis. Fiunt d autem lethargi (in-
- 40 quit Definitionum Medicarū Author) οἱ μὲν παύσας τῆς ἀρχῆς, οἱ δὲ ἐν ἀποσώσεως quod est hi qdē patiente principio, hi uerò propter abscessum Quæ uerba duplicē possunt, no-

bis sententiā ostendere. Quarū prima est, capiēdo apostasin pro transitu unius morbi in alterū. ueluti apud Hippocratē aliqñ legi, nos antea scripsimus. Adeo ut sensus sit, fieri lethargū, aliqñ primogenio cerebri affectu, aliquando uerò consensu, uel transitu, permutationēq; morbi alterius: ut quū ex perperam refrigerata phrenitide, in lethargum transitus fit. Vel alterius etiā partis, in ipsum cerebrum. Secūda uerò, quæ magis mihi arridet sententiā est, fieri nō nunq; lethargū patiēte cerebro, absq; ulla partis corruptiōe, nō secus ac phlegmonen, atq; erysipelas, in spersis inq; sanguine, aut bili, uel utroq; humore per ipsam cerebri, mēbranarum ue, aut utriusq; substātiā: nōnūq; aut propter apostema siue abscessum, propriē, scapiendo apostasin, pro eo, in quo intermediū quoddā uacūū fit, corruptis u; aliqbus interiacētibus particulis, quē affectū ab Arabibus propriē dubellet; nūcupari præscripsimus. (Quāq; largē sūpto apo- 10 stematis noīe, apud Barbaros, et phrenitis, et lethargus, sed et oīs ferē tumor apostema nominatur) tūc; perniciosissimus huiusmodi lethargus erit. Sed de his aliās uberiū repetemus.

Hoc dūtaxat impræsentiarū apponere nō grauabimur, quoniā Galenus præsagitionē ex pulsibus docēs, ex sola uidetur itēperie humida cerebri lethargū cōcedere. Id quod tā ipsiusmet dogmati aduersum est, pituita germen esse lethargū q; pluribus in locis determinatis, q; nobis et ponētib; ipsum perpetuō inter tumores prater naturā. Sunt autē Galeni uerba hæc {Hus midæ intēperaturæ cerebri molles diuturnitate efficiunt pulsus, ac hoīem comatosū. Si ad illas accesserit febrilis calor, morbus appellatur lethargus, et pulsus est non modō mollis, sed maz- 20 gnus. Si uerò putrida pituita ita cerebrū afficiat: erit tū etiā morbus lethargus. etc.} Pro cuius ius sententiæ claritate, Nota, quoniā Galenus ibi duplicē uidetur lethargū ponere, Alterum 20 qdē ex sola intēperie humida cū febre, uidelicet per consensum, et per quādā euaporationē. Alterū uerò per protopathiā, et est quū pituita in cerebro aggregata putrefit, et hic uerē ac propriē lethargus est. Vbi nota uerba. Etenim de primā specie ait, {appellatur lethargus} de 2^a uerò {est lethargus.} Itē circa secūdā aduerte, quoniā Græcē dicitur {εἰδὲ ἐν πτωματικῇ φλεγμῇ καὶ τῷ ἐν κίφῳ καὶ τοῖς αὐτῇ γίνεσθαι διαθεσῖς} hoc est {si autē a pituita putrefacta in cerebro (q. d. primogenio affectu, et in cerebri substātia, non per euaporationē, et consensum, aut ex sola itēperie humida) huiusmodi dispositio fit: erit tū et hic morbus lethargus. etc.} Hæc duplicis lethargi distinctionē ex ipso met alibi collegisse difficile nō ē. Expressit tñ Aetius² ex Archigene, et Possidonio. q; q; a Galenoz difformes sint, minutissimum, et aggrē mobilē pulsū esse dicētes eorū, q; semper affecti sunt. q; si uerē lethargici sint. Quoniā 30 uerò q; per consensum uerē lethargus nō est, sicut neq; per consensum facta phrenitis, adeo ut uelut hæc paraphrenitis dici consueuit, ita et illū paralethargū uocare queamus: Idcirco Galenus simpliciter describens, lethargū, alibi non semel, præsertimq; methodi. 13. ° de uero intelligēs, ex putrida i cerebro pituita fieri protulit cū febre. AD 10^m uerò tumorē cōuertamur, q; typhomaniā uocauimus, propter id, quod dicemus. A Paulo autē speciatim {κῶμα αἴγρε πνον} Græcē nominatur. q. d. {somnia uigil} Etenim coma nō aliud, q; in semnū delationē nobis præsert. Dicitur. n. a uerbo {κῶ} quod ē, dormio (ut in Etymologico scriptū ē) 1. uñ formatur {κῶμα} ex quo ueteres {κῶμας} et {κῶμας} notariūt loca, i qb^{er} erāt dormituri. Vel a uerbo {κῶμα} quod ē {dormio} significat. Vñ {κῶμα} i. somnus, et per Syncopen 2. fit {κῶμα} dein mutata {οῖ} in {ῶ} fit {κῶμα} uel 3^o. nūcupationē hinc productā, ex Cælio 40 Rhodigino, b determinabimus. quoniā substratis pellibus, q; {κῶμα} uocat, indormirēt priores. 3.

Nōnulli

et p^o. de morbis
uulg. cōmētario
2. tēx. 21.
et supra fol. 29.
lin. 30.

et ibidē lin. 37.

u lib. 4. de præsag.
ex pulsibus. cap. 8.

Letharg². 2^x.

1^o.
2^o.

et 3^o. de locis affe-
ctis. ca. 5. post
principia.

et lib. 6. cap. 3.

et 4^o. de causis
pulsuū c. 14. et
de puls. ad Tyro-
nes. c. 13. et. 4. de
præsag. ex puls.
cap. 8.

a cap. 21.

10^o. 11. 12. Tu-
mor insimul.

Typhomania.

Coma unde
dicitur.

b lib. 11 cap. 11.
ante medium.

- Nonnulli autem & quartò ἀποτὸς καμᾶειν, quod est, crapulosè inebriari dictum esse coma, Galeno^c referente, uoluerunt. quoniā ebriorū instar, inconstans uniuersum corpus in motibus, titubansq; comatosi habent: ultra q; uigilantes in somnum quoq; deferuntur. Sed hæc ad Grammaticos. Satis. n. fuerit nosse coma somnū quodammodo significare: determinatum uerò id nomen ad speciem quandam, quæ non naturalis, at morbosa quædam ad somnum inclinatio est, & ut Etymologicus Author inquit ἡ ἀποτὸς καμᾶειν hoc est obliuiosa ad somnū delatio. Pro cuius nominis exquisitiore notitia, ex ijs, quæ Galenus libello de comate scripsit, notandum est, non aliud Galeno καμᾶειν, q; Hippocrati καμᾶ significare. Dicitur. n. cataphora à Græco aduerbio κατὰ quod est deorsum & nomine φῶρα quod est delatio. Etenim κατὰ φῶρα, hoc est, deorsum ferūtur hi, quos somnus inuasit. Qua de re nō est aliud cataphora, q; in somnū delatio. Itādemq; (Galeno docente^d) apud Hippocratē coma significat. Sed ne intelligas quidem cataphoram, coma^a ue, quoniam in somnū delationem esse interpretati iā sumus, Idcirco somnolētā semper, ad somnūq; peruenientē cataphorā esse. Haud. n. necessariò somnū coma, cataphora^a ue inducit, nisi in lethargicis. Sæpiculè aut in somnis uigil^a ue, ut in phrenitide erit. Quāuis ergo in somnū inclinet, deferatq; ac impellat, nō tñ semper dormiūt qui comate oppressi sunt. Sed eorū oculi nonnunq; grauati sunt, ut uix conuenire queant, & quadā inclinatione in somnū aded tenentur, ut sperare possis, si illis hoc ipsum cōcedas, eos facillimè somnū consequi. Verūm nō solum nō dormiunt, sed etiā spe, quam antea habebāt, ut dormituri essent, omninò destituūtur. Duplex igitur cataphora, coma^a ue est, tūm somnolenta, quā lethargicis propriam esse Galenus ait, ubi somnus, & quidē profundissimus existit: tūm in somnis, quæ tametsi phreniticis propria non est, illis tamen aliquando adiungi uidetur. Primam ex Hippocrate coma soporiferum nuncupabimus, secundam uerò, coma uigil, quod ob admistam pituitā bilim aduenit. Pituitæ. n. causa, in somnum inclinatio quædam fit: Bilis uerò ratione, uigil est. Atq; idipsum rursus bifariam esse potest. Vel. n. dominante bili: & coma uigil, Græcè ἀγρυπνὸν καμᾶειν ex Hippocrate, uel cataphorā uigilem ex Galeno simpliciter, generisq; nomine appellabimus, & hæc pigra non est. De qua ut decimo tumore loquēdū proposuimus. Sic. n. uocari ab Hippocrate cōsueuit coma uigil seu comatosus uigil non infrequenter proferente. Sic etiā Paulus nominauit. Vel superate pituita coma uigil fit. Et hæc secūda spēs est, quā uel coma uigil pigrū, uel ēt ex Galeno cataphoram uigilē pigram nuncupabimus: Magis. n. hi dormituriunt, ipsoq; à somno grauantur, ut nō multū moueātur, immò segnes in lecto decūbant. cū tñ excitantur, uolētīaq; ab astantibus patiuntur, ut surgant, magis intelligūt. Quod si quieti remissis in illis coma scuire permittas, eos magis, ac magis tūc desipere uidebis. Vetusiores Galeno Medici (Paulus ait f) malū id catochon (masculino genere) nūcuparūt. Estq; is tumor in cerebro factus, ex lethargo & phrenitide admistus, eo uidelicet superante, hac uerò subdominante. Quā ob rem somni plus, q; uigiliæ cōtinet. Adeò ut uel ipsa etiam uigilia pigra, grauisq; sit, & (ut ita dixerim) soporifera uigilia. Hic demū tumor est. quē ordine undecimū antea proposuimus, & catochon ex Paulo uocauimus. Ex Paulo inq; Quāuis. n. ex ueterū, nō proprio, dogmate Paulus catochū nominarit. Quia tamē illi ueteres ignoti nobis sunt, Eapropter nomenclaturæ dignitatem Paulo dedicasse libitū est. Aliud interim annotantibus, huiusmodi. sc. catochū nuncupatum. ab Hippocrate, Coma uigil pigrum, à Galeno autē cataphorā pigrā, aliud morbi genus esse ab eo, quē

^c lib. de comate
post principia.

Cataphora ad
et uñ dicitur.
^d Libello de comate.

Coma seu cataphora. 2^x.

Coma uigil
duplex.

Coma uigil
pigrum.

^e Vel lib. p^o. pro
rhet. in prin^o. et
3 epid. commen
tario. 3. tex. 73.
& 84. & alibi
sæpè.

^f lib. 3. cap. 6.

Catochus
Pauli.

g p^o. prorrheticorum parte. 2^a. com. 56. & 13. meth. c. 21. uer-
sus finē et lib. de puls. ad tyrones. ca. 17. & 4. de cau. pul. c. 17. 3^o de loc. affec. c. 4. circa finē. et. 4^o. 2^o post me^m.
Galenus, & Idēq; Paulus alibi, b ex ueterum quoq; sententia, fœminino genere catochen, seu catocham, & catalepsim. quasi dicat detentionem, deprehensionemq; nominant. Quemad-
modum, & eo morbo, pressos homines κατὰ τοὺς, & κατὰ τοὺς μένους. q. d. deprehensos, detenz-
tos uel, aut occupatos ex uetustioribus appellabant. ἀπὸ τοῦ κατὰ τοὺς, quod est, detineri, oc-
cupariq;. Hic. n. affectus (quem nos ordine duodecimum in catalogo declarandum proposui-
mus) minimē compositus esse scribitur, ut ille, qui ex lethargo, ac phrenitide mistus diceba-
tur. Verū ad humorem melancholicum in posteriore uentriculo residentem, ut propriam ip-
sius causam refertur. Quāq; libri de locis affectis interpretes Copus^a quē incōsultō Agrico-
Catoche, seu la^b trāscripsit, ubi Græcē Galenus habet κατὰ τὸ τοῦ κατὰ τοὺς καὶ τοῦ κατὰ τοὺς οὐνοῦ „
Catalepsus. κατὰ τοὺς μένους; quod est {in uocatis autem catalepsibus, & catochis} uel sic {in ijs autē, quas
b lib. 3. cap. 10. catalepses, & catochas uocant} utroq; n. nomine eundem affectum uocari insinuat. Interpres
Cōtra Copū, aut ita uertit {in catalepsi uerō, & uigilanti seopore (Græcē catochē) posteriora cerebri. etc.} „
& Agricolā. ubi quidem non in eo tantummodo aberrat, quoniā catochen pro uigili comate interpretatur.
a 4^o. de loc. af- Sed in alio etiam. Nam dictionem {seopor} paulō ante Græcē dictō {κατὰ τοὺς} dedicarat. Deins-
fectis. 2^o. et uide ceptus autem coma uigil insinuare uolens {uigilantē seoporē} conuertit. quod aliquis pro uigilāte
c. 3. 4^o. caro intelligere posset. de quo tamen infrā, A Raze, i Serapione, k & Auicēna, l Practiciq;
b Agricola ī es iust. lib. annot. uocatis passim (ut uidebimus) congelatio dicitur, quam nos catalepsin, & fœm. genere catocham
cap. 4. 2^o. cham appellauimus. Hanc quoq; mascul. genere catochum proferre possumus. Adeō ut duæ
i 9. ad Māforē sint catochi species. Prima, quam antea tetigimus, compositum esse, ac mistum ex lethargo, et
cap. 5. et p^o. cōt. phrenitide affectum dicentes, uocariq; etiam coma uigil pigrum, seu cataphoram uigilem pig- 20
cap. 8. litra. BB. gram. Secunda uerō species est, quæ frequentius fœm. gen. catochē, seu catocha, & specias-
k p^o. Breuiarij. liori nomine catalepsis nuncupatur. Hanc ob causam Paulus, m ubi & primi catochi, compos-
cap. 18. siti. f. ac uigilis comatis non pigri (de quo rursus postea loquemur) curationem proposuerat:
l p^o. 3. tr. 3. c. 12 Catochi spēs
duæ.
m lib. 3. ca. 10. Expeditisq; iam utriusq; comatis, cataphoræ uel uigilis inditijs, tūm. f. pigræ, quā ex Galeno
n cap. 6. uetustioribus catochum nominauerat, n tūm non pigræ, quā generis nomine simpliciterq;, cos-
ma uigil, Græcē α γυν πον κω μοι nūcuparat: sic demum subdit. {εἰ δὲ ὁ πῶς τὸν κατὰ τοὺς „
& πρὸν φασί, παρὰ τὸ α γυν πον κω μοι. etc.} quod est {Est autem ubi alterum catochū dis- „
cunt, præter uigilans coma} sic. n. Latine uertenda Pauli prima uerba sunt, ut apertius eius
sententiam ostendant {quod simplicem, non mistam habet causam, nimirum frigidiorē, sic „
cioremq; materiam, quæ posteriore cerebri uentriculo obstructo, malum id excitauit. Ob quā 30
Pauli loc^o ex etiam æger, si corripitur subito in illa permanet figura, qua correptus est. stans. s. uel sedens, „
positus. clausis oculis, aut respiciens. etc.} Dicebat ergo Paulus alterum esse catochum, præter uigis „
Expō p^o. lans coma. Quæ uerba duplici modo intellecta, semper uerū præseferent. uidelicet i præter
uigilans coma, & tā pigrū, q; non pigrū. ut totum exclusisse genus uoluerit, cuius species alter
2^a. catochus erat. Aut 2^a {præter uigilans coma} hoc est, præter eā comatis uigilis speciē. f. nō pig-
o. f. i titulo eius grā, quā ipse paulō prius, o generis noīe, uigil coma, Græcē α γυν πον κω μοι, nūcupauerat.
dē, & cap. 6. à quo uigili comate, seu uigilis comatis specie diuersus positus erat catochus primus. Subdit
ergo alterum adhuc esse catochum, à uigili comate. f. non pigro diuersum. Vt non ille tantum
catochus, sed hic etiam à uigili uocato comate non pigro diuersus sit, qui simplicem habet cau-
sam. etc. In idem uerō semper uenit: duas uidelicet catochi species esse, quarum prima est, quæ 40
undecimum à nobis propositum tumorem ostendit. Secunda duodecimum præsefert. Primam
aliq

- alio nomine coma uigil pigrum nominabimus, mistū ex lethargo dominante, ac supposita phrenitide affectū dicētes, Secūda adhuc alio uocabulo catalepsi, lucidioris doctrinæ studio, uocabimus: Simplicē interea tumore ex melancholico dūtaxat succo abortū esse determinātes. Hūc Galenus p̄ affectū, in suo condiscipulo uidit {cū. n. ille assiduo disciplinarū studio se fatigaret, p̄ p̄. prorrhetis corū. cōmetario. 2^o. com. 56.
- „ hoc malo correptus est. & Iacebat. n. (ut ait) ueluti lignū, prorsus inflexus, rigidusq; atq; extensus. Videbaturq; oculis apertis ita nos intueri, ut ne conuieret quidem, nihil tamē loquebatur.
- „ Is quoq; tempore eodem, quæ loqueremur audire se dixit, q̄q; non euidenter, clareq;. Nonnulla itē & memoria tenens referebat, præsentesq; omnes sese cōspicere dixit. Ita ut quorundā actiones recordatus exponeret: sed neq; loqui posse, neq; membrū ullū mouere. etc. & E quibus
- 10 Galeni uerbis unā cū alijs ab eo scriptis, perspicuū fit, Aetium q̄ ab eius, Pauliq; sententia q̄ plurimum aberrare. ut qui catocham, catalepsiū ue, aut si mauis dicere secundam catochi sp̄em. cum prima, quā coma uigil pigrū nominauimus, admisceat: signa qd̄ turpissimo errore confundens (coma uigil non pigrum interea omittens.) Aded ut simplicem causā, humorem .s. melancholicum ponēs, quæ secundi catochi est, mediam tamen inter phrenitidem, et lethargum affectionem scripserit, quod primæ catochi speciei interest. Præterea & huius deliriū, inordinatosq; manuum motus, & febrem, atq; oculorum aliquando clausuram, ut dormire uideatur, (quæ symptomata primi catochi sunt) & fixos, intentosq; oculos, et palpebras immobiles, (quæ secundi catochi sunt,) admisceat. Cū tamen Galenus p̄ catocham, catalepsiū ue absq; febre inuadere, ultraq; eos, qui eo malo correpti sunt, audire, ac uidere, quin & memoriari (q̄q; posteriorē cerebri partem occupari potius contingat) & demū, quia immoti permanēt, & sine loquela, desipientiam in ipsis cognitu (præterq; in principio morbi) impossibilem ait: Aetius tamen ab Alexandro (ut perpendenti liquet) aliqua transcribēs, de falso lethargo loquēte, eoq; nomine utrūq; comatis uigilis modum intelligente, sensu etiā priuatos esse minimeq; audire, adiunxit, ac si caro, soporē ue insimul affecti sint. Quā ob rē condemnanda quidem Aetij cōfusio est. Nisi ab oībus prædictis iam affectibus, cōpositum quēdā, mistūq; ex utraq; catochi specie, atq; etiam caro affectum intellexerimus. quem Aetius catochæ, catalepsiūq; nomine intellexerit. Quæ morborū confusio impossibilis non est. Quemadmodū & causæ, humores ue ipsi etiam confundi possunt, & plura insimul affici loca, à diuersis interrim humoribus, uel eisdem patientia. Quibus porro positis, p̄ statim Aetium excusabimus.
- 30 Interea tamē annotantes, q̄ si sic Aetium ab errore immunem reddere conabimur, aliam Aetij catochen, catalepsiū ue, à catochæ, catalepsiū ue Galeni, quin etiam à prima catochi specie diuersam omnino esse, confiteri necessum est. Quam fortassis intentionem Aetius non habuit. Eam. n. (ut sui moris est) expressisset. Verū hæc obiter intantum dicta nunc sint. Ad propositū ergo reuertamur. C O M A inq; uigil non pigrū, quod pro decimo tumore nunc enarrādū proposuimus, Paulus ex Hippocrate simpliciter {coma uigil} Græcè {ἀγρυπνον κόμα} nūcupat: Nil præterea adiungēs, sicq; nos etiā generis nomine utentes, agrypnon coma, decimū tumorem nominauimus. Coma. s. uigil non pigrum intelligentes. Tumor hic est, q̄q; ex lethargo etiam, & phrenitide commistus, Nihilominus tamen plus phrenitidis. q̄ lethargi, quoniam plus bilis, q̄ pituitæ particeps est. Quam ob rem & si ad somnū inclinant, deferunturq;
- 40 magis tamen uigilantes, q̄ dormientes sunt, quicunq; hoc mali genere affecti sunt. Atq; aded multum, facileq; mobiles existunt, ut neq; aliquam corporis partem (ut Galenus ait) uehementer

q̄ lib 6. cap. 4.
Cōtra Aetū.p̄ 13. meth. cap.
21. uersus finē.

r̄ lib. p̄. cap. 14

Aetij quædā
excusatio.Agrypnon co
ma.libello de Cos
mate cap. 3.

mēter

t lib. de comate: **menter mouendo, neq; alta uoce clamando deficient. Quod si eos concites, aut cum illis loquar**
 cap. 4. in fine et **ris, toruè te intuentur, atq; etiam magis ab se alienantur: inferre q; malum tentant, & ad aus**
 p^o. prorrhet. cōs **diendum promptissimi fiunt: Nulla q; in re sunt ijs, qui summè desipiunt dissimiles.} Huius**
 mētario p^o. com. **modi affectum, sicuti & alium quoq; uidelicet coma uigil pigrū iam iam declaratū, Galenus**
 p^o. & de puls. **alios se uetustiores imitatus ex phrenitide & lethargo mistum appellat, nonnulli autem uos**
 ad Tyrones. 16. **cant (ut idem^u ait) Typhomaniā. q. d. Latine fumosam insaniam: quoniam. s. febrem, non sic**
 et. 4. de puls. cau **cuti pura, exquisita q; phrenitis incendentem, at succensam, & ueluti ex uiridibus lignis ele**
 sis cap. 16. et. 3^o. **uatū ignem, tūm debilem, tūm fumosam, & resolutu difficilem excitat, ob pituitæ admisionē,**
 de loc. affect. ca. **quæ, uiridium lignorum instar, succendi, atq; effumare, non uehementer incendi sciet. Vnde**
 4^o. & uide. 4. **& febres fumosæ, uaporosæ q; ac humidæ non ἐλωδῆς modò. q. d. palustres, humidæ ue**
 de præfagit. ex **(ἐλως. n. paludem significat) quoniam. s. paludis ritu continuos uapores humidos emittant, ue**
 puls cap. 3. **rūm & τυφώδῆς à uetustioribus, Galeno^x referente, nuncupantur. q. d. fumosæ. τυφώ**
 Typhomania. **enim, & τυφώδῆς idem est, quod fumo, seu fumigo. Magis tamen fumosum est coma uigil**
 u lib. de comate **pigrū, ut in quo pituitæ, lethargi q; plus, q; bilis, phrenitidis ue inuenitur. Hinc lethargo pro**
 cap. 4^o & p^o. **pinquiorem typhomaniā illi crediderunt, ut ex Galeno colligi potest. ^o Fumosi ssimū uerò**
 prorrhet. cō. p^o. **somnolentum coma¹ est, quod quia lethargicis ut proprium inest, lethargicum coma dixisse**
 x lib. cōtra Lyz **absurdum non est. Quanquā uerò ita est, uidelicet typhomaniā nomen de admisso phrenitidi**
 cū. cap. 2. et. 7^o. **lethargo, tam. s. pigro, q; non pigro dici, propriè q; magis (uti dictū est) de pigro: Nobis tamen,**
 Aphor. 42. et p^o. **qui proprijs, specialibus q; nominibus designatos tumores in catalogo uestigamus, cum alteri**
 Aphor. 12^o. **speciei, uidelicet pigro comati nomen ex Paulo determinatum inuenerimus, illi q; catechi nos**
 o Lib. llo de comate **menclaturā determinarimus, Alteri uidelicet non pigro comati dicto, ubi (ut diximus) bilis do**
 c. 7. i fine. **minatur, tanq; speciale nomē Typhomaniā ascripsisse placuit. Tuū uerò fuerit quouis nomis**
 y p^o. 3^o. trac. 4. **ne appellare, modo rerum differentias obseruaris. Nonnulli autem potius } Typhoniam} per**
 cap. p^o. **syncopen proferunt. Coma. seu cataphorā quālibet Princeps^y Arabicè } subeth } nūcupat, sic**
 x p^o. Cont. cap. **etiā Razes,^z Serapion^a & Abēzoar.^b Subeth simpliciter dicti nomine tā coma, q; caron (de**
 8. litra. cc. & 9 **quo mox loquemur) intelligentes. Hali Abbas^c aut (ut eū Latine loquentem legimus) obstupe**
 ad Māforē ca. 5. **factionē simplicem, utrunq; affectū, coma uidelicet, atq; caron uocat, fortassis uerò & subeth**
 lib. Diui. cap. 6. **proprio idiomate scripsit. Sed de comate simpliciter enuntiato, quemadmodū & de caro mox**
 a lib. p^o. Breu. **deinde repetemus. Quod autem nos paulò ante coma uigil pigrum, ubi lethargus phrenitidē**
 cap. 17. **excellit, seu cataphoram pigrā, seu cum Paulo catechū diximus, Auic.^d subeth alshari, uel**
 b lib. p^o. tr. 9. **shari, uel alsahara, uocat. q. d. (ueluti apud Serapionem^e legimus) subeth uigilatiua. Est. n. (ut**
 cap. 13. **idē Auic. f. inquit) sahara superfluitas in uigilia, et egressus à re naturali. etc.} Si uerò coma**
 c 9. Theor. c. 5. **uigil non pigrū sit, ubi phrenitis, ac per hoc uigilia superat, ab Auic.^g sahara, seu shera sus**
 & 5^o. Practicæ. **bethia nuncupatur. Serapion^b utrunq; subeth uigilatiuam nuncupabat. sic etiam Razes.ⁱ Ale**
 cap. 16. **xander^k autem falsum lethargum uocat. Hali Abbas^l demum, corrupto quadantenus Græco**
 d p^o. 3^o. tr. 3. **nomine, cuma, utrunq; uigil dictum coma nuncupauit. (exponit q; interpres. i. ob stupefactionē**
 cap. 12. **peruigilatiuam.) Alteram uerò catechi speciem, quam propriè catalepsi^m, & catechen uocaz**
 e lib. p^o. Breu. **ri prædiximus, Serapion^m congelationem habet, qui tamen } cathacheis } corruptè, pro } catos**
 cap. 19. **chis } legit. Idemq; Razes congelationem uocat.ⁿ qui tamen catalensim, & catalasim, & cas**
 f Ibidem tr. 4. **talensiam, deprauatè, pro catalepsi habet. Distingueretamen uidetur à congelatione sachos,**
 cap. 4. **siue saccos, aut succos, Latine dicemus extasim, hoc nomine, subeth uigilatiuam intelligēs. Ad**
 g p^o. 3^o. tract. **uersus**
 3. cap. 12.

- uerfus quem tamen Auic.⁹ inquit { De subeth alshari: quam quidam Medicorum nominant sa-
 chos: sed non est ipsa: Immo sachos est species congelationis. } Opinor autē corruptam esse
 dictionem hanc à nomine { catochos } & per syncopen { cachos } scriptum esse: mutatoq; deinceps
 litera c. in. f. factum esse { sachos } adaucta deinceps corruptione { saccos } & demū, { suc-
 cos } in Barbarorum libris legi. Razes tamen à Paulo⁹ sumpserat, catochum quoq; ex ueterū
 sententia nuncupante, quod Hippocrates coma uigil pigrum intellexerat. Principis ergo di-
 ctum contra Paulum quoq; ac ueteres, à quibus Paulus sumpsit, dirigi potest. Omnes tamen
 defenduntur. quoniā æquiuocū nomen catochos est. Diuersus nanq; catochos est, quā uulgò cō-
 gelationem dicimus, à catochō, quam Barbari subeth uigilatiuā nūcupant. perinde ac ad nau-
 10 seam usq; præostensum iam est. Definitionum Medicarum Author sub catochi noīe utrāq;
 comatis spēm, somnolētā. f. & infomnē, atq; etiā catalepsiū Catochen'ue intellexisse uidetur.
 Tres enim catochi species ponēs, Primam ait somnulosam esse, lethargo proximam. Nos
 coma somnolentum, Galeni, atq; Hippocratis dogmate, appellauimus. Secundā uerò speciē ait
 uigilantem, cui tetanū, & uulua præfocatonem proximos, affines'ue affectus esse adiunxit.
 Nos hanc catalepsiū, & fœm. gen. catochen, seu catocham uocari prædiximus. Tertiā deniq;
 catochi spēm Author ille posuit, phreniticā. f. ex catochō detentione'ue (intellige secūda spe-
 cie) & phrenitide mistam. Veluti ut subdit Typhonia delirus lethargus, uel lethargicum
 delirium. q. d. ex lethargo et phrenitide compositus affectus est. Prius uerò communiter catos-
 chum definiens, simplicem catalepsiū, congelationem'ue generatim esse supposuit. dicens
 20 sensu priuari animam, corpusq; uniuersum uelut gelu obrigescere. Quæ omnia dicta quomo-
 do et à se inuicem repugnent, & Galeni placitis refragentur, ex ijs, quæ de catochis, & cor-
 mate præscripta iam sunt, dicendāq; adhuc nonnulla supersunt, liquere perfacile potest. Quod
 enim sensu destitutum est, an phreniticum sit, deliret'ue, cognosci (Galeno⁹ docente) nequit.
 Ex eo fortassis Definitionum Authore Aetius⁹ suam fabricauit catocham.

EXPOSITIO LIBELLI DE COMATE.



- 30 **ERV** M Enim uerò quoniam de Comate meminimus. Est autē Co-
 ma genus (ueluti prædictum est) ad coma somnolentum, quod lethar-
 gicis proprium est, unde lethargicū coma dici potest, et ad coma uigil,
 quod phreniticis inesse nonnunq; solet, quāuis illorum proprium nō sit:
 (exq; sitis. n. nō inest, sed mistis.) Rursusq; coma uigil subdistingui-
 tur in pigrum, & non pigrū: perinde ut ex Galeno in libello de cor-
 mate collegimus. Quāq; Aetius⁹ Possidonio potius, q̄ Hippocrati, Galenoq; innixus, ali-
 ter coma, & quidem satis obscure definiuit. pro quolibet profundiore, ac insimul deliro
 somno capiens. Hanc ob causam & hoc loci pro Tyronibus, & ijs, qui singula exquisitiū
 pernoscere optarint, Galeni libellum de comate summa diligentia correctum inferere decre-
 uimus. quem in octo capita, distinctioris doctrinæ, ac facilioris memoriæ causa, dislinximus:
 Cuilibet interim capiti propriam intentionem præponentes, atq; Hippocratis loca, unde Ga-
 lenus suam extraxerit sententiam, in margine apponentes. Quamprimū nanq; perlecto opu-
 sculo, & Authoris intentionem percipere, & memoria tenere, cuius uel medicinæ candida-
 40 to promptissimum erit. Prius uerò q̄ ipsius Galeni uerba referamus: Duo prælibanda sunt:
 Alterū est, scribendi occasio: Alterum uerò totius opusculi summaria intentio. Primum quæ
 dem sic

o p^a. 3ⁱ. r. 3. c.
12. in titulo.

p lib. 3. cap. 6.

Catichos no-
men æuocū.

Cōtra Defini-
Authorem.

q p^o. prorrh.
cometario. 2^o.
com. 56.

r lib. 6. cap. 4.
quā uide supra
fol. 319.

s lib. 6. cap. 6.
Cōtra Aetiu.

Scribendi oca-
tasio.
in principio.

Totius opu-
sculi summa.
cap. primo.
cap. 2.
cap. 3.
cap. 4.
cap. 5.

cap. 6.
cap. 7.
cap. 8.

in prin. prorr-
heticorū.

Quod liber de
camate sit ger-
manus.

ut libro. 4. de
præfagit. ex pul-
sibus. cap. 3. in
com. p. p. prorr-
heticorum. 3.
epid. part. p.
com. 7. in prin.
et libello de lin-
guarum Hippoc.
exponē dictiois.

Idē proponendi
modus est in prin-
cipio libelli de op-
tima corporis co-
stitutione.

dem sic absoluitur. Quoniam Hipp. libro Prorrheticorū primo de comatosi quibusdā loquēs, atq; unā uigilantibus, an phrenitici sint, dubitat. Cōmunis aut uulgarisq; opinio est, comatis nomē de profundiore somno intelligere: phrenitici uerō uigiles sunt, ac delirantes: Eapropter stulta, nec non uana Hippocratis dubitatio apparet, an. s. phrenitici sint, qui comatosi iā esse præpositi sunt. Ultra q̄ impossibile uidetur in simul comatosos. q. d. dormiētes, ac uigiles existere. Omnibus. n. apparet, q̄ si comatosi, sōnolētiq; sint, uigiles iterē, phreniticiq; simul esse nequeūt. et ecōtrā. Illius ergo Hippocratici textus occasione, opusculum id scribere Galenus coactus est.

IN Quo (ut secundū quoq; propositum absoluerimus) proposita circa textum difficultate, uigiliæ coniunctū aliquando esse coma, ex Hippocratis monumentis, ostendit. Ut uanam non esse dubitationem liqueat. sicq; statim difficultatis solutio data sit. Ex altero tamen, aduersoq; latere, aduersum esse uigiliæ coma, uel eodem ex Hippocrate docet. E quo magis augetur ambiguitas: cū superfluous esse Hippocrates uideatur i coma non somnolentum i aliquando proferens. Hanc igitur soluit. Addens statim, quomodo possibile est unā hominem comatosum, ac uigilem esse, quanq; contrarium uigiliæ coma est. Quoniam uerō dū coniunguntur, coma uigil dicitur, hoc autem duplex est. s. pigrum, et non pigrum, Idē utrūq; declarat: cū ita semper ex Hippocratis monumentis comprobans. Quibus expeditis, ad primæ quæstionis solutionem reuertitur, cur. s. Hippocrates dubitat, an phrenitici sint? Improbataq; aliorū respōsione: Propriā deniq; solutionem repetens, eā clariū assignat. per quam omni ruditate immunis Hippocratis quæstio redditur. Ab alterius demū quæstionis determinatione se absoluit, excusatq; Galenus. An. s. de præsentibus, an de futuris phreniticis Hippocrates in præassumpto textu intellexerit. Sunt aut Hippocratis uerba, in quibus orta quæstio est, hæc. ἵδι καμῶν ὁδὸς ἐν ἀρχῇ σι γινόμενοι, μετὰ καφάλας, ὁσφύος, ὑποχονδρίων, τῶν χῆλον ὀδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἀρᾶν φρενιτικὴν εἶναι; quod est Latine Qui comatosi iter initia fiunt, cū capitis, lumbi, hypochondrij, colliq; dolore uigilantes, an phrenitici sunt? Quāuis autem liber Prorrheticorum omnino legitimus nō sit. Præscriptam nihilominus sententiā

Galenus ut Hippocratis germanam admittens, in examen reuocat. Commentariolum uerō hunc de comate Galeni legitimū esse, ultra proprii dogmatis concinnitatē, ex multis etiā eiusdem Galeni locis compertissimum est. Sed Galenum audiamus.

CAPVT PRIMVM.

In quo proposita quæstione quadrimembri, quid nam comatis nomine apud Hippocratem intelligendum sit. Quāq; apud Homerum, aliosq; ueteres significet somnum (ut ex duobus Poetæ locis ostendit) quod erat. quæstionis membrum. Ex Hippocratis tamen quatuor locis, coniunctū esse interdū uigiliæ coma, demonstrat. Adē ut nec somnum, neq; cataphoram, aut aliud quidpiam uigiliæ oppositū esse concludatur. In simul. n. stare nequirent. Quod demū ex nominis etymo ab expositioribus assignato quasi corollarie cōfirmat. Declarans interē tria in quibus comatosi conueniāt cum his, qui comazant, ebrij uel sunt, duōq; alia in quibus ab illis differant. Hippocratis tandem dubium soluens, dubitandiq; rationem ex eis inferens, quæ de comatosi, atq; ebrij præpiterat.



VID Nam significat comatis nomen apud Hippocratem? Vtrum ne in somnem cataphorā? (ut aliqui expositores affirmarūt) An somnum ipsum? An (sicut alij) somnolentiam cataphoran? sic. n. quidam illam nominauerunt, compositaq; appellatione uocabulum exposuerunt. Nonnulli tamen non his uocabulis, sed lethargicam cataphoran ab hoc uiro coma nominari asserunt. Verū ab alijs anti-

quis

quis testimonium maximè fidedignum nullum factum est. Licet. n. hoc uocabulum de alia re illi, præcipuè ferant: Nihil tamen prohibet Hippocratem ipso diuersimodè uti. Cōfessim. n. ^{e lib.}

1. apud Poetam hoc uocabulū somnum significare uidetur, quū ait* & coma mihi grauiter patienti ^{f 14. aliados uer}
2. lumina te xit & alio in loco f & Quoniā ipsum molli comate obtexi & Hippocrates autem ^{ius finem.}
- hac uocabuli significatione (ut apparet) minimè utitur. Etenim unā cum uigilia coma fieri, et ^{g tex. p.}
1. phreniticis assidere autumat. In principio nanq; prorrhethici hæc scripta reliquit & Qui cor ^{h comitatio. 3.}
- matosi inter initia fiunt, cum capitis, lumbi, hypochondrij, colliq; dolore uigilantes, an phreni- ^{tex. 73. ate mem}
- tici sunt? In tertio quoq; epidemiorum ^b (ex quibusdā. n. concessis ipsius legitimis cōmentar- ^{de muliere, quæ}
- rijs testimonia accepimus) hoc modo dicit & Undecima intelligebat, sed erat comatosa: urinæ ^{in Thaso egros}
- multæ, tenues, & nigra, uigilans. & Atq; hæc deinceps ait & Vrinæ huius perpetuò nigra ^{abat.}
- erant, tenuesq; & dilutæ, comaq; consequebatur, cibum non sumebat, inanimosa, uigil & In om- ^{i ibidē circa finē}
- nibus. n. prædictis sermonibus, de uigilia, comateq; (ut uidetur) meminit. Rursusq; in eodem ^{tex. ubi depraua}
4. libro alium infirmum describens, inquit & Huic semper, postq; hominem ego uidi, alius tur- ^{te & uig. uas &}
- bata fuit, urinæ tenues, & nigra, comatosus ipse, & uigil. & Qua de re omnibus clarū extem ^{i. a. sus, pro uo}
- plo fit. nec somnum, neq; cataphoram comatis uocabulum significare. Quocircā expositor ^{ua & legiur}
- res nonnulli (ut arbitror) à comazando, hoc est, inebriando, comatosos nuncupari asserūt. Nā ^{quod nō aduertit}
- & qui comazant, quod est, inebriantur, uigilant quidem, Vigilātq; etiam, & illi (ut inquit) ^{Cruferius.}
- qui comatosi sunt. Verū hi non ita læti degunt, sicut qui comazant, ebrij ue sunt. Quemad- ^{Corolla. p.}
- modum contrā ^z qui comazant non ualde quicq; annuūt, ut ille, qui comatosus est. Quos præ- ^{k ibidē tex. 34.}
- 20 fertim ^b ex oculis licet deprehendere. Humidi. n. ipsis sunt, & rubei, ac minimè firmati, ^{in fine.}
- sed uicissim nūc fursum, nūc deorsum obuoluuntur. Nihilominus uniuersum corpus utrisq; ^{Cōuenien. p.}
- fallax, inconstansq; in motibus est, eodemq; in loco permanere, cōtineriq; minimè potest. Qua ^{Differen. p.}
- de re de uniuerso accidentium cōcursu non immeritò Hippocrates ambigit, an phreniticos si- ^{2.}
- ue quid aliud ipsos nominare expediat. Phreniticos. n. uocare illos ueretur, cū non delirent: Dubitādū rō. ^{Cōuenien. 2.}
- Omnia autem phrenitica symptomata uideat. Capitis. n. lumbi, hypochondrij, colliq; dolores, ^{1 Alia qdē sym}
- atq; alia phreniticorum symptomata ¹ illis utiq; insunt. Quo fit ut hunc uirum neq; errasse, ^{ptomata sunt. ut}
- neq; ignorasse aliquid certum sit. ^{uigilia. stilluioq;}

CAPVT SECVNDVM.

- In quo clarioris, certiorisq; dogmatis gratia, q; primo capite soluta probabiliter difficultas est: quia tamen ^{ibi. & corporis i}
- 30 non ex Hippocratis dictionibus totum, sed dimidiū fieri, plurimū uerò ex commentatorum sententijs col- ^{constantia, seu ti-}
- lectū est: Idcirco boni Interpretis munus obire uolens Galenus (ut. s. nō uera modò, sed Authoris quoq; men- ^{tubatio. quas hic}
- ti conformia referat) ex quatuor ipsius met Hippocratis seriebus, uigiliæ oppositum esse coma, elicit. Vnde ^{prædixit.}
- contrarium eius quod dictum est, inferri uideatur. Quam oppositionis intentionem, comatis. s. ac uigiliæ (uc ^{z comatosi mēs}
- magis elucescat) iuxta loquendi, alijs etiam in rebus, consuetudine n. ex undecim eiusdem Hippocratis locis ^{promptior est ut}
- manifestos. ^{quidpiā libera-}



ERV M Et si hæc haud esse probabilia nullus unq; dicet: Ea tamen mihi nec sufficienter, neq; cum demonstratione prolata esse uidentur. Opus. n. erat ex ipso Hippocrate dictionem exponere. Ut non solum ea ratione probabiliter declarata es-

- se, uerū etiam secundum illius mentem exposita diceremus. Nanq; ut arbitror boni exposi- ^{Boni exposi-}
- toris ^e munus est, considerare non solū an ratione probabiliter, aut uera exposuerit: Sed etiā an ^{toris munus.}
- authoris mētē in quod dixit obtineat. Quod quidē in priori sermone minimè obseruatum est. ^{e uide in prin.}
- 40 Quauis quædam uocabuli pars ex illius Senis sententia declarata sit, per illas dictiones, quib- ^{nostræ præsa-}
- bus uidetur declarare uigiliæ speciem esse coma. Et quispiam fortasse integram rei sententiā ^{tionis supra sōs}

habere

habere iam utiq; arbitratur. Verū si paululum expectauerit, atq; audierit eiusdē libri epidemiarum tertij diſtiones alias: Is profectō inueniet quo pacto non intelligat, non ſolum huiusce rei ſententiam integram, ſed neq; dimidium totius ſe cognoscere deprehendet. Ea igitur conſidera, quæ de infirma quadam muliere uerba dicit^m & Alteram ex abortione ad quintum mens^m ſem, domeſtici cuiusdam uxorem ignis corripuit. quæ inter initia comatoſa erat, et rursus uigil.} Hac. n. uerborum ſerie coma ab ipſa uigilia, ea oppoſitione, quæ eſt inter contraria, diſtinguere uidetur. Rursus autem in peſtilenti ſtatu inquitⁿ & comatoſi ut plurimū, & rursus uigiles erant.} & Paulo poſt^o & Plerosq; uerō ſemper aut graue coma ſequebatur: aut tenues, paruosq; ſomnos dormiebant.} Præterea etiam ſic^p & In thoſo Parium quendam, qui ſupra Dianæ templum decumbebat, febris corripuit acuta, primō continua, & ardens, ipſe ſubundus, & initio comatoſus, & rursus uigil erat.} In omnibus. n. hiſce uigiliam comati opponit. Quōd ſi de more hoc modo Hippocratem expoſueris decies mihi ipſum, quū de rebus contrarijs mentionem facit, hoc pacto ſcribentem comperies. Immo nec aliter urq;. ueluti ex multis pauca aſcribam, ex eodē tamen libro. Ex uno. n. libro cuncta exempla accipere, pulchrius, honeſtiusq; eſſe uidetur. Duas igitur lege mulieres quas ante peſilentem ſtatum deſcribit. De prima. n. ſic ait. ^q & Quinto cuncta exacerbat ſunt, multū delirauit, ſtatimq; ad mentem redijt.} De Secunda autem muliere loquens, ^r ſic aduerbum ſcripſit & nonnihil delirauit, ſtatimq; ad mentem redijt. Contrarium. n. eſt delirium, mentis conſtantia, ſiue intellectioni. Deinceps autem in peſte multos infirmos deſcribit. Atq; omnium primum illum enūmerat, de quo paulo ſuprà mentionē feci, qui uariē, inæqualiterq; & grotauit. Nec non ſæpe numero quamplures accedentes, & recedentes ſpontaneas in contraria mutationes fecit. Hoc autem pacto incipit^s & In Thoſo Parium quendam, qui ſupra Dianæ Templum decumbebat febris corripuit acuta; uerū primarum dierum numerum in præſenti ſermone ſcribere haud opus eſt. De illis ergo duntaxat, quibus egeo, mentionem faciam & Undecima ſudauit, nō toto autem corpore. reſfriguit, Moxq; recaluit.} Etenim reſfriguit, moxq; recaluit, inter ſe contraria eſſe uerū eſt. Poſtea ſubiungit & Duodecima febris acuta, deiectiones bilioſæ, & cætera, quæ ad uigeſimum quartum uſq; diem. & Vigeſima quarta recidiua fuit febris. Trigefima autem quarta ille ſine febre fuit. Aluus non conſtitit, & calor redijt. Quadrageſima ſine febre fuit. aluus paruo tempore conſtitit, à cibo, abhorrebat, rursusq; aliquantulum febricitauit.} Præterea hæc & Nam ſi quando intermitteret, eſſetq; leuior: Mox rursus grauabatur.} Grauari enim, & leuari, contraria ſunt. Deinde hæc ſubiicit & Aluus adſtriſta, rursusq; laxata; Aluus nanq; reſtringi, eaq; rursus laxari, contraria ſunt. Deinceps alia quadam infirma expoſita inquit^t & Die octaua. proximisq; diebus multū delirauit, ſtatimq; ad mentem redijt.} Deinceps etiam dicit & Vigeſima aliquantulum friguit, ſtatimq; calor redijt.} Et iterum & Vigeſima ſeptima ſine febre fuit, aluus ſubſtitit. nō multo poſt dextera coxendix grauiter illi diu doluit, & febres iterum reuerſæ ſunt; Deinde etiam ſic & ſequentibusq; diebus obmutuit, rursusq; ad mentem redijt, & locuta eſt.} Sed quid omnia exempla memorare, multiloquioq; uti opus eſt? Cū præcipue decies mihi decem millia numero ſint eiſmodi apud Hippocratem dicendi formæ, abundeq; conſtet interpretatio. Qua de re quū ſic dicit & Comatoſus eſt, & rursus uigil & Coma ipſi uigiliæ opponere compertiſſimum eſt.

in li. 3^o. epidem.
commentario 2^o.
tex. 8. in prin^o.

n Ibidē comēta-
rio 3^o. tex. 16.
o Ibidē tex. 63.
p Ibidē tex. 77
in prin^o. et uide
rursus poſt me^m.

Hipp. mos de
cōtrariorū enū-
tiatione.

q 3^o. epid. comē-
tario 2^o. tex. 8.
r Ibidem tex. 9.
circa me^m. Eun-
dē uerō ſermone
uide ibidē tex. 3.
quū de Euryana
eſſe loquitur.

s Ibidem comē-
tario. 3^o. tex. 72.

t 3^o. epid. comē-
tario. 3. tex. 73. et
uide tex. 66. ſuē
tres uariis modis
ut.}

CAPVT TERTIVM.

Quoniam uigiliæ contrarium coma esse, prædictū secundo capite fuit. Quod nil aliud esse apparet, q̄ cataphoran quandā ad somnū. propterea dubium proponit. Cur. s. aliquando {coma non somnolentum} profert. Cui dubio statim respondet. Quia. n. consequi ut plurimū & sui rōne somnus consuevit. Idcirco subintelligendū necessario uidetur. Cū simpliciter {coma} seu {comatosus} profert. ut in ultima huius capitis auctoritate manifestatur. Quoniam uero nonnunq̄ licet rariū, insomnes uigiles^{ue} remanent, q̄q̄ ad somnum inclinentur, impellanturq̄. Idē ad determinandum id quod rariū, & præter morbi rationē contingit {nō somnolentum} ab Hippocrate nonnunq̄ addi, proferriq̄ {non somnolentum coma} ostendit: sex quidē ex locis, in alijs etiam similibus dictionibus, comprobans. Duo in omnibus ex tali modo loquendi ab Hippocrate significari dicens, alterū. s. ea, quæ morbi ratione consequi solent, alterū uero insimul, quæ præter morbi rationem aliquando adnēti etiam symptomata inueniuntur.



T Si potes cataphoram delationem^{ue} ad somnum uigiliæ opponere: Nihil aut aliud esse apparet cataphora, nisi quod rursus ex hoc uocabulo coma significatur: Quid ergo erit, Cū dicit hoc modo? {Detinebatur aut aut comate perpetuo non somnolenti, aut uigilantes cū laboribus erāt.} Etenim

tale genus expositionis Hippocrati propriū est, subindicare. s. eo loquendi modo partim qdē ea, quæ consequi consueuerunt, partim uero ea, quæ præter morbi rationem adueniunt. Velut

1. ti qum dicit^r {Ardētes uerō febres paucissimos arripuerunt, & minimē ex ægris ij laborauerunt. Nec sanguis de naribus, nisi paucis, & admodum paucus profluxit, nec delirabant.}
2. Deinde Paulō post ait^r {Nullumq̄ tunc febre ardente uidi mortuum, neq̄ in phrenitim incidisse} per quæ, cū copiosi sanguinis effluxus à naribus abesset, morbū non tangere mētem, neq̄ properē obuenire pericula significabat. Nā si sanguinis copia de naribus profluxisset, mētem morbus utiq̄ tetigisset, acutaq̄ pericula contigissent, quibus resistere non oēs utiq̄ potuissent. Et quod infert, uidelicet {Neq̄ in phrenitim incidisse} cōsimili modo dictū est. Iisdē. n. tēpestantibus, & ysdē causis febres ardentes, & phrenitides exoriuntur. In æstiuo. n. tempore, in regionibusq̄ calidioribus, & in adultorū ætate, & in naturis calidioribus, in uiuendi quoq̄ rationibus, uitæq̄ institutis modo simili, siquidem febres ardentes plurimos inuaserint, quod phrenitica abundarent, dignum erat putare. Quam ob rem non esset illi consentaneum plaudere, si decepisset, dicendo {phrenitides quidē haud oīnō, febres uerō ardentes multæ fuerunt.} In eadē quoq̄ sententia hæc dicta sunt² {Febrium aut ardentium, quæ uigebant, hæc erat constitutio. Initio comatosi erant, fastidiosi, inhorrescebant, febris nō acuta, neq̄ malignoperē erant sitibūdi, neq̄ deliri.} Et paulō post^a {Neq̄ sanguis ritē profluxit, neq̄ alius quispiā cōsuetus fiebat abscessus decretorius.} At illa quomodo dicta sunt? {Tubercula aut secundū alterutrā aurē multis, secundū uerō utrāq̄ plurimis erāt, q̄ slādo in erectū, febre carebāt: nonnullis, aliquātulū accēdebantur, sed oībus extincta sunt, citra alicuius incōmodū, neminiq̄ suppurarūt cuiq̄. Vti solent, quæ alijs ex occasionibus extuberāt} Verē. n. præter morbi^r rōnē erat, ea nihil suppurasse, neq̄ rupta, aperta^{ue} esse. Deinde subinfert {Horū aut modus erat talis, laxa erant, magna effusa, citra inflammationē.} Id. n. morbi rōni cōsonū nō erat, quod oībus absq̄ inflammatione, circa aures abscessus fierent. Quas ob res & hoc in loco^d rursus coma somnolentam cataphoram esse (ut uidetur) his uerbis declarat {Erat autem coma continuum non somnolentum} Hoc enim dicit, ac si coma ipsum somnolentum esset, ac ueluti tale ut plurimū^e feret. Præterea nunc, quæ præter rationem raro fiunt, indicat. Quando autem in eodē tertio epidemiarum libro, de Pythione dicit^f {Nona comatosus erat, cū excitaretur, fastidiosus.} Hoc in loco coma cataphoram quandam esse, manifestē declarare uidetur.

Dubium.

Rñsio.

u 3^o. epid. com
mētario. 3^o. tex.

39.

x p^o. epid. comē
tario. 2^o. tex. 15.

16. cum. 17.

y Ibidē tex. 19.

x 3^o. de morb.

uulg. comētario.

3^o. tex. 34.

a Ibidē tex. 42.

b p^o. lib. eiusdē

commentario p^o.

tex. 10.

c Morbū intelli

ge, ardētē febrē,

cuius rōne hæc

nō sunt, sed tē-

pestatis aquilo-

nie etc. Vide pro

his p^o. 2^o. cō. 17.

et. 3^o. cō. 34.

& cap. sequenti

huius.

c lib. 3. comēta-

rio. 3^o. tex. 39.

e uide adhuc cla-

rius cap. sequenti.

f comētario. 3^o.

DD Quoniam tex. 74.

CAPVT QVARTVM.

Quoniam in somnne coma inueniri prepositum est, id aut cataphoram esse prædixerat: Idem non temerè dubium incidit, quomodo in simul uigilia, cataphoræq; impossibiles sunt? Responsum enim subdit, duplicem uidelicet cataphoram esse dicens. Alteram scilicet quæ in somnum iam peruenit, minimè uigilans, quæq; lethargicis propria est: Alteram uerò quæ in somnū licet impellat, atq; inclinet: nequaq; tamē lucrari somnū potest. Atq; hæc quæ phrenitico: um propria non est, illis tamen assidere, adiungiq; interdū in sole. Quam tunc nonnulli ex lethargo & phrenitide mistam non temerè arbitrati, Typhomaniā uocarunt. Vtrinq; autem cataphoræ spem, apud Hippocratem coma dici ait. Adeo ut minimè repugnet, absurdum uel sit, si quædā comatō somnolentum seu uigil sæpe numero pronūtiari: præsertim quia uigiliæ phrenitidæ cataphora etiā pigra coniungi solet. uti ex Hippocratis etiā auctoritate demū cōprobat. quæ nonnulli, q se Hippocraticos putat impossibile reputarūt.

Cataphoræ
spēs. 2^a.



Somnolenta.

Non somnolens

in seu uigil.

Coma utriq; ca
taphoræ cōmu
ne nomen est.

e 3^o. epid. cōmen
tario. 3^o. tex. 3^o.
f Idem cap. præ
cedenti prope finē

Erūm nullo modo fieri posse dicunt, ut idem simul cataphorā patiat, & uigilet. Hæc. n. admirabiles isti expositores inquirunt, haud cognoscētes duas esse cataphoræ species (ut probatissimi Medicorum scriptum reliquerunt: & effectus ipsi, qui in hac re quotidie apparent, expressè testantur) Quarū altera quidē somnolenta est, altera uerò in somnis. Dicuntur autē ambæ comatæ siue cataphoræ. Nā in utraq; commune est, ut oculos attollere nequeant. Sed cum eorū grauedine sint, & dormire desiderant. Alterius autem peculiare est, ut hi quidem mox, profundèq; & diu dormiant: Illi autem uigiles, & uersuti maneant. Cū ipsis diuersæ, uariæq; imagines rerū semper succedant, quæ illorū mentem moueant, interrumpantq; somnum. Quamobrem insomnes quidem extant ut plurimū. De lecto autem surgere, uigilantiumq; opera exercere nequeunt. Hæc. n. opera non adeo exactè persoluunt, ut facerent, si sine infirmitate uigilarent. Oculi namq; illos rū grauedine quadam correpti sunt: Cataphoræq; uidelicet in somnum inclinatione tenentur, adeo ut sperare possis, si illis hoc ipsum concedas, eos facillimè somnum consequi. Verū non solum non dormiunt. Sed etiam, in quam antea coniecti erant, spe dormiendi priuantur omnino. Quare hoc in loco potes intelligere, quod coma, ueluti commune uocabulum de utraq; cataphora prædicatur. At de illa præcipuè, quam cataphoram absolutè de more uocamus. Nā si somnolentam cataphoram duntaxat intullexeris: decipieris quidem, ea de causa, q eam cataphorā, quæ somnolenta non est, ab hac uocabuli nuncupatione separabis. Quæ quidem non minus, q; altera cataphora scilicet somnolenta, sub appellatione comatæ uocabuli continetur. Siue igitur somnolenta, siue non somnolenta cataphora fuerit: hanc Hippocrates coma uocare cōsueuit. Neq; tamen ea inter se repugnant, quæ in exemplis particularibus protulit. Præterea non sine ratione aliquando in tenuibus, paruisq; uigilijs: aliquando in somno, coma apprehenditur. Cataphora namq; nunc cum somno, nunc absq; somno uenit. Qua de re qui cataphora tenentur, eos insomnes esse solum, uel solum dormire, dicere non possumus. Sed ea ratione differunt, q illos rum plures dormiunt, pauci uerò, qui sic se habeant, insomnes permanēt. Vnde & si utriusq; sit affectus idem: longè tñ in dormientibus peculiarior inuenitur. Hoc igitur est, quod sic ait: Detinebatur autē comate perpetuo nō somnolento: ac si somnolentū coma ut plurimū fieret. Quod si utriusq; est cōmune uocabulū coma, et magis, proprietate quadā, somno conuenit. Is quē quī somnolentā cataphorā uult indicare, maxima cū rōne ægrotū comate teneri absolutè dicit. Quī uerò cataphorā sine sōno significare illi in aīo est, nō absolutè, sed cū epitheto sic ait: Comate in somni tenetur. Nouit. n. utriq; Hippocrates, q. s. coma sōno peculiare est, cū sit sōni naturæ magis simile, & q aliquā nō sōniculosum uenit. Cæterū si hæc ita se habent, minimè mirandū est, si coma nō solum lethargicis, uerū etiam phreniticis accadat. Ignorare autem non

non debemus, q̄ somnolentū coma lethargicis propriū est. Inſomne autem uigil' ue coma, quāq̄
phreniticis propriū nō est, & aliqñ tñ solet illis euenire. Multos. n. phreniticos inuenias, q̄ de le- g. Ibidē i prin.
cto surgere qdē possunt: oculos aut minimē tollere possunt, et lethargicorum more semper in capitis sequētis.
eodē loco permanent. Quā ob rē q̄ plurimi, sed indocti medici quo uocabulo sit opus eos nō a-
re, minimē norūt: et in ea re penitus ambigui sunt. Ipsi q̄ hic affectus sine nomine, & extras
neus esse uidetur. Quāuis illorū quidā ex phrenitide & lethargo affectum commistū esse
arbitrentur: Quēqdē Typhomaniā uocauerunt. Id uerō etiā peius iter cetera habetur, q̄ aliq
se fatentur sectatores Hipp. & illud ipsum asserūt. Cū tñ Hipp. in tertio epidemiarū (quidē
liber inter legitimos Hippocratis et est, & haberi debet) adeo apertē, & manifestē ita scri-
pserit b { Nec phreniticorū mania correptus fuit qui spīa: quod alijs usu uenit: sed alia quapiā
cataphora pigra grauius peribant } Id. n. declarauit, q̄ non modō cataphora interdū phreni-
ticis adueniat, uerū etiam q̄ illis pigra quēdam cataphora saepenumero accidat.

Typhomania.

Asserit illi ipos

sibile esse simul

cataphora pati, et

uigilare, seu phre-

niticos esse.

b comitatio. 3^o.

tex. 45.

CAPVT QVINTVM.

Quoniam non solū de somnolenta cataphora lethargicis propria meminit Hipp. sed etiam de uigili phreni-
ticis nonnūq̄ eueniente, Rurſusq̄ de hac interdū pigra: i dē dō duplicem esse cataphoram repetens, eam, quā
uigil, inſomnisq̄ est, iterū in duas spēs subdistinguit, uidelicet pigram, & non pigram: Ambasq̄ proprijs
inditijs definit. Hipp. interea morē declarās, q̄ nil superflūū, aut ociosum (ut Poet. & faciunt) adiūgit. Quinimō
nō generi tāū, sed spēs quoq̄ morborū, et eorū gradibus, pro clariore dogmate nō a adinuenire consuevit.



Aeterū si uis in hoc sermone intelligere quid sit pigra cataphora, Id opus est, ut
memoria repetas eam diuisionē, quā superius facta est: aliam. s. esse cataphoram
20 somnolentā, aliā uerō nō somnolentam. Quā cū somno uenit, eā esse lethargicos
rū propriā, & illis inesse semper. Quā uerō sine somno est, eam non esse phreniticorū pro-
priā, i neq̄ semper illis adesse. Somnolenta igitur (quantū ad præsens negotiū attinet) lethar- i Idē cap. præce-
gicis ipsis accidit. Quā uerō sine somno uenit, & phreniticis euenire solet, eam distinguere dēti uersus finē.
tentabo. Quō faciliē queas iuenire quid differētiæ sit in eo, quod ab Hippocrate dictū est. Hip Hipp. mos cir-
pocrates. n. non est habendus in numero illorum, qui rebus nomina frustra imponūt. Neq̄. n. ca nōiū us ū.
temerē cataphoran pigram uocauit. Nec usus est epithetis ociosis, aut superfluetibus, ut Ho Oppositū huius
merus, qui humidum, aut pingue oleum, & lac album dixit. Omne. n. lac album, et omne oleū 71 aphor. cō. 29
humidū, & pingue est. At in huius libris nō dictio, nō syllaba, nō deniq̄ litera est, quā nō aliā de alba pituita.
quid maxime aduertendū significatione determinet. Quam ob rem quū de phrenitide loquitur simplici. n. adie-
30 (id. n. quod in proposito utile est, eos docere uolo, qui eius loquendi consuetudinem cognosce- cione. etc. Respo-
re cupiūt) sic aliqñ dicit { Amens est: } Aliquando autē { Delirauit } Aliās etiam sic { inter- sio. non simplici
misso spiritu locutus est. } Atq̄ aliās { Desipuit } Interdū etiam dixit { non fuit apud se } oī nō, ut Poet. q̄
Et interdū { mania correptus fuit } aliqñ { Mania tenebatur } Et aliās { non intelligebat } ob carminis deco-
aliās { rationi dissona loquebatur } Hęc. n. sunt omnia ex his, quā solēt illis euenire, qui la sio- rū, uel cōplemen-
ne quadam mentis oppressi sunt. Quos quidem uniuersos desipientes uocare potes. Hip- tū pleonasmō sē-
pocrati tamen genus duntaxat proferre haud suffecit: Sed unicuiq̄ speciei, in desipientiā pē utatur. sed ad
magnitudine, proprium uocabulum adinuenit. Ut in febribus etiā solet. Ait enim { cales- glē dē dū rei pro-
scens cœnauit homo. } Neq̄ enim ausus est uocare, febrem, tantam caliditatem, in qua cœ- prietatem 4^o. ut
nare quispiam potest. Præterea cū febris magnitudinem uellet ostendere, dicere de mor- aphorif. 28. &
40 re ipsius est { ignis eum corripuit } ueluti quū dixit { Mulierem quandam, quā des- 3^o. de artic. cōm.
cumbat in littore, trimeslri fœtu grauidam ignis corripuit. } Verū de his hactenū. p^o. 13. aliter Leo-
nicens in Antis-
sophista.
k p^o. epid. cōmē-
tario. 3. tex. 30.
uide pro his quā
.2. de crisi. cap.
13. 16.

DD

ij

Id. n.

Id. n. satis est, in quo fuimus occupati in ostendenda, circa uocabula, uiri huius diligentia. Nunc in illorum gratia, quae persuasi sunt, ad propositum reuertamur. Duæ igitur sunt rationis cataphoræ. Vigilis cataphoræ species. Quarum altera dicitur pigra: Cuius nunc Hippocrates mentionem facit. Alteram autem phoræ species uocabulo generis nominat. Commune autem utriusque est, quo etiam à somnolenta maxime differunt, scilicet quia delirent, neque rationi consentanea loquantur, et ad surgendum promptissimi sint. Quorum nihil in lethargicis cataphoris uidere est. Haud enim qui lethargicis affecti sunt, ulla seorsum aliquid, aut sapienter loquuntur, sed difficulter quidem sentiunt, neque acclamati, neque puncti faciliter excitantur. Quod uero coma phreniticis accidit: Id quidem est insomne, et citra sentiendi, mouendique difficultatem. Cum enim qui eo comate laborant, uocem sonum uel audiat, exurgunt faciliter. Quod si quis eos aliqua in corporis parte contingat, mox oculos tollunt, et in tangentem respiciunt. Cum uero cataphora laborat, aut manus, aut crura motant, iactantque, aut toto se corpore repente attolentes, mox reuoluuntur, nullaque habita ratione desipientes, illorum more, quæ conuulsionibus quibusdam cruciantur, se exagitant, et quodammodo debacchari uidentur. Hæc igitur, et alia huiusmodi faciunt: et si quod loqui uolunt, eorum sermo stultus est. Quorum quidem nihil in lethargicis uidemus cataphoris. Immobiles. n. qui eiusmodi cataphoris laborant, et ueluti muti semper decumbunt, ijs qui profundo sopore (quem Græci κέποι uocant) tenentur, ualde similes. At illorum, qui in somni cataphora tenentur, Alij quidem adeo multum facileque mobiles existunt: ut neque aliquam corporis partem uehementer mouendo, neque alta uoce clamando deficiant. Quod si eos concites, aut cum illis loquaris, te toruere intuentur, atque etiam magis ab se alienantur: Inferreque malum tentant, et ad audiendum promptissimi fiunt, nullaque in re sunt ijs, qui summe desipiunt, dissimiles. Alij uero contra, quum surgunt, magis intelligunt, nec multum mouentur. Quod si in illis coma scire permittas, eos magis, atque magis desipere uideas. Hæc igitur ratione hos ab illis, qui lethargica cataphora correpti sunt, agnoscere licet. Hæc itaque est illa cataphora, quæ ab Hippocrate pigra dicitur.

Cataphoræ uigilis non pigra inditia.

Cataphoræ pigra inditia.

CAPVT SEXTVM.

Ad principalis questionis (cuius ratione commentariolus scripsit) solutionem reuertitur. Cur. s. Hippocrates ambiguus in prorrheticis sit, an eos, qui comatosi erant, atque una uigiles. etc. phreniticos esse pronuntiandum sit? Respetta igitur questione, ac dubitandi ratione, aliorum responsione assignat. qui dictionem {ερα} (quam nos interrogatiue traduximus: an? siue utrum?) syllogistice, atque illatiue interpretantur. ut significet idem, quod {ergo} uel {igitur}. Adde ut secundum illorum expositionem, non dubitet Hippocrates ipsum phreniticum fuisse sed determinate potius inferat, sic interpretando {Ergo phrenitici sunt.} Quorum quidem expositionem duabus rationibus improbat. Primo quia non potest sine præassumptis syllogistica illatio fieri. Secundo quia in textu dictio {ερα} præponitur, ut mos est, quum dubitatio est quoties n. illatiua fuerit, in medio potius locum sibi uedicat, sic dicendo: phrenitici ergo sunt. {Suaque interpretatione denique ex quatuor Hippocratis seriebus comprobatur. Quibus possemus nos tertiam rationem adiungere, quoniam differunt, quia quando dubitatio hæc dictio est, accetum circumflexo scribitur in penultima, ut idem Galenus in primo prorrheticorum insinuat, atque etiam Ammonius testatur. sic uidelicet {ερα} Quando autem illatiua dictio est, paroxitonus est, hoc est, accetum acutum in penultima habet, sic uidelicet {ερα}. Sed hanc Galenus hic non ponit: quoniam hoc, an illo modo Hippocrates scripserit, compertum non est, nec demonstrari potest.

a. cō. p. uersus medium.

b. in tract. de feb. mil. ac differentia dictionum.

c. ca. præcedenti.



Noniam autem non solum cataphora affici phreniticos quosdam, sed etiam pigra: de qua maxime quissiam dubitare poterat, aperte didicimus. Ad reliquam dubitationem transeamus. Cuius si aliquam solutionem profectum inuenerimus: iam de comate totum, idemque perfectum negotium habebimus. Hæc autem dubitatio talis est. Hippocrates posuit in principio prorrheticis de his, qui in somni, uigili uel comate tenentur, meminit:

Id

Id ambigit, utrū phreniticos, an quid aliud eos nominare expediat. Eius autem uerborū series talis est: Qui comatosi inter initia fiunt, cū capitis, lumbi, hypochondrij, colliq; dolore uigilantes, ἄρα, quod est, an, phrenitici, sunt? Bifariā autem ea uerborū series describitur. In aliquibus. n. exemplaribus habetur, ut hic notatum est. In aliquibus autem absq; particula illa εἰς οὖν; hoc est {sunt} scripta est. d. an phrenitici? Nunc igitur scrutandū primò restat, cū d. idē uide cap. ultimo.

duæ sint comatis primæ species: quarum altera semper lethargicis, altera phreniticis interdū accidat: Quare nūc Hippocrates ambigit, an illos, qui sic habeant, expediat nominare phreniticos? Id. n. non solū dubitabile non esse apparet. Verū etiam in promptu est, ut eius contrarium inueniamus. Cū. n. duo comata sint, alterū insomne, somnolentum uerò alterū. Cūq; hoc, quod cū somno est, ipsorumq; lethargicorum proprium intelligi nequeat: Dictio. n. ζυγισ- Quæ p^a. cur abigit Hipp. Quæstiois rē. ga. s. dubitare, nō debuit Hip. uideri enuntiandum. Quare igitur dubitat Hippocrates? SYLLOGISTICA Illatuaq; Solutio aliorū.

coniunctio est illa dictio {ἄρα} (inquiunt nonnulli) & non dubitativa. Sed hanc quidem expositionem fortasse probarem, si interpretationem barbaram, omniq; Græcorum consuetudine dissonam non haberet. Cū uerò nec Hippocrates, nec alius Græcorum tali propositio dupliciter. nū cōpositione in scriptis usi cōperiātur: Qualiter ego cōiunctionē {ἄρα} ibi syllogisticā esse cōcedā? Ante. n. q; assumptis propositionibus in ratiocinatione utamur, easq; conclusioni accommodemus, ratiocinari, syllogizare uē non possumus. Vt uerbi gratia (quò his etiā, qui in disserendi ratione minū exercitati sunt, id quod dicitur manifestum fiat.) hæc oratio {ἄρα γ' ὁ μὲν εἰς;} quod est {an dies est?} et {ἄρα σήμερον ἐλεύσεται;} id est {an hodie ueniet?} habet illud {ἄρα} quod est {an} dubitativum. Quòd si oratione enuntiatiua illud explicare uoluerō: Aut simpliciter, & absq; omni demonstratione, sic dicam {ueniet hodie?} Aut cū demonstratione, sic {si sol est super terrā, ἄρα, hoc est, igitur dies est.} Item {si ambulat, ἄρα, quod est, igitur mouetur?} Cū autem sine demonstratione aliquid enuntiamus, ea cōiunctione non indigemus. In ea. n. oratione superflua esset: nec ullus propriè enuntiando sic dixerit {dies est igitur?} neq; sic {igitur dies est?} Cū sic liceat absolūtè dicere {dies est?} Sed neq; sic in demonstratione possibile est uti hac cōiunctione {ἄρα} id est {igitur?} Etenim si omnis demonstratio ex alijs præassumptis propositionibus, aliam assumptam propositionem comprehendit: Nullamq; nunc assumptam propositionem syllogisticam ad demonstrandū accipere uideatur Hippocrates: Id sequitur, quòd ea demonstratio nō est. Quomodo ergo {ἄρα} coniunctio ex dubitativa fiet syllogistica, & illatiua? Adde q; neq; eundē locum obtinet dubitandi coniunctio, & syllogistica, & illatiua uocata. Dicimus. n. dubitativā esse, quā præponitur cū interrogatione, syllogisticā uerò & illatiuā, quā sine interrogatione inter nomen & prædicatū collocatur. Cū. n. dubitamus, hoc modo dicimus {ἄρα ἢ μὲν εἰς;} quod est {an dies est?} Cū uerò rōcinamur, sic {ἢ μὲν εἰς ἄρα εἰς;} hoc est {dies igitur est?} Quoniā ergo cū interrogatione prælocata cōiunctio {ἄρα} est: Nō debemus ipsam accipere, ut syllogisticā, sed ut dubitativā interpretari. Nō. n. sic extat prolātū {φρηνίτικοι ἄρα εἰς οὖν;} quod ē phrenitici igitur sunt? sed sic {ἄρα φρηνίτικοι εἰς οὖν;} hoc est {an phrenitici sunt?} Quocirca Hippocrates apertè dubitauit, neq; expressè affirmare ausus est. Quēadmodū sæpius ferè eum fecisse uidemus. Verū mihi libet unum, aut alterum exemplum adducere. Ne in re adeò manifesta diutius immoremur, In primo igitur epidimiarum sic ait {postea omnes hi dysenterici fa-

c. cōmētario. 2^o.
tex. 71.

f. cōmentario. 3.
tex. 15.
g. lib. p^o. cōmen-
tario p^o. tex. 13.
h. ibidē tex. 14.

Et sunt: An q̄a (Græcè ᾱρα ὀν) dilutas urinas emiserit? aduertendū est. Quod hic ait q̄a ad-
uertendum est nec impudentissimus quidem permittet aliter intelligere: q̄a coniunctionem
ᾱρα dubitatiuam. In sexto quoq; epidemiarum sic post mīdium cōcretio pueris magis,
ᾱρα ὀν βερμὸν ᾱρα; quod est an quia calidiores? In ipso etiā prorrhenco & inquit phre-
niticis alba deiectio mala est, ut Archecrati, An et his pigrities aderit? Et rursus h In pri-
uatione uocis spiritus promptus, ut est in his, qui strangulantur, malum est. An hoc delirium
portendit? Quare si modum, finemq; orationi facere oportet, neq; alius quispiam Græco-
rum unq; coniunctione ᾱρα eo modo usus est, neq; etiam (ut nunc ostendi) ipse Hippocra-
tes: Id sequitur (ut puto) q̄ aliquis eos meritō reprehendere possit, q̄ coniunctionē illā ᾱρα
ut non dubitatiuam exposuerunt.

CAPVT SEPTIMVM.

Quoniam aliorum solutio reprobata iam est, exponentium s. ᾱρα ut illatiuam, quō Hippocratem a calum-
nia uendicarent. Ut qui non dubitet (secundum illorum expositionē) sed assertiue inferat phreniticos esse. Si
autem nos exponimus ᾱρα ut dubitandi coniunctionem, augeri tantō magis contra Hippocratem pro-
posita quæstio uidetur, quoniam de re non dubitabili dubitet. Cum in se minis cataphora non lethargicis, ac phre-
niticis euenire soleat. Nō ergo dubitandum fuerat, an phrenitici sint: sed certē affirmādum. Ideo Galenus hic,
repetita prius quæstionis ratione, ueram pro Hippocrate responsionem subiunxit. Ideo scilicet ambiguum
fuisse: quoniam morbus ille adhuc circa principia erat, in quibus similia symptomata ebrijs euenire solent. mi-
stis uidelicet biliosis cum pituita succis, progressu uero temporis, uel in phrenitidē (acriore bili reddita) uel
in lethargū (ea discussa, dominanteq; interim cruda pituita) conuerti morbus consuevit. Hanc ob causam nō
temere circa morbi principia dubitat Hippocrates, an phrenitici sint? Decenter igitur soluta iam quæstio est.

Quæstionis
repentio.

Vera Galeni
solutio.



T qui scio me difficiliorem orationem fecisse. Nam cum somnolenta, catas-
phora distincta sit a nō somnolenta, quæ phrenitis iam est: quomodo absur-
dū non uidebitur firmē, grauiterq; non enūtiare phreniticos esse hos? Ves-
rūm quia mihi non minor est cura difficultatis uerborum, q̄ ueritatis: Eam
esse coniunctionem dubitatiuam fateor. Causamq; ostendam quare non sit ausus Hippocra-
tes enuntiare eos esse phreniticos, atq; adhuc dubitet. Etenim ea uerba ε̄ν ᾱρα ὀν quod
est inter inina in serie apposita totam orationis habent uirtutē, quod expositores multi, ues-
luti superflua scripta prætermittunt. Consimile. n. quodpiam pluribus incipientibus ægritus
dinibus euenire solet. Quemadmodum fieri in quibusdam ebrijs uidere est. Cum quidem co-
mate laborant, & titubant, & grauedine capitis occupantur: Neq; si cogantur, palpebras tol-
lere possunt. Ob hanc autem rursus grauedinem affecti tædio, seq; ipsos & reuoluentes, &
exagitantē, atq; etiam ex alia in aliam faciem, situmq; mutantē, dormire nequeunt. Hæc. n.
fieri sæpenumerō uidere licet in ebrijs. quando ebrietate caput ipsorum grauatū est, atq; in-
de simul in coma ex grauedine trahitur, simulq; somno prohibetur. Hoc igitur modo cū alis
qua humorum incoctorum copia caput inuasit, uno & eodem tempore comatosi sunt, &
uigilant. Initioq; morbi eiusmodi facti, interdū patiuntur quidem: Veluti si ex uino talis affe-
ctus ipsis accidisset. Verū sic neq; lethargus, neq; phrenitis consecuta est. Interdū uero si in-
cocta humorū multitudo facta sit acris, in phrenitidē terminata est. Multis autem eius portio
subtilior uel concocta, uel per uapores discussa euacuata est, quæq; crassiore materia fuerit,
ea remansit. Atq; eo modo lethargus factus est. Igitur si talis ille morbus inualuerit, is affe-
ctus (quemadmodum nos ostendimus) iam phrenitidi proximus est. Ut uero putant illi qui
ex lethargo, et phrenitide affectū comistū introduxerūt i lethargo magis affinis esse uidetur.

Quoniam

a talis itelligit de
eo, prius q̄ i phre-
nitidē, aut lethar-
gū terminetur.
dū tamē comatosi
si sunt, et uigilāt
Ideo Typhoma-
niam illi nuncus
parat q. d. leuiter
succensam ma-
niam, etc.
i quos uide sus-
pra cap. 4^o. uer-
sus finem.

CAPVT OCTAVVM.

Quoniam duplex litera Hippocratis est, & cū uerboz sunt, & sine illo, propterea quæstione altera propo-
 sita, an s. de præsentibus, an de futuris phreniticis prima quæstio intelligenda sit. Respondet, alibi determinan-
 dum, præcipueq; ob illud uerbum { sunt } si. n. ponitur. tūc quæstio erit { an sunt phrenitici an non? } si uerò
 non ponitur: tunc & sic etiam intelligi potest, & hoc modo { an futuri sunt phrenitici, an nō? } Cum igitur di-
 uersa sit quæstionis forma, diuersus quoq; esset respondendi modus. Eapropter se nescire quomodo respon-
 dendum sit, facietur. Sed hanc, ueluti ad propositum minimè conducentem omittit. Cū hic quæ sit uocabuli co-
 matis significatio duntaxat uestigare proposuerit.

Vtrum autem qui sic affecti sunt, an qui paulò post futuri sunt, eos phreniticos nos 2^a. quæstio cir-
 minare oporteat, impræsentiarum determinandum non est, tum quia hoc alterius ca eundē Hip-
 erit considerationis, quæ quidem ad propositam rationem nihil pertinet. tum ma- pocratis textū
 10^o gis quia nescio quomodo. propter illud uerbum { εἰσι } hoc est { sunt } quod illi particula { an } i prorrhencis,
 phreniticiz aliqui quidem ascribunt, aliqui uerò non apponunt.

Finis Libelli de Comate, qui tamen si ex Græco exemplari, & antiqua uersione, per Montesau-
 rum restitutus, a nobis tamen in plurimis locis redituus penè redditus est.

Ut cuius singula perlibranti liquere possit.

Hæc sunt, quæ de comate, ipsiusq; speciebus, pro decimi, & undecimi propo-
 sitione in catalogo tumoris enucleatione, intantū hoc loci dicta sint. Donec, s. mistos
 esse tumores ex bili, ac pituita pernouerimus, q̄q; in decimo, bilis, in undecimo uerò
 20^o pituita dominatur. Ad calidos tamen ambo tumores reducuntur. Cum his autem et de cas-
 talepsi, duodecimo inq; tumore, tetigimus. Etenim & hunc in eorum albo collocasse nō dede-
 cet. Cum eadem ratione, qua præscripti, generationem recipiat, & si posteriore magis par-
 tem occupet. Verum enim uerò inter melancholicos hic tumores computandus, ad frigidos sta-
 tim reducendus uenit. **A**T Priorem prædictis affectum consideremus, quem Græci { κε-
 ρα } uocāt, nosq; ordine tertiumdecimum antea proposuimus. Dicitur autem { κερα } a nomine
 { κερα } seu { κερα } quod significat caput, unde { κερα } fit. i. capitis grauitas. quoniam s.
 caput huiusmodi symptoma mirū in modū mole stare, grauareq; solet. è quo noīe { κερα }
 uerbum, quod est, perturbari, capiteq; grauari, & { κερα } ea dicta sunt, quæ in profun-
 dam, et malam huiusmodi quietem hominem trahunt. Quamq; uerò ebrietatem, uertiginemq;
 nec non & quamlibet capitis grauitatem, siue molestiam (uti Cælius quoq; annotat^k) signi-
 30^o ficare potest: Nihilominus tamen apud Medicos, uti nos impræsentiarum capimus, affectum
 quendam soporiferum præfert, apoplecticis proximum. Etenim nisi dūm acriter punguntur,
 sentirent, apoplectici esse dubio procul omni iudicarentur, q̄q; nec si puncti sentiūt, aliquo pa-
 cto respondent. uel alijs præter tactum sensibus uti possunt, ueluti nec motibus, nisi quū for-
 tissimè punguntur. Est igitur propriè caros, inquit Galenus^l (Leoniceus uertit Latine stu-
 40^o por) totius corporis insensibilitas, atq; immobilitas repentina. Contingit^l tamen (ut alibi di-
 xit^m) sentire. quod intelligendum (ueluti prædictū iam est) quoties punguntur. Quod si neq;
 tunc sentiunt, apoplecticos esse determinat, utrosq; Hippocrates aliquandòⁿ mutos nuncupat,
 ab uno symptomate, quod est, uocis priuatione nomen imponens. Differūt uerò ab apoplecti-
 2^a. cis etiā, uti ex eodē Galeno^o didicimus, quoniam in apoplexia stertor² esse solet, ac respiratio
 40^o necessariò læditur.³ Idq; quadrisariam.^p Vel. n. omninò auferri, apparet. Vel si remanet, ma-
 3^a. gna cū ui cōpletur. Vel tertio intermittens, atq; inæqualis remanet: quæ tres fortis apoplexiæ
 species

Tumor. 13^o. et

14^o.

Caros, et Apo-
 plexia.

k lib. 11. lectio-
 nū antiquarum.
 cap. 11.

l quinti Aphorif-
 morū, com. 3^o.

Differētia i-
 ter apoplexiā

et carū. quīq;
 m 6^a. Aphor. cō.

51^o. circa prinā.

n utin prædictis
 Aphor. In. 5^a. n.

50^o. intelligit cas-
 romenos. i. caro

affectos. i. 6^a. ue-
 rō. 51. apoplecticos

o 4^a. de locis af-
 fectis 2^o. et præ-

allegatis Aphor.

p ex. 2^a. Aphor.
 cō. 42. & uide.

3^a. de locis affe-
 ctis. 10.

species sunt, uel demū, si non omnino, aliqualem tamen ordinem seruare uidetur. Atq; hæc le-
uis apoplexia ab Hippocrate nūcupatur. Carus autē profundissimē dormietis instar, anhe-
litū apparenter impeditū nō habet, neq; stertor ipsi adest, nisi ex cōsuetudine stertens hō sit.
Præter has uerò tres penēs symptomata differētias, ex sensu, uidelicet, stertore, ac respiratio-
ne sumptas, adhuc duas eodem ex Galeno penēs se dem affectam collegimus. Etenim quanuis
uterq; affectus in cerebro fiat: Carus tamen anteriora magis, ⁴ præcipueq; primos uentricu- ⁴
los, consensuq; deinde medium: Apoplexia uerò totum cerebrum afficit. Item ⁵ Carus uētres ⁵
magis, cerebri corpus minus: Apoplexia autem corpus magis affici significat. Est autem am-
borum affectuū causa frigidus, & crassus, aut omnino uiscidus humor (idem Galenus ait)
quand; et alijs cōsentire affectibus Carum dixerit, præcipueq; musculis temporum mirū im-
modū læsis, aut ubi quæpiam caluariæ fractæ, depressæq; portio mediū uentriculum cōterat.
Verū de his, atq; alijs multis, aliās uberior sermo habendus est. Nunc igitur sat superq; sit
scire, q; maxima ex parte impactos cerebro humores Carus sequitur, rarissimēq; aliter adue-
nire solet, paucissimiq; uisi sunt, qui superslites euaserint. Si. n. ex impactis cerebro humoris-
bus, crassis quidem (ueluti prædictū est) ac frigidis, uiscidisq; sit morbus, ad mortem sæpis-
simē hominem perducet. Quod si uehementior aliquādo febris, q; in lethargo sit, Carū præ-
cedat (quemadmodū Paulus ait) Debilis tamen febris inest, Actij, ¹ & Possidonij dogma-
te. Quū ex prænarratis humoribus, & nō cōsensu Carus sit, quinimmo ex crapula, uiniq;
potione absq; febre nonnunq; fieri Hippocrates ait. ^a quem postea febris superueniens sanat
At lethargo peiorem esse Alexander insinuat, dū in caron lethargum aliquando ægros pers- ²⁰
ducere protulit. ^a Quemadmodū et ipsum Carum in apoplexiam, ut fortio-rem morbum ues-
here consueuisse compertum iam est. Arabes subeth nomine tam coma, q; Carum, atq; omnē
deniq; cataphoram comprehendunt. Ut ijsdē locis, quibus de comate scripsisse prænotauimus,
de caro etiam intellexerint. Latinorum recentiorum plurimi, præsertim, qui Græcos nobis au-
thores interpretantur {soporem} Latine conuertunt. Sed minis (ut mihi uidetur) appositē.
Quoniam sopor naturalem, atq; optatum, uel Cicero ^x somnum significauit. Vnde Quintus
Serenus ^y ait. {optato pergit uiduare sopore} quand; de lethargo loquens postea soporem als-
tum uocauit. ^z Quemadmodū & grauem somnum quoq; appellat. Commune igitur nomen
{sopor} est, ueluti & {somnus} quæ uocabula pro epitheti conditione, bonum, uel malū sis-
gnificabunt. Quod si unus aut alter Latinorum pro malo sopore sumpserit. Alij tamen pro ³⁰
Græcorum caro, nonnulli pro illorum comate usurparunt. ut sæpē in epidemijs liquet. Quo-
niam ergo reliqui (uti dictum est) ut commune uocabulum intelligunt. Eapropter securitas
tis, & euitandæ æquiocationis gratia, nos Græco nomine caron, siue carū semper nuncupas-
bimus. Ita etiam & apoplexiam, tametsi Celsus ^a attonitum uocat, quinimmo exquisitiū pers-
pendentibus non attonitum morbū nūcupat, prout multi usurparunt, sed attonitos homines, qui
tali morbo deprehensi sunt. Fiunt uerò (eodem enarrante) ictu quoq; fulminis interdum attos-
niti. Quam ob rem peculiare morbi nomen illud non est. Neq; aliud. s. paralyfin, quum ait ^b
{Nunc utriq; paralyfin appellari uideo.} Adeo ut commune uocabulum et hoc apoplexiæ,
ac neruorum secundū partem factæ resolutioni sit. ultra q; hoc Græcum nomē est. Compers-
tum uerò est & Siderationis etiā nomen, quo plurimi interpretes utuntur, huic morbo ut pros ⁴⁰
priū dedicari non posse. Cū sideratio quoq; nomen commune sit. Inquit. n. Plinius ^c {Sides-
ratio

q 4. de locis af-
fectis. 20.

lib. 3. ca. 50.

lib. 6. cap. 5.

lib. 3. ca. 50.

lib. 6. cap. 5.

5. Aphorif.

Aphorif. 50.

lib. p. ca. 14.

Subeth.

Nota contra
plurimos inter-
pretes Græ-
corum.

Sopor.

x p. de diuina-
tione. & in Sal-
lustium.

y cap. 55.

z cap. 56.

Apoplexia.

a lib. 3. ca. 26.

Attonitus mor-
bus.

Attoniti.

Paralyfis.

b lib. 2. ca. 27.
in principio.

Sideratio.

c lib. 17. cap. 24

- ratio tota è cœlo constat. Quapropter & grando in ijs causis intelligi debet, & carbuncu-
latio. etc.: Commune igitur uitium est è sidere adueniens, non in humanis, aut animalium
duntaxat corporibus: uerum etiam plantis. Adeo ut plurimi quoq; {σφακελον}. Alij autem
{βλητὸν} Latine {Siderationē}, & {Sideratos} interpretentur. Nec leuis, aut contemnenda
pauperculis, miserrisq; uel grammaticen Latinam, nedū Græcā ignorantibus studentibus
accedit. Serapion, ^d Razes, ^e Auicēna, f Hali Abbas, & Atq; ipse etiam Abenzoar^b, Græcorum
seruato nomine, apoplexiam uocant. q; q; Serapion subdit Arabicum nomen dicens & ^g
est alsecati { Alexander, ⁱ & Paulus ^k eodē in simul capite de apoplexia, & paresi, seu pa-
ralysi, siue quæ apoplexiam aliquandō sequitur, propriè uocata (iuxta Galeni etiā decreta)
paraplegia, determinariūt. Actius uerò seorsum de apoplexia prius^m (quam Cornarius Si-
derationē uertit) ex Galeni monumentis, deincepsq; ex Archigene locutus est. Post deinde
autemⁿ de paralysi resolutionē ue, ex Archigene tantū determinauit. Sed omnia figillatim,
atq; uberiùs proprijs capitibus disputabimus. Nunc uerò propositum quod intendimus, ex-
quamur. Dicitur ergo à Græcis {ἀποπληξία} à uerbo {ἀποπληττω} quod est Latine
{percutio} quoniā, s. ueluti percussus, et fulmine iccū extēplo decidit, et attonitus iacet. q hoc mor-
bo deprehēsi iā sunt. Vñ et {ἀποπληκτοι} dñr, hoc est, attoniti, stupidi, insensati, solidi. etc.
Quoniā uerò ex frigidis, crassisq; nō pituitosis modò, ac per hoc uiscidis, sed aliqñ etiā (ut cū
Hippocrate Galenus ait)^o melācholicis fit. Idcirco ad frigidos tumores referendus hic uenit.
Vñ inter acutos morbos, q sine febre sunt, à Galeno^p cōnumeratur. imò eius remediū, salusq;
superueniēs febris est. ^r Nisi ex phlegmonode aliquo affectu gignatur, uti nonnunq; (licet rari-
ssimè) fieri posse Galenus affirmat. ^s Idem quoq; de caro dicēdum, Cū (ut uidetur) in eo,
quod magis, minus ue est, ab apoplexia differat. Quāq; ille ob adueniētem humori putredinē,
unde frequentior febris est, lethargicorum instar mox ad calidum uergit, qui ab initio frigi-
dior exortus est. Verū de his haftenū. TVMOR autē ordine quintusdecimus Arabicè
uocatus {Rbia alsabian} suprà, in sermone de phrenitide, octauo inq; tumore, declaratus iā est.
ut ipsum repetere superpondium sit. Illuc ergo recurre. Vbi etiam & Sextumdecimū Ara-
bibus {sibarez} dictū inuenies. Itemq; Septimūdecimū, quem ex Auicēna {fatera} nominaui-
mus. atq; demū Duodeuigesimum {sekakilos} dictū, ibidem à nobis obiter declaratos of-
fendes. Quamobrem ad Recētorum nomina pertranseamus. TVMOR Igitur vnde
uigesimus ordine sequitur, quem nō ex Græcis, aut politis illis Romanis declarare possumus,
sicut nec alios quoq; quatuor insequentes. Verū ex Barbarolatinis potius chirurgicis descri-
bere conabimur. Qui tamen ab inuicem circa huiusmodi nomina interdū dissentiūt: Testu-
do igitur abscessus est magnus, humoralis, mollis, uel non ualdē durus, latiore forma in modū
testudinis (uti Lanfrancus, ^t et Guido ^u aiūt) à cuius similitudine nomē accepit (Quāq; Rolā-
dus ^x qñq; i modū oui, qñq; aut in modū castaneæ nasci uoluit.) Sic. n. circa principia fieri pōt
progressu uerò temporis satis magnū fieri tumore Recētores aiunt. ^y in quo tamen pinguis
materia tunica quadā obiecta continetur (quā cistim uocant) quæ caluariæ ita inhæret, ut ip-
sam plerūq; uitiet. Rarò. n. i alijs partibus, præter q; sub capitis cute, oriri Brunus^z testis est.
Qui uarias in uarijs partibus habere formas, alibi^a subiungit. Si uidelicet interdū in alijs à ca-
pite locis oriatur. Hanc non est dubium (Præceptor nosler ait^b) de numero esse abscessuū,
subq; meliceride, uel atheromate contineri uidentur. tamen ad meliceridem magis inclinare. Cū
pulte gaultius. cap. 13.

d p^o Breuiarij.

cap. 24.

e 9. ad Manso

re. 4. et lib. Diu.

c. 12. et p^o. Cōt.cap. p^o littera. D.f p^a. 3. et 5. ca.

12. 13. 14.

g 9 Theor. ca.

6. et 5. Tract.

cap. 22.

Alsecati.

h p^o. Theysir.

tr 9 cap. 11.

i lib. p^o. cap. 16.

k lib. 3. cap. 18.

l 4. de rōne uic.

acut. com. 23.

Apoplexia uñ

dicitur.

m lib. 6. ca. 27.

n Ibidē cap. 28.

o 6^a. Apborif.

56. 57.

p 2^a. Apbor. 19.et. 5^a. eiusdem.30. et 31. p^o.r ut 6^a. Apbor.5^a.s 2^a. Apborif.

com. 42.

Tumor. 15^o.

Alfabian.

Tumor. 16. 17

& 18.

Tumor. 19^o.

Testudo.

t tr. 3. doc. 2^e.3^o. in chir. mag.u Trac. p^o. doc.p^e. 4^o. et 2^e. p^o.x lib. p^o. ca. 16.

y ut Manardus

Epist. 7^a. p^a. &

Tagaul. de tum.

præ. nat. ca. 13.

z lib. 2. cap. 7.

rubrica 4^a.

a lib. 2. cap. 3. in

principio.

b Manar. epist.

7^a. 2^a. cuius uer

ba exscripsit Ta

pulte gaultius. cap. 13.

pulte liquidior sub eo contineri humor inueniatur. qui os etiam contaminare, & in cariē perducere uideatur. Hunc tumorē nos scēpiculē in ijs, qui Gallica lue infecti sunt, conspeximus. quo dissecto, erosum quoq; craneū inuenimus. Quā ob causam & eundem quoq; Talpā Lanfrancus^c & Topinariā uocari ait, quoniam. s. sicut talpa sub terra deambulat, ita hic sub cute craneum quoq; depascitur. Ex tenui, mucosoq; hoc est, glutinoso phlegmate fieri Lanfrancus ait Theodoricus autem.^d Rolandusq;^e melancholicum succum eius generationi adiungūt. Haud uerō aquosum tenuis nomine intelligas, uti id est, ex quo oedema fit. sed tenue quidem ait, quod à crasso, duroq; & assicato differt. à quo abscessus alij gignuntur: in quibus lapidi, aut arenæ, uel cuiuspiam huiusmodi duræ naturæ simile continetur. quos omnes Chirurgorum grex nodos ex Auicēna uocare consueuit. Verosimile autem est, & nitrosæ quidpiā pituitæ, atq; etiam aliquandō atræ bilis admisceri. quorum uel & os quoq; ipsum uitare, corrumpereq; potest. Et ego (inquit Guido. f) sicuti Lanfrancus, uidi hominē, qui habebat talpam (pro testudine nostrā accipit, ut postea uidebimus) ulceratam supra proram capitis, cum corruptione ossis, adeo, q. ita perpendebatur panniculorum motus, ac si locus esset discooperatus. Frigidus quidem tumor est, calefieri tamen interdū solet, in crescente putredine.

Tumor. 20^o. EST et alius, quē ordine uigesimū posuimus, Talpāq; nūcupauimus. Hūc maior Chirurgorū pars pro eodem cum testudine sumit. Sic. n. Brunus, & Theodoricus, ^h & Rolandus ⁱ intellexisse uidentur, uidelicet sub testudinis nomine talpam. Cum de testudine mentionem facientes, nil de talpa dixerint. Argellata^k uerō clariū ambas confudisse apparet: de testudine, siue talpa, tanq; de eodem affectu loquens. Nec aliquam expressit differentiam Lanfrancus, ^l qui Topinariā quoq; pro eodē intellexisse apparet. Verū Guido Cauliacus ^m nomen testudinis ueluti genus commune talpæ, siue talpariæ, boccio, & herniæ posuit. Si. n. in capite nascatur, Talpariam, in collo bocium, in testiculis herniam uocandam præcipit. quam rursus cum sanie interdū, & squamis, aut fistulis, hoc est cuniculosis quibusdam anfractibus reperiri adiūxit. Manardus ⁿ uerō (cuius uerba Tagaultius ^o imitatur) diuersam esse speciem à testudine talpam, ex Recentiorū sententia reputauit. Id quod dubio procul omni uerū nō est. Etenim uel cum Guidone, Testudinem Talpæ genus esse, uel cum alijs, pro eodem ambo uocabula sumi, & Talpam, seu Talpariam non aliud, q. Testudinem significare proferendū est. Solū legimus Vigonē, ^p qui expressē Talpam à Testudine distinguit. Nos igitur etsi distinctam à Testudine Talpam posuerimus, Haud tamen eadem culpa redarguimur. quoniam non ex aliorū sententia locuti sumus. quorum interpretes fidus esse cupiens, iuxta eorum mētem loqui debet, q. q. falsum exposuerint. ^a Manardo nihilominus, Vigoniq; ac Tagaultio i eo subscribemus: ut si crassior materia fuerit, pulsiq; potius, q. mellis substantiæ assimilis (nuper determinata, & usurpata uocabuli significatione, distinctioris dogmatis gratia) Talpam, & non testudinem appellemus. Quam deinceps ad atheromata, quemadmodū, & testudinem ad meliceridē referamus. frigidūq; itereā tumorē intellexerimus. De utrisq; Celsus i capitis affectibus loquitur. ^b Nos autē suprā de atheromate, Imelicerideq; ^c ac steatomate ^d fusius determinauimus.

Tumor. 21^o. PRÆTER hos autem alius restat tumor, quem Topinariam nuncupant, nosq; ordine primum supra uigesimum collocauimus. Quauis n. (uti dictum est) Lanfrancus cum Talpa, & Testudine confudisse: uideatur diuersus tamen affectus est, & pueris (uti Gulielmus, Placentinus^e & Argellata^f scripserunt) familiarior. s. sitq; (ut aiunt) ex phlegmate dulci, quod

e tr. 3. doc. 2. ca.
4 in prin^o.

d lib. 3. ca. 24.
in prin^o. et uide
cap. 26. 27.

e lib. 2. cap. 3.
in principio.

f tr. 2. doc. 2^a.
cap. p^o.

Tumor. 20^o.
Talpa.

g lib. 2^o. cap. 7.
rubr. 4.

h tr. 3. cap. 24.
26. 27.

i lib. p^o. ca. 16.
et. 21. 30.

k tr. 2^o. cap. 2.
libri. 21.

l tr. 3. doc. 2. c. 3.
m tr. 2. doc. p^a.

n tr. 4^o. circa me^m

Contra Ma
nardum &

Tagaultiū.

o Epist. 71. 2^a.
de tum. ca. 12.

p li. 2. tr. 3. c. p^o.

a uide sup. fol.
13. in prin^o. &

323. uersus finē.
p lib. 7. cap. 6.

q fol. 183.
r fol. 84.

s ibidem. et uide
supra de ganglio
fol. 305. lin. 34.

Tumor. 21^o.
Topinaria.

t lib. p^o. chirur
giæ cap. 5^o.

u li. 2. tr. 2. c. 3.

- „ quod declarat uiscositas saniei, & albedo eius. Et aliquando fit ex phlegmate mislo cū san-
 „ guine: quod declarat eius color, qui est rubeus, et citò ad maturitatem deuenit. Et aliqñ fit ex
 „ melancholia, uel cholera, sed tamen rarò. Ideo rarò uidetur citrinitas, aut nigredo in eius san-
 „ nie. Hunc uerò tumorem nos ad hydrocephalon intrepidè reducendum censemus. de quo
 „ prius iam locuti etiam fuimus. ^x
- PRAETER hunc uerò alius quoq; tumor succedit, pueris, quinimò lactentibus infantulis
 frequentissimus. Quem aliqui lactumen, Alij lactucium, Alij latimum uocant. Nos in ca-
 talogo uigesimum secundum statuimus. Huiusmodi autem nomina à lacte Recentiores impo-
 fuerunt. Quoniam, lactis impuritatem sequi putabant. Qua de re Argellata inquit ⁹ latimū
 10 generatur in pueris, maxime ex acuitate lactis, unde caput efficitur crustosum ^z uberiusq;
 „ Gulielmus Placentinus ^z ait ^z Hæc ægritudo non nascitur nisi in pueris, cum lactantur, &
 „ uocatur crusta, Et fit eis in fronte, & capite. Et multoties diffunditur ad alia membra. Na-
 „ scitur hæc ægritudo in pueris, propter acuitatem lactis inducentis falsedinem in nutrimento
 „ pueri, uel in materia, quæ debet in nutrimentū cōuerti, quæ materia humida est, et uiscosa. Et
 „ signum q̄ acuitas lactis cum tali materia est causa huius ægritudinis (q. d. nitrositas glutinosi-
 „ tati adiuncta, ueluti de achoribus, & fauis prædictum iam alibi ^a fuit) est asperitas reperta
 „ in crusta, cum tenacitate crustæ. Nam asperitas crustæ significat super adustionem, sed te-
 „ nacitas, & adhærentia super uiscositatem. Hæc inquit Manardus ^b non est dubium ad
 „ achoras, & uel ceria, uel psyracia, uel exanthemata antiquorum pertinere. Cur autem sic
 20 disiunctim loquatur, rationem adiungit, dicens ^z Licet. n. eodem semper nomine lactuminis à
 „ mulieribus appellentur: uariant tamen multum, iuxta materiæ, à qua gignuntur, uarietate
 Nos autem etsi quodammodo ad prædictos referri posse morbos, materiæ. s. nitrosæ, atq; in-
 simul glutinosæ ratione admittimus: Differre tamen ab illis, forma, & curandi etiam metho-
 do hunc affectum arbitramur. Maxima. n. curationis indicatio hic est, post conueniens nutricis
 regimen, crustas humectare, quò decidant, & huiusmodi cutaneam expurgationem adiuuare
 potius, q̄ exiccationibus ad sanitatem perducere. Infantibusq; (uti dictū iam est) lactentibus pro-
 prius affectus est. Illi autem morbi adultioribus aduenire solent. Ad capitis ergo scabiē re-
 ferre quispiam possit, quod Abenzoar^e sagram uocat, de quo nos etiam suprā, ^d in sermone de
 Cerio, meminimus. Verum exquisitiū perpendentibus euestigiū compertissimum fiet, neq;
 30 scabiem esse hunc affectum, quod lactumen uocamus, nullum n. in infantum capite ulcus fit,
 sed glutinosus quidam humor per poros sudoris instar emanat. q̄ statim qdē, q̄ à porulis illis
 foras egreditur, à continente densatur, gelaturq; ut crustæ formā recipiat. Qua tamē deciden-
 te mollientis, atq; humectantis alicuius medicaminis ui, nullus ibi morbus apparet, neq; tumor
 aliquis affatu dignus. Ex quo mulieres crustam decidere, capitis morbum sanari dicūt. Quæ
 quidem Neapoli populari uocabulo ^z Ruuā ^z appellāt. Videtur igitur nō aliud, q̄ expurgatio
 quædam esse à Natura quidem facta, sed præternaturalem intereā causam, uidelicet uitiosos
 succos, exterioremq; alteram, & quidem priorē. s. lactis, ac nutrimenti uitium præseferens. In
 synonymis continentis Rasis legimus ^z Anacarsius ^z & anatatare ^z i. pustulæ quæ sunt in Anacarsius.
 capite. Alios tñ potius, q̄ hūc affectū intelligimus. Vbi. s. pustulæ sunt. Sed alia percurramus. Anatatare.
 40 CORNU Igitur consequens est, tumor qdem ordine uigesimustertius antea propositus. Tumor. 23.
 Ex uerrucarū genere est, atrabilario ex succo generationis originem sumens. nōnunq; uerò Cornu.

x fol. 308. in de-
 claratiōe tumoris
 sexti huius noui
 catalogi.

Tumor. 22.

Lactumen.

Lactucium.

Latimum.

7 libro. 5. tr. 3.

cap. 4.

z lib. p. chirur.

cap. 2.

a sup. fol. 167.

168.

b Epist. 7. 2.

Cōtra Manar-
 dum.

c p. Theysir. tr.

p. cap. p.

d fol. 175. linea.

39. 40.

Ruuu.

Anacarsius.

Anatatare.

Tumor. 23.

ab

ab assiccata pituita, magis aut ab utroque humore commisso. Quamquam iuncturis omnibus, quæ in extremis partibus sunt, communis ab Auicenna describitur, sic dicente: Cornua sunt additiones spissæ, recurvæ, nascentes super iuncturas, in extremitatibus, propter uehementiam operationis. quod ob motus uehementiam, cuius ratione calefiunt iuncturæ, indeque attrahunt, attrahuntque humorem crassum, (siquidem hic in corpore abundabat) tenuioribus partibus discussis, ad lapidem conuertunt. Sunt autem instar cornu, à quorum similitudine nomen ipsis impositum est, in summo acutiores tumores, circa basim uero crassiores: tum quia crassissimæ partes in radice, ac basi resident, tenuiores uero, siue minus crassæ ad superiora magis eleuantur. tum secundo quoniam ab eisdem humoribus magis, ac magis continuo nutritur. Indeque augetur basis, summa uero extremitas, deficiente eousque humoris penetratione, gracilescit, magisque tamen interea durefcit, ac ferè in lapidem conuertitur. ob siccitatem quoque quasi conuulsionem quandam passa recuruatur. Quauis inquam Princeps iuncturis proprium hunc tumorem præscripserit: Plurimi tamè ex Recentioribus (quorum nomina impræsentiarum enarranda proposuimus) inter capitis affectus unam cum testudine, siue talpa adnumerarunt. Quo in loco nomen id mereri decentius est, cum ibi cornua nascantur. Sed ne impossibile quidem est usque adeò nonnunquam huiusmodi cornua indurari, atque in ossium naturam conuerti, ut ossi os adnasci, uel ex ipso etiam osse emergere uideatur. Quocirca Lanfrancus ait: Vidi quoque cranei manifestas eminentias, sicut cornua. Nam uidi hominem, qui uenit ad me pro consilio, qui habebat in capite septem eminentias, unam alia maiorem, et in diuersis locis. Quarum aliqua erat ita magna et acuta sicut cornu capreoli, uel longitudinis, pollicis, et multum lædebat cutem. Et miratus fui quomodo cutis non fuerat ulcerata. Quum ergo uidi quod habebat à craneo suam originem, et radicem non me uolui de cura intrmittere. Sed ægro consului, ne se poneret in manu alicuius, propter curam, quoniam mihi impossibilis uidebatur. Hæc Lanfrancus. Nos autem Panhormi unam cum solertissimo chirurgo Iacobo à Sory, nostro à pueris ferè familiarissimo, nobilè quandam puellam uirginem, quæ plurimis recuruas, simulque in summo exacutis, cornu uisulorum instar, effigies representatibus, et omnibus ferè artubus, præcipueque manuum, cubiti, et genuum correptam conspeximus, atque etiam in capite, et fronte. Verumtamen non sub cuti, sed super ipsa oborti erant tumores illi, et quidem nouo quodam generationis ordine. Etenim uelut lapidis generatio contingit in uestica, ut scilicet alia paulatim, atque alia super alia uelut tunica adueniente, in magnitudinem increseat: Ita et in illis aspeximus plurimas uelut 30 osseas crustas, sibi inuicem inhaerentes, non secus etiam, ac si auellanarum cortices dimidios, alterum alteri superimponas, minorem tamè maiori, ut in acutam, Pyramidisque effigiem coniungatur. Tacti autè summoperè circa basim dolebant, et intantum firmissimè, ac summa duritie inhaerebāt: ut nemine medicorum aliquo remediorum genere succurrere ualente, ad nos tandè, post multos iam sui morbi, atque ortus horum annos, consanguinei uenerint. Continuo enim et magnitudine, et alijs nouis enascentibus numero etiam augebantur. Quam Dei Opt. Max. gratia paucissimis diebus ad sanitatem reduximus, pristinamque pulchritudinem. Cum tamen turpissima euaserit, demoniū potius, quàm hominē præseferens, usque adeò ut parentes libentius mortem, quàm uitam illi optarint. Sed curandi rationem locis deinde proprijs recensebimus. Nunc uero quod propositum est, ab soluamus. Melancholicus proculdubio tumor, terrestrisque est, etiam si à lenta pituita 40 in principium duxisse nonnunquam potuerit. Qua de re ad frigidos dubio procul referendus est.

Verum

e 7^a. 4^a. tr. 3^o.
cap. 14. & uide
prius in titulo de
pituita. 12. eiusdem.

De cornu
tuberculo obferuntur
et sunt cornua
in capite dicitur quodammodo

f uide Theodo-
ricū. 3^o. 27^o. &
Lanfrancū. tr. 2.
doct. 2^a. cap. 3.

g tr. 3. doct. 2^a.
cap. 3.

Historia.

VERVM Enimuerò his expeditis ad alios cutaneos potius tumores accedamus. Iuxta seriè Tumor. 24^o.
 igitur catalogi ordine quartus supra uigesimum succedit, ἀλωπεκία. Cum qua in simul & 25^o.
 „ de ophiassi, consequentiæ necessitate determinabimus. { Vñ. n. ambæ, secundū morbosam afz Alapecia &
 „ fectionē, malū sunt (ait Galenus^b) Nomina autem iuxta figuram habentes diuersa. Serpens Ophiassis.
 „ ti. n. (qui Græcè ὄφις dicitur) similis læsa capitis pars in ophiassi apparet. Alopecias autem b p^o. de comp.
 „ ob id appellatas ferunt, quòd uulpibus frequenter accidāt. { Hæc Galenus, qui utriusq; mor med. secū. loc.
 bi nomen à similitudine impositum à ueteribus esse ostendit. Verū in quo slet similitudinis cap. p^o. circa
 p^a. ratio, quibusdam ambiguum adhuc extitit. Nonnulli. n. Græcorum ἀλωπεκίαν, & ἀλω Alopecie mor
 τειάσιν inde sic dictam esse alteram morbi speciem uolunt: Quoniam (uti iam iam ex Ga bi ad uulpe si
 10 leno præscriptum est) Vulpi, quæ ἀλώπηξ Græcè dicitur aduenire huiuscemodi pilorū ca militudinis rō
 „ sus aliquādo consueuit. Etenim (ut Albertusⁱ testis est cognomēto Magnus) capitis aliquanz triplex.
 „ do patitur calefactionē, & præcipuè tempore æstiuo, & curatur sanguine ad extra fluen i lib. 22. de aniz
 „ te, & pellem ulcerante, & ideò cadunt tunc ei pili { Quo tempore uenatorum canes eam ab malibus. litera. V
 horrent. Intellexit autem Albertus per sanguinem, uitiosum humorē (ni falsus sit.) Qui. n.
 doloris causa fuerat uitiosus humor ad cutim deinde à natura depellitur. Quom ob rē & Ga
 „ lenus à præscriptis uerbis alibi^k subdit { quod aliud est nihil, q̄ pilorum denudatio, qua locus
 „ affectus apparet colore prorsus exangui. { Galeni uerba Paulus,^l Aetius,^m Auicenna,ⁿ Se
 2^a. raption,^o Hali Abbas,^p atq; Abenzoar^q exscripserunt. Nonnulli autem (ut in Etymologico, l lib. 3. cap. p^o.
 Antiquorumq; lectionibus^r scriptum est) alia similitudinis ratione, deductum esse à uulpibus m lib. 6. ca. 55.
 20 id nomen asserūt. Vbi. n. uulpes ipsa lotum effuderit, eue stigio locus ille infructuosus reddi n 7^a. 4ⁱ. tr. p^o.
 tur. Are scentibus herbis, nec alijs denuò succrescentibus nouis, ut area q̄ primum fiat. Eadē cap. 5.
 igitur ratione morbus hic pilos diruit, qui iam præorti fuerant, nec alios renasci finit. Defini o p^o. Bre. c. p^o.
 3^a. tionum uerò Medicarum Author tertiam ab ijs diuersam duntaxat similitudinis rationē per: p 8. Theoricæ.
 pendisse apparet, quoniam. s. uulpis pilos colore aureos, flauos uē repræsentare hoc morbo af ca. 18. post prin^a.
 „ fecti capilli uideantur. Sic. n. ait iuxta Syluanij interpretationem^s { Alopecia est; quū color Cōtra definit
 „ (intellige pilorum, de quorum affectibus ibi loquitur) albidior redditur. Qua mutatione, auri Authorem.
 „ colorem referentes pili radicitus decidūt; ubi patet Syluanium legisse { χερσὶς οὐρα καὶ τριχὶ q p^o. Theisir.
 χαις; quod est { auri colorē referentes pili; cui sententiæ Oribasij antiquus interpres asli: tr. p^o. cap. 3.
 „ pulatur.^t Cūm dicit { Alopecia autem uocatur, quia uulpis similat colorem; Quæ interpretas r lib. 19. ca. p^o.
 30 tio non modò ab Oribasij mente dissentit, uarios ibi colores, pro humorum uarietate, referens Celsus Rhodig.
 tis, sed ob eandem rationem falsissima est: cum præscripto Medicarum Definitionum Aus s post me^m. libri
 thore. Haud enim flauus tantum, aureusq; color ex huiusmodi morbo fit, q̄q; interdū fieri t lib. curōnum
 contingit, quū scilicet ex flaua bile, aut pallida originem acceperit, uerū si ex pituita, alz cap. 13.
 bus, quemadmodū si atrabilario ex succo generetur, niger color resultare, (uel Galeno, ac Cōtra Oriba
 uniuerso medicorum Grege testibus) conspicitur. Sed ne hi quidem colores in pilis (ut aiunt) sū Interpretē.
 at in cute, ob inspersos, impressosq; inibi humores, euadunt. Noster uerò Græcus Codex, ubi
 Syluanius legit { χερσὶς οὐρα; habet { δια ἢ χερσὶς οὐρα; quod est { Qua mutatione diu
 „ perdurante, siue (ut alij interpretantur) inueterascente, pili radicitus decidunt. { Quouis auz
 tem pacto legerimus, ab errore immunis reddi Author ille non potest, albidiorē fieri
 40 ri pilorum colorem simpliciter, uniuersaliterq; definiens. Nos uerò primam similitudi
 nis rationem cum Galeno, & Medicis ferè omnibus insequamur. Secundam interea

Ophiasis nos minimè despicientes. Nec minùs alterù nomen à similitudine impositum est. s. iaphiasis. q. d. men à similitu Latine i serpentatio quoniam serpenti, qui iophis Græcè uocatur, laesa capitis pars in eo morbo apparet. Sic. n. Galenus ait. " Qui tamen similitudinis rationem. quomodo. s. serpentis forma ubi supra. s. m. laesa pars repræsentet, non expressit. Nec etiā (ut qui eius dūtaxat uerba transcripserūt) p. de cōpo. med. Paulus, & Aetius. " Definitionū tamē Author Galeno ascriptus eam declarasse apparet, secundū loc. cap. p. de paratu subdens i cū tortuosa nudatione Græcè i μετὰ τῆς σκολιᾶς τοῦ τῆς ἰλῶσις. Celsus. p. facil. 13. uerò de tortuosa nuditate nil meminit. In eo tamen serpenti assimilari insinuat: quoniam il- 2. x lib. 3. cap. p. lius animalis instar serpit, ab occipitio exordiens, ad frontem usq. duobusq. serpentibus, quasi y lib. 6. cap. 5. in occipitio adnexi sint, assimilare uidetur. quorū alter in dextra parte, alter uerò in sinistra z lib. 6. cap. 4. antorsum, & frontem uersùs ad aures serpat. Sic. n. huiusce depilatio deambulare uidetur, 10 a 2. meth. cap. extendiq. Haud tamen relicto priore loco (quēadmodū de herpete alibi Galenus ait) In occipite. n. oriens, ibiq. uehementius affixus ad anteriora nihilominus expanditur, uel ad aures usq., uel magis interdū. s. ad frontem, donec hinc & inde serpentina capita coniungantur. Sed ipsum Celsum audias i Id uerò, quod à serpentis similitudine ophiasis appellatur, incipit ab occipitio, duorū digitorum latitudinem nō excedit: ad aures duobus capitibus serpit: Quibusdam etiam ad frontē: donec se duo capita in priorem partem committant. i Priorē similitudinis rationē innuit Princeps, b quū ait i Et fortasse accidit in ea figuratio proueniens. sicut figura serpentis. i Cui tñ nō adeò inharere uidetur, utens aduerbio i fortasse i uti alteri. quā præscripserat, et nos ut tertiā narrabimus. Quinimmo Hali Abbas illi itatū assentit, ut hāc reprobet: sic dicens i Aiunt autē nōnulli Tyriam (sic. n. uocant oēs Arabes, quoniā serpentes omnes, præsertimq. uiperas Tyri nomine intelligūt) dici quoniā in hac passione, pilorū fit euulsio, ipso in loco contorta, & incurua, qualis est serpentis reflexus. sed nihil est quod proponunt. i Est ergo similitudinis ratio uerior, cui non Hali Abbas modò, sed ipse etiam Auicenna 3. na subscribit: Quoniam scilicet non solum ibi pili cadunt, ut in alopecia. Verū id plus est, q. d. p. Bre. c. p. excoriatur cū ea cutis tenuis, sicut accidit serpenti. Nec aliud mea sententia uoluit Serapion, d dicens i Et eueniunt cortices ei sicut quū excoriatur serpens i Abenzoar autem solus Definitionum Authoris sensum comprobatur. Qui deinceps rationem eiusmodi tortuositatis uel ligat. sic scribens i Et dicitur tyria, eo q. depilatio cutis sit per uiam tortam. Et causa istius tortuositatis est paucitas phlegmatis in quantitate, cum non ultima subtilitate. quoniam si esset in subtilitate ultima, fieret depilatio per uiam rectam. sicut facit aqua, quando cadit super terram. Sed quia retinet aliquid grossitudinis, & non est æquale, accidit ei, quod accidit aquæ, quando aliquid luti ei super spargitur: quia cum cadit in terram, facit uiam tortuosam, & non rectam. Et propter hoc ab antiquis nominatur nomine serpentis, scilicet tyria. i Dicit autem Abenzoar in præscripto sermone, phlegmatis, & nō alterius humoris inæqualitatem: Quoniam hunc duntaxat humorem causam esse amborum affectuū cognouit. VERVM enim uerò diminutum hoc est: Tres enim humores Galenus, ac post eum Oribasius, Alexander, Paulusq., & Aetius, f cumq. his etiam Razes & declararunt: bilim uidelicet utranq., ac nitrosam pituitam. Quibus quidē Serapion, Auicenna, Hali Abbas, b & Constatinus Africanus i quartā nō temerè (ut mihi uidetur) causā addiderunt: sanguinē, uidelicet corruptū. Sæpe. n. et nos hūc uidimus. ut copiosa, et sæpius repetita sanguinis missione, intermissisq. unā purgationibus opus fuerit ad sanitatē. Hoc præsertim æuo, quo Gallica lues huiusmodi affectuū 40 occasio

occasio fit. Ad eò ut quibus pili cadunt, excusari nequeant, etiã si omninò careant, quin eo con-
 tagio infecti à uulgo determinentur. Quemadmodũ uerò diminutũ illud est. unũ. tantũ hu-
 morẽ horũ morborũ causam esse: Ita & Abẽzoaris ratio rhetorica potius apparet, q̃ demon-
 stratiua. Etenim humores, qui ab uniuerso corpore in totũ caput defluũt, non aquæ unitæ ins-
 tar, super aliquo plano defluũt: ut huiusmodi tortuosum iter fiat. At per euaporationẽ quan-
 dã ascendũt. Ad eò ut si aliqua pars magis affici contingat, promptior quidẽ ea erit, quæcunq̃
 futuris, et ex ossibus, ijs, quæ in Bregmate syncipite uel sunt, superstat, infidelisq̃. Quod si per
 uenas huiusmodi humor exiliat, ubiubi quidẽ uenæ sunt, è quibus effundi humor potest, ibi af-
 fectũ gigni posse compertũ est. Diuersitatis tamẽ causa nōnunq̃ est, ut in parte cadant, in alia
 uerò non, ipsa loci dispositio. Quẽadmodum & in alyis omnibus affectibus pronũtiandũ. Nã
 q̃ in hac, uel illa parte tumor, uel intemperies, aut abscessus, seu dolor, siue q̃dvis aliud præ-
 ter naturã acciderit: ab uniuersa tũ Philosophorũ, tũ Medicorũ schola nō alia assignari unq̃
 potuit ratio, præter eius partis dispositionẽ. Cuius adhuc dispositionis interdũ manifesta cau-
 sa est, nōnunq̃ uerò usq̃ adeò abdita: ut sat superq̃ nobis sit dicere, hanc partẽ idẽ magis affi-
 ci, quoniã ad recipiendũ affectũ disposita magis est. At enim uerò q̃q̃ innumeros fere depila-
 tos conspeximus: nunq̃ tamen uel huiusmodi tortuosis arcis, uel (ut Celsi definitio est) ea
 circulari depilationis effigie uel in infantibus, uel in natu maioribus uidimus. Impossibilem tñ
 eiusmodi formas euenire, non dicimus. Verũ ex accidenti fient, sicuti & alias multas, diuersasq̃,
 si quispiã numerare uellet, figuras inspeximus, ob diuersas (uti præscriptũ iã est) par-
 titũ dispositiones. Mea quidẽ igitur sententia, uerior similitudinis ratio est, quã tertio loco rez-
 censuimus. Quod si peregrina mente singula perlibrarimus, ac præterea rationem ipsam ex-
 perimentis, & ijs, quæ oculis euidẽtia sunt, cõprobarimus: Verissimã similitudinis, rationem,
 & inde morbi spẽm, atq̃ ophiaseos ab alopecia differentiam inueniemus. Etenim quia tenuis
 cuticula non in ophiassi modo, sed in ipsa etiã quauis alopecia quotidie resoluitur, contabescitq̃,
 ita ut furfurũ unã copia (uti post hæc enucleabimus) decidat: Eapropter non quia serpentĩũ
 senectæ assimiletur, ophiassis, aut serpentantio dicetur. Verũ quia ob uehementiorẽ adustionẽ,
 gignentisq̃ humoris crassitiem, squamulæ quædã (ut in lepra contingit) à patiente loco de-
 cidant, serpentũ squamulis per similes. Quẽadmodũ perbellẽ (mea quidẽ opinione) Theodorus
 Priscianus ait.^k Huiusmodi ergo affectũ, qñ contigerit, non alopeciam, sed ophiassin appel-
 labimus. Ab ea nihilominus, in eo, quod magis est, ob maiorẽ uidelicet cutis exustionem, dif-
 ferre determinabimus. Qua de re bilis atræ plus, ac grossioris nitrosæ pituitæ, in ophiassis ge-
 neratione, At in alopecia ortu bilis, sanguinis uel corrupti plus concurrere, Itemq̃ alopeciam,
 perdurante affectu, & crescente ad ophiassin deniq̃ permutari posse decernimus. E quibus
 rursũ liquet tantũ distare, ut ophiassis infantulis accidat, ac per se (Celsi dogmate) finiatur,
 ut difficilioris curationis (ut Serapion rectẽ expressit) existẽs, q̃ alopecia, natu grãdioribus,
 & q̃bus copia exustorũ humorũ maior sit, frequentius aduenire queat. Nisi Celsi ophiassin
 aliũ ab ea, quã hic uestigamus, affectum intellexisse malueris. Tuũ uerò est quouis modo noĩs
 rationẽ intelligas, dũmodo rerũ differentias, ac per has methodi intẽtiones pernoueris. Quæ
 aduertẽs Galenus statim subdit. Nos aut̃ propter qd sic appellari cõtingit, nō quærimus. Vñ
 uerò oriantur, causa quærẽtes. etc. Quæ uerò Albanus i Alexãdri interpretatione partim ex
 antiqua uersione, partim proprio pedagogi marte, deliria cõtexit de ulceribus, ac plagis. etc.

^k lib. p^o. ad Ti-
 motũ cap. 6.

Cõtra Celsũ.

^l p^o. de compo.
 med. secũdũ loc.
 cap. p^o.

Cõtra Albas
 nũ Torinũ.

1 ut lib. 20. cap. falsissima esse, & ab Alexandri sententia prorsus aliena, tum ex Græco Alexandri codice,
 2. circa finē. 8. tum ex Andernaci nuper ædita interpretatione liquet. Quāuis impossibile non est, ubi alopec-
 post prin^m. 13. cia, præcipueq; ophiasis malè curata inueterauit, cutem in ulcera, ac deinde, achoras, uel ceria,
 post princ^a. 22. uel aliquē huiusmodi ulcerosum affectū perducere. Sed tunc alterius generis morbus est. non
 post princⁱ. 23. circa finē lib. 21. q̄ ulcera sint, uel alopecia, uel ophiasis propria symptomata. Celsus aream uocauit utrunq;
 ca. 19. post prin. affectum. s. alopecia, et ophiasim. Quoniā arida, sterilis, ac pilis destituta cutis, ut herbis area
 32. lib. 22. cap. terræ locus sit. Plinius nullibi (quod uidisse recolam) de area, pro huiusmodi morbo, uel de
 21. circa finem ophiasis nomine mentionē fecit. Ex quo sub Alopecia uocabulo subintellexisse utranq; speciē
 22. post princⁱ. autumo. Cuius sæpissime in suo de naturali historia meminit. Pliniumq; (uelut in alijs quoq;
 lib. 23. cap. 4. cir consueuerunt) secuti sunt et Marcellus Romanus, ^m & alter quoq; Plinio ascriptus ⁿ de me- 10
 ca me^m. 6. circa dica re liber. § Alopecia (hic inquit) magnā fœditatē afferunt: & propter hanc seruorum
 principia. 7. post pretia diminuūtur. § Q. Serenus ^o sub capillorū fluore intellexit, quē ex ueneni potione, aut
 principia. 8. ante Salamaⁿdra^e tactu nōnunq; euenire ait. Quēadmodū et ex animalis uenenosi morfu, aut esu,
 me^m li. 24. cap. uel ciborū quoq; uitio sorū frequēti usu cōtingere solet. Perindē ac de Adolescente Galenus
 4. uersus finem refert sibi familiari. Quicquidē per tres, aut quatuor menses quotidie se fungis explebat. Vn-
 5. i prin^o. 7. pro de in alopecia cecidit. Quāq; aut non capiti modo, sed uniuerso etiā corpori cōmunis uterq;
 pe me^m. 11. post affectus est: Quia tñ pilorū usus maior in capite, supercilijs, et palpebris est: Ibiq; pilorum co-
 princⁱ. 14. circa pia maior: Idcirco euidēti^or, & pilorū usui magis oppositus in capite existens, ac turpiorem
 princⁱ. 19. circa inde hominē reddens, tanq; capiti proprius morbus ab omnibus describitur. Ex eo morborum
 principia. li. 25. genere hos esse Galenus ait, ⁱ in quibus naturalis aliqua pars, quæ utilis antea fuerat, amissa 20
 cap. 2. circa finē est. Qua de re morbū esse in numero diminuto determinandum. Erant aut utiles pili, tum ad
 11. in principio defensionem, & cooperimentum, ut præcipue capilli, atq; etiam barba sunt, tum ad de-
 lib. 27. cap. 13. corū, uirilitalisq; inditiū, ut præsertim barba. tū tertio ad oculorū tutelā, ac exquisitiore quoq;
 uersus me^m. lib. uisionis actionem, ut palpebræ, nec nō supercilia sunt. (Quēadmodū ex Galeni ^r quoq; mor-
 28. cap. 11. circa numētis dediciſſe promptū est.) Itaq; quoniā nō turpitudinē modō, sed alicuius etiā usus, ac ui-
 principia. lib. 29. dendi quoq; actionis læsionē huiusmodi pilorū casus inducit: Ea propter Galenus in morbo-
 cap. 6. sæpe. lib. rū catalogo recēſuit, quiquidem in diminuto numero facti sint. Sed ne obstat quidem, q̄ alibi
 32. cap. 7. 10. non morbū, sed symptoma esse insinuet. quā ob rem causæ, quæ morbus est, occurrēdum esse
 circa finē. li. 34. præcipit. Etenim qui morbus est, alicuius symptomatis respectu: Alterius morbi ut causæ cō-
 ca. 15. post mem. paratione symptoma dici potest. Nec aliū ibi morbū ponit. q̄ huius depilationis, ut symptoma 30
 & alibi sæpe. tis causa sit, nisi uitiosos ipsos humores, qui pilorum radices erodunt, corrumpūtq;. Sunt ergo
 Alopecia, & Ophiasis ex imediata causa casus pilorū. Haud. n. i temperies causa. Nā sic ex sola intēperie caderēt. Neq;
 quo morborū genere. ratione tumoris: quoniā tūc in omni tumore pili deciderent. qui tñ uehementer fixi permanēt, 2
 Contradictio- nis Galeni so- lutio. quo uis tumore, aut in temperie in mento factis. Cū uerò neq; solutionis continui causa cadāt 3
 m de medicas- p p^o. de compo. pili. Sic. n. à uulnerata parte statim & ipsi desluerēt. Reliquū est igitur ut per se humores illi 4
 mentis cap. 6. med secūda loc. casus pilorū causa sint. Quā ob rē in numero morbi humores illi sub cute acruati dicēdi sūt,
 n cap. 6. & sine ei uide sed qdē adaucto. E qbus rursū eueſtigio sequitur morbū in numero adaucto causam esse alterius
 o cap. 8. cap. primo. morbi, qui sit in numero diminuto. Sed de his, atq; alijs maioribus difficultatibus aliās uberiūs
 p p^o. de compo. g 14. meth. cap. disputandū reſeruauimus. Nunc uerò nouiſſe duntaxat satis est, in huiusmodi succorū circa
 med secūda loc. 17 in principio cutim facta aggregatione, nonnihil tumoris, & quidē maioris, q̄ in herpete, ac simplici eryſi- 40
 cap. 18. & fine et uide pelate fieri, ut nō temerē inter tumores à nobis collocentur. Pro humorū uerò natura, & tē-
 r. 11. de usu par- tium cap. 14. peramētū
 s primo de cōp. med. secūda loc. cap. p^o. post prin.

peramentum quoq; uel calidum, uel frigidum nanciſcetur. Omnis autem pilorū caſus à præternaturali cauſa factus, ſiue hi affectus iam iam prædicti adſint, ſiue propter ulcera, uel tinea pili cadant, in libris Arabicorum (uti Bellunenſis¹ ait) inuenitur nominatus ꝛ alcharha non naturalisꝛ quemadmodum naturalis ipſa caluities, quæ Græcè {φαλακρωσις} dicitur, apud eosdem ꝛ alcharha naturalisꝛ appellatur.

EADDEM quoq; ratione in tumorū albo reponendus alter eſt affectus, quē ordinē uigeſimū ſextum propoſuimus. Græcè {πρωγιάσις}, Latine interdum porrigio, interdū uerò ꝛ furfur, ꝛ et aliqñ ꝛ furfurꝛ appellatur. Etenim {πρωγον} Græcè nobis ꝛ furfurꝛ ſignificat. Vñ in numero plurali nonnulli dicūt ꝛ πρωγαςꝛ quod eſt ꝛ furfuresꝛ et inde {πρωγιάσις} q. d. ꝛ fur

10 furatioꝛ deriuatur. Quāq; nonnulli pityriaſim urinæ incontineſciam ſignificare Græcis aiūt.

Sed mea quidem ſententia, non recte. Volunt. n. illi aliquando urinæ uitiiū intelligere: quoniam uidelicet furfuraceæ quædā ſubſtantia, ſquamulæ ue in urina reſident: de quibus in Aphor.¹ rſimis, ꝛ prognosticis,² ac ſexcentis ſerè in locis ſcriptum eſt. Et ſi retentionis urinæ cauſa fieri poſſint, ubi furfuracearum ſquamularū aceruſ meatum obſtrueret. ꝛ πρωγιάσιςꝛ

ergo Galenus,³ Alexander,⁴ Paulus,⁵ ꝛ Aetius⁶ Græcè nominarunt. Arabes reſpondente Græcæ dictioni uocabulo ꝛ alhebrizꝛ appellarunt. quod aliud nil eſt, q̃ Latine ꝛ furfur. ꝛ

Eapropter Serapion,⁷ Razes,⁸ Auicenna,⁹ Hali Abbas,¹⁰ Abenzoar,¹¹ Meſue,¹² Conſtantiuſq; demum Africanuſ,¹³ prout nobis traducti ſunt, furfures nominant. Quæ quidem nomina conſideraſſe operæpretiū fore duximus. Cū multa circa hæc apud Authores, præ-

20 ſertimq; Romanos ambiguitas occurrat iſis, qui diligentius cuncta perpendunt. Vltrà quod penes morbi eſſentiam, cauſaſq; ꝛ ſedes quoq; affectaſ: Inde q; penes morbi notas, ꝛ uniuerſam curandi methodum, maxima (ob Authorem diuerſitatem) confuſio exiſtit. Quam pro uiribus elucidare, atq; omnes ſerè concordere reddere pauciſſimis, quoad poſſibile fuerit, enitemur, à nominis uſu exordienteſ. Celfuſ¹ n. ſub porriginiſ nomine intellexiſſe hunc affectum, perſpicuum iam eſt. Nullibi. n. de furfure meminit. Ita etiam. Q. Serenuſ,² quū ſic in car-

„ men redegit ꝛ Eſt inſenſibilis morbuſ, ſed noxia forma: Cū caput immenſa pexum porrigine ningit: Copia farriſ uti frendētib; ædita ſaxiſꝛ Nec aliud Horatiuſ uoliſſe apparet, quū ait³ ꝛ Vngere ſi cauleſ oleo meliore, caputq; Ceperiſ impexa fœdū porrigine. etc. ꝛ Scri-

„ boniuſ Larguſ,⁴ uel (ſi Græcuſ author fuit, ueluti noſ opinamur) eiꝛ interpres ꝛ totiuſ

30 corporiſ porriginēꝛ habet. Aemiliuſ uerò Macer⁵ neutro gñe, ſingulariq; numero ꝛ furfurꝛ uocat. Nec aliud hic furfuris uocabulo, q̃ illorū porriginēꝛ intellexiſſe apparet. Etenim à ſimilitudine deſumptū furfuris, ſeu pityriaſiſ nomē eſt, quoniā corpuſcula quædā furfuribuſ ſimilia à cute reſoluūtur. Aliaq; rōne porrigio nuncupatur à porrigendo (ut aliq; exponūt) quod eſt, extēdēdo, q̃a creſcēdo porrigitur, extēditur ue nō modò q̃a parua incipiēſ, increſcit poſtea:

ſed quoniā priuſ à capite exordiēſ, dein barbæ, ac ciliſ, ꝛ ſuperciliſ: poſtmodū uniuerſo etiā corpori cōmunicari ſolet. Pliniuſ autē iter furfures, et porriginēꝛ, quādā ſubitelligere differentiā inſinuat. Primò quoniā ſcoſum de porrigine, et furfuribuſ meminit: Secūdo quoniam uel in eodem capite, non ſecūſ ac de rebus ab inuicem differētib; loquitur, furfures inſimul porrigine fortiores eſſe innuens. Propter primum conſidera quoniam per ſe interdū porriginem

40 profert: ꝛ interdū uerò ꝛ addita dictione ꝛ capitiſ ꝛ ſic ꝛ ad porriginem capitiſ. ꝛ De furfuribuſ autē ſic meminit. Aliquando¹ enim ꝛ furfuresꝛ capitiſ ait: Aliquando² furfures in

facie

BE iij

facie

1 expo. Arab.
nom. litera. A.

Tumor. 26^o.

Pityriaſiſ.

1. 4^o. aphor. 77

u. 2^o. Progn. 28.

x. p^o. de cōpoſ.

med. ſecūdu loc.

cap. 8.

y. lib. p^o. cap. 4.

z. lib. 3. cap. 3.

a. lib. 6. ca. 66.

b. p^o. Bre. ca. 4.

c. 5^o. ad Maſo.

4^o. 2^o lib. Diuiſ.

cap. 109. 2. 25.

Cotin. cap. 22. li

tera. N.

d. 7^o. 4^o. tr. p^o.

cap. 24. ei ſequē

tibuſ.

e. 8. Theoricæ

18. et. 4^o. Præſti

ca. 13.

f. lib. p^o. They.

tr. p^o. cap. 10.

g. De ægri. ca.

pitiſ. cap. 2.

h. lib. p^o. cap. 5.

i. lib. 6. cap. 2.

k. cap. 3.

l. 2^o. Sermonum

ſatyra. 3^o. ante

mediū.

m. cap. 243.

n. cap. 22. de li

lio circa finē. et

40. de uio liſ, et

62. de Malua.

o. 29^o. ca. 6. poſt

prin^o. 20^o. 14.

circa prin^o. 24^o.

5^o. circa mem.

p. 24^o. cap. 19^o.

circa finē.

q. ut. 20^o. 9. uet

ſuſ finē. ꝛ cap.

21. poſt prin^o.

r. 21^o. 19^o. ante

mem. 22^o. 21^o.

prope finē 24^o.

5^o. circa prin^o.

19. circa finē.

s ut lib. 23. ca. 8. facie, Nōnunq; furfures ex facie, Nōnunq; furfures corporis: Atq; alibi demum furfu
 post principia. res cutis expressè scripsit. Vt non in capite solum, sed in facie, ac uniuerso etiā corpore furf
 t ut lib. 22. cap. fures generari significet. Ex quo & alibi sæpius simpliciter, & absq; ulla penitus addis
 2 5^o. post prin^a. tione, ad furfures remedia præscripsit. Propter secundū. cuius Plinij uerba legenti por
 et. 3 5^o. 1 5^o. cir ca finem. tione, ad furfures remedia præscripsit. Propter secundū. cuius Plinij uerba legenti por
 u Vi lib. 26 ca. riginem à furfuribus secreuisse liquebit: quum de fœnugræco loquens, sic ait? Farina por
 8. post prin^a. riginem capitis, furfuresq; cum uino, et nitro celeriter tollit. Longè autem apertius idem cō
 x 23^o. p^o. uersus firmat. Vbi de ursino adipe, atq; hircino demū felle, præter alia remedia, loquens, sic etiā scri
 fin. cap. 2. post psit? Porrigini cum uino prodest (scilicet adeps ursinus) Ad hanc & cornus ceruini cis
 mediū. 3. uersus nis è uino. utq; non tædia animalium capillis increcant: Item fel caprinum cum creta cimos
 me^m. 4. ante me dia. 7^o. ante me dia. 8^o. uersus fi lia, & aceto. sic ut paululū capilli inarescant. Item fel hircinum cū urina tauri. Si uerò uetus
 nē. 9^o. post pri^a. sit, etiam furfures, adiecto sulphure emendat? In quibus quidem uerbis nulli nō apertum fie
 lib. 24. cap. 11. ri opinor, non modò à porrigine furfures differre, uerū etiam difficiliorem affectum esse: ut
 circa prin^a. & cui præter tauri urinam, sulphur quoq; hircino felli adiunxit. Eandem uisi sunt differentiam
 sæpè alibi. obseruasse alter quoq; Plinius, & Marcellus Romanus, batq; etiā Apuleius Madaurēsis.
 y lib. 24 ca. ult. in fine. Apertissimè nanq; hi (ut cuiq; apud eos uidere facile est) differentiam faciunt. Hanc diffes
 z lib. 28. cap. 11. rentiam & si recentiores (quos uidimus) omnes uel nō aduertunt, uel fortassè neglexerūt,
 in principio. Marcellus tamen Vergiliū^d in Plinij monumentis olfecit. Quāq; non rectè decernit in tri
 Cōtra Marcel lū Vergiliū. plici determinationis modo, peiusq; in primo, dū porriginis & furfurū uoce, unū idemq; Plin
 Cōtra Rñsio nio mali genus significari ait, uniusq; mali duas fuisse quondam appellationes, quod Celsus
 nem primā etiam indicare uidetur? Hæc. n. Marcellus. Sed quous unum esse mali genus intelligere admit
 Cōtra. 2^{am}. timus; Aliquam nihilominus differentiam, saltem in eo, quod magis, minusue sit, eligere præ
 a lib. p^o. cap. 4. scriptis ex Plinij utriusq; ac Marcelli Romani, et Apulei quoq; debuerat. Quæ de causa neq;
 b de medic. c. 4. huiusmodi responsio mentem eius placauerat. Vnde & secundo rursus subdit, dicens? Aut
 c de uirtut. her barum. cap. 20. porriginē, capitis: furfures uerò; reliqui corporis fuisse. Cui rursus intellectui acquiescere nō
 d lib. p^o. cōmen tiorum Diose. potuit. Quoniam capitis, & faciei quoq; furfures (ut iam iam ex Plinij locis adnotauimus)
 ca. 28. scriptum inuenimus: perindè ac in Scribonij Largi compositionibus^e totius corporis porrigi
 e cap. 243. nes, aliquando legimus. Quam ob rem & tertiam subiungit expositionem, dicens? Aut mas
 Cōtra 3^{am}. defacere porriginem, furfures uerò siccos esse? Adeò ut in hoc differant, quoniam. s. porrigo
 humida: furfures uerò siccae sint. Sed ne hunc quidē sensum admittamus. Quæ. n. humida est
 manantis alicuius ulceris ratione humida sit. Quocircā fortioribus medimentis indigeret. Plin
 f ex lib. 28. ca. nius autem addens ad furfures sulphur, uti præassumptum est, s ualidioribus indigere des
 11. in principio siccantibus furfures ostēdit. Hermolaus Barbarus^g à furfuribus pityriasisⁱ ue diuersam esse
 g in Glassemat. porriginē telligit, ac ad Græcorū λειμῶδες, hoc est, squamulas reducit. quoniā quasdā quasi
 in Pliniū. squamulas à cute resolui Celsus ait. Nos aut, quāq; apud Celsum, aliosq; multos Romas
 h p^o. de compo. nos, ueluti præactū est, porrigo furfures, pityriasimⁱ ue cōprehēdit: prout pityriasis furfuras
 med. secundū loc. tio ue, apud Græcos, & Arabes, porriginem quaq; continet, inficias non imus: Duas tamen
 cap. 8. esse species ostendemus: Quarum quæ leuior est, & capiti magis propria: porriginem, quæ
 i lib. 6. cap. 65. uerò fortior, & nō capiti modò, sed toti etiam corpori communicari solet, furfures, iuxta Plin
 De cā pityria nij, & eum insequentium placita, nuncupari, præsentī quidem animo decernimus. Pro cuius
 seos uariæ sen exquisitiore notitia, duplicem hanc speciem enucleare certum est, quo tot, tantāq; de causa
 tentiæ. morbi diuersitates concilientur. Etenim Galenus^h, cui ad uerbum subscripsit, Aetiusⁱ ex uis p^a.
 tiōsis

1. *h*os ichoribus fieri hunc affectum scribit: Haudquaquam interea declarans ex quo humore, seu
 2. cuius humoris ichore fiat. Alexander^k autem, cuius uerba transcripsit Paulus, ^l ex uitioso hu
 more. s. uel falsæ pituitæ, uel biliosi, & melancholici sanguinis, generari uitium id determi
 3. nauit. Serapion^m uero ab ijs diuersus utrisque est. Etenim cum prius dixerit accidere ab humo
 re, aut à ueneno malo (quasi per humores Alexandro, & Paulo assipularetur: per uenenum
 uero, quo nomine semper Græcorum ichoras intelligere consuevit, Galeno, & Aetio subscri
 bere uellet, sicque illos conciliaret, quoniam ex utraque causa fierent. s. ex humoribus, atque ip
 sis etiam ichoribus) statim quod post hæc subdit. Et generatur à duabus causis: quarum una
 est, ut sit complexio capitis calida, exiens à natura sua, mala, generans furfures, & humores
 10 remanentes cum dispositione sua in natura. Et fortasse generatur ex superfuitate humorum
 calidorum, quando effunduntur ad caput. In quibus quidem uerbis apertissime ostendit, ma
 gis ex calida intemperie, quam ex humoribus gigni affectum, ijsque humoribus calidis, quando con
 4. tingit. Adde ut ex pituita fieri non queat. Razes quaque ad Mansorem scribens, ⁿ libro Di
 uisionum^o nullam expressit causam: Nihilominus tamen in Continente, ^p authoritate Aaron
 prius fieri hunc affectum ex phlegmate falso ait: Mox uero deinde ex Alexandro phlegma
 5. falsum, & humorem melancholicum adiunxit. Licet non recte, ubi Alexander habet ^q ex caco
 chymia hic ^r ex mala complexionem referat. Demum ubi nullum nominat authorem, ex
 6. propria uidetur sententia, phlegma, & cholera causas ponere. cum de phlegmatico, & cho
 7. lerico capite mentionem faciat. Hali Abbas^q phlegma falsum, & melancholicum humorem in
 20 causa ponens, nil de cholera, uel intemperie meminit. Auicenna^r bilium præteritis, phlegma falsum, et
 8. melancholicum sanguinem morbi causas esse, ac interdum solam intemperiem posuit. Qui tamen etsi cum Sera
 pione conuenit, solam aliquam intemperiem ponere, ab eo nihilominus discrepat, dum non ut ille calidam,
 9. sed siccam intemperiem declarauit. Mesue^s calidos & frigidos humores ait: nullum tamen
 10. proprio nomine distinguens. Constantinus Africanus^s, uel ex cerebro exire, uel ex fumo cu
 iuslibet humoris caput ascendens nasci morbum declarat. Cumque dicat {cuiuslibet humoris}
 11. sanguinem quoque affectus causam uoluisse insinuat. Quem nullus aliorum expressit. Abenzoar^u
 demum prædictis omnibus authoribus aduersatur. ut qui unam duntaxat causam posuit, uideli
 cet pituitam, sed ne hanc quidem falsam, tenuem uel illius ichorem, sed crassam dixit. nil peni
 tus de alijs humoribus, aut ichoribus, uel intemperie mentionem faciens. QVIBVS pro
 30 secto intellectis authorum ferè omnium, in nomine prius, ac deinceps in causæ assignatione di
 uersitatibus quem sequi ex ijs congruentius sit, quaque inde curationis methodum eligere debea
 mus, latet: prius quam aliquam concilij formam inuenerimus. cum unusquisque propriam sententiam
 & rationibus, & experimentis comprobare queat. Nullus enim condemnandus inconsulto est,
 prius quam eius, qua mouetur, ratione intellexerimus. Pro cunctorum igitur concilio, simulque non
 modo nominum, sed rei quoque differentiarum intelligentia, Notandum imprimis est, quod duplex Pityriasis dicitur
 huiusmodi pityriasis est, duplicem quoque habens originem. Interdum enim furfures sunt ex
 tenaci, pituitosque humore. sed ne absurdum quidem est, ut ex melancholico etiam generari queat.
 Præsertim quoties nonnihil tenacis pituitæ admixtum illi sit. Non quia huiusmodi humores
 ad caput fluant, uel cutim ipsam, ibique aceruentur: sed uapores duntaxat, quod paulatim & caloris
 40 ui ducti exhalantes, inter barbae pilos, atque capillos extra cutim eiciuntur, ibique ob tenacitatem,
 uel terrenam quandam substantiam retenti, maximeque à pilis, ne in balium digerantur, impedi
 di

k lib. p^o. ca. 4.

l lib. 3. cap. 3.

m p^o. Breuiarij
cap. 4^o.n s. ad Mansorem
cap. p^o.

o cap. 109.

p lib. 2. cap. 22.
litera N

Rasis locus.

q 8. Theoricæ
cap. 18.r 7^a. 4^a. tr. p^o.
cap. 24.s cap. 2^o.t lib. p^o. cap. 5.u p^o. Thyfir tr.
p^o cap. 10.Pityriasis dicitur
plex species.

- cū mēp pū dē uocant) corruptione gigni decernimus. Contabescit. n. desquamaturq; &
 resoluitur frustulatim cuticula, usq; adeo interim persiccata, ut ad albidius uergens, quasi in
 squamulas piscium resoluitur. Qua quidem priori resoluta, q̄ primū & alia gignitur, cū nō
 aliud q̄ ipsius ueræ cutis efflorescētia quædam, uel (Galeno^a docente) superficies sit cutis
 cula hæc. Qua rursus, atq; iterū resoluta, denuo semper alia noua perpetim regenerata instau-
 ratur, non tamen adhuc firma, sed quoniā uitiosis ichoribus infarta cutis est, Idcirco & reso-
 lubilis etiam hæc regignitur. Quem desquamationis modū in lepra, lichenibus, & scabie (uti
 Galenus^b ait) atq; ipsorum quoq; uiscerum affectibus quibusdam, præsertimq; uesicæ, adue-
 nire in dies conspeximus. Nobis autem huiusmodi furfurationē maximē in alopecia, magisq;
 10 adhuc in ophiasī non semel inspexisse permissum est. Quinimmo & nouacula caput radente
 chirurgus, aut quouis tonsore, qualibet rasura, sic desquamari, ac resolui cuticulam uidere uni-
 cuiq; in promptu est, ut cornu instar, uel capæ multis ex foliiculis cōpositā esse cutim, qui spīa
 suspicari queat. Eoq; magis, quō uetustior, aut maior uel ophiasis, uel alopecia sit. De hac igitur
 specie, tanq; morboſo quodā affectu Galenus eiusq; simia Aetius, præter eā, quæ ex Ar-
 chigene colligitur, & Abenzoare desumpta est, intellexerunt. De hac quoq; nō Celsus mor-
 do sed ipse etiam Alexander, Paulus, Serapion, Razes, Auicenna, & Haliabbas, Mesue,
 Constantinusq; Africanus loqui intendebāt. quū in morborū catalogo reposuerunt. Primam
 uerō speciem, uel neglectā ab his, ut minimē sui ratione morboſam, uel sub hac secunda com-
 prehensam esse ab his omnibus Authoribus, præcipueq; à Celsō (ut patet) determinandū est.
 20 Quauis autem furfuratio hæc morbus non sit, morboſum tamen symptoma est. cuius causa
 (ut uidebimus) in intemperie sicca morbus est. Cuius adhuc morbi causas esse ichores ex Ga-
 leno declarabimus. Hæc q; rursus est, quā (licet rariū) nonnunq; tamen ulcerari & Celsus,
 & Alexander, Atq; nos ter etiam Arabum Princeps testes sunt. Quāq; Paulus, & eum
 hac in re transcribens Haliabbas simpliciter, absq; ulcere fieri affectionem hanc aiūt. Qua
 in re de Paulo mirandum est, qui Alexandri (ut liquet) uerba exscribens, dictiones τῆς κατὰ
 τὸ πλῆθος quod est {secundū plurimū} non scripsit. Aut ergo in Alexandri, quem Paulus
 exscripsit, codice non erant uerba hæc, Aut (quod potius reputo) in Pauli codice nunc desin-
 derantur. Nisi ueritati, nedū Alexandro repugnantem Paulum intellexisse malueris. ob
 ichorum nanq; acrimoniam exulcerari nonnunq; inspeximus. Quam ob rem Alexandrum
 30 Græcè loquentem legentibus perspicuū exemplū fit, dictionem {plurimū} non uerbo {resol-
 uuntur} construendam: ut Andernacus fecit, legendo {plurimū} resoluuntur} neq; cum Al-
 bano Torino interpretandum est {κατὰ τὸ πλῆθος} Latine {confertim} qui Alexandri sen-
 sum minimē olfaciens, confertim resolui corpuscula intelligit. Quod autem omnes rei uerita-
 tem perspiciant, Alexandrum Græcè loquentem audiamus {ἢ πτυγίαις ἐστὶ συντόμως
 ἐπὶ τῶν λεπτῶν πτυγίαις σώματων, ἐκ τῆς ἐπιφανείας τῆς κεφαλῆς, ἢ καὶ ἐκ
 τῆς αἰμῆς σώματος, ἀπὸ τῆς, χωρὶς ἐλκώσεως κατὰ τὸ πλῆθος.} quod est, Græcis
 40 Latina uerba reddendo {Furfuratio est (ut compēdiosè dicam) tenuium, furfuraceorū cor-
 porum, ex superficie, tum capitis, tum reliqui corporis resolutio, absq; ulcere secundū pluri-
 mū.} In qua quidem dicendi serie, uerba {secundū plurimū} non alteri dictioni accommo-
 dari posse perspicuū fit, q̄ ultimò, et statim antehæc dictis. s. {sine ulcere} Sed de his, atq; alijs
 multis alibi. Hæc iterum secunda species non tantū capiti, & barbæ, locisq; pilo infartis,
 sed

a 4. aphorismo
rum. 77. et. 2.
prognosticorum
con. 60. in fine.

b 4. aphorismorum. 77.

Pauli locus.

Cōtra Ander-
nacu, et Alba-
nū Torinū.

sed uniuerso etiā corpori cōmunicari solet. Cūq; in capite inualeſcit, in achoras, uel aliud capi-
tis ulcusculū, uel interdū alopecias, aut ophiasēs permutari (nisi curetur) consueuit. Quū ite-
rò totū corpus acriter afflixerit: in psoras, lepras, aut lichenas pertrāsire nōnunq; uisa est. To-
tius enim corporis cutis albeſcit, à qua nō secus atq; ab ipso capite (si peētine, aut strigili fri-
cueris) furfuraceæ multæ ueluti squamulæ substantiæ resoluentur. Intellexit autem Ale-
xander per humiditas, eas, quæ iam exulceratæ sunt, ut è quibus aliquid saniei emanare appa-
reat. Ex quo mirandū magis est, Paulum Alexandri uerba, de humidæ pityriaseos curatio-
ne, transcribentem, Nihilominus tamen abq; ulcere illas fieri simpliciter protulisse (Nisi pro
ut antea diximus) mancā Pauli literam esse suspicemur. Distinguemus uerò primam speciē,
à secunda. Etenim ex prima pingue, sordidiusq; caput apparet, & frigidum potius sentitur.
ut capitis tegmina citò, uelut oleo intincta fuerint, sordidescant: squamulæ item, furfures ue
grossiores, quæ grossi phlegmatis atq; unā tenacis inditia erunt. Capilliq; lenes erunt, et plu-
rimis ad albū citius peruenient. In secunda uerò siccitas quædā, leuiusculusq; sæpiculè pruri-
tus in capite, ac alijs ubi inualuerit partibus, absq; oleagina illa sorditie. Ultra quæ squamulæ
etiam tenuiores, aridioresq; cū quibus sæpenuerò pexo capite plurimi etiā pili cadūt. Quæd
si peētendo quadantenus cōprimas, infricesq; faciliè multoties caput rubefiet. Capilli aridior-
res, ac sæpè fissiles ob ariditatem fiunt. Præter hæc demum omnia, prima spēs uel in corpo-
re, secundū alias omnes operationes sanissimo, euenire solet: Secunda uerò non nisi uitiosis
humorū ichoribus redundans ipsum corpus sit. Sed hæc satis, atq; intantū dicta sint hoc loco.
Ut duæ furfurationis species à nullo unq; uberius enucleatæ innotescant. Reliqua proprijs
locis discutienda reseruauimus. Ad id ergo reuertamur, unde digressi fuimus. Duæ nanq;
difficultates propositæ sunt. Quarū prima fuit de porriginis, ac furfurum uocibus apud Plin-
niū. Atq; hanc enodabimus, dicentes, Plinio, eiusq; seētatoribus altero Plinio, ac Marcello, &
Madaurensi Apuleo porriginis nomen, primam iam dictam spēm: furfures uerò secundam
præsetulisse. Altera uerò & maioris quidem momenti difficultas de causis fuit. Cū tot uar-
riæ Authorū sententiæ extiterint. Pro huius ergo confusionis elucidatione, imprimis quid nā
ichoris nomine Galenus intellexerit, enucleare operæ pretiū est. Quāuis n. i. x. ω. multa apud
ueteres Authores repræsentare appareat: Idē nihilominus omnibus præsefert: uidelicet sub-
stantiam quandam tenuem, serosamq; & aquosam, quam in corpore, ac intus uasa adhuc exis-
tentem, serosam humorum partem, siue serosum humorem, siue quod clarius est, humorum
(ut puta sanguinis, aut alterius bilis, aut pituitæ) serū, siue serositatem dicere possumus. Ex-
tra uasa autem, ac forās, extra corpus defluentem, saniei quandam sic nominatam speciem, ex
Celsō, generisq; nomine cū Plinio saniem uocare possumus. Nec. n. aliud q; præscriptū illius-
modi serum Plato uoluit, quum ait: Ichor autem, sanguinis quidem serū, mite: Nigræ uerò
bilis, sed acutæ, immite. Siquidem hæc uerba ex Græco habentur. q; q; prima confundat
Marsilius, sic interpretans: cruor præterea, qui sanguinis residuum, & defluxus est. etc. Nec
aliud unq; Hippocrates (Galenī expositione) intellexit. Vel etiam Aristoteles, quū
exquisitè perpenditur. Itemq; Diocles, f. Anteq; hos omnes Homerus. & quū à sauciata per
Diomedem Venere ichorem promanasse effinxit. Quāq; alij cruorem, alij saniem Latine
interpretati sunt. Minimè aduertentes q; Latinum id nomē {sanies} tametsi apud Pliniū Græ-
corū ichori aliquando respondens, aquosum quendam sanguinem, ac serosum significet, siue
ab

Primæ spe-
ciei inditia.

2. spei inditia.

i. x. ω. q. quid?

c in Timæo uer-
sus finē.

d ut patet. 4. i.

de rōne uic. in

morb. acut. tex.

p. 2. 6. epid.

cōmētario. 2. tex.

38. et 2. epid.

in principio.

e 3. de hist. aīa

liū. 19. in fine. et

20. ante mem.

Cōtra Mar-

siliū.

f in epist. quam

Antigono Regi

scripsit, quam

Paulus refert li-

bro p. cap. ult.

g lib. 5. Iliados.

ab affato iocinore, ^b aut pulmone¹ defluentē siue ē cerebro uiperā punctis emissam^k scripse-
rit: Vt eundē aliqui cruorem, aliqui uerō sanguinem simpliciter uocant. Celsus¹¹ tamen uoca-
bulum { sanies } æquale ichori non est, sed ichorem sub se, uelut speciem, atq; etiam alterā,
quam meliceriam uocat, comprehendere hic uoluit. ac utraq; saniei speciem, nec in uenis, aut
sanguine posuit, neq; ab affatis iocinore, uel pulmone, sed à malis ulceribus emanantem intelle-
xit. Ichorem interea tenuem, subalbidum, maximeq; ubi neruo læso inflammatio secuta est: sec. 17.^o

Meliceriam uerō crassiozem, & glutinosiorem, subalbidam, melliq; albo sub similem, atq; ubi
nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca, maxime ex genibus defluentem definiens.

Qua de re ab æquiocatione tutum non est, uel saniem, uel cruorem, qui Græcè ἰχὴρ dicitur
tur interpretari: sed tutius quidem uelut in alijs quoq; multis uocabulis ostendimus, Græcū
nomen usurpare: sicq; ichorem appellare. Id nihilominus memoria tenentes, quod iā antea ad-
monuimus, serosum quēdam homorem, tenuiorem uel humorum partem, prius q; extra uenas
eiecta putrescat, ichoris uocabulo significari. Cū uerō corruptus iā est, atq; in tenuius, seros-
susq; conuersus est sanguis, uel quiuis alter humor, q; q; non aliud, q; serosam, tenuemq; illam
substantiā præferat, generali tñ uocabulo, Celsi dogmate, saniem, ex Auicēnā aut inter-
prete, uirus, aut uirulētā, ex Serapionis uerō traductore, uenenū subtile nūcupare possumus.

De quo quidem ichore apud Galenum quoq; nonnihil aliquando legimus. dū scilicet ab ulce-
ribus siccandum ichorem, abstergendamq; sordem docuit, ^m Atq; ubi quatuor ulcerum tem-
pora definiens, ⁿ ichorem prius, ac deinde pus emanare uoluit: pus ichore crassius, quemadmo-
dum & Celsus^o quoq; supponens. E quibus omnibus mirum non est, si Dioscorides^p ex uir-
ribus, intensiq; uiridibus arboris Corni folijs, uel rectius legendo, lignis emanantem liquo-
rem, tenuem uel aquam, siue (ut Plinius^q idem uocat) sudorem { ichorem } nūcupauit. Sed no-
strum prosequamur intentum. Galenus^r igitur (non secus ac de Homero, Hippocrate, Pla-
tone, Aristotele, atq; etiam Diocle præscriptum iam est) in danda pityriaseos causa, ichoris
nomine tenuiorem, aquosiorē uel humorum, uel sanguinis partem intellexit. Pro cuius rei no-
titia, omisis ijs, quæ ab ipso, ex libro de elementis secūdo, ^s ac de tuenda uoletudine sexto^t di-
dicimus (quanq; ibi liquorem, hic uerō saniem interpretes conuerterunt) Ea præ cæteris
exquisitè perpendamus, quæ in sexto epidemiorum^u perbellè scripsit Galenus. Quoniam, sc.
quilibet ex quatuor humoribus habet proprium ichorem. Adeo ut ichor quidam sit sanguinis,

hic mitior cæteris omnibus est: Itemq; alius ichor pituitæ, uel dulcis, aut acidæ, aut etiam
salsæ, quorum qui dulcis pituitæ ichor, serum uel colamentum est, mitior reliquis est, q; q;
hic minus est, q; ichor sanguinis, ut quartæ substantiæ, Minusq; adhuc q; acidæ, minimeq;
omnium, qui salsæ. acrior autem qui flauæ, quemadmodum & acerrimus qui atræ bilis ichor
& ueluti serum quoddam est. In omnibus autem (ut ab initio sui sermonis annotauit Gales-
nus) uenenosa quadam, & maligna facultate præditam tenuiorem humoris partem intellis-
git. licet magis, minus uel hic, aut ille huiusmodi facultatem (uti prædictum est) participet. cū
iuxta humorum, quorū ichores hi superfluitates sunt, naturas à se inuicem differant. Quas
ob res bonum ichorem eum, qui sanguinis est, uel ex Hippocratis intentione, uocat: aliorum
comparatione, qui peiores sunt, ut præsertim qui salsæ pituitæ, uel flauæ, aut demum atræ bis

lis ichores existunt. q. d. illum minus malū esse. Quibus quidem omnibus prælibatis, ad dubij
enodationem reuertamur. In primis, n. Galenus^x (cui ad uerbum Aetius^y subscripsit) piz

tyriasis y lib. 6. ca. 65.

b ut lib. 28. ca.
11. ante. medium.
i ut lib. 30. cap.
8. post. medium.
k lib. 30. ca. 14.
post principia.
l lib. 5. cap. 26.

m 3^o. meth. c. 3.
n lib. de titius
morbi temporis
bus cap. 3.
o lib. 5. cap. 26.
sec. 17.
p lib. 1^o. cap. de
cornu. secundum
Marcellū. 140
qui traduxit hu-
mor.
q lib. 23. cap. 8.
parū post mem.
r p^o. de comp.
med. secundū loc.
cap. 8.
s cap. p^o.
t cap. 13. et. 14.
u cōmetario. 2.
cōm. 38.

x p^o. de comp.
med. secundū loc.
cap. 8.

Pityriasis causam esse ait, uitiosos ichores, intellige uti iam iam prædictum est, tenuiores, seriosioresque partes bilis utriusque, scilicet tam flauæ, quam atræ, atque etiã salsa pituita. Per id enim quod addit uitiosos ab ichoribus sanguinis distinxit, qui, horum respectu, boni potius ichores dicuntur. quemadmodum ex ipso etiam Galeno didicimus. Hanc Galeni, atque Aetij comprobantis sententiam Alexander, et Paulus tantum abest, ut reprobarint: ut potius magno cum artificio simul exponentes approbarint. Etenim Alexander non dixit inde fieri uitium, quod pituita salsa, aut biliosus humor, aut melancholicus sanguis in caput efferantur. Sed eius uerba hæc sunt ἡ γίνεται δὲ τὸ πάθος τῶ το δια τὸ κακοχυμίων πίναν ἀνενεχθῆναι ἐν τῇ κεφαλῇ, φλέγματος ἀλμυροῦ, ἢ χολώδους, καὶ μελαγχολικῆς αἵματος; quod est, ad uerbum interpretando; Fit autem affectus hic, quoniam humoralis quædam prauitas phlegmatis salis, uel biliosi, et melancholici sanguinis ad caput ascendit; Vbi κακοχυμίων (quod exposuimus ut sonat, humoralem prauitatem, seu uitium) huiusmodi prædictos ichores significat. Ideo in Genitiuo casu ponuntur humores. quod quoniam ichores pituita salsa, uel flauæ bilis, aut atræ ad caput ascendunt. Ita etiã peregrina mente perpendendo Pauli uerba intelligenda sunt: quum sic etiã ait, ferè per eadè uerba; Fit autem cacochymia; id est humoralis uitio, seu dixisse maus uitioso humore. Haud. n. addendum ab Andernaco fuerat; corporis; Fit ergo, inquit Paulus, ex cacochymia uel salsa pituita, uel biliosi, et melancholici sanguinis in caput ascendente; Si ergo inuicem comparentur alter alterius expositor fit. Verbi gratia dicit Galenus ex uitiosis ichoribus fieri affectum hunc, si tu ergo adhuc quæras, ex quibus nam ichoribus? Respondebit Alexander cum Paulo, ex ichoribus, scilicet salsa pituita, uel bilis flauæ, aut atræ. Quod si prius Alexandrū, Paulumque legeris dicentes fieri ex cacochymia salsa pituita, uel alterius bilis: Dubitare statim posses, quomodo ex horum cacochymia? Ex Galeno, atque Aetio respondere poteris, dicens, ex cacochymia. id est ex uitiosis horum ichoribus. Sic igitur Græci authores conciliantur: qui præsertim de secunda, tanquam morbosa specie loquuntur. Serapion uerò non aduertens Alexandrum, et Paulum in Galeni sententiam peruenire: hosque de humoribus intellexisse opinatus, utranque causam retulit, dicens; Hæc ægritudo accidit ab humore, aut ueneno malo; per uenenum. n. ut aliàs diximus, ichorem intelligit: dixitque; malo; sicut illi uitiosis; addebant. Tu autem ex illorum sententia, humoris uenenum malum, seu uitiosum ichorem intellige. Si. n. humores adiungantur, uidelicet crassiores humorum partes, aliquem furibus peiorem affectum gignerent, magisque in profundioribus consistentem. Nec aliud intellexisse Principem dicemus, quum ait fieri ex materia acuta baurachiani. etc. quasi per acutam materiam, ipsum uoluerit tenuem ichorem, quod, ut Arabum moris est, uel fortasse interpretum, Barbaro loquendi modo ueritatem perturbat. Præsertim cum nil de bili meminerit. Cumque ex superfluitate humorum calidorum Serapion in fine generari adiunxerit: non aliud, quam quod dictum est insinuat. Etenim calidi iam prædicti ichores sunt. Haud. n. ex dulcis, uel acidæ pituita ichoribus fieri Alexander, Paulusque ait, qui frigidi sunt, sed salsa pituita, aut bilis, uel atræ, siue melancholici sanguinis. Si quispiam ergo quæreret, In quo morbi genere hic affectus est? et an calidus, uel frigidus? sique ichores illi cuticulam illam contabesciunt, qua id quæ litate agunt? Respondet Serapion quod calida. Ut ad calidos affectus reducendus hic sit, et in genere morbi, quod est, intemperies calida computandus. Princeps uerò ex sicca intemperie la et itemperie. gigni uoluit. Innuuntque hi ambo, ex sola etiam intemperie fieri posse. Id quod prorsus impossibile

x 6. epid. comē
 tario. 2. cō. 38.
 a lib. p. cap. 4.
 b lib. 3. ca. 3. in
 prin.

Cōtra Ander
 nacum.

c p. Breu. c. 4.

d 7. a. i. w. p.
 cap. 24.

sibile

- sibile de secūda specie nō uidetur. Nec uetustioribus aliquid addere absurdū est, qn̄ potius lau-
dandū: quotiēs aliquid uerū adiungitur. Nam & ex insolatione, atq; immodica nonnūq; sic-
citate, cuticulā excorticari, ac desquamari uidimus. Verū est tamen q̄ calor, induc̄t siccitatis
ratione, id efficiet. Distinguentur autem hæ ab ijs, quæ ex ichoribus fiunt, quoniā quæ sola ex
intemperie fiunt fursurationes paucissimæ erūt. Idcirco fortassis eam negligentes Græci omi-
serunt. Præsertim cū durare nequeat, quin ad cutim peruenientes humores deniq; corrūpan-
tur. In oībus tamen, quorū causæ prædicti ichores sunt, caliditas cū siccitate redundans est.
quemadmodū in prima pityriasis sp̄e, potius frigiditas, nonnūq; cū humiditate, nonnūq; uerò cū
siccitate exuperat. Nec aliter itelligere oportet Razē, q̄ tamet si alicubi omisit bilim, Alibi f
10 tñ, uti præscriptū est, tetigit. Quā nihilominus Hali Abbas, & uel eius iterpres omisit. Ut sup
plere illius defectui opus sit. Mesue, b Cōstātinusq; Afric. frigidus, calidosq; hūores ponētes
cōdēnādi nō sūt, si utrūq; sp̄em cōprehēdere uoluerūt. A qbus eleuati uapores, iā tenuiores exi-
stētes portiones, pro ipsis ichoribus itelligi possunt. Nec absurdū est à sāguinis uitio so ichore
fieri, sāguinē pro aggregato ex humoribus quatuor itelligēdo, uel si de 4. itelligimus substā-
tia, ipsū uitiosū supponere. Ut uitiosus quoq; ac acris eius ichor sit. Qua de re Cōstātinū quo
q; à culpa liberabimus. Abēzoarē^k uerò de prima pityriasis sp̄e uerū dixisse præscriptū iā ē.
Quorū porrò redūdātū humorū, siue ichorū notā, quēadmodū i alopecia, & ophiāsi dicitur,
ex colore cutis distinguētur. q̄q; furfurū color, ob nimīā cuticulæ siccitatē, uel ēt pituitosi hu-
moris, ut i prima sp̄e, ad albū sēper uergit. Hæc ad nausēā usq; et præter nostrā itentionē di-
20 cta sūt. Ob noīum, causarūq; tātā apud Authores cōfusionē, ut cui credēdū sit, minimē cōper-
tū hucusq; fuerit. Præsertim q̄a multi noui scriptores hodie nil, præter id, quod ab alijs præscri-
ptū iā est, addere, sed eorū dūtaxat monumēta exscribere decreuerūt. Nil unq; uel etiā expos-
nentes, uel (præter q̄ in paucissimis, & ubi nulla fere difficultas occurrit) annotantes.
A D aliū igitur affectū pertrāsire tēpestiuū est. quē numero. 27^m. proposuimus, et {φθρίας} Tumor. 27.
oir} Græcē, q. d. Latine {pediculationē} uocauimus. Etenī {φθρί} Græcē, Latine pediculus ē. Phthiriasis.
Vñ nōnulli ad pediculos, quasi ad morbū remedia docēt. quare Paulus^l {πρὸς φθρίδας} hoc
est {Ad pediculos} Galenus^m uerò, et Aetiusⁿ {περὶ φθρίδας} quod est {de pediculatio-
ne} scripserūt. De hoc affectu nōnihil antea tetigisse recolo. Vbi. f. de cerio loquebamur. Cui
ius causā aliqñ esse, Princeps dicebat, morsus alboud, hoc est, pediculorū Pharaonis. q. d. feras
30 hū. Inqt. n. Cælius Aurelianus^p {Antecedēte cachexia, ēt hoc Symptoma gñatur, quod nos ac-
cidēs dicere poterimus. Sūpsit igitur nomē, nō à genere, sed à multitudine pediculorū. Plurimi
„ n. creātur, nūc per totū corpus, nūc per eas partes, quæ capillatura cōceptæ sūt. Et nūc cōsue-
„ ti, atq; simplicis formæ, nūc ignoti, hoc est, latiores, et duri magis, ac sæuētes, morsibus uehes-
„ mēter, quos qdā ferāles appellāt. Nā ēt sæpē sub capillis iueniūtur corpora penetrasse. Id ge-
nus morbo Pherecydē philosophū baud incelebrē, Poetamq; Tragicū cōsumptū esse frequens
apud Authores memoria est (uti rectē Rhodiginus^q inquit.) Ad eum grauiter affectum, quū
uisendi gratia Pythagoras discipulus aduenisset, ac quo nam pacto haberet sciscitatus esset:
immittens is digitum per ianuam, inquit {χρὸς δὲ λα} quod est, ex corpore palam est. Et
per numinū, maximeq; Apollinis irā immisum referūt Græci scriptores, præsertimq; Aelia
40 nus. De hoc igitur. Q. Serenus^r ita scripsit {Noxia corporibus quæ dā de corpore nostro: Pro-
„ genuit natura uolēs abrūpere sōnos: Sēfibis, et monitis uigiles, itēdere curas. Sed q̄s nō pauēat
„ Pherecydis fata tragœdi. Qui nimio sudore fluēs, aī alia tetra, Eduxit turpi miserū quæ mors

te tulerunt. Quas ob res peripateticorum Princeps ait Pediculi ex carne fiunt, quibus futuri, ceu
4 s. de hist. az ionthi quā sine pure emergunt exigui: quos si pungas pediculi exeunt. Accidit morbus hic non
nimalia cap. 31. nullis hominibus praenimio corporis humore. Et quā aliquos foeditate obijisse proditum est ut Ale
5 lib. 7. cap. 51. manē Poetam, et Pherecydē Syriū. Et quibus et Plinius locus explanatur, quū ait Morborū ue
Plinij locus rō tā infinita est multitudo, ut Pherecydes Syrus copia serpentium ex corpore eius erumpente,
expositus. expirauerit. Etenim quā solēt Graeci ἐξ αἵματος simpliciter, et ἐξ αἵματος ἐν τῇ κεφαλῇ pediculos
appellare. Idē uerō ē Graecē ἐξ αἵματος quod latine serpens, seu repēs, à uerbo ἔρπω quod est,
repo, seu serpo. Inde igitur Plinius Graecorum imitatione, serpentes uocat pediculos: quoniam su
per corpus ipsum serpunt, praecipueque in capite. Non ut aliqui opinantur colubri, aut uiperæ for
tassis ē Pherecydis corpore exudarūt. Id etiā genus incurabili morbo Sylla Dictator, et Ale
man (teste Plinio) interierūt. Vt mirū sit nasci quoque in sanguine ipso hominis aīalia (aliās
6 lib. 11. ca. 33. inquit) exesura corpus. Quā ob rē alibi de eodē Sylla testatur. quod sibi foelcis cognomen as
u lib. 26. ca. 13. seruit Age, Non exitus uitae eius, oīum proscriptorū ab illo calamitate crudelior fuit, ero
in fine. dēte se ipso corpore, et supplicia sibi gignēte. Quocirca Serenus quoque subdit Sylla quoque
x lib. 7. ca. 43. infelix tali languore peresus, Corruit, et foedo se uidit ab agmine uinci. Fortēque ob id, i Cor
y cap. 5. nelia domo, nemo ante Syllā Dictatorē traditur esse crematus. Cōburi. n. suū corpus uel ipse,
z lib. 7. ca. 54 uel quiuis alter iussit, ob tantā foeditatē. quā Plinius nō hāc ob causam cēset: sed id eū uoluisse
a libro. 4. de re se, ueritū talionē, eruto Cai Marij cadauere. Quicquid tñ de hoc sit, quod nostrū ē exequamur.
medica. cap. p. Aegyptij Reges, (inqt alter Plinius recētor) quibus erat studiū scrutari corpora mortuorum,
ubi de raphani et causas ualeitudinū, oculata fide recognoscere: in corde ipso nasci eiusmodi uitium. s. phthiriaz
uiribus loquitur. sim prodiderūt. Eius uerō curationem alibi Marcello congruens edocuit. Celsus de pe
b lib. p. cap. 4. diculis palpebrarū loquens, ex Graecis etiā φθειράσι uocat. Veluti et quā plurimis in locis
de re medica. Plinius. Galenus s. uitij causam ita definit: pediculorū generatio quibusdā in capite cōtingit
c lib. p. cap. 4. αἰθρῶς (hoc est acruatim, q. d. simul copia multa) ex multis uidelicet humoribus, calidis quē,
de medicamentis. sed nō ad tantā caliditatē progressis, ad quā perueniūt acres ichores. Quare manifestū est in
d 6. 6. sec. 15. profundo cutis pediculationis affectionē fieri. Vbi etiā aīalia hāc generari possibile est: nō in
e ut praeter al- superficie cutis, i qua furfurationē cōsistere diximus. Eadē ferē tū Aetius, et quōque ex Ara
legata loca etiā bibus Serapion, ac Razes i exscripserūt. E quibus liquet non ex ichoribus, at ex ipsa humo
lib. 20. c. 6. post rū substantia fieri pediculos. Vt nō temerē Auicēna ad ea, quae ferē mediocria secūdū sub
mem. 22. post p. stantiā sunt, referre uisus sit. Quod si Hali Abbas grossam humiditatē scripsit. si tñ exqui
cipias lib. 23. ca. sitiū perpendatur eius sententia, deductoque liuore, Tenuissimorum relatione grossam itellexit:
4. uersus finē. eorum. s. quibus furfures fiūt, uel quae per halitū insensibilē digerūtur, aut in sudorē, uel in fordes
p. post prin. 8. conuertuntur: ueluti perbellē Auicenna declarat. Nec eiusmodi calidus humor bilis rubea tan
uersus finē. lib. tū est: ueluti eā solā Caelius Aurelianus expressit. Verū quibet humor, praecipueque (ut opis
24. cap. 5. circa nor) sanguis, ac pituita, quibus putredinalis calor aduenerit, non multus, nec (ut Abēzoar ait)
mem. 9. i fine. in factū esse: sed in fieri. quousque. si aīatū quā fieri (Auicēna explanāte) pōt. Vñ pediculus Gra
10. i prin. bis. cē dictus est φθειρά à uerbo φθεῖω, quod est putrefio: quoniam ex corporis putredine fit. Vt
et circa mem. 21. in Etymologico legimus. Quāque communis pediculorum generatio, absque tumore euidentē
25. ca. 5. i fine. fieri queat. In ea tamen de qua hic loquimur, pediculatione, ob infartam esse cutim et pus
lib. 30. cap. 14. tridis illis humoribus, et pediculis etiam, quibus adhuc erodentibus, dolorem fieri, mordicatio
post mem. et alibi nemque, et inde ulcuscula cōtingit: humores quoque eleuari necessum est. Vltra quā ueluti ionthi
saepē. praexistunt, perinde, ut Aristoteles inquit, quibus apertis pediculi exeunt. Ad calidos uer
f p. de comp. rō hic
med. secūdū loc.
cap. 8.
g lib. 6. cap. 67.
h p. Breu. c. 5.
i 2. 5. Cōt. c. 17.
k 7. 4. i. 3.
cap. 26.
l 8. Theorica.
cap. 17.
m li. 4. Chronio
e. 2. circa prin.
n libro p. n. p.
cap. 11.

rò hic affectus putredinis ratione referendus est. Arabicè & Motes immores; .i. pediculi expos-
nuntur in synonymis continentis Rasis. Sunt uerò & quædam species pediculorum, qui dicun-
tur Arabicè & alcarad; à nostris uulgò piattolæ dicuntur, in Sicilia chatalli. Abèzoar^b uocat pla-
tulas. Nec aliā intelligi opinor, q̄ hanc spēm apud Arabes nomine & alguardan; & interdū si-
ne articulo & guardan; et & gardan; atq; et & alfeed; quā in inguine, atq; axillis præcipuè oriri,
antiquior Arabicorū noīum Auicennæ interpret ait. Præter hanc uerò pediculorū speciem alia
est, sub cuticula oboriens, ibiq; affixa permanens, aut parum deambulans, præcipuèq; in manib;
bus, & pedibus, frequētiusq; i pedibus in fantiū, non permittens illos quiescere: Dñr Arabicè
& assoab; apud Abèzoarem, à nostris uulgò pedicelli, dicunt aliqui pedoscilli. Mirum herclè di-
ctu, q̄ uti perbellè Abenzoar descripsit, cū excoriatur cutis (ubi s. minimus ille ionthus uaru-
lus ue, cuiusdā sudaminis istar, apparet) exeūt aī alia uiua, tā paruūcula, q̄ uix possunt uideri.



ED Alios quoq; tumores à Galeno, in suo de tumoribus cōmentario, minimè ta-
ctos perpēdamus. In ipsis uidelicet oculis, eorūq; partibus nouū hūc iā inceptū
catalogū cōtexentes: siue Græcis, siue Latinis, aut Arabicis noībus uocentur.

Quæadmodū ergo Galenus pterygion, ipsius adnatæ oculi tunicæ morbum, et
staphylomā, ipsius et oculi tunicæ corneæ uocatæ affectū in tumorū albo recēsit: Quos atē
nos ordine sexagesimū, 0 et 61^m. P declarauimus. Itēq; ut angulorū oculi morbū Encanthida
recoluit: Quē rursus ordine 59^m. supra enucleauimus: Quam ob causam plures alios tum-
totius oculi, tū et earūde tunicarū, atq; uueæ et notatæ, sic & alios angulorū, ac deniq; palpe-
brarū quoq; tumores omisit? Nullamq; nihilominus tumorū speciem remanere gloriatur, quā
in eo cōmentariolo non tetigerit? Sed qui sint, & quales hi tumores enumeremus, à totius ocu-
li tumoribus exorsi, numerum tamē inceptum, pro clariore noui catalogi numero, obseruātes.

Totius Oculi & partium eius Tumoris numero: 63.

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totius Tumor | | | |
| 28. Proptosis Galeni | 43. Melon. | 58. Carcinoma. | 73. Pachytes. |
| siue epiesmos Pauli | 44. Clau ⁹ Pauli, & | Vneæ mēbranæ tumores. | 74. Barytes. |
| Totus sed præcipuè Mē- | Aeti. | 59. Synchysis. | 75. Hydatis. |
| branæ adnatæ Tumores. | 45. Clauus Introdu- | 60. Mydriasis. | 76. Psorophthalmia. |
| 29. Taraxis. | stori. | 61. Proptosis, Pauli. | 77. Crite. |
| 30. Ophthalmia. | 46. Hypopyon. | Palpebrarū tumores. | 78. Chalazion. |
| 31. Epiphora Introdu- | 47. Onyx. i. unguis. | 62. Ptosis. | 79. Poriasis. |
| 32. Chemosis. (stori) | Adnatæ atq; etiā corneæ | 63. Madarosis, seu Mil- | 80. Lithiasis. |
| 33. Xerophthalmia. | communes tumores. | phosis. | 81. Alantifac. |
| 34. Sclerophthalmia. | 48. Hyposphagma. | 64. Pladarotes. | 82. Sude: Auic. |
| 35. Scirrhopthalmia. | 49. Achlys Aeti. | 65. Emphysema. | 83. Sarcosis. |
| Mēbranæ corneæ tiores. | 50. Nephelion Aeti. | 66. Symphysis, siue an- | 84. Lupia. |
| 36. Phlyctæna. | 51. Vla, seu Nepheliō. | cylosis. | 85. Mydesis. |
| 37. Bothrion. | 52. Leucoma. (Pauli. | 67. Ectropion. | 86. Pustula Abèzoaris. |
| 38. Cœloma. | 53. Sebel. | 68. Lagophthalmos. | 87. Scleriasis. |
| 39. Argemon. | 54. Bothor Auic. | 69. Trachoma. | Angulorū oculi tumores. |
| 40. Epicauma. | 55. Hymenepanastasis | 70. Syccosis. | 88. Anchylops. |
| 41. Encauma. | 56. Nyctalopia. | 71. Tylosis. | 89. Aegyllops. |
| 42. Myocephalos. | 57. Anthracosis. | 72. Dasyoma. | 90. Epinyctis. Pliny. |

- Tumor. 28.** PRIMVS Ergo tumorum oculi priorum, qui octauus supra uigesimum ordine dicens Proptosis, uel dus est, à Galeno Græcè $\pi\rho\omicron\tau\omega\sigma\iota\varsigma$. q. d. Latine procidentia uocatur. De hoc nonnulla obi Ecpiemos. ter à nobis præscripta iam sunt. Vbi de staphylomate propositus, ex Galeni catalogo, sermo fuerat. Illuc ergo recurras, Denuoq; illis exactè perpensis, huc reuertaris: & causas morbi consideres. Etenim Definitionum Medicarum Author^s ab iclu uiolento¹ (ut in athleticis certaminibus contingere solet) uel strangulatione, ² cū febre³, uel capitis dolore⁴ fieri proptosis, procidentiam⁵ uel definiuit. Introduciorius⁶ uerò quā causam posuit, ipsam uidelicet inflammationē, qua moti oculi à sede sua procidunt. Sextam ex Paulo⁷ adiungemus (qui $\epsilon\kappa\mu\epsilon\omicron\varsigma\mu\omicron\varsigma$. i. expressionem intereā nuncupat) ex uehementi uidelicet dolore (intelligo oculorum, aliter eadem esset cum quarta.) Atq; ex eodem septimā discas, quoniam. s. mulieribus ex uiolento partu nonnunq; contingit. Octauam ab Aetio⁸ sub $\epsilon\kappa\mu\epsilon\omicron\varsigma\mu\omicron\varsigma$ nomine intelligas. Ex fluxionibus. n. plurimis, quæ acruatim à capite defluerunt (etiam si phlegmone non sit, percipito) exprimi oculum cōtingit. Quāq; Aetius seorsum de proptosi loquens, ⁹ longè peiorem affectū intelligit. ut $\epsilon\kappa\mu\epsilon\omicron\varsigma\mu\omicron\varsigma$, quod est Latine expressio prominentiam quandā ipsi præseferat: haudquaq; tamen procidentiam. Sed $\pi\rho\omicron\tau\omega\sigma\iota\varsigma$, de qua iam antea locutus fuerat, ¹⁰ est quū totus oculus foras procidit. Vt à palpebris contegi non possit: Aliquando etiā usq; ad malas, & supercilia. Atq; hoc maximè contingit ex casu ab alto loco, aut ex plagis iclibus¹¹ uel capitis uiolentis. Prædixerat uerò uel ex ulceribus carbunculosis, ¹² aut internis uasis, ac pelliculis, qbus adhæret oculus ruptis, aut laxatis, ¹³ eiusmodi affectū aliqui euenisse. Præter quas omnes prædictas causas, ab Arabū Principe¹⁴ quatuor alias collegimus, uidelicet septimi oculi cōtinentis musculi paralytim¹⁵ (quam Razes quoq; insinuat¹⁶) uehementem uomitum, ¹⁷ clamoremq; ¹⁸ ac tinesimum. ¹⁹ A quauis autem causa euenierit, tumor quidam in oculis apparet. qui si ex humoribus factus sit, Ad calidos, uel frigidos, pro humoris ipsius efficientis ratione reducetur. Arabicè dicitur $\{almahagiat\}$ Bellunensi²⁰ teste. Antiquus uerò Arabicorū nominum Interpres habet $\{alicod\}$. i. ægritudo, qua oculi mouentur ad exteriora.
- Tumor. 29.** AB Hoc uigesimus nonus tumor sequitur, qui Græcè $\tau\epsilon\rho\alpha\varsigma\iota\varsigma$ dicitur, Latine resonans & perturbatio à uerbo $\tau\epsilon\rho\alpha\tau\omega$ quod est, & perturbo. De qua sic Introduciorius Author ait¹ Taraxis perturbatio uel est, quū oculus leuiter, ac mediocriter commotus tandem rubicundior euadit. Paulus² oculi humiditatem esse definit. & calorem cum rubore præternaturali nō ex corpore, sed ab externa aliqua causa proueniētē. Vt à sole, fumo, puluere, uel oleo. Qua de re occasione ipsius ablata, promptissimè soluitur. Nec aliud Aetius³ insinuat. Auic. f. 30 ophthalmiā nō uerā, et uerā similē, et cōturbationē, seu turbulētiā uocat. Antigor litera habet $\{uacillationē\}$. Quāuis postea & Græco nōie utatur quadatēnūs corrupto. dicēdo $\{trasis\}$ uel ut alia dicit $\{tharachs\}$ Dixitq; $\{t\}$ permutatur, & est in principio permutationis i. ophthalmiā, nōiatur Græcè, aphrihen⁴ Incognitū sedē nomen ē quoniam Græco deriuetur, usq; aded⁵ corruptum est. Græca tamen dictio est $\{t\}$ $\pi\iota\phi\omicron\varsigma$ de quā posterius loquemur. Aliquis ibi tumor calidus, & sanguineus existit, quāq; leuis adhuc, uaporosusq;. Calidus ergo est.
- Tumor. 30.** OPHTHALMIA uerò manifestior tumor, atq; interdum ingens, cū uehementissimo dolore sit. Hūc trigessimus ordine propositum. Membrana oculi adnata phlegmone est: quā proprie Galenus aith⁶ $\{o\phi\theta\alpha\lambda\mu\iota\alpha\}$, & dicit, nōie (ut aliās inquit) sumpto à sede affecto. Etenim $\{o\phi\theta\alpha\lambda\mu\iota\alpha\}$ Græcè idē est, q. Latine $\{oculus\}$, i. uñ $\{ophthalmia\}$ deriuatur, quasi dicat $\{ocula\}$ ris⁷. Non simus quidem omnibus affectus est, quem non Celsus, modo, ac Plinius, sed Rōmāni oēs

ni omnes lippitudinem unanimi cōsensu uocarunt.

- QVOTIES autem unā cum ingenti phlegmone, humoris etiam copia influxerit, Intro: Tumor. 31.
 ductorius Author epiphoram (Latine defluxionis impetum nonnulli conuertunt) proprie no Epiphora.
 minari uoluit. Tamen si (ut ait) commune nomen id est, tum inflammationis magnæ uniuerso
 illata corpori, tum largorum fluorū. Adeo ut de testu quoq; epiphoris Plinius aliquādo me-
 minerit. ^{k lib. 20. ca. 13} qui tamen sexcentis in locis epiphorā eam, quæ in oculis fit, intelligit. At lachryma: ^{prope finem.}
 rū quoq; copia etiam sine phlegmone, aut ullo tumore sub epiphoræ nomenclatura intelligi po-
 test. Propterea nonnulli, pro lachrymarū defluxu immodico, epiphoræ nomen usurparunt. Ni
 ex gemitu, ac tristitia fiat. De morbofis. n. lachrymis nūc sermo est, q; epiphoræ nūcupentur. ^{1 cap. 19. usq;}
 10 Sic Largus, ¹ & Columella, ^m ultra Plinium, epiphoram intellexerunt. Quam Celsus ⁿ pi-
 tuitæ cursum uocat. Nos autē hic ex Introductorio magnā intelligimus phlegmonem, unde pi-
 tuitæ cursus emanet, lachrymæ ue, et fluxionis impetus sit. Quocirca à propriè dicta ophthal-
 mia, lippitudine ue, in eo quod maius est, differt. Quā Celsus his uerbis descripsisse apparet: ^{ad. 27. sepe.}
 „ quū sic ait ^o {Hos igitur interdū inflāmatio occupat, ubi cū tumore in his dolor est, sequiturq; ^{m lib. 7. cap. 17}
 „ pituitæ cursus, nonnunq; copiosior, uel acrior, nonnunq; utraq; parte moderatior.} Nos intelli ^{prope finem.}
 gemus, ubi acrior, copiosiorq; pituitæ cursus sit, epiphoræ noīe tumore qdē hūc, quē trigessimū ^{n lib. 6. cap. 6.}
 primū ordine recensuimus. Idē quoq; apud Galenū ^p Alexandrū, ¹ Paulūq; ^r intelligo E qui- ^{sepe, præsertim.}
 bus rursū liquet, q; Auicēna rectius dixisset {aphrihenz. i. epiphorā uocari, qñ ex ophthalmia ^{sec. p^a. et. 8. et uis.}
 trāstus sit i chemosin: adaucta. s. ophthalmia (q; q; et saluari eius sentētia pōt, largius epiphorā ^{de lib. 7. cap. 7.}
 20 capiēdo. s. pro humorū ad oculos effluxu. Cū taraxis ipsa, præter euidētē effluxū extiterit. ^{sec. p^a. & præ-}
 EST autē χύμωσις, uel (ut alij per. i. scribūt) χύμωσις (Paulo ^s definiente) Cū utraq; pal- ^{sertim. 14.}
 pebræ ex uehementi inflāmatione inuersæ fuerint. Ut uix oculi ab ipsis cōtegantur, et albū ^{o lib. 6. cap. 6.}
 oculi nigro sublimius euaserit, rubrūq; iā redditū plurimā nigri partem occupet. Nec aliud ^{sec. p^a. ante mem.}
 Aetius ¹ esse innuit. Si ergo scribatur per. v. { χύμωσις } formari dicemus à uerbo { χύω } ^{p 8^o. de comp.}
 quod ē { fundo } ut nil aliud sit χύμωσις, q; fusio quædā. q. d. copiosa defluxio, ac sparsio sanz ^{med. secundū loc.}
 guinis in adnata. Hac igitur ratione scribentur Latine { chymosis } Nobis uerò magis arridet, ^{cap. 5.}
 ut scribatur per. i. { χύμωσις } q. d. Latine { hiatulatio } nuper usurpato uocabulo, à similitudi- ^{q lib. 2. cap. p^o.}
 ne hiatula, q; Græcē { χύμη }, à qbusdā etiā ex nostris { chame } nūcupatur. Quarū caro circ- ^{Tumor. 32.}
 cūcirca rubidior existēs, i medio cauā, nigrāq; cōtinet. Quocirca Introductorius Author ^{ait} ^{Chymosis.}
 30 { χύμωσις ex inflāmatione uehementiore utraq; palpebras i exteriorē partē detorquet, ne totū ^{r lib. 3. cap. 22.}
 „ oculū cōtegāt. Propriè uerò χύμωσις dicitur, quū albū utraq; iridis parte inflāmatione afficiz ^{sec. 5.}
 „ tur. Iuxta irim autē cauū, hiatularū similitudine, apparet { Idemq; Definitionū Author ¹ inuit, ^{u ubi sup^a. sec. 6.}
 „ dicēs { chemosis est ambiētis oculū mēbranæ, quod albū quoq; appellatur, affectus, hiatulae carz ^{i lib. 6. cap. 5.}
 ni persimilis } Sic. n. Græcē legēdū { χύμωσις } ubi dicitur i ipresso codice { χύμωσις } ^{χύμωσις.}
 „ ον λινκί σαρκί } quod est { similis albæ carni } Hac igitur rōne scribendū nostris characte- ^{u cap. 15. post}
 ribus { chemosis } Quouis autē modo scribatur, uel proferatur, satis est affectus differentiam ^{medium.}
 pernouisse. Si. n. tadio affectus q; spīa, ophthalmiæ spēs esse, chemosin, epiphorāq; ac taraxin, ^{x post mem. lib.}
 & eam, quam proprio, speciali; rursus nomine, ophthalmiam appellauius, recenscat. Vez
 lut Arabes obseruarunt, nihil interest. q; q; illi tres expresserunt spēs, epiphoran interea sub
 40 ophthalmia propriè dicta, uel chemosi comprehendentes. Taraxis à Serapione ² (quam pri- ^{y lib. 2^o. Brea.}
 mam speciem ophthalmiæ dixit) corruptè { Tarkinisis } dicitur. Secūda species { Noutelinie } ^{cap. p^o.}

Est, quam propriè ophthalmiam ex Galeno uocauimus. Tertia species nominatur ab eo
 z 9. Theorica Hermusilis q. d. chemosis. Tres quoque has ut ophthalmiæ species Hali Abbas 2 declarat.
 cap. 12. et 5. Pra Razes ad Mansorem scribēs, & in Diuisionibus h sub ophthalmiæ, corrupteq; obtalmiæ
 Efficæ. cap. 34. nomine cunctas cōprehendit. In Continente uerò tametsi non aliud uoluerit: speciatim nullo
 a lib. 9. ca. 15. minius Græcorū chemosin ipse Arabicè guardinigi appellat, et Rosarini. Tresq; Ioāniti
 b cap. 19. auctoritate species aliquando 4 declarat. Arabum deniq; Princeps noster ultimam speciem
 c lib. 2. Cōt. ca. ex Græcis hymosin corrupteq; in quibusdam codicibus scinosin appellari ait. subdens
 p^o. et. 2. littera D. Et apud nos dicitur alquardenis; secundū nouam autē litteram aluardinegi. De quo tas
 d Ibidē. cap. 2. men uocabulo pauca quædā à nobis scripta s. legas, ubi de encanthide sermocinati sumus.
 D. circa me^m. Siue autem tres, siue quatuor ophthalmiæ species ponantur, quāq; ex omnibus humoribus
 e 3^a fen. 3ⁱ. tr. gigni (Auicenna docente) cōtingit, quia tamen inclusi putrescunt, calefiuntq; ut phlegmoni
 p^o. cap. 6. post Siue autem tres, siue quatuor ophthalmiæ species ponantur, quāq; ex omnibus humoribus
 principia. gigni (Auicenna docente) cōtingit, quia tamen inclusi putrescunt, calefiuntq; ut phlegmoni
 f supra fo. 284. nen in oculis inducant. Idcirco ad calidas referēdi tumores sunt. Præsertim quia rarissime ab
 in medio et idē. alio, q; à sanguine biliofo, uel sanguinea bili gignuntur. In synonymis continentis Rasis legimus
 mus & fartis i. i. ophthalmia de motu peētoris, & pulmonis. Sed alia contemplanur.

Tumor. 33. A B His sequitur trigessimus tertius tumor, qui ξηροφθαλμία q. d. Arida lippitudo dicitur.
 Xerophthalmia. Haud n. obstat, quoniam Celsus non tumere oculos ait. Verum nanq; esse admittimus eui
 mia. dentem tumorem non habere oculos. Intrinsecus tamen aliquis tumor est, humoris in p^{er}fora
 a lib. 6. cap. 6. tione, Vnde & rubedo, & grauitas succedit, atq; etiam dolor. Introducōrius. Author & inter
 sec. 29. oculi totius affectus (nō temerē, ut mihi uidetur) annumerat. Ita etiā Paulus, h. Præcipuē autē
 g ca. 15. i. p^{ro}. adnatæ esse, ueluti præscriptos, determinamus. Nec aliud uidetur i Aetius uelle, qui commu
 h libro. 3. cap. 3. nem oculis, ac palpebris posuit. Potes enim prius oculorum morbus esse, interim uerò &
 sec. 9. i lib. 7. cap. 2. ipsis palpebris communicari. Arabum uerò Princeps inter palpebrarum (ut uidebimus)
 k ubi sup^a. post morbos recenset. Sed morbi definitionem intelligamus. Inquit ergo Introducōrius. k & xero
 principia. rophthalmia est cum anguli, ulcerosi, exasperati, & pruriginosi sunt, palpebræ rubent, lac
 Obiectio. chryma salsa & nitrosa profluit. & Ex qua quidem admissa definitione non arida penēs hunc
 l ubi sup^a sec. 9. Authorem diceretur. q. s. nihil penitus inde effluat, quēadmodū Paulus uoluit, Aetiusq; m
 m lib. 7. ca. 75. (licet non expresserit) insinuare tamen uidetur. Sed quoniam quod defluit arefactiuum est,
 n lib. 9. Theori quia nitrosum, salsumq; ac per hoc pruriginis inductiuum. Introducōrio Hali Abbas 2 adhæ
 ca cap. 13. post rere uidetur, qui pruriginem uocat. Arabum uerò Princeps, o oculi siccitatem nūcupans, Pau
 prin^a et uide. 5. lo magis assentit, quoniam. s. nulla inde materia defluat. Id quod sæpenuerò propter mate
 Pract. cap. 37. rie grossitiem euenire ait: nil. s. humoris effluere. N O S autem Maxima ex parte sic
 o 3^a. 3ⁱ. tr. 3. esse, uti Paulus ait, nōnunq; uerò cū Introducōrio salsas, acresq; et nitrosas emanare lachry
 ca. 5. mas posse, aliquando affirmauimus. Itaq; Authores quodammodo conciliauimus. Tumoremq;
 Rñsio p^a. ibi aliquem inesse adiunximus, ob infertos humores, qui ruborem, pruritum, ulcera, & aspe
 2^a. ritatem efficiunt. Citra durtiem tamen esse Aetius inquit. Verum si exquisitius singula pers
 librarimus, ut nos postea obseruauimus, Introducōrij Definitionem, ipsius p^{er}serophthalmiæ
 esse, à Paulo, magisq; ab Aetio declaratam inueniemus, de qua tamen p^{er}serophthalmia postea
 p 9. Theor. cap. rius loquemur. Attamen restat mox considerandum, quoniam Hali Abbas seorsim, de oculi
 13. post prin^a. et 5. pract. ca. 37. prurigine, quam diximus, & de alia l loquitur, quam inter palpebrarum morbos recenset,
 g 9. Theor. ca. ac scabiem quoq; appellat, in quatuor (ut uidebimus) species distinguens. Vel ergo Intro
 13. post mem. et ductōrij Codicem deprauatum esse existimandum, & p^{er}serophthalmiam xerophthalmiæ loq
 5. Pract. ca. 48.

- componendū est. tuncq; xerophthalmia iam definitio deerit. Hoc interim annotantibus, quoniā
 2^o. s. penēs Introductorij Authore decreta differūt psorophthalmia, & psoriasis. Illam oculi
 affectus scabies ue est, hæc uerò ipsius palpebrarum coronæ. Vel secundo Authorem illum
 3^o. condemnare oportet, Pauloq; Aetio, & Auicennæ inherere nil inde profluere determinan-
 tibus. Vel quod magis pium est (uti iam præactum est) sic inuicem conciliare. Vt magna s.
 ex parte aridi, nihilq; manantes oculi sint, Aliquando tamē, ob ardoris, pruritusq; uim lachry-
 mæ moueantur, quæ nihilominus pauciores sint, q̄ in ipsa psorophthalmia. Quod si nil inde
 emanet, adhuc tamen in tumorum catalogo reponimus, tum rōne humoris nitrosi pruriginem
 inducentis copia, tum ratione pruritus, quoniam assidua fricatione oculos, palpebrasq; tumere
 10^o necessum est. Ad calidos uerò potius referrem.

- NBC Minus inter oculi affectus, atq; huius præsertim adnatæ, alius quoq; à Paulo, "Intro- Tumor. 34^o.
 ductorijq; Authore descriptus tumor est, qui σκληροφθαλμία q. d. dura lippitudo nuncu- Sclerophthalmia
 patur. quē tumorem ordine quartum & trigessimum proposuimus. Quāq; Aetius cōmū- mia
 nem oculo & palpebræ posuit. Cuius definitionem à Demostene præscriptam, ut reliquis co- r lib. 3. cap. 21.
 11^o pioſiore enarrabimus. Inquit ergo ex Demostene Aetius & Sclerophthalmia est, quū pal- sec 9.
 12^o pebræ duriores fuerint, & ipse oculus durior, & ad motum pigrior fuerit, dolensq; acru- s lib. 7. cap. 2.
 13^o bicundus. Et præsertim quū post surrectionem ex somno, palpebræ difficulter aperiri pos- & 74.
 14^o sunt, & nulla humiditas euacuatur. Gramæ uerò in angulis consiſtunt paruæ, contorta sub-
 15^o aridæ. Et quū ipsas palpebras euertere uolumus, non faciliè à nobis eueri possunt, ob duriz-
 20^o tiam. Hanc ferè definitionem Hali Abbas¹ transcripsit, qui duritiem in oculo uocat. Nec d f 9. Theor. cap.
 fert Razes, duritiem quoq; appellans, ac deniq; Auicenna, x qui & Gesse & Arabice nuncu- 13 post prin. et
 pat. Qui uerò cum Raze lippitudinem aliquando aridam, grossamq; inesse dicentes, non aliud 3. Pract. ca. 36.
 lippitudinis nomine intelligunt, q̄ prædictas gramas, hinc quorumq; lemas. Flaud enim, ut ex u lib. 2. Contin.
 Romanis prædiximus, ophthalmiam. Huius origo esse solet, post ophthalmiam, uel chemosi- cap. 2. lipp. 1. p. 3.
 uel epiphoram, quoties, uel nimium congelatæ, uel acrioribus medicamentis assiccatae ab ins- cap. 5.
 consultis medicis fuerint. Quauis ergo nonnihil adhuc calidi particeps sit: ad frigidum nibi-
 lominus uergit. Cū glutinosa, atq; siccata pituita, uel melancholicus humor dominetur. Eoq; ma-
 gis aduenire huiusmodi tumor cōsueuit, quō durior, grossiorq; ophthalmiæ humor extiterit.

INTRODUCTORIUS. Autem liber σ κ ε ρ ω σ ι, ut à sclerophthalmia diuersum as- Tumor. 35^o.

- 30^o se Tum adiunxit, tametsi duritiem nomen id non minus q̄ σκληροσιν significat. Nos ergo Scirrhopthal-
 ex eius placitis hunc tumorem ordine trigessimum quintum addidimus, & quoniā in oculis etiā mia.
 aduenit, quō ab aliorum membrorū duritie differat, scirrhopthalmian appellauimus. Oriz
 11^o tur autem (ut ait) ex inflammationis diuturnæ uehementia, carne increſcente, & subliuida
 A Quo statim reliquos percurramus affectus ipsi quidem mēbrana dictæ corneæ proprios. Tumor. 36^o.
 De quibus quidem omnibus iam, tametsi obiter, Nihilominus tamen plurimū quod ad propo- usq; ad. 47^m.
 situm spectat absoluius. Vbi de pterygio, sexagesimo quidem, ex Galeni catalogo, atq; etiā
 de staphylomate, sexagesimoprimum & hoc tumore, sermonem habuimus. De hypopyo qdem,
 & onyche, unguē ue, tumoribus proculdubio calidis, in sermone de pterygio² satis superq; fol 284. 30.
 præscriptum est. De reliquis uerò omnibus, ut phlyctænis, quas Aui. ueſicas uocat, Bothrio, et sequētibz.
 40^o celomate, Argemo, Epicaumate, Encaumate, Myocephalo, Malo, & Clauo utraq; calidis
 quidem et ys, quatenus erodentem, siue nitrosam, putridamq; pituitam siue b. l. m., uel admistū
 humorem

humorem in tunicis inaspersum, ut mali causam habent: In sermone, quem uberrimè de staphy-
 lomate habuimus, determinatum iam est. Quam ob rem hic repetere superpondium foret. Il-
 luc ergo repetas. Quibus euestigio intellectis, mox deinde huc reuertare. Atq; illis paucula
 superaddas. Etenim in synonymis Rasis legimus {colcotana, idest pustula, in cornea.} credo
 autem aliud nolle, q̄ id, quod apertius Arabum Princeps² de sanie sub cornea loquens (quam
 nos ex Græcis ὀνίχα. i. unguem, & ὀνίχων. q. d. suppurationem uocari diximus) ait {Et
 quando corroditur cum ea pars. s. cornea, nominatur calcatthaia} uetustior autem litera habet
 {calcataren} aliqui dicunt {calcatron} usq; adeò Arabicorum nominum corruptio, uariuq;
 apud uarios illius Idiomatis Authores usus est. Rursusq; in iisdem synonymis Serapionis le-
 gimus {alfuchoach. i. ungula oculi.} Pluraq; in his alia. Quæ, ne in Barbarorum barathrū
 ceciderimus, omisisse certum est.

Tumor. 48.

usq; ad. 53^m.

Hyposphag-

ma.

Anisum.

Ammyun.

Anatotira.

Anosikima.

a sup. fo. 111. 32

b 9 Theoricæ

c 3. post prin^a.

et. 5. Præf. c. 39.

e p. 80. cap. 26.

f a. Contin. c. 20.

g litera. kk.

h. i. u. u. u. u.

Leucoma qd?

Nephelion

Pauli.

m litera. ge.

n fo. 295. 296.

o 297.

p 24. Cont. col.

q. rub. secūda.

r lib. 3. cap. 22.

s. sec. 25.

t post me^m.

u ca. 15. uersus

finem.

v lib. 7. cap. 37.

w in prin^o. et uide

x usq; ad. 40^m.

y caput.

z sup. fo. 296

aa lib. 7. cap. 25.

ITAQUE ad tumores adnatæ, corneæq; communes accedamus. à quadragesimo octauo
 exorsi, hyposphagmate inq;. Pro cuius iterum enucleatione, quæ à nobis antea obiter scripta
 sunt, perpedito. Vbi. s. ecchymoseos specie secundâ explanauimus. Halia Abbas⁶ {Tarsum
 nominat. Abenzoar^c uerò {tassam.} In synonymis Contin. Rasis legimus {anisum} & paulò
 post {ammyum idest sanguis ligatus in cornea.} Sed primū superficialiùs, secundum profun-
 diùs consistere significat. Item paulò post ibidem scribitur {anatotira. i. tar. fa. i. sanguis li-
 gatus in oculis} Ibidemq; {anosikima} idem morbus appellatur. Alibi uerò^k {sanguine mor-
 tificatū in oculis} & {maculā^m} uocat. DE Pauli autem Nephelio, atq; Aetij tam Nephe-
 lio, q̄ Achly, hoc est, caligine, prædictum quoq; est, in eo sermone, in quo de staphylomate per-
 tractabamus. Nunc uerò sat est annotasse, quoniam Arabicè {ketamon} dicitur ab Antiquo
 Arabicorū nominum Auicennæ interprete, quod est in oculo quasi nubes. Atq; in synonymi-
 mis Razes^e ait {Agildis est ulcus in mēbro corneæ: Cuius color est, ut fumus} credo q̄ cor-
 ruptum sit nomē {achlys} quod est Latine {fuligo.} Quod autē λευκωμα dictum est. q. d. La-
 tine {albugo} cicatricis quædam species est, profundius consistens, q̄ altera species, quæ gene-
 ris nomine ὀνίχ. i. cicatricem, speciatim, uerò (Paulo f. docente) νεφέλιον, hoc est, nubes-
 culam nonnulli appellant. Quocirca Definitionum Author^g ait {leucoma albugo^{ue}, cicatrix
 est, crassa & profunda, ulceri inducitur} Introductorius uerò liber^b distinctius cicatricem
 (quam Paulus Nephelion, idest nubeculam uocabat) & leucoma siue albuginem definit, sic
 dicens {cicatrix est, ubi nigro oculi ex alto ulcere membranæ crassities superuenit, & color
 albior apparet: Accidit quoq; albæ membranæ dictæ, sed non perspicitur. Albugo autem nihil
 à uocata cicatrice differt: Nisi q̄ ex ulcere maior cicatrix, simul & crassior in iride nasci-
 tur, quam leucoma, hoc est, albuginem uocant.} Cur uerò albidior cicatrix fiat, Aetiusⁱ de-
 clarat, sic dicens {omnes cicatrices in nigro oculi albæ apparent. Densata. n. corniformi tuni-
 ca, subiectus ipsi cæruleus color non translucet.} A quo quidem Aetio discas, generis nomi-
 ne uocari primam speciem. s. cicatricem, haud quidem Nephelion, uti Paulus fecit. Etenim
 id nomen (ut aliàs^k declarauimus) alteri morbo Aetius dedicarat, unā cum Introductorij,
 ac Definitionū Authoribus, uidelicet cuidam superficiali in cornea factæ ulcerationis spe-
 cie. Quam ob causam & nos in catalogo addidimus, dicentes {Nephelion Pauli} & {Nephe-
 lion Aetij} q̄q; id nō Aetij modo, sed Introductorij quoq; ac Definitionū Authoris est. Maxi-
 mē tamen supereminentes (hoc est supra tunicam, calli cuiusdam instar, eleuatæ) cicatrices
 albescunt

„ albescunt(uti perbellè Aetius idem ait)^m planæ autem, & tunicæ æquales, minùs sint albæ. ^{m lib. 7. ca. 37.}
 Cuiusmodi uerò sunt ad æquidistantiam non pervenerunt, modò de cæulis sunt, ut ait Cuius ^{in prin^o.}

bimus, ipsum exactius intelliges.

Tumor. 55. ALIVM Ergo expediamus, quem nos ὑμενεπαύσασιν uocauimus. q. d. (nouis effectus Hymenepana uocabulis) Latine Membraneruptionem Galenus & duobus distinctis nominibus ὑμενῶν stasis. ἡ παύσασιν uocauit, hoc est membranarum eruptionem, siue extuberantiam. Quæ quidem, ob humorum quandam in membranarum substantiam insersionem, ac sub ipsis quoque factam aceruptionem, usque adeo ut extuberent, succedit. quisquis ille humor fuerit. Cornarius & pellicularum eminentias Latine interpretatur. Verisimilius autem est flatuosos spiritus esse, qui recludantur. Quæ de re ad emphysemata illorum referendus tumor sit.

Tumor. 56. SED Ne indecens quoque est, in tumorum catalogo recensere nyctalopiam. Cum maximè ob uisui spiritus crassitudinem, itaque reliquorum oculi humorum, ac tunicarum (Aetio docete) fiat. **Nyctalopia.** Præcipueque corneæ. Quæ tunicarum crassitudo non sit, ni crassis quidem succis infartæ illæ sint, quandoque & ob capitis imbecillitatem fieri potest. Verum quia ad hanc quoque imbecillitatem crudorum humorum, crassiorumque copia sequitur. Idcirco difficillimum uidetur huiusmodi affectum absque tumore fieri. Galenus absque ulla morbi definitione ueluti per se notum affectum superponens, eum curat. Qui tamen alibi ab exteriori symptomate, atque interiore nomen impositum esse innuit. Ab hoc quidem quia uisus actionis læsio in diminutione est. ab illo uero, quod niam, noctu minimè hos uidere apparet, qui huiusmodi morbum patiuntur. Etenim prout non Aetius modò, sed Paulus quoque, ac Arabum Princeps comprobant, Die quidem homo cernit, Sole dein occiduo, obscurius. Nocte uero demum penitus nihil uidet. Libro tamen de linguarum Hippocratis expositione ait & Nyctalopes per noctem non uidentes & Alexander una cum Galeno de nocturna duntaxat cæcitate meminit. sub quo tamen uerbo iam reliqua comprehenduntur. Nam si nocturna cæcitas esse dicitur: statim concipi necessum est interdum uisum adesse. Aliter absolute cæcitas diceretur, non solum quæ noctu adueniat. Quod si quidem interdum cernendi facultas adest, noctu autem oboletur, quamprimum ratio dicat, quò magis occidente Sole deest lumen, eò magis & cernendi uim diminui. Quam ob rem occidente Sole obscurius cernunt quicunque talem affectum patiuntur. Hi uero Nyctalopes dicuntur Latine lusciosi, siue luscitiosi, & lusciti atque in singulari numero Nyctalops. Ipse autem affectus dicitur nyctalopia, Latine luscio. Quandoque Græcis omnibus medicis Nyctalops in communi usu est. Vnde Plinius ait & sanguine hircino sanari lusciosos putant. Nyctalopas appellant Græci etc. Componitur autem nomen id est νυκταλωπ ex tribus dictionibus, scilicet νύξ, quod est nox, & ἄλω, quod est idem, quod ἄλυνω. id est decipio, impono, seduco, atque etiam erro, & ὥψ, uel ὥψω, id est uisus. Quoniam si nocte uisus decipit, quæ deest, uel errans est, hominèque uidere sperantem decipit. Dicitur ergo νυκταλωπ, παρὰ τὸ ἐν τῇ νυκτὶ ἄλυνθαι, ὅ ἐστι ἄλυνθαι τὸ ὥψω, quod est ex eo quod in nocte imponit, hoc est, decipit uisum. Vel potius, quoniam ἄλω Græcè idem est, quod uideo, addita ἄλ, unde contrahitur & ἄλω, hoc est & non uideo, hinc fit ἄλαος, qui, si non uidet. Vnde Galenus libro de linguarum Hippocratis expositione ait & νυκταλωπ, ὁ τῆς νυκτὸς ἄλαος, hoc est & Nyctalopes, siue luscitiosi, qui nocte non uident. Ad hunc sensum Plinius quoque accepit, Qui ait & caprinum iecur si uescatur, restituit uespertinam aciem his, quos nyctalopas uocant. Qui eodem quoque nomine quædam Plantam alibi uocat, quoniam felore quinguo noctibus luceat. Celsus imbecillitatem oculorum nominat, ex qua quidam interdum

satis,

- fatis noctū nihil cernūt. Definitionum uerò Medicarū Author oppositum de nyctalopis morbi significatione sensit. Videlicet hos interdū nihil, noctū uerò naturaliter cernere. Cuius quidem uerba correxisse promptissimum, transposita negatione, fuerat. Legēdo. s. $\xi \mu \epsilon \rho \alpha \varsigma \mu \epsilon \nu$ „ $\delta \epsilon \alpha \nu$, $\nu \nu \kappa \tau \delta \varsigma \delta \epsilon \mu \eta \beta \lambda \epsilon \pi \alpha \nu$ quod est ξ die quidē uidere, nocte autem non conspiciere ξ Sed illius fortassē Authoris hæc intentio fuit. Vnde Definitionū Author utraq; fortassis opinio- nes aduertens, utrunq; hoc nomine significari censuit. Sic scribens ξ Nyctalopes uocantur, „ qui die uident obtusius, sole occiduo acrius, nocte magis adhuc. Vel contrā, die parū, uespe- „ re autem, uel nocte, prorsus nihil. ξ Tuū uerò est si Authorē secundi prorrheticorū sic quoq; intelligere uelis. ut dicat affirmatiuē, quia. s. in nocte uideant) uel negationem adiungere: ut nō
- 10 Celsus modo, et Galenus intellexisse apparēt, sed ipsa sermonis series ostēdere uidetur. Nos autē neglectis huiusmodi adulterinis libris, Galeno, Paulo, Alexandro, Aetio cæterisq; tam Græcis, q; Latinis, atq; Arabibus etiā adhærentes nyctalopē pro uespertina cæcitāte perpetim intelligemus. Quā Serapion^s Arabicē ξ subrucati^z nuncupat. Hali Abbas^t ξ sebequera^z ξ tenebrositatem^z uocat. Razes aliquando Græco utitur nomine.^u Aliquando^x autem Arabi- ca dictione ξ Asche^z utrunq; contrariū affectum intelligens, Itemq; alios, quando. s. de longe uidet, ξ nō de prope, ξ econtrā. Auicēna autem, qui primum, quem præ manibus habemus, Nyctalopen uocauit.^y Eius tamen oppositum, ut. s. in die non uideat, noctū autem conspiciat, proprio idiomate ξ algiehar^z corruptē autem in antiqua litera ξ alihar^z nominat. frigidus affe- ctus est, quem uestigamus, ξ uel melancholicus, uel phlegmaticus, aut mistus.
- 20 AB Hoc alium contemplare tumorē, quem ordine quinquagesimum septimū proposuimus. quiq; nō modò corneæ adnasci solet, ac. adnatæ membranæ communicari, sed ipsis etiam pal- pebris, Græcè $\alpha \nu \theta \rho \alpha \kappa \omega \varsigma$: dicitur. q. d. carbunculatio. Celsus carbunculum uocat. Sic dicēs^z „ ξ solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunq; in ipsis oculis, nonnunq; in palpe- „ bris. Et in his ipsis. modò ab interiore, modò ab exteriorē. ξ Nos multa de anthrace generatim antea^a locuti sumus. Ad quem locum reuertare. Quemadmodū etiam ea, quæ de cæcro (quod Græci $\nu \alpha \rho \kappa \iota \nu \omega \mu \alpha$ uocant) generatim dicta iam sunt, ^b repetere potes. Deinde quæ à Paulo^c dicuntur intellige. Vberius autem, ξ ita ut à nullo exquisitiū referantur, quæ de anthraci- bus, carbūculis uē Aetius^d ex Seuero, ξ de canceratis deinde oculorum ulceribus^e scripta nobis reliquit. Qua de re non est, ut à nobis hic referantur. sed ab ipsis discas. Auic. de can- „ cro locutus est f (quem hic ordine quinquagesimum octauum statuimus) atq; etiam Hali Abs- bas.^g Anthracosin uerò sub hulcerū fortē spēbus, aut sub cæcro hi Arabes intellexerūt.
- SVPBREST Ergo, ut uniformis tunicæ affectus consideremus. inter quos est ille, quē or- dine quinquagesimum nonum posuimus. diciturq; Græcè $\xi \sigma \upsilon \chi \upsilon \sigma \iota \varsigma$ q. d. Lannē ξ confusio^z Hic est, quem Auicenna ξ bothor in oculo^z uocauit. q. d. (uti prædictū iā in declaratione quin- quagesimi quarti est) propriam Arabs uocē ignorasse ostendit. Galenus,^h ac Paulusⁱ absq; ulla morbi definitione curāt. Nisi q Galenus addit ξ ubi multa sanguinis effusio fit in ξ stare^j Paulus uerò confusiones ex icū aduenire insinuat. Quid nam autem sit, non explanant. In- „ troductorius uerò Author^k inquit ξ confusio autem est, quoties humores oculorum suo loco non consistunt, proprium ordinem seruantes, sed perturbati sunt. ξ quod uerbum $\xi \tau \epsilon \tau \alpha \rho \alpha \gamma$ „ $\mu \epsilon \nu \alpha$ quod nos uertimus ξ perturbati sunt ξ interpres uertit ξ hūc, illucq; feruntur ξ Apertius „ multo Definitionū Medicarum Author^l ait ξ synchysis, confusio^u uē est ruptio tunicarū, quæ

q post mem.

r cap. 15. circa finem.

b circa finē lib

s 20. Bre. ca. 10

t 9 Theor. cap.

13 uersus finem

et. 5. Pract. c. 61.

u 9. ad Māforē

cap. 28.

x 2. Cōt. cap. 2.

litera. BB. etiam

cap. 4.

y 3^a. 3^l. tr. 4.

cap. 5.

z lib. 6. cap. 6.

sec. 10.

a supra. fol. 85.

86.

Tumor. 57. 58

Anthracosis.

b supra. fol. 87.

et sequentibus.

c lib. 3. cap. 22.

sec. 29.

d lib. 7. cap. 30.

e ibidē cap. 31.

f 3^a. 3^l. tr. 2.

cap. 12.

g 9. Theoricæ

cap. 13. de passio-

nibus quæ in cor-

nea in prin^o. ξ

5 Pract. ca. 46

Tumor. 59. 60

Synchysis.

h 4^o. de comp.

med. secūda loc.

ca. 5. sec. 6. ante

mem. ubi Scribo

nij largi compos-

itionē refert.

i lib. 3. cap. 22.

prope finem.

k cap. 15. circa

finem.

l post mem. lib.

in profundo sunt, aliquando quidem ex percussu, interdū uerò spontina cū profusione humorum, & pupillæ alteratione. } E quibus uerbis huius Authoris aliquo modo tumore esse elicitur, atq; pupillæ dilatationē ob huiusmodi humorū profusionem fieri. Diligentius uerò, atq; apertius hunc Aetius^m affectum nobis enucleat, dicēs & confusio oculi plerunq; ad uehementē plagas consequitur. Sed et ex uiformis tunicæ inflammatione contingit, ruptis in ipsa uasis. Pupilla uerò colore turbida fit, & aut maior, aut minor seipsa euadit. } Sic ergo tumor nec cessariò fuerit, dum ex inflammatione uueæ confusio fit. à qua nihilominus phlegmone penitus absolui nequit, quotiēs ex uehementi percussione conturbatio humorum fit. Hanc ex tali phlegmone factā synchysim bene innuit Auic.ⁿ quando de pupillæ dilatatione loquitur, quā ipse & alintisar } Arabicè nominat, Græci uerò & μυσφίσις } appellant. Nos tumorem numero sexagesimum posuimus. Ita etiā & Hali Abbas^o ex apostemate in uuea orto fieri firamini dilatationē, aut coartationē posuit. Quomodo autem uel maior, uel minor aliquando pupilla fiat, alibi discutiendū erit. Nūc uerò sat superq; fuerit synchysim, ac mydriasim quoq; maiore ex parte in tumorum catalogo, causarum ratione, reponendas esse. Mydriascos causas à Paulo, & Aetioⁱ perlegas. Ambo. n. ob humorum copiam affusam, acruatamq; fieri aiūt. Quāq; nō me latet aliquando, licet rariū, ob membranæ uueæ siccitatem, Galeniⁱ dogmate fieri posse. de qua tamen ut dixi aliās sermo fiet. Razes aliquādoⁱ dilatationē pupillæ habet, Aliquandoⁱ autem Arabicū nomen & alintisarⁱ in eius scriptis inuentum est. AbenZoarⁿ & synchysim, et Mydriasim sub pupillæ dilatatione cōprehēdisse uidetur, sicut alij quoq; Arabes fecerunt. In synonymis Serapionis legimus & alurafar } Alij habent & alustasat } .i. pupillæ dilatatio. Prius uerò q; alia consideres, aduerte hic q; idem non est synchysis, & hypochyma, siue hypochysis, latine suffusio. Hæc. n. est, quā uulgus catarractam uocat, & aliqui guttam serenā, et aquā descendētē ad oculū dicunt alij. Cuius principium uocat imaginationē Arabicè in synonymis cōtinentis Rasis dicitur & Anusmuma } de qua tñ suffusione aliās loquemur.

Tumor. 61. TUMOR sexagesimus primus, uidelicet Pauli proptosis, declaratus iam à nobis est, supra in sermone, quem de staphylomate scripsimus. Est. n. genus quoddam ad myocephalon, malum, clauumq; et staphyloma. ueluti uberrimè ostendimus. Communes affectus hi corneæ & uueæ sunt. Quæ de re ad alia pertransire occasio præceps accelerat. Itaq; tumores in palpebris obortos perpendimus. Inter quos primum occurrit, quā Græci & πύλωσις } uocant q. d. Latine deplumationem. Etenim πύλωσις (unde πύλωσις deriuatur) apud Græcos idem significat, quod apud nos & pluma } .s. pēna mollis: cui palpebrarū pilos assimilarunt. Vnde & πύλωσις etiam dicuntur, quicunq; morbum hunc patiuntur. Inter morbos à Galeno^o cōnumēratur, in quibus aliqua utilis pars deperdita est. Vt in numero morbus sit diminuto. Sed ultra pilorum defluuium, crassities quædam palpebris inest, callosa, & rubicunda, quemadmodū Paulus^s ait. Vt composita sit affectio (Aetio^o docente) ex madarosi, et sclerophthalmia. Nec semper inesse pilorū casum innuit Paulus, at sæpè. Quo circa prima ratione callosus quidā tumor est. Introductorius uerò Author^o aliter ptilosin, q; Paulus, atq; Aetius, definit. Etenim sic ait & ptilosis est, cū alij quidem subnascuntur, Naturales autem collapsi, fractiq; stimulant, ac pungunt. } Eo modo, quo in dentium regeneratione pueris contingere solet. Inde igitur m tus est Cornarius, qui præter Galeni intentionē, ubi Græcè ille scripsitⁱ prius & πύλωσις } quod est & ad ptilosi affectos } Hic Lannè traduxit & Ad glabras, simulq; nascentes, alias

m lib. 7. ca. 56

n 3^a. 3ⁱ. tr. 4.
cap. 12.

Alintisar.

Mydriasim.

o 2. Theoricæ.
cap. 13. de passionibus uueæ. i. prin^o et 5. Prac
cap. 47.p lib. 3. cap. 23.
sec. 30.

q lib. 7. cap. 52.

r p^o de sympt.
caus. cap. 2.s ut 9. ad Mūs
forē. cap. 29.t ut lib. Diuif.
cap. 34. & uidepro uroq; . 3^o.

Cōt c. 3. lit. PP.

u lib. p^o. trac. 8.
cap. 17.

Tumor. 61.

Proptosis Pauli.

x supra. folio.
297. et sequen-
tibus.

Tumor. 62.

Ptilosis.

y 14. meth. ca.
17. in prin^o. &
in fine.z lib. 3. ca. 22.
sec. 17.

a lib. 7. cap. 78.

b cap. 15. ante
medium.Cōtra Corn^m.c 4^o. de comp.
med secundū. loc.

cap. 8.

40

alias

- alias palpebras, ptilos Græcis dictos; rursumque subdit Galenus: $\pi\tau\iota\lambda\omega\varsigma$ quod est in his aut, qui ptiles affecti sunt; Hic Latine interpretatus est etiam in his, qui glabras, si mulque nascentes alias palpebras habent; Quæ uerba cum Galeni non sint: addenda quidem eius seriei non erant. Ne his, quibus Græca lectio ignota est, blaterandi occasio sit. Etenim Nota contra Galenū quasi Latine loquentem, non Cornarium, aut alium quemuis interpretem fimbrias multorum Inter dilatantē audire optamus Propriam uerò phantasiam alibi seorsum huiusmodi Interpreter, quibusdam ueluti scholijs, ostendere potuerant. Sed quamprimū à nobis scripta hæc sunt, Vltimam Cornarij correctionem conspicerē occurrit. Vbi uerba hæc ab eo, non ampliùs ex Introductorij, sed Pauli, atque insimul Aetij definitione, sic uersa inuenimus; Ad eos, qui crassas, 10 callosas, ac rubras, glabrasque, et pilis nudatas genas habent, ptilos Græcis dictos; Rursumque alia uerba statim sic; In his, qui crassas, callosas, ac rubras, et glabras palpebras, siue genas habent. etc. Quæ adhuc expōnē, ex quouis Authore excepta sit, immo etiā si ex ipsius Galeni alibi scripto dogmate, nō laudo. Fides. n. interpretis nō est, qui tot tantaque aceruat. Tutius ergo est, uel Græcū nomen usurpare, uel aliud potius nouū nomen Græco respondens (Aristotelis dicitur uenia) d. in Prædicas effingere, uti nos fecimus ptilosim; deplumationē, et ptilos; uerò de plumatos appellantes. Quod mētis cap. de res at glabrities necessariò ptiles non insit, Galenus quoque uidetur Paulo fauere: quū ait $\pi\tau\iota\lambda\omega\varsigma$ latius. et mem.
- 20 $\mu\iota\lambda\phi\omega\varsigma$ uocat, quasi dicat, pilorum palpebrarū defluuiū patientes. Est enim $\mu\iota\lambda\phi\omega\varsigma$ (ut alium quoque numero sexagesimum tertium Tumorem simul absoluerimus) communi omnium, præsertimque Pauli uoce, pilorum palpebrarum defluuium, quod etiam à Græcis $\mu\iota\lambda\phi\omega\varsigma$ Milphosis, seu 2 Madarosis. dicitur, à uerbo $\mu\alpha\delta\alpha\iota\omega$ quod est caluius sum, caluesco, glabresco. Vnde et $\mu\alpha\delta\alpha\iota\omega$ e lib. 2. cap. 22. i. caluus etiā deriuatur. Inde et madarosis, et madisis pilorū quidē defluuiū, ex acri fluxione obortū (uti Aetius s. inquit.) E quibus omnibus liquet, eā potius literam cōmendandā f. lib. 7. cap. 78. esse libri Defini. Medic. Auth. 8 in qua habet Milphosis est defluuiū palpebrarū, ex acerrimo defluxu; quā alia litera, ubi habet ptilosim; Serap. h. casus pilorū palpebrarū duas spēs facit. quarū prima est hæc milphosis, seu madarosis nūc dicta, quā uel acuta humiditate, uel alopecia fieri ait. Secunda uerò est, quā nos hic primo loco declarauimus, et ptilosim appellauimus. Qui et rubedine, ac dolore perseverante, pilos ibi gigni impossibile ait. Razes primā à nobis dictam speciem isilac; et isulach; uocat; Secundam uerò scilicet milphosim ipse ismorbum uulpinum; quasi dicat alopeciam nominat. Abenzoar casum pilorum palpebrarū habet. Princeps autem Medicorum Arabum, priorem (quā nos ptilosim uocauimus) Arabice isilac; etiam appellat. Addens Et est Græcè, anufeme, et alia litera habet abufimi; alia uerò asufimi; aliaque tandem abirfema; Qui et ulcerationem extremarum partium, unde pili cadunt, fieri adiūxit. Plurimumque ophthalmie succedere, atque inde oculi corruptionem fecit qui uoluit. Distingues præterea in recētē, et antiquā. De milphosi uerò seorsum ab hac loquitur, sub noīe casus pilorū; Hali Abbas denique palpebrarū casum; utranque spēm appellat. Tum. 64.
- SED Alium intelligamus, quem ordine sexagesimum quartum statuimus Græcè $\mu\alpha\delta\alpha\iota\omega$ Pladarotes. 40 $\rho\acute{o}\tau\eta\varsigma$ nuncupatur, quasi dicat flacciditas. De hac Introductorius loquitur. Sic dicens; Pladarotes est, mollia ueluti corpora, uetusta, et maxime decolora, palpebrarū parte interna, nō dū aspredinē habentia. Propterea $\mu\alpha\delta\alpha\iota\omega\ \rho\acute{o}\tau\eta\varsigma$ à Græcis uocatur. Dicit aut sic quoniam apud

q. 2^o. Cont. cap. 2. liter. 11. r. 3^a. 3^a. fac. 3. cap. 20. Græcos $\omega\lambda\alpha\delta\alpha\pi\omega\nu$, nō humens simpliciter significat, sed quod cum humore flaccescit. Oportet ergo intelligere in eo, quod pladaron est. q. d. flaccidum, & humorem, & ex humore infirmitatem. Hinc solent illi quædam ulcera $\omega\lambda\alpha\delta\alpha\pi\omega\nu$, id est laxa, & mollia, seu flaccida nominare. Hunc morbum aliud non esse opinor, q̃ illud, quod à Raze⁹ dicitur { celsum } ab Auicenna⁹ { susan } siue rectius, secundū nouam literam { althute } quod nomē interpretatur { morū } idcirco & ab Hali Abbate⁹ { morum } scriptum inuenimus. Haud. n. illis assentimus, qui ad scabiem fortem, ex Auic. referunt. Quāuis ei quod corrosiuum est, illius fortis scabiei remedijs succurrendum uoluerit. Inquit ergo de hac Razes. à quo Auic. & Hali Abbas transcripserunt { De celso. Hic morbus accidit ex corrupto sanguine malo. & inuenitur caro interior palpebrarum, aut nigra, aut rubicunda, mollis. & fluit ex eo sanguis continuē.

Contra Mardum.

s. 9. Theor. cap. 13. de affectibus palpebr. uersus finem et. 5. Pract. cap. 57.

Tumor. 65.

Tebegi.

t. 3^a. 3^a. tr. 3^o. cap. 8.

u. supra fol. 113.

et sequentibus.

x. 3^a. 3^a. fac. 3. cap. 25.

y. in expōne tumoris. 31.

x. lib. 6^o. tr. 8. cap. 3. in fine.

a. lib. 6. cap. 15.

b. lib. 7. ca. 64.

c. lib. 7. cap. 7.

sec. 6.

Tumor. 66.

Symphysis.

d. 2^o. Cont. cap. 2. litt. MM.

e. 3^a. 3^a. tr. 1. ca. 10 et 24.

f. 9. Theor. cap. 13. de passionibus, quæ in palpebris, circa mem.

et. 5. Pract. cap. 51.

g. lib. 6^o. tr. 8. cap. 5.

h. cap. 15. ante medium.

i. de affect. oculi. lorū. in fine.

Tumor. 67. 68.

Ectropiō et lagophthalmos.

k. Introd. cap. 3.

Defin. Author.

supra cū enumerat palpebr. aff.

l. ut Paulus. lib. 6. cap. 10. et. 12.

6. cap. 10. et. 12.

AB Hoc alium proposuimus tumorem numero sexagesimum quintum. qui ab Auicenna⁹ { Tebegi } & cum articulo { altebegi } uel cum aspiratione, ut alij scribunt { Thebegi } & { althebegi } nuncupatur. q. d. Latine { inflatio } de hoc generatim, quia uniuerso potest corpori, & cuius parti aduenire, supra, & quidem uberrimē locuti sumus, quū de œdemate, pro absolūuendo Galeni catalogo, sermonem faceremus. Quoniam igitur facile est, reuolutis quibusdam paginis, eō reuerti, satis quidem superq̃ hic fuerit, alteram œdematis speciem hoc nomine significatā esse Auic. eam. s. quæ uaporoso spiritu repleta est, ac nō morbū, sed symptoma potius appellauimus. Verū deinceps pulchriora, intelliges: Cū de alati fac, ex ipsius etiā Principis⁹ decreto, sermonem faciemus. Fortassis hunc intelligit Abēzoar⁹ quū uocat Arabiē { scarnabe } quod Latine etiam sonat { inflatio } Legimus quandoq; in Arabum monumentis { Thebebusi } hoc est { Thebegi } Primam uerō œdematis speciem Bellunensis { Trebel } uocari insinuat. dū in expositionibus Arabicorū nominum, eius a thebegi differentiam posuit.

AT Sexagesimum sextum contemplemur, qui Græcè à Paulo⁹ $\sigma\upsilon\mu\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$. q. d. Latine coalescentia, siue conglutinatio uocatur. Ab Aetio⁹ autem $\pi\epsilon\sigma\sigma\upsilon\sigma\iota\varsigma$, hoc est, agglutinatio, dicitur generatim, siue inuicem palpebræ coalescant, siue albo, aut nigro, uel toto demū oculo. Quoties uerō albo palpebræ agglutinantur, & oculi motus impeditur (inquit Aetius) affectionem hanc $\alpha\gamma\chi\lambda\omega\sigma\iota\varsigma$. q. d. Latine detentionē, seu cōtractionē uocat. In idē ferē tendit Introductorius Author. Celsus⁹ uerō affectum hunc, quouis modo fiat, $\alpha\gamma\chi\lambda\omega\beta\lambda\epsilon\phi\alpha\gamma\omega\nu$. q. d. { palpebrarum detentionem, } ex Græcorum quoq; placitis, nūcupat. Rasis⁹ Interpres⁹ inuiscationem, & consolidationem palpebrarum uocat. Sic Auicenna⁹ inuiscationem, Hali Abbas⁹ s. conglutinationem, & consolidationem dicit. Abenzoar⁹ tandem coniunctionem, seu sigillationem palpebrarum appellat. In synonymis continentis Rasis legimus { anitusma }, id est apostema quod nominatur inflatio. Apertius uerō paulo post { antrifina }, inflatio in oculis. Tumorem ibi aliquem inesse, quin sapius ex tumore quopiam ortum habere huiusmodi coalescentiam, pro comperto habemus. Quocirca ad sexagesimum septimum accedamus, atq; unā cū eo sexagesimū octauū cōsideremus. Illū Græcè $\epsilon\kappa\tau\epsilon\phi\omega\nu$ hūc uerō $\lambda\alpha\gamma\omega\phi\theta\alpha\lambda\mu\omega\nu$ uocant. Dicitur. n. $\epsilon\kappa\tau\epsilon\phi\omega\nu$ à nomine { $\tau\epsilon\phi\omega\nu$ } quod est { conuersio } & præpositione { $\epsilon\kappa$ } quod significat { extra } q. d. ad exteriora conuersio. Quod nomen quanuis de inferioris, superiorisq; inuersione dici queat, eo modo quo simpliciter intellexisse Introd. b. ac Defin. Auth. apparet. Qui absolūtē palpebrarū uitū posuerunt: nil interea de lagophthalmos exprimētes, tametsi et hi aliās lagophthalmū nōi arunt. Nihilominus tñ Alij⁹ Græci

- ci, ac Celsus^m etiam ectropion inferioris, lagophthalmion autem superioris palpebra inuer-
sionem significare statuerunt. Dicitur uero ἡ λυγρόφθαλμος à nomine ἡ λυγρός quod est
lepus uel ἡ λυγρότης quod est leporinus & ὁ φθαλμός quod est oculus. q. d. lepori-
nus oculus quoniam. f. adpertus est ijs oculus qui hunc affectū patiuntur, inter dormiendum
(inquit Aetius) uelut in leporibus fieri solet. Ea namq; à alia oculis apertis dormire certum
est. Vnde nonnulli^o aiunt leporem dici ἡ λυγρόν à uerbo ἡ λείν quod est uidere, quasi uir-
dere existimentur dormientes. cū oculos non claudant. q. q; alijs à dictione ἡ λεί quæ intensiua
particula, & ἡ ὤτος, i. auris, deriuari componi uel ἡ λυγρός nomen aiunt. Quoniam. f. ma-
gnas auriculas habeant huiusmodi animalia. Sed prior etymi ratio ad nostrum propositū spe-
ciat. Quare Auicenna. P. qui utranq; speciem sub nomine inuersionis palpebrae Arabicè au-
tem ἡ ἄσπερη uel sine articulo ἡ ἄσπερη in ueteri codice corruptè ἡ ἄσπερα in eodē capite de-
terminat. sic ait & nominatur oculus huiusmodi oculus leporinus Razes, & Abenzoar^r
utrunq; morbum sub noīe etiā inuersionis palpebrarū scripserunt. Hali Abbas^r separationē
palpebrarū nominat. Siue autē ulceratione prægressa, & carne ipsarum superauēta, quæ ad-
modū sæpius contingit. siue à duriore cicatrice palpebra cōtrahitur, ac eueritur, siue ex car-
bunculis, aut alia quauis occasione, absq; aliquo subincluso tumore huiusmodi euerسیون fieri
difficillimū, atq; rarissimū est. Ea propter in tumorū albo recensuimus. Ectropion Albucasis
uocauit simpliciter ἡ ἄσπερη seu cū articulo ἡ ἄσπερη lagophthalmion uero nuncupat ἡ ἄσπε-
ρη seu ἡ ἄσπερη leporinū. Apud antiquū Auic. interpretē legimus ἡ ἄσπερη, hoc est, inuer-
sio palpebrae forteq; uoluerūt per hanc dictionē Arabes ectropion per aliā uero dictionē, q
ibidē exponitur, ἡ lagophthalmion. Est autē alia ἡ ἄσπερη i. a. gritudo palpebrae superioris.
Mox Deinde quatuor insimul perpedamus, de quibus eodē capite Aetius^r ex Seueri monu-
menti loquitur, quorum primus est, quem sexagesimum nonū ordine proposuimus, & ἡ ἄσπερη
ἡ ἄσπερη seu ἡ ἄσπερη Gracè dicitur, quod est Latine ἡ ἄσπερη siue ἡ ἄσπερη post
quem septuagesimus est, qui ἡ ἄσπερη q. d. ἡ ἄσπερη dicitur. Et deinde septuagesimus pri-
mus, ἡ ἄσπερη, & ἡ ἄσπερη quod est callositas, & callus uocatus. Præterea septuagesimus
secundus, qui ἡ ἄσπερη & ἡ ἄσπερη Gracè, quod est, Latine ἡ ἄσπερη seu ἡ ἄσπερη ap-
pellatur. De tribus primis duntaxat Paulus^r insimul determinat. Razes autem, quauis alis
quando² de oculorum scabie locutus, nil de speciebus meminit. In continentis tamen uolumis
ne⁴ quatuor hæc, ad Seueri exemplar, definit: scabiei species esse supponens. Nec aliter Hali
Abbas, & Auicenna^r quatuor has pruriginis, & scabiei species definiunt. Atq; etiā Se-
rapion, Qui corruptis Gracis dictionibus loco ἡ ἄσπερη quod est ἡ ἄσπερη habet ἡ ἄσπερη
loco ἡ ἄσπερη i. a. affredo habet ἡ ἄσπερη sycosim uero dicit ἡ ἄσπερη et tylosim deniq; hoc
est callum uocat ἡ ἄσπερη Abenzoar^r idem intellexisse apparet, q. q; unam duntaxat speciem
expressit, dicens eam, quæ coritibus ficuum assimilatur cæteris deteriore esse. Quā. n. gra-
nulosa uocat, chalazio potius conuenire uidetur. Ni uelis per granulosa scabiem, eam in-
telligere asperitatem, quam Aetius absq; defluxione fieri ait. in qua uelut milij grana, et erui
parua semina uideri scripsit. Verū hic peior Abenzoaris error esset. Nam granulosa
hæc cum ficosæ, tū quoq; tribus alijs spēbus iā iā præactis cōmune genus (uti uidebimus) est.
Sed Aetij ex Seuero uerba intelligamus, unde Arabes hi transcripserunt. quò rectius iudica-
re queas, an hi uera retulerint. Inquit ergo ἡ ἄσπερη Asperitates, quæ etiam ab aliquibus densita-

m lib. 7. cap. 7.
sec. 9. & 10.n lib. 7. cap. 73.
o uide Etymos-
logicū & Celiū
Rhodig. lib. 26.
cap. 29. & 30.p 3^a. 3^a. trac. 3.
cap. 12.
q 2. Cont. ca. 2.
6. littera. NN.
r p^o. Theor. fir.
tr. 8 cap. 2.
s 9. Theorica.
cap. 13. de mor-
bis in palpebris.
circa mem. &
9. Pract. ca. 20.t lib. 2^o. cap. 14.
u ibidē. cap. 13.

Tumor. 69.

70. 71. 72.

x lib. 7. cap. 43.
uide. 3^a. Epid. cō-
mētario. 3^o. tex.
23.y lib. 3. ca. 22.
sec. 12.z Vi. 9. ad Ma-
serē cap. 19. &
20 et lib. Diuis.
cap. 22.a lib. 2. Contin.
cap. 2. littera. AA
b 9. Theor. ca.
13. et. 5^o. Pract.
cap. 49.c 3^a. 3^a. trac. 3.
cap. 23.d 2. Breu. ca. 5.
l p^o. Theor. fir. tr.8. cap. 4.
m lib. 7^o. e. 43.

Dasymp.
Trachoma.
Sycofis.
Tylofis.

e lib. 7. ca. 76.
et uide etiā. 77.

Psorophthal-
mia.

f lib. 3. cap. 12.
sec. 8.

g 3^a. 3ⁱ. tr. 3. c. 7
h 9. Theoricæ.

ca. 13. de. morb.

palpebrarū post
mem. et uide. 5.

prac. cap.

i 3^a. 3ⁱ. tr. 3. c. 9.

k 14. meth. ca.
ultimo.

m lib. 7. cap. 7.
sec. prima.

n 3^a. 3ⁱ. tr. 3. c. 17.

Tumor. 73.

Pachytes.

Tumor. 74.

Barytes.

o 9. Theoricæ.
cap. 13. de pal-

pebrarū morb. i
prin^o. 5^o. Pract.

cap. 48. et. 9.
Pract. 21.

Tumor. 75.

Hydatis.

res uocatur, ex mala curatione sæpe fiunt. Dū medici diutius collyria instillant. Quemadm
dum, n. in externis uulneribus pinguium adhibitio, carniū quarundam inutilium causa est: „
Sic etiam in præsenti fieri cogitare oportet. Sint autem & ex fluxione (hoc est collachrymas „
tione diuturna minimè mordaci. Si, n. acris esset, citius oculis damnum induceret, q̃ palpebris „
affectionē infeminaret. Fit etiam aliquando nō prægressis fluxionibus lachrymis ue, neq̃ ma „
nifesta causa præsente. Et sunt huiusmodi nō similes his, quæ ex fluxionibus fiunt. In illis, n. „
(.f. quæ ex fluxionibus) densiores, & asperiores, & cruentiores euerſæ palpebræ appar „
rent. In his uerò uelut milij grana, ac erui parua semina uidere est intra palpebras exurgenz „
tia. Estq̃ hæc species, reliquis curatu difficilior. Differunt tñ hæc inter se Nam q̃ d̃ α σ τ ρ s „
densitas ue in superficie est, & cū rubore. τ ρ α χ υ τ ρ s autem, Aspritudo ue maiore in a quas „
litatem, ac eminentiam habet, cū dolore simul, ac grauitate. Ambæ autem oculos humectant. „
Quæ uerò sycofis dicitur altiores eminentias habet, & uelut incisas. Et cui aly rei, q̃ fici „
biantis similis est? τ υ λ ω σ ι s uerò, idest callositas, aspritudo est diuturna, induratas, et calloz „
sas inæqualitates habens. Hæc Aetius, qui tantū abest, ut scabiei species ponat (quemadmo „
dū Arabes egerunt) ut satis distanti capite seorsum de scabie palpebrarum, tanq̃ diuersa „
morbis specie ab his quatuor pertractarit. De qua tamen scabie sic ait: τ ω ρ ο φ θ α λ μ ι α, quod „
est, lippitudo scabra est, quū anguli ulcerosi sunt, ac rubicundi, & ualde pruriginosi, & pal „
pebræ rubicundæ, & lachrymæ salſæ, ac nitrosæ desillant. Nec aliud uoluisse Paulus f in „
sinuat. Sicq̃ Definitionū Author, et Introductorius quoq̃, qui psoriasim, q. d. scabiositatē ap „
pellauit. Hi, n. distinctam scabiem ab illis affectibus intellexerūt. Quāq̃ Introductorius non „
nulla de speciebus illis dicit, quæ à præscriptis diuersa apparent, sed tamen quæ de tylofi dis „
xit, exquisitorē rei definitionē, si ijs, quæ hic dicuntur adiunxeris, efficient. Ex diuturnitate, n. „
crassiores, albidiores, & parum sensiles, fieri palpebras ait, eoq̃ difficulter sanabiles. Dū ue „
rò de asperis loquebatur, eas, quæ ex fluxione gignuntur (uidelicet sanguinolētores esse, ma „
gisq̃ asperas, & carnosas) cū his, quæ sine fluxione sunt (q. f. fici acinis similes sint) admis „
cet. Sunt enim acini ficus, milij quoq̃ seminibus per similes. Quod demum de sycofi ait. (car „
ni uidelicet quid simile adnasci), Seueri, Aetijq̃ illum enarrantis sententiæ minimè aduersas „
tur. Quas enim illi posuerunt maiores eminentias, carneas esse ex hoc Authore intelligas „
quæ proculdubio oculi motum aliquo modo impediunt. „
P R A E T E R Hæc uerò, crassas quoq̃ palpebras definit Introductorius. Vnde nos aliā ele „
gimus tumorū speciem: & numero septuagesimam tertiam collocauimus τ ρ α χ υ τ ρ ι α quod „
est, & crassitudinem uocantes. Est, n. (ut inq̃) ubi euerſæ palpebræ duriores ijs, quæ natura „
liter se habent, existunt, & scabris magis carnosæ. Auicenna & grossitudinē palpebrarū „
uocat. Ac scabiem aliqui sequi, nonnunq̃ uerò nimirū frige faciētibus præsidijs succedere uoluit. „
P O S T Hūc uerò alius prætermittendus nō est, q̃ ab Hali Abbate descriptus est, notatus ite „
rim & grauitas Græcè τ ω ρ ο φ θ α λ μ ι α dici pōt. Inq̃ ergo Hali Abbash & grauitas at palpebræ ex „
uētositate grossa fit, quā q̃ patitur, cū a sōno excitatur, iuenit in oculo tāq̃ arenæ qd simile, et „
pulueri. De huiusmodi etiam grauitate ab alijs affectibus distincta loquitur etiam Princeps. „
S E D Aliū quoq̃ intelligamus, qui à Galeno & Paulo et Defin. Auth. Græcè τ υ λ ω σ ι s q. d. „
Latine & aquula nuncupatur, Celsus uerò uescicā notat pingue, Auicenna & & farnac. & Ha „
li Abbas uerò proprio idiomate & auratus uocat, eiusq̃ interpres exponit Latine & fissuram „

Legimus

- legimus n in synonymis Rasis, q̄ {Aurus} illorum idiomate significat oculos. Vnde nomen
 auratus; efformatum est. Quāq̄ in alijs eiusdem synonymis legatur {auratis. i. noduli pal-
 10 pebrarū superioris pinguedinis. s. farnach} Albucasis eundem affectum uocat {axirnath.} p. lib. 2. cap. 10.
 11 {Est autem huiusmodi affectus (inquit exactius, q̄ reliqui Paulus) pinguis quædā substātia,
 12 palpebræ cuti præter naturam substrata} Intellige non interna palpebræ regione, sed inter
 duas portiones perioſtij corporis mediam uti Galenus ait, 1 ac superioris quidem palpebræ.
 Ut ab alijs ferè omnibus determinatum est. Eo namq̄ loco uiscosa quædam, pinguisq̄; et un-
 ctuosa substantia secundum naturam genita est, molliendarum. s. sua pinguedine palpebrarū
 gratia. Hac igitur supra modū aliquando naturalem aucta, hydatis uocatus affectus gignetur.
 10 {In aliquibus autē (subdit Paulus) et præsertim pueris, ceu natura humidioribus augeſcens,
 malorum superuenientium causa redditur: dum oculum pondere suo grauat, eoq̄ fluxiones
 lachrymas ue excitat.} Razes autē ipse uocat {schernach} siue cum articulo {alschernach}
 11 & Minnulam, quoniam s. (ut ait) assimilatur capitellis māmullæ. ut à nobis quoq̄; papillæ dici
 queant, Græcè θηλαί. Diuersæ tamen interim affectiones ab alijs papillis, quas in capitis cute
 oriri antea præscripsimus. s. fol. 303.
 DE alio autem tumore, quam τῶ ποφθαλμίων. q. d. oculorū scabiem, siue scabram lippitu-
 dinem uocari prædiximus, et septuagesimum sextum ordine tumore proposuimus: antea iā,
 quū detrachomate, sycosi, & tylosi loquebamur, quos affectus scabiei spēs Arabes ponebant,
 nos q̄; tum ad huiusmodi propositum spectat, satis superq̄; scripsimus. Ad hæc referri uidetur
 20 quod nonnulli Arabes {fulatum} uocant. Aiunt. n. {q̄ est ægritudo oculorum, quæ accidit
 11 pueris, propter fletum, & est quasi scabies.} Nisi uelis id, quod antea diximus {fulach} intel-
 ligere, quā ptilosim græcè nuncupauimus. In synonymis Contin. Rasis legimus {drasmoz-
 tus. i. leuis scabies oculorum.}
 AD alia igitur accedere, occasio præceps accelerat. Succedit ergo tumor ordine septuagesi-
 mus septimus, Græcè {xειθῆ} quod est Latine hordeū, siue hordeolum, ab eius grani similitu-
 dine uocatum. Tuberculum quidem hordei instar, oblongum, super pilorum locū, quod Græcè
 30 τῶ ποδῶ Paulus appellat, enantum {τῶ ποδῶ} Galeno referente, uel numero plurali {τῶ
 ποδῶ} ueterum quoq̄; Græcorū nonnulli uocarūt, prout ab Introductorio quoq̄; ac Aetio
 comprobatur. Cornarius Aetij interpres {τῶ ποδῶ} Latine uertit {præputium} à simi-
 30 litudine (ut putauit) ad τῶ ποδῶ, id est præputium, pudendi uirilis nomine deducto. Sed quā ha-
 beat cum præputio, uel ipso etiam pudendo similitudinē, haud intelligo, Nec ipse nominis uim
 perfecte considerauit. Etenim eadem ratione, qua præputium uirilis membri {τῶ ποδῶ} eadem
 quoq̄; morbus hic {τῶ ποδῶ} dicitur. Deducuntur enim à nomine {τῶ ποδῶ} & {τῶ ποδῶ} quod
 est Latine desiderium, Addita enim {σ} figura pleonasmō dicta, fit {τῶ ποδῶ} quoniam à
 mulieribus desideratur, uel desiderium illis auget. Vnde {τῶ ποδῶ} uerbum est s. {desidero.}
 Quoniam uerò uulgaris opinio mulierum est, ut in Italia sic opinor in alijs quoq̄; regionibus,
 ob mulierum utero gerentium desiderium, alijs huiusmodi morbum aduenire: Quoties u3.
 qdpiā desiderant, quod in alicuius alterius manibus sit: Nisi. n. desiderāti grauidæ illud præ-
 11 beat q̄ possidet, hordeolū sibi adnasci ait: Quocircā solent grauidæ mulieres dicere, Da mihi
 40 hoc, Aliàs ad te mittā hordeolū. Inde igitur ex cōmuni plebis opinione {posthian} q. d. {deside-
 11 riū} seu dixisse mauis {desideriolū} ueteres nuncuparunt. Nec mirū, aut nouum quid est,

q. 10. de usu par-
tium cap. 7. ost
principia.r. 2. Cōc. cap. 2
litera. bb.

s. fol. 303.

Tumor. 7. 6.

Pscrophal-
mia.t. Vt in antiqua
Arabico. notum
Auc. interpret.
u supra fol. 361

Tumor. 77.

Cithre.

x lib. 3. cap. 22.

sec. 14.

y 4. de coma.

med secundū loc.

ca. 5. sec. 4. uer-

sus finē. & in fi-

ne libri.

z cap. 15. ante

mediū

a lib. 7. cap. 8.

Cōtra Corna-

rium.

y p^o. de diebus
 decret. cap. p^o. =
 3ⁱ. de crisi. ca. 2.
 et. 3ⁱ. prognos.
 e^om p^o.
 z 3^a. 3ⁱ. tract. 3.
 cap. 15.
 a p^o. Theyfir.
 tr. 8. cap. 9.
 b lib. 7. cap. 7.
 sec. 2.
 c 2^o. Cont. cap.
 2. litera. 2. et lib.
 Diuif. cap. 36.
 d de affec. ocul.
 uersus finē.
 e cap. 15. ante
 medium.
 f lib. 7. ca. 79.
 nomina, ex uulgari hominum opinione imponere. Ut de crisi (Galeno docente ²) liquere po-
 test, alijsq; nō paucis. Ex superabundanti sanguine fieri, Princeps hordeolum ait. ² Abenz-
 zoar ⁴ uerō ex humore acuto. In idem reduci potest, capiendū acutum largē (ut calidū. s. hu-
 morem connotat) Tunica tamen quiddam quod difficulter mature scit, comprehensum esse do-
 cuit Celsus. ⁶ Razes ⁷ quoq; hordeolum uocat. Qui non temerē uiscosum esse tumorem ait.
 Etenim sanguinem, pituitā nihilominus admixtum, huiusmodi tuberculi causam esse reor. De-
 finitionū Author ^d nil à præscriptis Authoribus differt. Introductorius uerō Author ^e quid-
 piam nouum habet. Nam non modō in extremis palpebrarum partibus (ubi s. pili nascuntur)
 gigni hordeolum uoluit. Verū & in interna palpebræ regione, iuxta coronam (oculi intelliz-
 go, uidelicet iuxta Iridem) suppuratum tuberculum hordei grani formam referens eodē nō-
 mine appellat, sed hunc abscessum in palpebris uocat Aetius. f Possemus autem Introducto-
 riū uerba & aliter intelligere. quū s. ait: *ἡ γὰρ τοῦ σπέρματος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ* quod est, ad coronas, seu
 prope coronas, ut non coronam oculi, quā & in idem uocamus, intellexerit, sed ipsarū palpe-
 brarum extremitatem, circuitū ue, quem Paulus tarsum nominabat. In quō loco hordeolum
 nascitur. Dici autem potest cum Aetio forinsecus, quoniam. s. nō interiori loco, sicuti grando,
 nascatur. Alia tamen ratione intus dici absurdū non est, quoniam nequā exteriori palpebræ
 cuti oboritur, sed cum in tarso nascatur, à cartilagine potius emergere uidetur. & sic ab inte-
 rioribus. q. q. ut in medio existens recte extremorū cōparatione, intrinsecum, & extrinsecum
 esse tumorem, diuersis respectibus, quemadmodum & neutrum, proferri potest. Marcellus
 Romanus & uarulum nominat: Hali Abbas & Hordeum. ^h In synonymis continens legitur
 i filcaz & Carui: id est hordeolum.
 Tumor. 78. T V M O R uerō septuagesimus octauus est, qui Græcè dicitur χαλαζιον, quod est Latine
 79. 80. & Grando à Definitionū. Authore *ἡ χαλαζία* quod idem est. Et *ἡ χαλαζία* q. d. & Gran-
 dinatio ab Introductorio i nominatur. Otiosi humoris (præsertimq; lentæ pituitæ) cōcretio-
 nem in palpebris esse, ait Paulus. ^k Cuius ratione rotundæ quædam eminentiæ, pellucidæ,
 grandini similes (Aetio docente ^l) apparent. Quibus dissectis humor euacuatur, similis can-
 dido oui. Arabum Princeps ^m non semper grandinis instar pellucere insinuat. Nec temerē,
 quoniam (uti Paulus ⁿ ait, anteq; ipsum Celsus ^o) nō semper ab interiori parte palpebræ, per
 cartilaginem intermediam lucet. Quandoq; in exteriori parte sub cuti aggregatur, ut in-
 cisa cuti ab exterioribus tumorem sanare debeamus. Alia igitur, et quidē uniuersalis erit sis-
 30 militudinis ratio, quoniam. s. dura simul, ac rotunda eius substantia grandini assimilatur. Quā
 Introductorij quoq; ac Definitionū Authores, & Celsus, ac demū Albucasis ^p uoluisse insi-
 nuat. Mobiliaq; esse tubercula simul atq; digito hūc, uel illūc impelluntur, ait Celsus. Nec mili-
 tantūmodō magnitudinē refert (uti Definitionum Author ait) sed usq; adeo nonnunq; incre-
 scere uidimus, ut lentis, quæ si non curatur, parui ciceris, dein magni, quantitatem superet,
 Razes ^q & niueum simpliciter, et & morbū niueum, seu morbū niuis uocat. Sed Aetius ^r Gan-
 glia quoq; seorsum ueluti, et steatomata, atheromata, et melicerides, præter grandinem in pal-
 40 pebris adiunxit. Quatuor pustularum species Abenzoar esse ait. ⁴ Quas tamen huiusmodi
 species Paulus uel sub generali de illis alibi scripto sermone, uel sub grandinis uocabulo in-
 tellexisse uoluit. Hali Abbas ^s grandinem quoq; eum, quē præ manibus habemus uocat. Aben-
 zoar ^t autem granulofam scabiem, & granula nuncupat, Arabicè & halbarda ^z ut idem ait. ⁴

Hæc

- HAEC** autem grando, si male curata magis indurescat { παρ' αὐτοῦ } dici potest, ex Intro
 ductorij Authore "uel παρ' αὐτοῦ, q.d. Latine { Tosatio } siue maior dicere { Tosus } quando non
 definit postea propositū à se hūc tumorē ille, Author. Ni mancus (ut opinor) Liber sit. **SIN** u cap. 15. circa
 niq; usq; adeo indurescat, ut in lapideam substantiam pertrahatur { λιθίασις } ex eodem nuncu
 pabatur (quauis ipse hanc in exteriore, illam uero, s. poriasim, interiore palpebræ parte fieri
 supposuerit.) Sed quauis in regione fieri utraq; euenit, rationabileq; est. Aetius^x autē idē
 per lithiasim q.d. lapidositatem, siue lapideitatem, & poriasim intellexisse uidetur. Verū tas
 men est, q. de hac seorsum à grandine pertrahauit. Sic & Arabum Princeps^y (qui aliquan
 do sanguinem à lapidositate emitti adiunxit) atq; etiam Hali Abbas.^z Paulum uero cum nec
 10 de poriasim, neq; de lithiasim ullibi meminerit, sub grandine intellexisse uerisimile est: Quas ob
 res & Definitionum Authoris negligenda sententia non est: cum de chalaza locutus, q. pri
 mum subdit, { Eadem quoq; est lithiasis. } Nos uero distinctioris doctrinae grana, præsertim
 cum diuersa inter hos tumores materia appareat, distincte grandinem, poriasim, & lithiasim
 in catalogo proposuimus. Suntq; hi ultimi tumor septuagesimus nonus, & octogesimus.
QVI BVS octogesimus primus succedit: quem Auic.^a uocat proprio Idiomate { alantifac. } Tumor. 81.
 Razis^b autē, et Hali Abbatis^c Interpretes { Inflationē. } Sed Hali Abbas, qui tumorē quoq;
 dicit, inter totius oculi morbos Aetij,^o et Demosthenis imitatione: Illi uero inter palpebrarum
 affectus annumerat. Omnes tamen quatuor huiusce morbi species declarant. quas Razes ex
 Ioannitij monumentis didicisse refert. Primam uentosam, Secundam phlegmaticam, ex phleg
 20 mate non grosso aduenientem. Tertiā aquosam, & Quartam melancholicā ponunt. Proprijsq;
 singulas inditijs perbellē describunt. quæ apud eos uidisse inutile nō fuerit, nec te uidisse pœ
 nitebit. Sed tamen ab Aetio melius didicisse fuerit, qui primam quidem speciem emphysema
 nuncupauit, p. secundam uero, & tertiam œdema.^d Secundam quidē simpliciter œdema, ter
 tiam uero, cū additione { οὐροφόν } quod est laxū. Quartam deniq; scirrhum, induratum uē
 œdema nominat. Frigidi tumores sunt omnes quatuor species. Ad uentosum prima, secunda
 uero ad phlegmaticum, tertia ad aquosum, quartaq; demū ad melancholicum referuntur.
PRAETER hos uero Princeps^e alium habet, quem octogesimum secundum ordine pro
 posuimus. Ipse autem uocat Arabicē { sude } siue cum articulo { al sude } Interpretes uero anti
 quus uertit { Morum. } Definit autem ipse, q. { est caro bothoralis, addita in oculo } Credo non
 30 aliud intellexisse Introductorij Authorem, (q. q. postea definitionem haud adiunxerit) hoc no
 mine { σαρκομα } q.d. { carnositas } Hali Abbas f. carnem superflua uocat. Sed notandum inte
 rea est, Auicennam in alio codice non alium describere tumorem, Sed pro curatione inuisca
 tionis palpebrarum, de qua iam antea locutus fuerat, cōsiderare, si causa illius sit carnis incre
 mentum, quid nam agendum ueniat. Verū quicquid sit, sarcosis huiusmodi tumor est. Qua de
 re quauis distinctā, arguendi gratia, proposuerimus sarcosin à sude, pro eodem tñ capiatur.
QVI BVS uis octogesimum quartum intelligamus, uidelicet quem Barbarolatini quidam Tumor. 84.
 e recentioribus Lupiā uocant. Theodoricus^f enim in palpebris eam posuit, parte, s. interna, Lupia.
 & speciem nodi reputauit. Si exquisitē quispiam consideret, apud eum non aliud, q. grando
 40 est. Apud Guidonem^g uero, quem sequitur Tagaultius^h i Lupia, sicut lupulus (idest paruus
 lus lupus. Ridiculum. n. est herbae cōparare) mollis rotunda in iuncturis. & locis siccis, suam
 aperit natiuitatem. Ad ganglion aliqui redducunt. Differunt. ergo lupia Guidonis, à lupia
 Theodorici

u cap. 15. circa
principia

Poriasim.

Lithiasim.

x lib. 7. cap. 801

y 3^a. 3ⁱ. trac. 3.

cap. 21.

z 9. Theoricæ.

c 13. et 5. Pract.

cap. 51.

Tumor. 81.

Alantifac.

a 3^a. 3ⁱ. tr. 3. c.

25. 26. 27.

b 2. Cont. cap.

2. littera X.

c 9. Theor. ca.

13. post prin^a. et

5. Pract. cap. 35.

d lib. 7. cap. 12.

13. 14.

p cap. 12.

q cap. 13.

r cap. 14.

Tumor. 82. 83.

Sude.

d 3^a. 3ⁱ. trac. 3.

cap. 11.

e cap. 15. circa

prin^a.

f 9. Theor. cap.

13. de palpebra

rū morb. in fine

et. 5. Pract. cap.

57. et 9. Pract.

cap. 24.

Tumor. 84.

g lib. 3. cap. 28.

h tr. 2. doct. 2.

c. 4. circa mem.

i cap. 13. libri.

primi post prin^a.

- Theodorici.** Haud uero Aetij ganglion est, in palpebris descripta lupia. Cum Theodoricus
lib. 7. ca. 83. intus genitam, indeq; aperiendam uoluerit: quemadmodum de grandine scribitur: Actius^k aut
 in exterioribus orta (ut patet) mollientibusq; ac discutiendis medicamentis curare docuerit.
- Tumor. 85.** **OCTOGESIMVS** Quintus tumor est, quem Introductorij Author *μυδῆσις* Græcè
Mydesis. uocat. q. d. Latine {putridam tumefactionem} à uerbo. n. dicitur *μυδῆσις* quod est, {putrefio,
 tumeo, inflor. etc.} Inquit ergo {Mydesis commune nomen est partium, quæ ex putrefactio-
 ne contabescunt. Palpebræ quoq; eadem laborant: ubi & tumores apparent, & assidue
 diffluunt, adipem paulò copiosorem sortitæ.} posset ad putridam hydatidem reduci. quam sæ-
 pè uidimus in gangrænâ deniq; terminari, ac sphacelon superioris palpebræ, præsertim anno
 1539. ut ob adustionem, quæ necessaria fuit, lagophthalmi facti sint hoïes, qui passi eâ sunt. 10
- Tumor. 86.** **OCTOGESIMVS** sextus præscriptus tumor est, quem Abenzoar^l sub pustulæ nomine
Pustula. descripsit. Cuius quatuor species definiuit. Primam, cuius humor mellis similis est, et hæc me-
lib. 9. ca. 8. c. 3 liceris Aetij^m est. Secundâ, cuius humor similis lacti. Tertiâ, cuius materia similis pulvis fa-
lib. 7. ca. 83. rina, quæ atheroma est. Quartâ, in qua lacti coagulati humor affinis includitur.
- Tumor. 87.** **DENIQ;** tumor ordine octogesimus septimus, atq; inter palpebrarû affectus ultimus est: qui
Scleriasis. ab Introductorio Authore *σκληρίασις* dicitur. q. d. Latine {durities} quanq; sub scleroph-
 thalmia includi poterat. Nos tamen ab illa distinctum tumorem posuimus. Sclerophthalmiam
 scilicet durum tumorem oculi prius, licet palpebræ communicatum intelligētes, scleriasim ue-
 rò ipsius duntaxat palpebræ duritiem, seu durum tumorem. Quocirca illam inter oculi affe-
 ctus, hanc inter palpebrarû morbos enumerauimus. Inq; ergo præscriptus Authorⁿ {sclerias- 20
 sis est tumor palpebræ cū rubore, doloreq; difficulter aboletur: durat magis, q̃ inflammatio:} „
- cap. 15. ante medium.* **PRAETER** hos affectus, Aetius^o uarices, & malignas adnascencias palpebrarû decla-
lib. 7. cap. 84 rauit. quas ut incurabiles omisit. Itemq; Paulus^p de uerrucis palpebrarum, meminit. Hali Ab-
lib. 6. cap. 17 bas^q de formicis, quæ idem quod uerrucæ sunt, & de tinea palpebrarum. Sed hæc, & alia
q. 9. Theoricæ. q̃ plurima ad ea, quæ uel nunc, uel in præcedentibus dicta sunt, reducentur. Quocirca præ-
lib. 5. Prae- cap. 57. scriptis duntaxat sexaginta tumoribus oculi, uel totius, uel partium, aut palpebrarum contens-
 ti: eos qui in angulis oboriuntur (præter eū, q̃ à Gal. in suo de tumoribus præter naturâ catalo-
 go dictus est, encanthida) cōtemplemur. Est. n. octogesimus nonus, qui græcè *ἄγχιλωσις* uo-
cap. 15. ante medium. catur. q. d. Latine {iuxta oculū} Etenim *ἄγχιλωσις* significat {propè} seu {iuxta} {et} *ἄγχιλωσις* oculus
lib. 7. cap. 84 lum. unde *ἄγχιλωσις* hoc est {iuxta oculū}. Vt Definitionū quoq; Author^r testatur. {Est 30
lib. 3. cap. 22. enim (ut idem ait) tumor in angulo magno confurgens, & humorum collectionem habens, nō „
sec. 11. et uide li bro. 6. cap. 22. perforatus, neq; foramine peruius præditus.} Cui quidem definitioni Paulus^s subscripsisse ui-
 detur. Dū ait {Prius q̃ abscessus in ulcus erumpat, anchilops uocatur.} Postq̃ uero in ulcus „
 eruperit, Aegilops nuncupatur. Qui ruptus si negligatur, usq; ad os in fistulâ dehiscit. quem
 admodum sæpenuerò nos experimentum docuit. Adeò ut ferè idem anchilops, & aegilops
 sint, tempore solo differentes. Quâ fortè ob causam, Definitionū Author nil de aegilope me-
 minit, sub anchilope intelligens. Introductoriusq; expressè pro eodem sumens, ait {Aegilops,
 uel anchilops abscessus quidam est. etc.} Inter oculum, et nares huiusmodi abscessus gignit-
 tur. Auic.^t {garab} & cum articulo {algarab.} utrunq; appellat. Qui tamen Paulo inhærens,
 ait {Et exitura illa prius, q̃ rumpatur, nominatur {akilus} corruptum nomen est. Volebat. n. 40
lib. 3. 1. 2. cap. 14. 15. dicere {Aegilops} Hali Abbas^u {coruū} utrunq; uocat. Razes uero aliquando^x {garab} Ali-
lib. 9. Theoricæ. cap. 13. de angu- lorū oculi passio- nibus. & s. præ- lica cap. 60. & lib. Diuis. ca. 4. quando

quando⁹ autem in lachrymalibus fistulā.} nomineq; proprio Aegilopem corrupto uocabulo
 {angiles} dicit.² Sæpè tamen hoc {apostema in lachrymalibus} nuncupans. Nec aliter de his
 scripsit Abenzoar,⁴ qui fistulam uocat lachrymalium. Plinius⁵ uerò epinyctidas aliquando.

Græcorum ægilopas uocasse uidetur (prout antea⁶ demonstrauius.) adeò ut æquiucum ip-
 si etiam Plinio epinyctis nomen sit. cum liuentes quoq; pustulas, noctibus inquietantes signifi-
 care idem retulerit. In tibijs fortasse, iuxta Pollucis definitionem, ac pedibus, uel in alijs quoq;
 partibus eminentibus, præter oculos, uti ex Celso⁷ colligi potest. Nec absurdum est, quod
 Plinius subdit, de angulorum quoq; ulceribus intellexisse. q. s. qdā eodem nomine appellāt pu-
 stulas liuentes, ac noctibus inquietantes, in eodē uidelicet anguli loco. quasi quod subdit prior

10 rem significationem specificans sit, haud alium ab illo diuersum affectum præferēs. Aetius
 autem anchilopem⁸ ut diuersum ab ægilope⁹ f. abscessum describit. Illum enim ad atheroma,
 & meliceridem reducebat: Hūc uerò os corruptentem, atq; ægrè curabilem morbum defi-

niuit. Quas ob res & nos ut tres numero tumores in catalogo proposuimus: cum possint dis-
 stinctè tres intelligi: uidelicet ægilops, anchilops Aetij, & Plinij epinyctis (iuxta tertiā à nos-
 bis declaratā significationē): uidelicet liuida pustula, in angulo nocte inquietans. In synonymis
 Contin. legitur {afilutis} corruptè à nomine {anchilops} aliàsq; ibidem {hagiloms} &
 & {afilus} & {ahuulis} & quādoq; in antiqua nominū Arabicorū Auic. expōne {aschylus}

Hi ergo tumores in oculis, uel eorum angulis adueniunt. quos memorasse Galenus debue-

rat. si nullam esse speciem, quæ præacta à se in eo libello non sit, gloriari optabat.

20 Nos autem Galeni patrocinium sumpsimus, ita semper & in omnibus his dicentes, nullam
 esse speciem, quæ ad illorum aliquam, puta uel phlegmonem, uel erysipelas, aut scirrhum, aut
 quauis deniq; ex ijs, quæ in libro de tumoribus inscripto præacta iam sunt, reducibilis non
 sit. Pro cuius exactiori notitia, reliqua etiam percurrāmus. quæ ad aures, uel his proximas
 partes attinent. Sat autem erit tres duntaxat scribere tumores. quorum primus erit ordine.

91. Auritus.

92. Parotis.

93. Pherea.

NONAGESIMVM Primum, auritum. q. d. magnas aures habentem appellauius. De
 quo affectu Abenzoar¹⁰ locutus est. de grossitudine. s. auris caput scribens.

NONAGESIMVS Secundus omnibus notus est, qui Græcè {παρωτίς}, à præpositione
 {παρ} quod est {iuxta} et {ὄτις} quod est {auris} q. d. {iuxta aures} E genere sunt in-

30 flāmationum (ait Galenus¹¹) fiunt autem glandulis iuxta aurē affectis. Razes¹² {cugile} uo-
 cat. Auicenna autē aliqñ k {fugille}, seu {fugule} aliqñ¹³ uerò {Bedirus} secundū aliquos codi-
 ces {ueditus} Nonunq; legitur {neditus} Græcorum, ac Romanorum Græx parotidas uocat.
 quāq; & illorum nonnulli (Definitionum Authoris testimonio) δρωσῆρας nominarunt.

NONAGESIMVS Verò tertius est, quem Hippocrates¹⁴ {φῆρα} plurali numero, neu-
 troq; genere uocat. sunt autem (uti Galenus¹⁵ ait) oblongiores sub auribus glandulosæ emi-

nentia, quales & satyri habent. quos quidam Iones {φῆρας} appellarunt. quasi diceremus

Latine {feras} Sicut. n. {θηρ} Græcè feram significat. Ita Iones, atq; etiā Aeolici per {φ} scri-
 bere solent {φῆρ} dicentes. Propterea Galenus antiquas Hippocratis glossas exponens, sic

11 ait {ῥῖοις δὲ καὶ φῆρας, καὶ θῆρας καλοῦνται. ἵνα ἢ ὅτιον θῆρα ἢ τὸ πῶς ἐρμηνεύει. i.
 40 A quibusdam autē satyri Pheres, & theres uocantur: ut Atticè dictum sit therea; quasi dicat
 tumores, quos Iones {φῆρας} dicunt, per {φ} Attici per {θ} scribunt {θηρας} sicuti quos illi

{φῆρας} Hip. expōne.

y ut 9^o. ad Mā
 ser. 30. & 2^o.
 Cōtin. cap. 5. lit-
 ra. uu.

z 2^o. Cōtin. ca.
 5. litera. TT.
 a 1^o. Theyfir.

tr. 8. cap. 10.
 b lib. 20 ca. 6.
 in principio.
 c fol. 185. linea.

28.
 d lib. 5. cap. 28
 sec. 14.
 e lib. 7. cap. 87.
 f De quo antea
 cap. 85. 86.

Replica^o. ob-
 iectionis cōtra
 Galenum.

Respsio pro
 Galeno.

Tumor. 91.

Auritus.

Tumor. 92.

Parotis.

g 1^o. Theyfir.

tr. 4. cap. 5.

b 3^o. de comp.

med secundū loc.

cap. 2. in prin^o.

Tumor. 93.

Pherea.

i 13 Cont. cap.

5. litera. k.

k 3^o. 4^o. trac. 2.

cap. 8.

l 4^o. 3^o. ca. 24.

m 6. epid. comē

ta. 10. 3. tr. 14.

n Ibidē in com.

& lib. de lingu.

{φῆγας} nominant, hoc est feras, hi {θῆγας} dicunt. Quam Galeni contextus usque adeo
 deprauatus est, ut quid nam sibi uoluerit, Interpretes minimè perceperint. Quam ob rem &
 Caelius Rhodiginus^p tumores ipsos pheres, et theres ex Galeno appellari ait. quod præactū
 et à nobis antea^q recolimus. Ab ipsorum itaque Satyrorū similitudine quos pingunt, finguntque
 oblongos apud aures excessus habentes, hos tumores {φῆγας} & alibi etiam {Satyriasmos}
 Hippocrates nūcupauit. Quam nos minimè latet nonnullos esse Hippocratis interpretes {φῆ
 γας} uocari dicentes: quoniam {φῆγας}. {Peloponnesi} ciuitate abundant. Alios uerò per {εῖ
 γας} scribentes dicere {φῆγας} sicque nominari, quoniam {φῆγας} Thessaliæ urbe plerumque oriun
 tur. Sed ueriores nominis formatione esse reputamus, quā prius enucleauimus. Potius hūc, qui
 parotidas nomine {fugille} apud Auicennam intelligerem. Sūt autem hi tumores frigidi, ma
 ximaque ex parte pituitosi, Nonnunquam uerò & melancholici. Quemadmodum parotides crasse
 siori ex sanguine saepenumero generationem recipientes, ad calidos potius reducibiles sunt.
 Sed Narium tumores percurramus, quos itidem Galenus minimè in libro de tumoribus præ
 ter naturā tetigit. Quēadmodū ergo ibi de polypis meminit: cur & hos omisit, qui sequitur?

94. Ozæna

96. Thelul Albuc.

98. Chaisum Arabum.

95. Sarcoma.

97. Alharbian Auic.

99. Hæmorrhoides Arabum.

Tumor. 94.

Ozæna.

a lib. 9. cap. 30.
 in prin.

b lib. 6. cap. 8.

c 3^o. de comp.
 med secundū loc.

d cap. 3. in prin.

e lib. 3. cap. 24.

f lib. 6. cap. 90

g fol. 282. &

h 281.

i ibidem.

k fol. 291.

l fol. 280.

m 5^a. 3^a. tr. 2^a.

n cap. 6.

o lib. Diaision.

p cap. 43.

q lib. 8. cap. 37.

r lib. 3. cap. 26

s Tumor. 100.

t Batrachos.

u 6^a. 3^a. ca. 17.

v i lib. 7. cap. 8.

w Tumor 101.

x Glassomeges

y thos.

z k 14. meth. ca.

a 8. & uidel lib. de

b morb. diff. ca. 8.

c l 6^a. 3^a. cap. 10.

d & uidel cap. 21.

QVORVM primus, ordine autem nonagesimus quartus est Græcè dictus {ὄζαινα} quas
 si dicat graueolens, seu foetens, à uerbo Græco {ὄζω} quod est Latine {oleo} Quo
 etiam nomine polyporum genus quoddam uocatur. Sic (Plinio teste^e) dictum à graui ca
 pitis odore, ob hoc maximè murenis eam consecrantibus. In naribus autem ulcus est plures
 crustas, & odorem foetum habens, uti rectè Celsus^f ait. Eius enim causa non acres mor
 do humores sunt (sic. n. haud graueolens fieret) sed unā putrescibiles. Velut Galenus^g Pau
 lusque^h, & Aetiusⁱ aiunt. De sarcomate autem nonagesimo quinto tumore, & atque thelul quod
 aliqui morum uocāt, & et alharbian^j et Hæmorrhoidibus Arabum^k, præcipueque Rasis, et Au
 cennæ locuti iam antea sumus, quū de polypo sermo à nobis fieret. Chaisum uerò, nasi quædā
 obstructio est, quæ tametsi ex alijs possit causis aduenire, Nunc tamen, ut ex subnascente car
 ne, uel quopiam tuberculo gignitur, de eo loquimur. De qua Principem^l uidere poteris, atque
 etiam Razem^m, qui uocat {alcasem}. aliqui habent {chase} alij uerò {chaisim} et {cassanū}
 Præter hos autem & in lingua, & ore tumores quidam gigni solent. quorū tres nō abimus.
 100. Batrachos 101. Glossomegethos. 102. Ancyloglosson 103. Aphthæ.

ERIT Ergo centesimus ordine tumor, qui Græcè {βατραχος} Latine ranula nominat
 tur, sub lingua existentium partium, præcipueque uenarum tumor est (ut Aetius^f inquit) Ma
 ximè autem pueris aduenire Paulus^g ait, qui phlegmonodem tumorem supposuit. Nos autē
 frequentius ex glutinosa materia genitum hūc tumore uidimus, coloreque (ut rectè Princeps^b
 ait) composito ex colore superficiei linguae, et uenarum eius. Veterinarij quoque medici ranā
 sub pecorum lingua nascentē (Columellaⁱ docente) cognouerunt. Tumor uerò supra centes
 simū primus est linguae magnitudo, quæ nō indecenter mea quidē sententia {γλωσσώμενος} in
 appellari posset. Hunc tumorem uidit Galenus^k usque adeo magnum ut linguam continere in
 ore homo non posset. flatuosque ex spiritu genitum fuisse curationis modus ostēdit. Auicenna^l
 linguae

linguae magnitudinem uocat: alijs etiam ex causis gigni posse non temerè insinuans. Aben-
zoar^m inter apostemata cōputari (si uolumus) posse affirmat.

m p^o. They. tr.
6. cap. p^o.

CENTESIMVS Verò secundus erat tumor, qui Græcè {ἀγκυλόγλωσσος} & {ἀγκυ-
λόγλωστος} q. d. {linguae detentio} dicitur, et qui eam patiuntur, ancyloglossi etiā uocari
queūt. Siue naturaliter à generationis initio huiusmodi affectus aduenierit, ubi membranæ in-
feriores genitæ duriores sunt, siue ab ulcere præcedēte durior cicatrix facta sub lingua sit,
aliquis inesse tumor apparet. (nisi ex nuda siccitate durities illa linguae ligaminibus aduenie-
rit.) præsertim quia dum contrahitur lingua, grossior euadit, quanq̃ alia ex ratione aliquid in
diminuta potius natura est. ut ex Paulo,ⁿ & Aetio^o colligi potest. Quam ob causam Prin-

Tumor. 102.
Ancyloglossos

10 ceps^p {linguae abreuiationem} appellat.

n lib. 6. cap. 29
o lib. 8. cap. 36.
p 3^a 3^a. cap. 12.
Tumor. 103.

TERTIVS supra centesimum tumor erat, qui à Græcis {ἄφθα} dicitur. Vnde (Rhodigi-
no⁹ teste) ἄφθιφος nuncupatur, quem huiusmodi uexat affectio. Puslulosum quidē oris ul-
cusculum est, à Græcis omnibus, ac Latinis eodem nomine definitum. q̃q̃ non oris modò, sed
testium, ac aliarum quoq; partiū ulcera aphthæ dici à Græcis omnibus consueuerunt. Quod
nomen ἀπὸ τοῦ ἄπτεν, quod est, incendere, & exurere dicitur. quoniam, sc̃os ipsum, aliasq;
affectas partes incēdat affectus hic. E quo etiā & Vulcanus à Memphiticis {φθῶς} & {ἄφθ-
ῶς} nominatur. Auicēna^r {alcola} Hali Abbas^r {calaha} nominat. Quandoq; in Arabū li-
bris legitur {colaham} & {alcule} & {cola} & {alcolaia} Calidus proculdubio, atq; incensus
tumor est. SED faucium quoq; ac gutturis, & colli tumores currenti calamo pertransamus.

Aptha.
q lib. 16. lec. an
tiqua. cap. 20.

20 Quemadmodum enim uuam, paristhmia, & antiades. 55^m. 56^m. & 57^m. in priori catalogo tu-
mores Galenus recensuit: Cur & alios omisit, qui etiam sequuntur?

r 6^a. 3^a. ca. 23.
& 3^a. p^o. doct.
p^a cap. 3.
s 9. Theor. ca.
16. & 5^a. Prac.
74. 75. 76.

104. Cynanche.

106. Synanche.

108. Congrona.

110. Bronchocele.

105. Paracynanche.

107. Parasyanche.

109. Folium.

111. Albada.

MVLTA Quidem hic de quatuor primis tumoribus dicenda forent. Quæ ad alium totum
discutienda reseruauimus. quemadmodum et alia quamplurima de reliquis tumoribus obiter,
& ueluti per trāsennam hoc loco præactis. quoniam Tomus hic primus ad immodicam ferè
magnitudinem accessit. Sat igitur nunc sit nosse, quoniam interioribus gutturis musculis in-
flammati, κυνάχη Græcè dicitur. Exterioribus uerò, παρὰ κυνάχη. Veluti faucium inter-
nis lōgis musculis gulam sursum attrahentibus inflammati, συνάχη. Externis uerò gulam
30 constringentibus, ac per hoc uoluntariam deglutionem efficientibus (quicquid Galeni sectas-
tores dixerint) affectis, παρὰ συνάχη à quamplurimis Græcis nominari consueuerunt.
quanq̃ id secus ex Galeni placitis declarandum restat. Generatim omnes affectus, qui nascun-
tur in gula, & suffocant, in synonymis Serapionis uocantur {canchuaraich} in synonymis ue-
rè Rasis {cauguantib} Veluti {giacculi} dicitur in synonymis Contin. {quinantia} (sic. n. cor-
ruptè dicunt Barbari synanchem) quæ fit ex ingressione spondilium.

Tumor. 104.
105. 106. 107.

OCTAVVS autem supra centesimum tumor est, Græcè dictus {γρόγγρος} & numero
plurali {γρόγγροι} bronchocele quædam species est, quæ. s. rotundior gutturis eminentia
cum duritie (prout ex Galeno^r didicimus) quales in quibusdam arboribus appendices sunt
quas grongros uocant. Vt etiam Theophrastus in primo de stirpibusⁿ ad uerbū ita scripsit.

Tumor 108.
Congrona.

40 {Nonnulla uerò hñt et uocatos à quibusdā gongros, aut ipsis proportionem respondentia. ut Olea.

t 6. de morbis
uulg. cōmēt^o. 3.
cōm. 14. & lib.
de lig. Hip. exp.
u cap. 13. circa
finem.

EST autem & alius tumor, quem numero centesimum nonum proposuimus, & ex Recen-

Tumor. 109.
Folium.

x lib. 2. cap. 9. tioribus Barbarolatinis Folium uocauimus. De quo sic Rolādus² ait {Eſt alia quædam paſſio, quæ naſcitur in ore, iuxta epiglotum (intellige, pro Barbarolatinorum more, laryngē) quæ dicitur Folium, quia ſunt una, uel duæ carūculæ tenuēs, & latæ, ad modū folij: quæ conſtruuntur circa tracheam arteriam, & uocem impediunt. Quū uerò patiens os aperit ad loquendum, ſe eleuant: & foramen tracheæ arteriæ oppilant. Quū uerò os claudit, ſubſident. Vnde patiens uix poteſt formare aliquod uerbum intelligibile. Quæ paſſio nunq̃ curatur, niſi beneficio Chirurgiæ; Nō ſolū uerò in numero morbus eſt: ſed aliquis ibi tumor præter naturam eſt. Arabicè {galfania} in ſynonymis Serapionis ſcribitur. Alibi uerò {galfama}.

Tumor. 110. A Quo declarandus reſtat tumor centeſimus decimus, qui Græcè {βρογχοκῆλη} uocatur. & Bronchocele. Increſcens. n. inter cutem & aſperam arteriam Tumor eſt (uti Celſus² ait) quo modò caro hebes, modò humor aliquis melli, aquæ uel ſimilis includitur. Interdū etiam minutis oſſibus pili immiſti. Quidam uerò adipoſus (Aetio² quoq; docente) quidam pultaceus, quidam uerò canceratus appellatur. Sepius autem inter aſperæ arteriæ caput (quod Græcè {βρογχο} dicitur, Latine guttur) et cutim naſcitur. Omnis autem Tumor {κῆλη} dicitur. prout aliàs iā ex Aetio⁴ declarauimus. b Inde {βρογχοκῆλη} quod eſt {gutturis tumor} appellatur. Aliqui gutturis ramicem. Alij gutturis herniam uocant. & unico nomine compoſito gutturherniam nuncupare poſſemus. Eos qui hoc morbo deboneſcantur gutturoſos uulgò appellamus. Medicorum Græc. Botium nominat.

Tumor. 111. ALHADAL, ait Antiquus Arabicorum nominum Interpretes, apoſtoma eſt, quod uidetur homini patienti, q̃ decolletur. Vnde nomen id Latine idem ſonat, quod {decollatio} Eam angina ſpeciem eſſe reputo, in qua colli quæpiam uertebrae ad interiora luxatur. Vt ab Hippocrate, ac Galeno d pluribus in locis ſcriptum eſt. Hic ergo tumor eſt, quem centeſimum undecimum ordine collocauiſus. Sed faciei tumores contemplemur.

112. Dionyſiſci. 115. Mentagra. 118. Noli me tãgere.
113. Hypopion. 116. Ephelis. 119. Butiraga.
114. Ionthis. ſeu uari. 117. Ignis ſyluaticus. 120. Gutta roſacea.

PRIMVS Ergo prædictorum eſt, Græcè dictus {δυννοϊσμοι} numero plurali. quoniam prope tempora utrinq; naſcentes oſſeæ quædam eminentiæ ſunt (ut Definitionū Auihor ait) Dicuntur aut et cornua, deſumpto à cornigeris animalibus nomine. Quod ſi altera duntaxat

parte obortus hic oſſeus tumor ſit, numero ſingulari, Dionyſiſcus appellari poteſt. Non aliū eſſe reor, q̃ ſatyriaſmi ſecundū ſignificatum, de quo iam antea locuti ſumus, ubi Exoſtoſeos q. d. exoſſationis in Galeni catalogo uigeſimi ſeptimi tumoris quadda eſſe ſpēm declarauimus.

DE Hypopio aut faciei affectu, quem Græci {ὕψωμα} uocant, prætaſtum quoq; nonnihil & in ecchymoſeos deciminoni quidem iuxta Galeni catalogū Tumoris enucleatione fuit.

SIC etiam de Ionthis, uariſ uel in ſermone, quem de epinyctidibus trigeſimo quarto eiſdē catalogi tumore habuimus, locuti iam ſatis ſuperq; ſumus. & Hos Barbarolatinorum Græc. uocat goſſos, & goſſonos, & coſſos, uel ad ionthos goſſi reducibiles ſunt. quanuis in ſynon.

Cotin. Raſis legerimus, {coſſis, ſpecies ſcabiei}.

QVEM admodum & de Mentagra ſcripſimus. Vbi lepram, uigeſimum quintum à Galeo no definitum tumorem enucleare conabamur. b Quò ſit, ut alia percurramus.

Tumor. 116. {EPHELIS} Ergo (uti Celſus¹ ait) à pleriſq; ignoratur. Quæ nihil eſt, niſi aſperitas quædam,

quædã, et durities mali coloris. sæpius at ex ardore solis progi gni, excitariq; solet. Asperita
tis, duritiæq; ratione in tumorum catalogo numerandam censuimus {εφελις} Græcè dicitur.
atq; etiam {εφελος} Deductum uerò nomen à sole est. qui Græcè uocatur {ελιος} Hic er
go est, quem ordine centesimum decimum sextum proposuimus.

QVEM Sequebatur alius, quem Recentiores ignem syluaticum uocant, & ignem agre: Tumor. 117.
stem, & nos centesimum decimum septimum proposuimus. De hoc igitur Nicolaus Florens Ignis syluatis
tinus^k ait {q} est de genere serpiginis, serpens per membra uicina, urendo sicut ignis. & est cus.

quasi esset scabies sicca. Magnam profecto exustionem præse fert, & in labijs maxima ex
parte, ac mento emergit. quem extractione ignis, attritione chalybis & durissimi silicis mus
k sermone. 7º.
tr. 6. sum. 3. c. 9.

liercula quamprimum pristinae sanitati restituere solent. Vbi tamen medicorum præsidys
sæpenuerò medium unguem affectus porrigit. Non alium esse opinor, quem Razes in Dis
uisionibus^l {Balkiat} et {albalkian} appellat, Guido^m autem ignem uolagium, et {derba}
uocat. Ad lichenè agre stem Græci referrent.

l lib. Diuis. cap.
133.

m tr. 6. doc. pº.
cap. 3.

HOC autem longè peior morbus est, quem Neoterici quoq; nominant {Noli me tangere.}

Tumor. 118.

Tumor est, quem numero centesimum duodeuigesimum scripsimus. Hunc Guido,ⁿ Theodo

Noli me tan

ricus,^o & Argelata^p exulcerati, maligniq; Cancris speciem esse definiunt: Sic autem nomi

gere.

nari, quum in facie, præsertimq; supra mentum, circa os, & nasum oritur. Lentè enim crescit

n lib. 4. doc. pº.

(inquit Theodoricus) quasi pustula toto anno manens parua. Dupliciq; ratione dicitur {Noli

cap. 6.

me tangere} tum quia contagiosus ualde morbus est, tum secundo quia ex remedijs etiã, quæ

o lib. 3. cap. 6. 8.

cõgrua uidentur, uelut æstro percitus, irritetur potius, q̃ mitigetur, & in sanas partes depa

p lib. 4. trac. 2.

scendo uagetur. Formicem aliqui nuncupant. alij Fornicem, alijq; fornacem proferunt. Aliud

cap. pº.

tamen formicis nomine intelligunt à formica, hoc est, herpete. ut diuersa scribentiũ capita per

q Vide Theod.

librare promptissimum est. Eũdem affectum loco duntaxat (ut aliqui uolunt) differentem, si

ubi supra. et cap.

crura inuasit, Lupum nominarunt. Frequentius autem (uti Nicolaus Florentinus^r ait) in ti

16. & Nicolũ

bijs aduenire solet. In medio corporis nascẽtem hũc alij Cingulũ uocat (ut inquit Guido.) Eũ

serm. 7º. tr. 4.

esse reor, quem Scribonius Largus,^s Marcellusq; {Zonam} Plinio ascriptus autem liber

sum. pº. cap. 24.

{circinũ} quoq; uocat. Nec aliud esse reputo eũ, q̃ ab utroq; Plinio^x {Zoster} dicitur: Ignisq;

& trac. 5. sum.

Sacri spēs ponitur, hoĩem profecto pernecās si cinxerit. Cãcri ergo spēm præscripti doctores

pº. cap. 27.

posuerunt. Rogerius^y autem, & Nicolaus^z ac demum Ioãnes de Vigo^a à cancro diuersum

r serm. 7º. tr.

definierunt, capitibusq; distantibus.^b In eo præsertim à cancro differre scribentes: quoniã ab

4. sum. pº. cap.

incensa magis bili cancer fit. Vnde cancer corrodit plus in uno die (inquit Rogerius) q̃ Noli

24.

me tangere in uno mense. Qui tamẽ deinceps de lupo loquens, quem & herpetẽ esthiomenũ

s cap. 3. 47.

uocat, plus cancro corrodere hũc ait, in profundo, & in duplo magis. Verba autem quæ Ro

t cap. 20.

gerius de cancro scripsit, Niculus eadem de lupo retulit. uidelicet plus uno die exedere, q̃ fa

u 3. 33. 34.

ciat Noli me tangere in mense. Ob uehementẽ ergo exesionem, erosionem ue, et lupum, siue

x lib. 26. ca. 11.

lupam, & esthiomenũ appellarunt. Quoniam uerò Gregarij quidã chirurgi huius fraudus

in fine.

lentiam, & lupacitatem cũ pecia scarlati, & cum appositione carniũ gallinarum actũ calis

y tr. 2. cap. 2º.

darum mitigare tentarunt: Idcirco uulgus (ut bene Guido testatur) Lupum inde nominari

z Vbi supra.

existimat, quoniam scilicet quotidie unam gallinam comedit. quam si nõ habuerit, totum crus,

a lib. 4. ca. 24.

ac deniq; totum hominem exederet. Quæ fatuitas ad hodiernum usq; tempus uulgo inest, gal

b Rog. cap. 5.

linæ carnibus uesci ulcus illud reputanti, ac pro compertissimo habenti. Non temerè tam lu

Niculus. cap. 22.

pum, q̃ Noli me tangere Manardus^d ad phagedænas retulit. Vterq; autẽ affectus à super

de cãcerosis ulc.

assata

et tr. 5. sum. pº.

prima.

cap. 29. de cãcr.

e Ibid. 14. 5.

d lib. 7º. epist.

HH

assata bile fit: à magis tamen exusta lupus. qua de causa uelocius erodens, & obambulans est. magisq; ob humoris grauitatem inferius: uelut Noli me tangere ob leuitatem superius emergit. Quauis autem aliqui hos, cancri species posuerint, Alij uerò (uti præscriptum est) à cancro distinxerint, Ex Theodorici^a nihilominus distinctione, concordēs illi fiunt. quoniam scilicet cancri generatim sumpti species erit. speciatim uerò à Græcorum, & Romanorū Cancro differt. Aequiuocum. n. nomen & cancrū; Theodoricus reputat: quoniam & phagedænam uti prædictū est, sub cancri uoce priores intelligebant. Verum de his aliàs uberius loquemur.

Tumor. 119. **TUMOR** Deniq; centesimus undeuigesimus restat. q. Buttizaga^a dicitur à Gulielmo de Saliceto. Ab Argelata^b scribitur & butiga^a diciturq; & gutta ruonia^a & & gutta rubea^a à quibusdam gutta rabida, Tumor magnus, erysipelaceusq; interdū exquisitus, sepe autem et alijs humoribus admixtus est, in facie erumpens, magnamq; homini molestiam inducens. Nicolaus Florentinus^c & inflationem faciei^a uocat. Gulielmus Placentinus^d & aurea ceruinā^a appellat.

Tumor. 120. Distinctus ab hoc tumor est, quem ordine ceterisimum supra uigesimum statuimus, et & guttam Gutta rosacea rosacea^a uocauimus. Sic. n. è recentioribus plurimi appellant. ut Nicolaus^e est. Ab alijs dicitur & gutta rosea^a ut à Theodorico, & et Argelata, & Ra^azes^b & uesligium rufum, & et & uitiū faciei in principio lepræ^a appellat. Etenim elephantiasim præcedere solet. Arabicè ab Auicennaⁱ dicitur & albedsanen^a. Inuenitur etiam apud Bellunensis interpretationem & albedasnan^a Gui dosimul de buttizaga, & gutta rosacea, eodem capite locutus est. ^k sicut etiam Argelata. Tres guttæ rosaceæ species posuit Niculus, ^m quem uidere poteris. Nos uerò interim ad alia transgrediamur. Mammarum ergo tumores contemnemur.

121. Sparganosis. 122. Chondriosis 123. Trichiasis. 124. Gynæcomastion.

Tumor. 121. **TUMOR** Centesimus uigesimus primus est, qui quidem Græcè & σπαργάνωσις^a appellatur. quasi dicat abundantia, nimiaq; lactis copia. ut propterea inflantur, doleantq; mammillæ. à uerbo & σπαργάνω^a quod est & luxurior, et abūdo. & Auic.ⁿ & lactis superfluitatē^a uocat.

Tumor. 122. **ALIVS** tumor est numero. 122. qui & χονδρίωσις^a & & θρόμβωσις^a dicitur. q. d. Latine grumescencia. Auicenna^o & lactis caseationem^a uocat. Qui tamen distinctū ab hoc caput scripsit, de lactis congelatione, & fortè intelligens alium tumorem, quem nos ordine. 123^m. colloca-

Tumor. 123. **Trichiasis.** uimus, & τριχίασις^a appellauimus. q. d. Latine capillitium, siue (ut alij dicunt) capillationē.

^k **Tr. 6. Doct. 2.** In cuius morbi causa non uehementer Aristotelem admirari nequeo, dū sic nobis scriptū reliquit & & Vbera tota fungosa ita sunt, ut si in poculo pilū forte hauserit mulier, dolor moueatur

^l **lib. 5. trat. 4.** in mammis. quem morbum & τριχίασις^a (quod est & pilarem^a) appellant, siue dixisse mauis cap-

^m **cap. 9.** pillarem & τριχίασις^a. n. & pilos, & magis capillos significat. Nec sedatur (subdit Aristoteles) donec pilus uel pressus exeat sponte, uel cū lacte exugatur. Credit ergo Arist. pilum per

ⁿ **12. fen. 3. c. 3.** os de glutinum ad mammas pertransire. Quo quidem dicto his, qui sese in Anatomicis administrationibus quantulumuis negligenter exercuerint, magis fatuū, ridiculū ue dici nil potest.

^o **Ibid. cap. 4.** ut non minū quoq; Aristotelis sententiam transcribentem, taciteq; comprobantem Manardū^r

^p **Ibid. cap. 5.** admirer. Etenim & si uerū fortassis est à māmīs interdū extractū esse pilū, post illarum duritiem, phlegmonē ue in scirrhu conuersam, (Id enim à mulieribus interdū experimento comprobatur audiuius:) Nihilominus tamē haud exhaustum ore pilum esse proferendū est, sed

^q **7. de hist. animalium. cap. 11.** lactis in mammarum uenulis exiccationem, usq; adeo ut pilorum effigiem repræsentet. Non

^r **Epist. 7. p. 4.** secus, ac in urinis aliquando capillitium (uel Hippocrate^s comprobante) inspeximus. quorum

^s **4. Aphor. 76** generationē Galenus^t in uenis potius, q̄ in renibus factam reputauit. Paulus^u uerò in urete

^t **6. de loc. aff.** ris

^u **lib. 3. cap. 45.**

^{sec. 3. ante me^m.}

ris meatibus gigni insinuat. Nos autem è renù colatorio resudate crassiuscula pituita, et una
durefcente, non secus ac in totius cutis pilorù generatione cōtingit, pilos huiusmodi, seu pilo-
rù effigiè referètia corpuscula, semipedalè aliquando longitudinè & quantia proficisci deter-
minamus. Sic igitur & in māmīs gigni pilaris quædā substantia resudando pōt. Vel intus ue-
nas prius exiccato lacte genitus pilus, per uenarū referatos porulos tandē erūpet. Quo qdē so-
rās egresso, (quēadmodū et ī dothienibus educto crassiusculo pure) dolor cessat, minuitur ue-

SOLENT Autem & uiris quoq; māmæ nōnunq; turgere (ut. 124^m. tumorē expediāmus)

adeo ut mamillis mulierum similes fiāt. Tumor hic græcè {γυναικώμασι} q. d. Latine {mu-
liebris māmilla} tam ab Authore definitionū, x q; à Paulo ⁹ nominatur. Arabicè in synonymis
10 mis Contin. legitur {geffir} Albucasis, ^z Argelata, ^a Theodoricus, ^b Lanfrancus, ^c Brunus, ^d libri.

atq; etiam Niculus ^e {māmillarum magnitudinem in uiris} appellarunt. Adiposus proculdubio
tumor est, pinguedine sub māmillis increfcente. Sed alios itelligamus, qui thoraci proprij sunt.

125. Pleuritis. 126. Peripneumonia 127. Phthoe 128. Althahalep. 129. Napta.

OMNIBVS Notus affectus est pleuritis, quia. s. membranæ succingentis costas inflāma-
tio est, Græcè. n. {πλευρις} costam, et latus significat. unde {πλευρις} q. d. {lateralis mor-
bus} dicitur. Arabicè {sōfati} q. q; nomen id aliquando significat illis apostema costarum, &
præcipuè mendosarum. Interdū legitur {sōfata} Aliquando dicitur {birsen} licet nomen id

generatim omne pectoris apostema (uel Auicenna f. docente) significat. In synonymis. Cont.
dicitur {Barsamut} Cuius spēs est {sacrisilion}. Abēzoar & suo idiomate nōauit {scabusia}.

20 MANIFESTVS quoq; 126^o Tumor est, Græcè dictus {πνευμονία} pulmonis. n. inflammatio est. In synonymis Rasis dicitur {chaiana} Quod nomē aliquādo etiam eius Gen-
ti phthisin præsefert. Dico {φθίσις} quā propriè Græci, præsertimq; Athenienses {φθόσις}

Galeno docente ^b nominant: totius uidelicet corporis cū febre parua extenuationem, quæ pul-
monis ulcera insanabilia consequitur. Nunc uerò in tumorum albo ut. 127^m. cōputauimus: pro
ipso uidelicet pulmonis ulcere intelligentes. cui non modò inflammationem, sed scirrhum quoq;
scirrhosam uel pblegmonen adnecti, q; plurimis dissectis, inspeximus.

RESTAT ergo. 128^o. tumor, quem Abenzoar ⁱ descripsit, uocans ipsum proprio idiomate
{althahalep} quo mortuum esse patrem suum ait, subq; spatulis in dextra, & sinistra parte
nascens malignū apostema esse, usq; adeo ut carnem ipsam usq; ad profundū quoq; mortificet,
30 interim ex aduulsis humoribus, interim uerò ex pblegmatico humore grosso, ac nonnunq; ex
aquofo sanguine genitum definiuit.

NAPTA Demū Tumor. 129^o. sequitur. Variè quidem scribitur. A nonnullis. n. {Natta}
dicitur, & ab alijs {nata} Inter dorsi tumores ab Argelata ^k connumeratur. {Est autem apo-

stema (ut inquit) magnum carnosum, & molle. In quo quidem apostemate non est dolor, Et
si est dolor in eo, est paruus. neq; est calor, Neq; pulsatio. Et aliquando ita crescit, q; superat
omnes partes corporis} Quanq; uerò prius, dorsi tumorem scripsit (Dorsi nomine postea
riorem thoracis partem intelligens.) Nihilominus tamen deinde subdit {Et hoc apostema acci-

dit in humeris, & in alijs locis.} Quinimò curationem scribens, postea sic ait {Verum natta
aliquando pendet ad modum, quo testiculi pendent: quoniam radix eius est ualde subtilis. etc.}

40 Idem Brunus, ^l & Theodoricus ^m de huiusmodi. s. tumoris prædicta definitione aiunt, fun-
go hanc carnis excrescentiam assimilantes: Eandem ambo historiam narrando, de quodam. s.
qui septem librarum pondere nattam habebat, & à quodam chirurgo exquisitè curatus est.

n. 2. doct. 2^a. Guido^m (quem Tagaultius^p exscripsit) natum, ancharumq; carni comparauit, Melonis, & cucurbitæ quantitatem aliquando referre dicens: diuersamq; formam, & diuersa inde nomina secundū diuersa quoq; membra sortiri. Bertapalea^p Ritio assimilauit. qui ut plurimum in uoz la manus, aut in fronte, et capite oriri, aut in collo post terga ait. Nos autem in scapulis duntaxat ortum huiusmodi tumorem uidimus, nec uerè carnem, sed adipem in eo contentam, tametsi carnosam aliquando inspeximus. Adeo ut ad steatoma reducendum esse dubio procul omni determinemus. Fortè non alium affectum Razes, & Gladularū magnarumq; nomine, ac etiam Hali Abbas^r dictione selaba^r ad melonis magnitudinē peruenire dicētes, intellexerunt.

q. 7^a. ad Man-

forē, 14.

r. 8. Theor. c. 11

Quauis ergo Medicorum Coryphæus Galenus nil de hisce multis tumoribus meminerit: Nihilominus tñ ad aliquem in eo libro præscriptorū reduci facillimè queūt. Vt nō temerè ab eo scriptum in calce libri sit, Nullam esse tumorū speciē, quæ in eo libro præacta nō fuerit. Oēs uerò deinceps uel sanguinei, uel phlegmatici, uel melancholici sunt, aut biliosi: Itēq; uel aquei, uel flatuosi. Ac demū uel calidi, uel nō calidi. Vt in proposito textu præassumptū est.



ED Non hi tantūmodo tumores à Galeno prætermiſsi in eo libro sunt. Vbi de tumoribus præter naturam locutus est. Verū & in alijs quoq; partibus q̄ plurimi sunt: Quos nunc insimul omnes paucissimis astringemus, ne in nūm mium satis tædiosum tumorem hic Tomus exturgeſcat. Vberius. n. in alio Tomo singula repetemus. Erunt ergo hi.

s. De his tribus uide. 3. de articulis. cōm. 2. et. 9.

2. 2^a. Aphorif.

40. 26^a. 4. 6. et

4^a. de locis affect.

cap. 5.

e lib. 4. cap. 12.

u in synon. Cōl.

fol. 481. col. 5.

x lib. 4. cap. 8.

y 3^a. cap. 4.

z Ibidem.

a Ex Defin. Au

thore.

b lib. de natura

mulieb. uersus fi

nem.

c tr. 2^a doct. 2^a.

cap. 4.

d 7^a. 4^a. de 3.

cap. 12. 14.

e lib. 26. cap. p^o.

circa finem.

f 8. Theor. c. 18.

g 2^a. 4^a. tr. p^o.

cap. 20. in fine.

h 2^a. 7^a. cap. 20.

21.

i 2^a. 93.

k trac. 6. doe. 1.

cap. 3. in fine.

l libro. 5. trac. 2

cap. p^o.

m 6. epid. part.

8. tex. 3.

Dorsi Tumores.

130. Cyphosis, seu cyr

tosus, & hybosis.

131. Lordosis.

132. Scoliosis.

Ventriculi.

133. Coeliacus. Celsi.

134. Aurys, Rafis.

Intestlinorum.

135. Colica.

136. Ileos.

137. Condylomata.

138. Hæmorrhoides.

139. Marisca.

Hepatis.

140. Hepaticus. Celz

si, & Aureliani.

Vitio hæpatis succedētes.

141. Cachexia.

142. Altherel. Bellus

nensis.

143. Thebegi.

144. Altherbel. Bel

lunensis.

Splenis.

145. Splenicus. Aus

reliani.

Rbenum.

146. Nephritis. pro

phlegmone.

147. Lithiasis.

Penis.

148. Satyriasmus. Pau

li.

Muliebriū locorum.

149. Cercosis.

150. Mola.

151. Nymphemege

thos.

152. κίον. Hippocr. b

153. Scleroma. Pauli.

Articulorum.

154. Arthritis.

155. Podagra.

156. Chiragra.

157. Ischias.

158. Lupia^f Guidonis.

159. Tophi.

160. Cornua. Auic. d

161. Ancylosis, seu

Ancyla.

Extremarū partium.

162. Paronychia.

163. Pterygiō. Celsi.

164. Condyli.

165. Perniones.

166. Gemursa^f Plinij.

167. Dētes muris. Bel

lunensis.

Crurium.

168. Alliathan. Inter

pr. Arab. nom.

169. Lupus.

170. Daſtilia f Halia.

171. Malum mortuū.

172. Terminthos.

Qui certam sedem nō

determinant

173. Emphysema.

174. Phlyctæna.

175. Turmusios & Aui.

176. Impetigo.

177. Effere.

178. Palmos.

179. Clauus.

180. Calli

181. Aegritudo bouina

Abēz. & et Albuc. i

182. Dracontium.

183. Syrones. seu pidis

celli, Guid. & et Ar

gelata^f.

184. Variola.

185. Morbilli.

186. Rubeola.

187. Crystalli.

188. Exanthemata

189. Ectymata. Fernel.

190. Hidroa. seu sus

damina.

191. Epinyctis. Roma

norum.

192. Bothor lenes.

193. Ganglia.

194. Seps Hipp.

195. Spina uentosa. 203. Herpes Essthiome 211. Spina. 219. Eparma, Hipp. 8
 196. Bubasticō ulc.² nos. Auic. 212. Morsus diaboli. 220. Rosboth. 2 Aetius. 4.¹. 21
 197. Hypersarcon. 204. Thymio Celsi.^c 213. Patursa f. i. mor 221. Cunus Rafis. b Celsus. 5.¹. 28.
 198. Cacoethe. 205. Ignis sacer. Cel.^d bus Gallicus. 222. Albothir Albus b ibidem.
 199. Sipedon. 206. Cerion Pauli.^c 214. Scopuli. casis.¹ c Ibidem. sec. 2.
 200. Nome. 207. Paratrimmata. 215. Tincosati. 223. Nakir Alb. k d Ibidem. sec. 4.
 201. Therioma.^a 208. Apofirmata. 216. Pinita. 224. Alchalā Abēz.¹ e lib. 4. cap. 35.
 202. Herpes Essthiomēnos. Celsi.^b 209. Zerma. 217. Spili. 225. Arcella Abēz.^m f Ex Ioāne Ale
 210. Rancula. 218. Tufius Auic. 226. Rosula sataritia. g p.^o. epid. com= metario. p.^o. 11x.
 HI Tumores in catalogo enucleandi remanent. Quorū profectō plurimi ad eos, qui declara= b 13. Cont. ca.
 ti iam in præcedentibus sunt, reducuntur: Plurimi autem obiter à nobis in aliorum quorun= p.^o in prin.
 dam definitionibus satis superq; ostensi fuerunt. Qui autem adhuc noua indigent explana= i p.¹. 57.
 tione, multi iam remanent. Sed quoniam Tomus hic ad nimis immodicum tumore præter opi= k 2.¹. 95.
 nionem nostram peruenit, Nos uerò ab alijs, et maioris quidem momenti speculationibus dis= l 2.¹. 70. cap. 9.
 strabimur, familiaribusq; negotijs impediti sumus: Ea propter primo huic Tomo colophonē m ibidē. cap. 8.
 imponamus. Itaq; Deo Optimo Maximo æterna laus, & gloria sit.

Τέλος.

VIRO VNDECVNQVE DOCTISSIMO IOANNI

Philippo Ingrassia, Philosopho, & Medico eminentissimo Hieronymus

Modius. S. P. D.

Q VVM Primum tuus de tumoribus præter naturam allatus est mihi liber (Vir doctissime, simul & humanissime) cæteris literarum studijs intermissis, ad eum legendum me contuli, quo sanè accurate diligenterq; lecto, proh Phæbe Pater quot, quantasq; res per obscuris tenebris iandiu inuolutas q; splendidis diuini tui ingenij luminibus illustratas reperi. Nihil me hercule factum est reliqui apud Græcos, Latinos, & Barbaros de morbis, atq; Symptomatis, quod non perspicuè, copioseq; explanaris. Dy boni q; doctē, q; planē quæstionem τῆς ἐνυκλείας αὐτῆς enucleas q; enucleatē Galeni libellum huius tui cognominem explicas. q; dilucidē eiusdem τῆς κώματος restitutum libellum enodas. ita firma, certaq; toto passim opere argumenta afferuntur, ut mihi quidem non persuadere, sed cogere uis deantur. nō permisse, atq; confusē, sed ordine quæq; suo disposita aguntur, scribendi genere nequaquā incondito, dissipato ue, quod in Philosopho, Medicoq; homine, & si non admodum animaduertitur, habet tamen hæc quoq; res negligentia modum. Equidem, ut ingenuè tecum agam, longè plus didici septem hos dies, quos legendis luculentis tuis lucubrationibus libentissime impendi, q; bisseptem exactos iam annos, quos in perplexis aliorum scriptis miserè perdididi. Propterea uerè te πολλῶν ἀντάξιον ἄλῶν, teq; μᾶλλον ἐπαινοῦμεν τῆς πάντων, cum Poeta appellabo. Quid pluribus? Cuncta illa in tuum libellum egregiè transferri posse arbitror, quæ in diligante Medico requirit Hippocrates. ἀγαθὸς, καλὸς, ταχὺς, ἀπὸνός, δὲ γυμνός, & ὁδός. Itaq; præ lætitia temperare mihi non possum, quin te si non coram, at certè literis amplectar, exosculer, atq; rogem, ut me in tuo ære, mancipioq; reponas. Vale Vir tam excellenter de literaria Rep. benè merite, cui, & tibi diu uiue felix, Cosentia quinto Idus Aprilis. M. D. LIII.

HH ij

Ne mireris candidissime Lector si duplicem inspexeris Indicem. Efflagitantibus.n. discipulis, ut de tuis moribus facta elucubrationes in lucem æderentur: imperfectus adhuc primus Tomus traditus est, usq; ad folium. 300^m. ubi Galeni liber de tumoribus præter naturam expeditus iam fuerat. Quam ob rem & primus Index ea, quæ ante illud scripta fuerant, ostendit. Pro quibus etiam & nonnulla scholia tradidimus. Quæ uero inde scribuntur: ut qui à Galeno in eo libello prætermitti fuerunt, tumores tibi demonstrentur, quique ad aliquam speciem illorum, qui in eo uolumine prætracti sunt, omnino reducendi ueniunt, hoc breuiori quidem indice reperies. Totius uero capitis primi expositionem, et quæstionem de causis doloris, quas fol. 12. in hoc tomo ædēdas proposuimus, ob quæ plurima superueniētia impedimentum, in hoc primo Tomo ædidiisse non quiuimus. Quorum nihilominus uice, libellum Galeni de Comate rediuiui factum, simulq; summarie expositū adiunximus. Hæc igitur accipito. Quæ si quadantenus tibi grata fuisse cognouero, quamprimum ad reliquorum æditionem accingar. Vale.



- A**benzaris error. 310. 30.
 & .32. 312. 32. 337.
 32. 344. 29.
 Alirfema. 361. 35.
 Abusimi. 361. 34.
 Achlys. 356. 24.
 Aegilops quid. 368. 34.
 Aeti error. 310. 29. 319. 11. 321. 32.
 Afilans. 369. 16.
 Agildis. 356. 23.
 αγκύλη. 307. 14.
 αγκύλωσις. 307. 14.
 Agricola error. 318. 8.
 Agrypon comæ. 301. 15. 319. 35.
 Abualis. 369. 17.
 Akilas. 368. 40.
 Alachad. 307. 22.
 Alantific & eius species. 367. 15. &
 sequentibus.
 Alasue. 357. 25.
 Albalkiati. 573. 82.
 Albani error. 311. 17. 339. 40. 345.
 32.
 Alband. 349. 29.
 Albedasnan. 374. 18.
 Albedsanen. 374. 18.
 Albir. 305. 10.
 Albugo. 356. 35.
 Albul. 357. 11.
 Alcarad. 351. 3.
 Alcasem. 370. 28.
 Alcharba naturalis. & non naturalis.
 341. 3. & 5.
 Aleman Preta pediculari morbo detrusus. 350. 4.
 Alcola. 371. 17.
 Alcolai. 371. 17.
 Alcule. 371. 17.
 Alfeed. 351. 5.
 Alfuchbach. 356. 10.
 Alfuturati. 314. 13.
 Aleibar. 359. 18.
 Alguardan. 351. 4.
 Alguardenisi. 354. 8.
 Alhadal. 372. 19.
 Aldebie. 341. 16.
 Alicod. 357. 24.
 Alibar. 359. 18.
 Alintifar. 360. 10.
 Almahagiat. 352. 23.
 αλωπακία. 337. 2.
 Alopecia. 301. 26.
 Alopecia cur inter tumores computetur
 340. 40.
 Alopecia communis toti corpori affectus.
 licet capiti ascribatur. 340. 16. ex quo
 morborum genere. 340. 20.
 Alopecia unde dicitur. 337. 5. & 8. cū
 sequentibus.
 Alopecia causa morbus est. 340. 31.
 Alphos uterq; in tumorum catalogo à
 Fuchio reponitur. 301. 18.
 Alfarbach. 364. 40.
 Alfabere. 363. 11.
 Alschernach. 365. 12.
 Alsecati. 333. 8.
 Alselba. 306. 23. quomodo differt ab als
 selaba. 307. 39.
 Alfude. 367. 28.
 Alhabalep. 375. 30.
 Alebegi. 362. 13.
 Alebegi. 362. 13.
 Alibute. 362. 5.
 Aluardinegi. 354. 8.
 Alumbetis tracti. 314. 18.
 Alurafar. 360. 20.
 Alustafat. 360. 20.
 Alxatrati. 363. 18.
 Alzemen. 307. 22.
 Ammyun. 356. 16.
 Anacar sius. 335. 38.
 Analotira. 356. 17.
 Anatatare. 355. 38.
 Anchilops quid et unde dicitur. 368. 28.
 Ancrisina. 362. 33.
 Ancyle quid. 307. 26.
 Ancyloblepharos. 361. 28.
 Ancyloglosson. 371. 3.
 Ancylosis. 362. 27.
 Andernaci error. 302. 14. 311. 17. 3
 345. 31.
 Angiles. 369. 2.
 Anisum. 356. 15.
 Anisuma. 362. 32.
 Anosikima. 356. 18.
 Anibracsis oculi. 359. 22.
 Anismuma. 360. 24.
 Aphrihen. 352. 34. 353. 18.
 Aphtha. 371. 11.
 Aphthas idest Vulcanus. 371. 16.
 Aphthiphos. 371. 13.
 Apoplexia. 301. 13. 332. 34. unde dis
 citur. 333. 14. eius causæ. 333. 17.
 Apoplexie & cari differentie quinque
 331. 31.
 αποπληξία. unde dicitur. 333. 14.
 Apostasis duplex. 316. 1. proprie qd ibi
 dem 8.
 Aqua in capite. 308. 15.
 Aqua intra cranium, & extra. 308. 11.
 Aqua descendens ad oculum. 360. 23.

- ἄρα. 329. sepe.
 ἄρα. 329. sepe & 330.
 Argemon. 357. 36.
 ἄρα. 315. 9.
 ἀργία. 315. 2.
 ἀργός. 315. prima.
 Area quid. 340. 5.
 Arthresis. 310. 25.
 Arthritis. 310. 26.
 Asarnach. 363. 21.
 Ascera. 363. 11.
 Asche. 359. 15.
 Aschylus. 369. 17.
 Asestra. 363. 19.
 Asorb. 351. 9.
 Asufimi. 361. 35.
 Asylus. 369. 27.
 Atasim. 306. 10.
 Athas. 309. 6.
 Attonitus morbus. 332. 34.
 Auerois error. 310. 32. & 312. 32.
 Auicennae error. 305. 16. & 310. 30. & 311. 20.
 Auicennae uarietas de ganglio. 305. 22.
 Auicennae superfluitas, & defectus de glandulis. 307. 3.
 Auratis. 365. 2.
 Auratus. 364. 41.
 Aurea ceruina. 374. 13.
 Auritus. 369. 26.
 Aurus. 365. 1.
 Axirnath. 365. 3:
 B.
 Balkiati. 303. 15. & 373. 12.
 Balkie. 303. 15.
 Barbe usus. 340. 12.
 Barsamut. 375. 21.
 Barytes. 364. 36.
 Batrachos. 370. 33.
 Beditus. 569. 21.
 Birsen. 375. 19.
 Boibor in oculo. 357. 18. & 359. 34.
 Boium. 372. 18.
 Βραχίον. 302. 29.
 Βραχίον. 302. 29.
 Βραχίον. 302. 28.
 Βραχίον. 302. 30.
 Bronchos quid. 372. 13.
 Bronchocele. 372. 9.
 Butiga. 374. 10.
 Butizaga. 374. 9.
 C.
 Calcataren. 356. 8.
 Calcataron. 356. 8.
 Calcatbaia. 356. 7.
 Canchuarach. 371. 33.
 Capillitium renum. 375. 1.
 Capillorum fluor. 340. 12.
 Capillorum usus. 340. 22.
 Capitis inflammatio. 311. 41.
 Capitis magnitudo. 308. 16.
 Καρ. 331. 25.
 Carbunculo oculi. 359. 22.
 Carcinoma. 359. 26.
 Καρ. 331. 25.
 Καρ. Βαρί. 331. 25.
 Cari & apoplexie differentiae quinque. 331. 31.
 Caros. 301. 12.
 Caros quid. 331. 30.
 Καρος unde dicitur. 331. 24.
 Caros leibargo peior. 332. 20.
 Καρ. & Βαρί. 331. 25.
 Carui. 366. 21.
 Καρ. & Βαρί. 331. 26.
 Catacheis. 320. 38.
 Catalasis. 320. 39.
 Catalensis. 320. 40.
 Catalensis. 320. 39.
 Catalepsis. 318. 22. 301. 10.
 Cataphora duplex. 317. 19. & 326. 11.
 Cataphora quid, et unde dicitur. 317. 9.
 Cataphorae uigilis species duae. 328. 2.
 Cataphorae uigilis non pigre inditia. 328. 17. pigre inditia. 328. 22.
 Catarracta. 357. 18. & 360. 22.
 Catocha. 301. 11. & 318. 2.
 Catoche. 318. 1.
 Catochi nomen equiuocum. 321. 8.
 Catochi species duae. 318. 19.
 Catochi species tres apud Definitionum Authorem. 321. 10.
 Catochos. 317. 33.
 Catochos Pauli. 301. 16.
 Cauquantib. 371. 34.
 Causi & phrenitidis eadem generationis cause. 325. 22.
 Celsi error. 339. 34.
 Celsum. 362. 4.
 Cerebri gangrena. 313. 13.
 Cerebri erysipelas. 313. 21.
 Cerebri phlegmone. 310. 31.
 Cerebri sphacelos. 313. 13.
 Cerebri uenule. 310. 16.
 Cerebrum quandoque pro similari, quandoque pro organico. 315. 23.
 Chaiana. 375. 23.
 Chaifum. 370. 25.
 Chalaza. 366. 23.
 Chalazion. 366. 22.
 Chalazosis. 366. 23.
 Chame. 353. 28.
 Chattilli. 351. 3.
 Chemosis quid & unde. 353. 21. & sequentibus.
 Χημ. 353. 28.
 Χημ. 353. 21. 27.
 Chondriosis. 374. 26.
 Chymosis quid et unde. 353. 21. & sequentibus.
 Cingulum. 373. 25.
 Circinus. 373. 27.
 Κοί. 316. 40.
 Κοί. 316. 39.
 Κοί. 316. 39.
 Cola. 371. 18.
 Colaba. 371. 18.
 Colabam. 371. 18.
 Colcotana. 356. 4.
 Coloma. 357. 3.
 Coma agrypnos. 301. 15.
 Coma duplex. 317. 19. & 326. 13.
 Coma unde dicitur. 316. 37. & 323. 16.
 Coma duplici cataphorae commune nomen. 326. 23.
 Comatis nomen quid significat. 322. 36.
 Comatis uigilis species duae. 328. 2.
 Comatesorum & ebriorum conuenientia & differentia. 323. 27.
 Congelatio. 318. 17. & 320. 38.
 Copi error. 318. 8.
 Cornarij error. 302. 9. & 360. 40. & 365. 29.
 Cornu. 301. 15. & 333. 40. qua parte nascitur. 334. 13.
 Cornua. 372. 29.
 Coruus. 368. 41.
 Cossis. 372. 37.
 Cossis. 372. 37.
 Κω. 316. 37.
 Κω. 316. 41.
 Κω. 316. 40.
 Cugile. 369. 30.
 Cuma. 20. 36.
 Cynanche. 371. 28.
 D.
 Dasyma. 363. 27.
 Dasyses. 363. 27. & 364. 9.
 Definitionum libri error. 337. 23.
 Definitionum libri locus. 333. 34.
 Deplumatio. 360. 30.
 Derba. 373. 12.
 Desideriolum. 365. 42.

Desiderium 365.40.
 Dionysisci. 372.27.
 Dioscuri. 369.33.
 Diffuris 363.32.
 Drasnotus. 365.22.
 Dubellet. 316.10.

ἐκβρασμα. 302.28.
 Ecbrasma unde dicitur. 302.28.
 Ectepismos. 352.8.
 Ectropion. & unde dicitur. 362.37.
 Eczesma 301.10. = 302.8. unde dicitur.
 302.22.37.

ἐκζέσμεα. 302.8.22.
 ἐκζέσμεα quæ. 303.30.
 Elcydriion. 301.11.
 ἐκζέσμεα. 303.41.
 ἑλός quid. 320.11.

ἐλόςδεῖς febris. 320.10.

Emphysema. 367.22.
 Ephelis 372.41.
 Ephelis unde dicitur. 373.3.
 Epinyctis Plinij. 369.3.
 Epiphora. 352.35. = 353.3.
 ἐρπετὶ i pediculi. 350.6.
 ἐρπετὶ serpent. 350.7.
 Exanthema. 301.14.
 ἐξάνθημα. 305.18.

F.

Fartis. 354.14.
 Fater. 313.35. = 314.13.
 Fatra. 301.16. = 313.35. = 333.27.
 Febres elodes. 320.10.
 Febres typhodes. 320.12.
 Ficositas. 304.13.
 Ficosum exanthema. 301.13.
 Ficus. 301.10. = 304.12. quid & eius
 loci. 304.19. cause. 304.22. calidus
 tumor. 27 species duæ. 29.

Filca 366.21.
 Fissura 364.41.
 Folium quid. 372.12.
 Formix. 373.21.
 Fornax ibidem.
 Fornix. ibidem.
 Fruticem. 314.13.
 Fugille. 369.31. = 370.10.
 Fugule 369.31.
 Fungus super cerebri membrana. 313.35.
 Furfuratio symptoma. 344.5. = 345.20.
 Furfures apud Plinium peior affectus
 porrigine. 342.12. quomodo a porris

gine differt. 346.24.
 Furfures & furfur. 341.8. unde dican
 tur. 341.32.
 Furfures Plinij & porrigo. 341.36.
 Fururati. 314.13.
 Futurati. 314.12.

G.

Galenī contradictio. & solutio. 316.13.
 Galenī defectus. 310.19.
 Galsama 372.8.
 Galsania. 372.8.
 Ganaga. 313.35.
 γαγγλίον. 305.34.
 Ganglion. 301.16. = 305.34.
 Ganglium. 305.34. = 306.6.
 Ganglij loca 305.14.
 Garab. 368.39.
 Gardan. 351.5.
 Geffir. 375.12.
 Gentilis & aliorum expofitorū error.
 309.9.

Geffe. 355.21.
 Giennun mefrat. 313.30.
 Glandule Avic. 305.16.
 Glandule magnæ. 376.10.
 Glossometebos. 370.39.
 Gongrona 371.36.
 Goffi. 72.37.
 Goffoni. 372.37.
 Grando. 366.23. = 367.38.
 Granula 366.41.
 Granulosa scabies. 363.36. 41.
 Guardan. 351.5.
 Guardinigi. 354.5.
 Gutta rabida. 374.11.
 Gutta rosacea ibidem. 15.
 Gutta rosea. ibidem. 16.
 Gutta rubea. ibidem. 10.
 Gutta ruonia ibidem. 10.
 Gutta serena. 360.23.
 Gutubernia. 372.16.
 Gynæcomaflos. 375.10.

H.

Hagiloms. 369.16.
 Halbarda. 366.41.
 Haliabbatis error. 310.30.
 Herpes esthiomenos. 373.32.
 Hiatalatio. 353.27.
 Hidroa quæ apud Celsum. 303.10.
 Hidroa secundū Hippocrate in æstate. se
 cundū Celsum in vere. 303.13.
 Hippocrates non uisur epithetis ociosis ut
 Poete. 325.26.
 Hippocratis mos de contrariorū enuntias
 tiene. 324.12. de indicando alterum.

alterū uerò subindicando. 325.13. & sic
 ea necessariorum usum. 327.25.

Hordeolum. 365.25.
 Hydatis. 364.39.
 Hydroa. lege Hidroa. sic n. scribendum
 semper erat Græcè ἵδρωα.
 Hydrocephalos. 301.10.
 Hydrocephalus. 305.41. eius species et
 cause. 308.4.
 Hymenepanassasis. 358.2.
 Hypochyma. 357.18.
 Hypopion. 372.33.

I.

Ichor Celsi quid. 347.6.
 Ichor quid apud græcos Aulbores. 346.
 27.
 Ichor sanguinis alijs mitior. 347.30.
 Ichor aliorum humorum qualis. 347.32.
 Ichor uenenosa qualitate affectus. 347.
 35.

Ignis agrestis. 373.5.
 Ignis syluaticus. 373.5.
 Ignis uolagius. 373.12.
 Imaginatio in oculis. 360.23.
 Inbordatura. 307.27.

K.

Karabitus. 310.22.
 Kermusilis. 354.2.
 Ketaman. 358.21.

L.

Lactucium. 335.7.
 Lactumen. 301.4. = 335.7.
 Lagophthalmos. 362.36. unde dicitur
 363.2. & sequentibus.
 Latimum 335.7.
 Lemides. 342.33.
 Lepores aperti oculis dormiunt. 363.5.
 Lethargici. 314.35.
 Lethargia. 314.35. unde dicitur. 315.8.
 Lethargi locus. 315.30.
 Lethargos 301.13. = 313.35. = an ex sola
 intemperie. 316.14. duplex. 316.20.
 unde dicitur. 314.38. = 315.1. = 314.
 20.

Lethe. 314.39. = 315.1.
 Letbum. 314.41.
 Letbusa. 314.39.
 Leuce inter tumores a Fuchio numerat
 tur. 301.28.
 Leucoma. 362.4.
 Lippitudo Barbarorum. 355.23.
 Lippitudo Romanorum. 353.1.
 Litbiasis. 367.4.
 Lupia quid & unde dicitur. 367.37.
 Lupia Guidonis a lupia Theodoricī dif

Ferl. 367. 41.
Lupus. 373. 24. quare carnes comedere dicitur. *ibidem.* 37.

Lusciti. 358. 27.

Luscio. 358. 28.

Lusciosi. 358. 27.

Luscitiosi. *ibidem.*

M.

Macula in oculo. 357. 21.

Madarosis quid. & unde. 361. 23.

Madisis. 361. 24.

Manardi error. 307. 12. de *acylosis* 313.

3. 334. 25. 335. 23.

Marcelli Virgilij error. 342. 17.

Mater puerorum. 309. 40.

Meliceria Celsi quid. 347. 7.

Membraneruptio. 358. 3.

Mialana erolii. 357. 24.

Milphi qui. 361. 20.

Milphosis quid. *ibidem.*

Minnula. 365. 13.

Morum. 367. 29.

Motes immores. 351. 1.

Mydesis. 368. 4.

Mydriasis. 360. 10.

ΜΥΝΤΕΣ. 313. 40.

N.

Napta. 375. 34.

Nata. *ibidem.* 35.

Natta. *ibidem.* 34.

Neditus. 369. 32.

Nephelion Aetij. 356. 37.

Nephelion Pauli. 356. 26.

Nephresis. 310. 26.

Nephritis. *ibidem.*

Noli me tangere. 373. 14. unde dicitur.

ibidem. 19.

Noutelinie. 353. 41.

Nyctalopia quid. 358. 9.

Nyctalopes. *ibidem.* 20.

Nyctalops unde dicitur. *ibidem.* 30.

ΝΥΚΤΟΡ. 314. 31.

ΝΥΚΤΟΤΗΣ. *ibidem.*

O.

Oblivio. 314. 38.

Obstupefactio. 320. 26.

Oedema palpebrarum. 367. 23. & sequentibus.

Ophiasis. 301. 26. Eius nomen unde dicitur quadruplex ratio. 338. 1. & sequentibus.

Ophiasis tortuositas unde. 338. 28. Eius causae. *ibidem.* 36.

Ophiasis uerior nominis ratio. 339. 21. nomen commune toti, licet capiti ascribatur. 340. 17.

Ophthalmia qd et unde dicitur. 352. 39.

Ozena. 370. 17.

P.

Pachyrris. 364. 31.

Palpebrarum usus. 340. 24.

Pannus in oculo. 357. 10.

Papillae. 301. 11. 303. 20. 365. 14.

Papulae. 302. 17.

Paracynanche. 371. 28.

Paralethargus. 316. 32.

Paralysis. 333. 9.

Paraphrenitis. 316. 32.

Paraplegia. 333. 10.

Parasynanche. 362. 31. 371. 31.

Parejis. 333. 8.

Parotis. 369. 28. calidus tumor. 370. 12.

an ex sola intemperie. 347. 41.

Pauli æginetæ error. 309. 20. 310. 29.

Pauli locus expositus. 318. 33. 345. 25.

Pedicelli. 351. 9.

Pediculatio. 349. 27.

Pediculationis causa humoralis. 350. 28.

Pediculi cur dicti serpentes. 350. 8.

Pediculi Pharaonis. 349. 29.

Pediculi quomodo Græcè dicuntur. 349.

26.

Pedicularum generatio. 350. 1.

Pedoscilli. 351. 9.

περι in compositione quid significet.

302. 23.

Peripneumonia. 375. 22.

περι μὲν τα. 302. 13.

περι μὲν τα. 302. 14.

Phalacrofis. 341. 4.

Pherea. 369. 34. 370. 3.

Pherecydes pediculari morbo peremptus.

349. 35. 350. 5.

Pheres. 370. 3.

Φή. 369. 38.

Phlegmone ex omnibus humoribus. 315.

38.

Phrenesis. 310. 22.

Phrenitides & causi ejusdem ex causis.

325. 22.

Phrenitis. 301. 12. 310. 4. 310. 25.

Eius species. 313. 22. Eius locus. 315. 29.

Phrenitidis ratio in quo. 313. 8.

Phibás. 371. 16.

Φθίς unde dicitur. 350. 38.

Phthiriasis. 301. 26. 349. 24.

Phthiis. 375. 24.

Phthoe. *ibidem.*

Piattole. 351. 3.

Pityriasis. 301. 26. 341. 7. Eius causae

341. 41. species. 343. 37. Generas

elo qualis. 345. 1.

πύρις. 341. 9.

Pityriasis humida quæ. 346. 6.

Pityriasis duplicis signa distinctius.

346. 9.

Pityriasis urinae. 341. 11.

πύρις. 341. 8.

Pladaron. quid. 362. 1.

Pladarotes. 361. 49.

Pleuresis. 310. 25.

Pleuritis. 310. 29. 375. 16.

Pleuritis ab omnibus humoribus. 315. 38.

Pliny locus. 350. 4.

Poriasis. 367. 1.

Porrigo Celsi. Q. S. & Horatij. 341.

24. Unde dicitur. *ibidem.* 33.

Porrigo & furfures. Plinij. 341. 37.

346. 23.

Porosis. 367. 2.

Posthia. 365. 27. & sequentibus.

Præputium. 365. 29.

Proptosis Galeni. 352. 2. Eius causae.

352. 5.

Proptosis. Pauli. 360. 25.

Propsochyis. 362. 24.

Psoia. 355. 2. 364. 19.

Psorophthalmia. 364. 16. 365. 16.

Ptilosi an insit glabrities necessario. 361.

15.

Ptilosis unde dicitur. 360. 29.

Pustula palpebrarum. 368. 11.

Pustulae glandosae apud Auic. 307. 31.

Pustularum species apud Celsum sepi.

304. 2.

R.

Rete mirabile & eius apostema. 312.

33.

Rbia alfabian. 301. 14. 311. 26. 333.

26.

Rosarium. 354. 5.

Ruua. 335. 15.

S.

Saccos. 320. 41.

Sacculos. 313. 18.

Sachos. *ibidem.* 40.

Sachafilus. 313. 18.

Sacrifition. 375. 21.

Sabara. 320. 34.

Sabara subethia. *ibidem.*

Sanies apud Celsum. 347. 5.

Sarcoma. 370. 23.

σάρκωμα πικρὸν ἢ λυγρὸν.

Sarcosis. 367. 31.

Sarnach. 365. 3.

Sathere. 363. 11.

Satyri Feræ dicuntur. 369. 36.

- Saryriasmus. 370. f.
 Scabies granulosa. 363. 37. 366. 41.
 Scabusia. 375. 21.
 Scaculos. 313. 19.
 Scarnabe. 362. 20.
 Sebernac. 365. 12.
 Scinos. 354. 7.
 Scirrophthalmia. 355. 32.
 σκίρ ρ ω σις. 355. 29.
 Scleriosis palpebrarum. 368. 16.
 Sclerophthalmia. 355. 12. 368. 17.
 Sebel. 357. 22.
 Sebequera. 359. 13.
 Secati. 333. 8.
 Sekakilos. 301. 10. 313. 18. 333. 23.
 Selaba. 376. 11.
 Serafiph. 357. 25.
 Shari subethia. 320. 34.
 Sibare. 301. 15. 313. 30. 333. 27.
 Sideratio. 332. 40.
 Silac. 361. 31.
 Siriafis. 301. 11. 308. 37. Vnde dicitur.
 308. 40. Eius causa. 309. 29.
 Siriafis non est tumor. 309. 39.
 Siros Græce quid. 308. 41.
 Sirsen. 310. 21.
 Sopor. 332. 25.
 Sosata. 375. 19.
 Sosati. 375. 18.
 Sparganosis. 374. 23.
 σπ γ ν ω σις. 307. 17.
 Squinania. 371. 34.
 Subeth. 320. 24. 332. 22.
 Subeth uigilantia. 320. 31.
 Subeth alsbahi. 320. 30.
 Subet sabara, seu alsabara. ibidē.
 Subrucati. 359. 13.
 Succos. 320. 41.
 Sucufuris. 363. 33.
 Suda. 367. 28.
 Sulach. 365. 21. 366. 31.
 Sulatum. 365. 20.
 Superciliorum usus. 340. 24.
 Susati. 362. 5.
 Sicon. 301. 12.
 σικον. 304. 12.
 συ κ ω δ ες ε ξ α ν θ η κ α. 304. 13.
 συ κ ω δ ης ε π α ν α σ τ ο ις. 304. 14.
 σύ κ ω σις. 304. 12.
 Sycofis. 363. 25. 364. 12.
 Sylla dictatori Cornelia domo primus cre-
 matus est. 350. 15.
 Sylla dictator pediculari morbo perem-
 ptus. 350. 10.
 συμ β ε β η κ ος. 344. 11.
 Symphyfis. 362. 23.
 Synanche. 371. 29.
 Synchyfis. 357. 37. 359. 33.
 T.
 Tagaultij error. 334. 25.
 Talpa. 301. 12. 334. 3. 16. et. 22.
 Talparia. 334. 22.
 Tarachfis. 352. 33.
 Tarasfis. ibidem. 32.
 Taraxis qd. & unde dicitur. ibidē. 25.
 Tarsam. 356. 14.
 Tarkinifis. 353. 41.
 Tarsos. quid. 365. 27.
 Tassam. 356. 15.
 Tebegi. 362. 12.
 Testudo. 301. 11. 333. 32.
 Thebebusi. 362. 21.
 Thebegi. ibidem. 12.
 Theres. 370. 3.
 θ η λ α ι. 303. 25. 365. 14.
 θ υ β. 369. 37.
 Thrombosis. 374. 26.
 Tosatio. 367. 2.
 Tosus. ibidem.
 Topinaria. 301. 13. 334. 4. 21. & 38.
 Trachoma. 363. 24.
 Trachytis. ibidem. & 364. 10.
 Trebel. 362. 11.
 Trichiasis. 374. 29.
 Tricutis. 363. 33.
 Tulufuis. 363. 34. Vbi male impressum
 est. & fulufuis.
 Tylosis. 363. 26. 364. 13.
 Τύ φ ω. 320. 12.
 Τύ φ ω μ α ι. 320. 13.
 Typhodes febres. 320. 12.
 Typhomania. 301. 14. 316. 35. Vnde
 dicitur. 320. 6. 327. 7.
 Typhonia. 320. 23. 321. 17.
 Tyria. 338. 20.
 υ δ ρ ο κ ι φ α λ ο γ πα θ ος. 307. 41.
 V.
 Varulus. 366. 20.
 Veditus. 369. 32.
 Vesalij defectus. 310. 20.
 Vestigium rusum. 374. 16.
 Vetrinus. 314. 20.
 Vlculcula quæ secundum Celsum. 303. 39.
 Vulpis lotium herbas arefacit. 337. 20.
 Vulpium morbus. 337. 11.
 X.
 Xerophthalmia quid. 354. 15. Vnde di-
 citur. ibidem. 25.
 Xatratis. 363. 18.
 Z.
 Ζέ μ ο ν. 302. 13.
 Ζέ ω pro ferueo. 302. 11.
 Ζέ ω pro scatco. 302. 36.
 Ζέ σις. 302. 12.
 Ζε σ ος. ibidē.
 Zona. 373. 26.
 Zoster. 373. 27.

CHARTARVM SERIES.

† a b c A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T
 V X Y Z. AA BB CC DD EE FF GG HH. Omnes sunt ternioz
 nes præter. a. quaternionem.

NEAPOLI OCTAVO IDVS MADII. M. D. LIII.

DONATVS CRASSVS ALEXANENSIS

Salentinus Authoris discipulus ad Lectorem.

IN Noua si fertur tua mens, occasio nunc est:
Perlege, non dubito quin faciatu eris.
Perlege, ne credas alijs hæc scripta libellis,
Vt multi obseruant scribere quæ alterius.
Inuenies Priscis, asl hæc immersa tenebris,
Erratis multis, ordinibus ue malis.
Corrigit, ac uertit, curtat, referatq; nouatq;,
Conciliat soluens, indigitatq; loca.
Nomina morborum perdocto inuenta Philippo
Concipias animo, si medicare cupis.
Haud poterat quisquam recte curare tumores,
Hoc sine, si tentet, consulibus medicis.
Manardus cæpit, Tagaultius illa resumpsit,
Fuchsius haud aliter. Nil renouare uolunt.
Non hæc mens nostro est, aliorum inuenta, Philippo
Carpere, sed proprijs gaudet, & alta petit.
Quisquis adhuc fuerit libri lacerator iniquus,
Mens precor & guttur sit lacerata manus.
Si tamen instimulat, ratione, uel arte repugnans,
Sit felix donis corporis, ac animi.

Quæ per totum reperijs errata, tã in Græcis, q; Latinis
diſtinctionibus corrigere facillimè poteris.

